


حساب پاڻو - I

درجو ڏهون



$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 3 + \dots + \dots + 78 + 79 + 80 \\ & = (1 + 80) + (2 + 79) + \dots + (39 + 42) + (40 + 41) \end{aligned}$$

پارتيه سنوڌان

باب - چوٿون الف

بنيادي فرض

قلم 51A

بنيادي فرض : پارت جي هر هڪ ناگرڪ جو فرض آهي ته :

(الف) هو پارت جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي تراني، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.

(ب) آدرش ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اُتساه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.

(پ) پارت جي ايڪٽا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.

(پ) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سيوا ۾ ٽپي پوندو.

(پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪٽا جي پاونا پئدا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪيترواد جي پيداڻ کان پري هوندي. اهڙيون رسمون جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.

(ت) پارت جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجهندو.

(ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندو.

(ت) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، چاچ جوڇ ۽ سڌاري جي پاونا کي اهميت ڏيندو.

(ث) عام ملڪيت کي سلامت رکندو ۽ هنسا کان پري رهندو.

(ت) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ۾ اڳتي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جنهن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.

(ڪر) ماءُ يا پيءُ يا ڀالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر چهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

سرڪاري فيصلو نمبر : آڀياس ۲۱۱۶ (پر.ڪر ۱۶/۱۴) ايس.ڊي ۴ تاريخ ۲۰۱۶-۴-۲۵
موجب استاڻت ڪيل ڪو آرڊينمينٽ ڪاميٽيءَ جي تاريخ ۲۰۱۷-۱۲-۲۹ جي ميٽنگ ۾ هن
درسي ڪتاب کي سنه ۱۹-۲۰۱۸ کان مختصر طور منظوري ڏني ويئي آهي.

حساب

پاڻو - I

درجو ڏهون



مهاراشتر راجيه پائيه ڀستڪ نرمي واپياسڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي



پنهجي سمارت فون ۾ DIKSHA APP ذريعي درسي ڪتاب جي پهرين
صفحي واري Q.R. Code ذريعي Digital درسي ڪتاب ۽ هر هڪ سبق ۾ آيل
Q.R. Code ذريعي ان سبق بابت پڙهڻ / پڙهائڻ لاءِ ڪارائتيون لنڪس
ملنديون.

© مهاراشر راجيه پائيم پستڪ نرمتي واپياس ڪرم سنشودن منڊل،
پڻي - ۲۰۱۰/۱۱/۱۴.

چاپو پهريون : 2018
سڌاريل چاپو : 2022

مهاراشر راجيه پائيم پستڪ نرمتي واپياس ڪرم سنشودن منڊل، هن
ڪتاب جا سڀ حق واسطا محفوظ ٿو رهي. منڊل جي ڊائريڪٽر جي لکيل
اجازت ڪانسواءِ هن ڪتاب جو ڪوبه ٽڪر، ڇپائي نٿو سگهجي.

حساب وشيم ماهر ڪاميٽي

ڊاڪٽر منگلا نارڙيڪر (اڏيڪش)
ڊاڪٽر جئشري آتري (ميمبر)
شري رماڪانت سرودي (ميمبر)
شري وناٿڪ گوڙ بولي (ميمبر)
شريمتي پراجڪتا گوکلي (ميمبر)
شري سندیپ پنچ پائي (ميمبر)
شريمتي پوجا جادو (ميمبر)
شريمتي اجولا گوڙ بولي (ميمبر - سيڪريٽري)

مڪيم سنيوچڪ: شريمتي اجوالا شريڪانت گوڙ بولي

انچارج آفيسر حساب،
پائيم پستڪ منڊل پڻي
ٻاهريون صفحو ۽ ڪمپيوٽر آريڪن:
شري سندیپ گوڙي
ممبئي

سنيوچڪ: شريمتي ڪيتڪي جاني

انچارج آفيسر سنڌي.
سنيوچن: شريمتي گيتا گڻيش ناڪر
ڪاپي رائٽر سنڌي
شري سچيتانند آفڙي، مڪيم نرمتي اڌڪاري
شري سنجي ڪانڊلي، نرمتي اڌڪاري
شري پرشانت هرڻي، نرمتي سهايوڪ اڌڪاري
ترجمو ڪندڙ: شري اشوڪ ڪملداس مڪنا
چڪاس ڪندڙ: شري وجيه راجڪمار منگلاڻي.
ڪاغذ: 70 جي. ايس. ايم ڪرپرو.
چاپيندڙ:
پرڻنگم آرڊر:

حساب وشيم ڪاربه گت ميمبر

شري اميش رنڙي	شري شريڪانت رتنپارڪي
شري سنيل شريواستو	شري اروند ڪمار توارڻي
شريمتي جيشري پرنڌڙ	شري سريش داتي
شريمتي تروپين پوپٽ	شريمتي سورنا ديشپانڊي
شري اڳيا پريٽ	شري پرڪاش ڪاپسي
شري انساري عبدال حميد	شريمتي آريا پڙي
شري سندیپ سوناوڻي	شري ملند پاڪري
شري وسنت شيواڙي	شري گيانيشور ماشاڙڪر
شري ملبشام بيٽي	شري لڪشمڻ داوڻڪر
شري شريپاد ديشپانڊي	شري سڌير پائيل
شري پرتاپ ڪاشد	شري گڻيش ڪولتي
شريمتي سواتي ڌرم اڌڪاري	شريمتي روهڻي شرڪي
ڊاڪٽر ڀارتي شهسٽر بدي	شري بنسي هوالي
شري انسار شيخ	شري روبندر ڪنداري
شري راماهنياڙڪر	شري راجيندر چوڌري
شري ڀرمود دومبري	
شري پرڪاش جهيندي	

ٽائيپسٽنگ:

شريمتي شوپا لالچنداڻي

پرڪاشڪ

ووڪ اٽم گوساوي، ڪنٽرولر
پائيم پستڪ نرمتي منڊل،
پرياديوي، ممبئي - ۲۵.

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور
خودمختيار سماجواڊي سَرو ڌرم ۽ سر-ڀاؤ وارو
لوڪشاهي گُڙاجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو
ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگرڪن کي :

سماجڪ، آرٿڪ ۽ راجنيتڪ نڀاءُ، ويچار، اظهار،
وشواس، شرڌا ۽ اُڀاسنا جي آزاديءَ درجي ۽ موقعي
جي سمانتا؛ خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن
سڀني ۾ شخصي سَوَمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي
اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ ڀائپچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ ڇويهين
نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءُ سنوڌان
سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي
ارڀڻ ڪريون ٿا.

راشتر گيت

جَنَ گَرُ مَنَ اَڌيناڻڪَ جِيَهَ هِي،
پَارَتَ پَاڳِيَهَ وَڌاتا
پَنڄاڻَ، سَنڌَ، گُجراتَ، مَراڻا،
دِراوڙَ، اُتڪَلَ، بَنگَ،
وَنڌِيَهَ، هِماچَلَ، يَمُنا، گَنگا،
اُچَچَلَ، جَلِ ڌَ تَرَنگَ،
تَوَ شُپَ نامي جاڳي،
تَوَ شُپَ آشيَسَ ماڳي،
گَاهِي تَوَ جِيَهَ - گَاتا،
جَنَ گَرُ - مَنگَلَ داڻڪَ جِيَهَ هِي
پَارَتَ پَاڳِيَهَ وَڌاتا،
جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي،
جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ هِي،

پرتگيا

’پارت منهنجو ديش آهي. سڀ
پارتواسي منهنجا ڀائر ۽ پينر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي ٿورو آهي. مان سدائين ان جي
لائق ٿيڻ جو جتن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن مائٽن، استادن ۽
سڀني بزرگن جو سمن ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرتگيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سڄو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
۾ ئي منهنجو سک سميل آهي.’

پرستاونو

شاگرد دوستو

ڏهين درجي ۾ توهان جو سواگت حساب پاڻو - I ۽ حساب پاڻو - II اهي ڪتاب توهان کي هن سال آپيلاس ڪرڻا آهن.

حساب پاڻو - I ۾ الجبرا، آرٿ - يوجنا ۽ عدد شاستر اهي مکيه ڪيتر آهن نائين درجي ۾ انهن يونٽن جي سڃاڻپ ڏنل آهي. انهن بابت وڌيڪ آپيلاس هن سال ٿيندو. مالي - يوجنا ۾ GST اهو هڪ نئون باب، اُن بابت سڃاڻپ ڏنل آهي. جتي نوان پاڻا، سوٽر يا آپيوجن ڏنل هر هڪ باب ۾ حل ڪيل مثال، آپيلاس لاءِ مثال ان کان سواءِ هوشيار ٻارن لاءِ خاص للڪاري سوال ڏنل آهن. جيڪي خاص تاري نشانيءَ سان ڏنل آهن. جيڪي شاگرد ڏهين درجي بعد حسابن جو آپيلاس نه ڪرڻ وارا آهن انهن لاءِ هن ڪتاب ۾ حسابن جون بنيادي ويچار ڌارا ٿيون، ٻين ڪيترن ۾ ڪم ڪرڻ لاءِ حسابن جو استعمال وغيره ڏنل آهي. ”وڌيڪ ڄاڻ لاءِ ان سري هيٺ ڏنل مسودو، انهن شاگردن لاءِ ڪارگر ٿيندو جيڪي اڳتي، اوچي تعليم ۾ حسابن جو آپيلاس ڪرڻ وارا آهن. اهڙن شاگردن کي ان مسودي جو آپيلاس ڪرڻ گهرجي. اُٽپ جي ماديرو سيلبي ڪيو. آر. ڪوڊ ذريعي هر هڪ سبق جي وڌيڪ ڄاڻ توهان کي ملندي. انجو آپيلاس توهان کي آپيوڻ ٿيندو.

ڏهين درجي جو امتحان اهميت وارو سمجهو ويندو آهي. ان ٻالهه کي تناو سان نه ڪڍي شاگرد چڱيءَ طرح ڪتاب جو آپيلاس ڪري جس حاصل ڪندا. ان لاءِ شپ ڪامنائون.

(ڊا. سنيل مگر)

سنچالڪ

مهاراشتر راجيه پائيم پوسٽڪ

فرمتي و آپيلاس ڪرم سنشودن منڊل پڻي.

پڻي

۱۸ مارچ ۲۰۱۸، گڙي پاڙو

پارٽيه سوريه تاريخ: ۲۷ ڦاڳڻ ۱۹۳۹

درجي ڏهين حساب پاڻو I-آپياس ڪري شاگرد هيٺ ڏنل ليافتون حاصل ڪندا

ڪيتر	يونٽ	لياقت
1. عدد بيان	1.1 انگي پروگريشن	• انگي پروگريشن اُپيوگه ڪري مثال حل ڪرڻ • مستقبل ۾ ڪنهن خاص مسئلو حل ڪرڻ لاءِ ڏاڪيوار نيوچن ڪرڻ
2. آئيجبرا	2.1 بسڱهي مساوتون 2.2 بن ڦيرائڻن ۾ ليڪي مساوت	• وهنوار ۾ جيڪو مسئلو به سڱهي مساوت وسيلي پيش ڪري حل ڪرڻ • لفظي مثال سمجھي، مساوت ٺاهي حل ڪرڻ (هڪ ڦيرائڻو يا ٻه ڦيرائڻو) • لفظي مثالن کي بن ڦيرائڻن ۾ پيش ڪري، حل ڪرڻ
3. وهناري حساب	3.1 وهناري، حساب	• بچت، سيزڻپ انهن مڏن بابت سمجھڻ • واپار وڻج ۾ مالي وهنوار ۾ زباني - سڃاڻپ
4. عدد شاستر امكان	4.1 اِمكان 4.2 گراف مرڪزي	• راند، ووٽنگه وغيره ۾ اِمكان جو اُپيوگه • خاص حاصل ڦيل جاڻ جي ليڪا روپ ۾ گراف - گول گراف وغيره روپ ۾ پيشڪش • گروهيٺ ڪلاس مان سراسري، اڌڪ ۽ ڍنگه لهڻ

ماسٽرن لاءِ سوچنا

پهريائين ڪتاب جو سمورو آپياس ڪري سمجھو. جدا جدا روتن جي سمجھاڻي ۽ سوترن جي چڪاس ڪري، مشغوليون پوري ڪرڻ ۾ مدد ڪريو.

عملي ڪم وسيلي ملهه ماڻڻ ڪرڻو آهي. شاگردن کي خود - اظهار لاءِ همٿايو. ڪنهن شاگرد ڪو حساب. علمدي نموني حل ڪيو آهي ته اُن شاگرد کي شاباسي ڏيو.

عملي ڪم (لسٽ)

1. گراف پني تي X-محور يا Y-محور جي پوروچوٽ ليڪون ڪڍي، اُن ليڪ تي ڪهڙا به چار ٽپڪا کڻي مساوا لھو. مساوون مان ليڪي مساوت ڪيئن تيار ٿئي ٿي، اُهو لکو (پوروچوٽ ليڪن بدران منڊ - ٽپڪي مان به ليڪون ڪڍي سگھجن ٿيون).

2. ڪوبه به - انگي عدد من ۾ سوچيو اُن کي حل ڪرڻ لاءِ جدا جدا پروليون تيار ڪريو. عدد جي انگن ۾ جدا جدا لاڳاپا تيار ڪريو ۽ اُن عدد تائين پهچو. (مٿي ڏنل عملي ڪم ۾ رٿ - انگي عدد کڻي مشغولي ڪريو)

3. کاڌي جي پڌارتن جي پئڪيٽ مٿان لکيل تفصيل درج ڪري، مناسب گراف ڪڍو. مثال بسڪوٽ جي پئڪيٽ مٿان ڪاربوھٽڊريٽ، پروٽين، سٽپ، وٽامن وغيره يونٽن جو چچرو ڏسو. اُهو پئڪيٽ ڪيتري وزن جو آهي، اُهو ڇاپيو، وزن جو گراف ڪڍو. اُھڙي نموني ڪاربوھٽڊريٽ، پروٽين سٽپ ۽ ٻين يونٽن جا چار حصا ڪري سگھجن ٿا.

4. ماسٽرن طرفان ڏنل جھجھائي، ورهاست چچرو، ڪمپيوٽر تي Excel Sheet تيار ڪريو. ان چچري مان جھجھائي گھٽڪندو ۽ ڪالمر گراف Excel ۾ تيار ڪريو.

5. هڪ ڍارو ڇهه دفعا ڦٽي ڪري، حاصل ٿيل نتيجا نوٽ ڪري چچرو ٺاهيو.

6. ماسٽرن طرفان سمجھايل جي. ايس. ٽي. وهنوار جو انوائز ڏسو. سڀني مڏن کي درج ڪريو. اُن تي ٽئڪس ڪيئن ڪڍجي اُهو ڪٽڻ کانپوءِ خاطري ڪريو.

7. ماسٽرن طرفان ٻڌايل پهريان 'n' سلسلي ۾ قدرتي عددين جو جوڙ ڪري ڏسو. مثال 1 کان 4 تائين قدرتي عددين جو جوڙ 4x5 هڪ چوڪنڊو تيار ڪريو.

شڪل اَنوسار اُھڙو ڪاغذ ڪپيو (هتي n=4) ته ان سوتر ۾ $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \therefore S_4 = \frac{4(4+1)}{2} = \frac{4 \times 5}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

(ٽپ : هتي a=1, d=1 آهي اُھڙي نموني جدا جدا ملھ ۾ بدلائي،

اڪي ۽ ٻڌي عدد کڻي مشغولي ڪريو.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

8. هڪ ڪارڊ جي پٺيان $\alpha = 6$ ۽ $\alpha = -6$ ٻئي ڪارڊ تي $\beta = -3$ ۽ $\beta = -7$ ائين لکو جدا جدا ملھ کڻي به سگھي مساوتون تيار ڪريو.

فهرست

باب	صفحہ
-----	------

1. ہن قیرائنن ۾ لیکي مساوتون 1 کان 29
2. پسگهي مساوتون 30 کان 54
3. انگي پروگریشن 55 کان 80
4. مالي رقا 81 کان 112
5. امکان 113 کان 128
6. عدد شاستر 129 کان 168
- جواب 169 کان 176

ٻن ڦيرائتن ۾ ليڪي مساوتون

1

اچو ته سڳون



- ٻن ڦيرائتن ۾ ليڪي مساوتن کي حل ڪرڻ جا طريقا - گرافتي طريقو ڪريمرس طريقو
- ٻن ڦيرائتن وارين ليڪي مساوتن ۾ بدلائڻ جو ٻيون مساوتون
- هر وقتي مساوتن جا حل

ذرا ياد ڪريو



ٻن ڦيرائتن ۾ ليڪي مساوتون (Linear equation in two variables)

جن مساوتن ۾ ٻه ڦيرائتا ڪم آندل هجن ۽ ڦيرائتن جي سڳهه 1 آهي انهن مساوتن کي ٻن ڦيرائتن واريون ليڪي مساوتون چوندا آهن اهڙين مساوتن جو آپياس آسان نائين درجي ۾ ڪري چڪا آهيون.

$ax+by+c=0$ اهو ٻن ڦيرائتن ۾ ليڪي مساوت جو عام روپ آهي. اسان کي ڄاڻ آهي ته هنن مساوتن ۾ a ۽ b جو ملهه 0 (بڙي) نه هئڻ گهرجي.

مثال: $3x=4y-12$ هن مساوت جو عام روپ (پرمائڪ روپ) $3x-4y+12=0$ آهي.

مشغولي: هيٺ ڏنل فهرست پوري ڪريو

نمبر	مساوت	ٻن ڦيرائتن ۾ ليڪي مساوت آهي يا نه؟
1	$4m + 3n = 12$	آهي
2	$3x^2 - 7y = 13$	
3	$\sqrt{2}x - \sqrt{5}y = 16$	
4	$0x + 6y - 3 = 0$	
5	$0.3x + 0y - 36 = 0$	
6	$\frac{4}{x} + \frac{5}{y} = 4$	
7	$4xy - 5y - 8 = 0$	

هم وقتي مساوتون (Simultaneous linear equations)

جڏهن ٻن ڦيرائتن وارين ٻن ليڪي مساوتن جو هڪ وقت تي عام حل ملي ٿو ته انهن مساوتن کي هم وقتي مساوتون چئجي ٿو.

نائين درجي ۾ ڦيرائتو رد ڪرڻ وارو طريقو ڪم آڻي مساوتون حل ڪرڻ جو طريقو آسان سڳيو آهي. اچو ته ان جو ٿورو اڀياس ڪريون.

مثال (1) هيٺ ڏنل هم وقتي مساوتون حل ڪريو :

$$5x - 3y = 8; \quad 3x + y = 2$$

سمجهاڻي (حل)

$$5x - 3y = 8 \quad \text{--- (I) طريقو I :}$$

$$3x + y = 2 \quad \text{--- (II)}$$

مساوت (II) کي ٻنهي پاسي 3 سان ضرب ڪريو

$$9x + 3y = 6 \quad \text{--- (III)}$$

$$5x - 3y = 8 \quad \text{--- (I)}$$

هاڻي مساوت (I) ۽ (III) جوڙ ڪريو

$$\begin{array}{r} 5x - 3y = 8 \\ + \quad 9x + 3y = 6 \\ \hline 14x = 14 \end{array}$$

$$\therefore x = 1$$

هاڻي $x=1$ جو اهو ملهه مساوت (II) ۾ رکيو

$$3x + y = 2$$

$$\therefore 3 \times 1 + y = 2$$

$$\therefore 3 + y = 2$$

$$y = -1$$

$$\therefore x = 1, y = -1$$

$(x, y) = (1, -1)$ اهو مساوتن جو حل آهي.

طريقو (II)

$$5x - 3y = 8 \quad \text{--- (I)}$$

$$3x + y = 2 \quad \text{--- (II)}$$

مساوت (II) ۾ y جو ملهه x جي نسبت ۾ لکيو

$$y = 2 - 3x \quad \text{--- (III)}$$

هاڻي y جو اهو ملهه مساوت (I) ۾ رکيو

$$5x - 3y = 8$$

$$\therefore 5x - 3(2 - 3x) = 8$$

$$\therefore 5x - 6 + 9x = 8$$

$$\therefore 14x - 6 = 8$$

$$\therefore 14x = 8 + 6$$

$$\therefore 14x = 14$$

$$\therefore x = 1$$

هاڻي $x=1$ جو اهو ملهه مساوت III ۾ رکيو

$$y = 2 - 3x$$

$$\therefore y = 2 - 3 \times 1$$

$$\therefore y = 2 - 3$$

$$\therefore y = -1$$

$$\therefore x = 1, y = -1$$

$(1, -1)$ اهو مساوتن جو حل آهي.

مثال (2) حل ڪريو: $3x + 2y = 29$; $5x - y = 18$

حل : (I) $3x + 2y = 29$. . . (II) $5x - y = 18$. . .

ڏنل مساوتن کي y ڦيرائڻي کي رد ڪرڻ واري طريقي سان حل ڪريو. ان لاءِ هيٺ ڏنل چؤڪنڊن

۾ صحيح انگ لکو. مساوت (II) کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان

$$\therefore 5x \times \boxed{} - y \times \boxed{} = 18 \times \boxed{}$$

$$\therefore 10x - 2y = \boxed{} \text{ . . . (III)}$$

مساوت (I) ۾ مساوت (III) جوڙ ڪرڻ سان

$$\begin{array}{r} 3x + 2y = 29 \\ + \boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \\ \hline \boxed{} = \boxed{} \end{array} \therefore x = \boxed{}$$

$x=5$ اهو ملهه مساوت (I) ۾ رکڻ سان

$$3x + 2y = 29$$

$$\therefore 3 \times \boxed{} + 2y = 29$$

$$\therefore \boxed{} + 2y = 29$$

$$\therefore 2y = 29 - \boxed{}$$

$$\therefore 2y = \boxed{} \therefore y = \boxed{}$$

اهو حل آهي $(x, y) = (\boxed{}, \boxed{})$

مثال (3) $15x + 17y = 21$; $17x + 15y = 11$

حل : (I) $15x + 17y = 21$. . .

(II) $17x + 15y = 11$. . .

هنن ٻن مساوتن ۾ x ۽ y جا ضربيندڙ اڌل بدل ٿيل آهن. اهڙين مساوتن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن کي جوڙ

ڪرڻ ۽ ڪٽ ڪرڻ سان ٻه نئون سؤليون مساوتون ملن ٿيون. انهن مساوتن کي حل ڪرڻ سان حل سؤلائيءَ سان

ملي ٿو.

مساوت I ۽ II جوڙ ڪرڻ سان

$$\begin{array}{r} 15x + 17y = 21 \\ + 17x + 15y = 11 \\ \hline 32x + 32y = 32 \end{array}$$

مساوت جي ٻنهي پاسي 32 سان ونڊ ڪريو

$$x + y = 1 \quad \dots \quad (III)$$

مساوت (I) مان مساوت (II) ڪٽ ڪريو

$$\begin{array}{r} 15x + 17y = 21 \\ - \\ 17x + 15y = 11 \\ \hline -2x + 2y = 10 \end{array}$$

مساوت جي ٻنهي پاسي 2 سان ونڊ ڪريو.

$$- \quad x + y = 5 \quad \dots \quad (IV)$$

مساوت (III) ۽ (IV) کي جوڙ ڪريو

$$\begin{array}{r} x + y = 1 \\ - + \\ x + y = 5 \\ \hline \therefore 2y = 6 \quad \therefore y = 3 \end{array}$$

$y=3$ اهو ملهه مساوت (III) ۾ رکيو

$$x + y = 1$$

$$\therefore x + 3 = 1$$

$$\therefore x = -2 \quad \therefore x = 1 - 3$$

$(-2, 3) = (x, y)$ اهو مساوتن جو حل آهي.

آپيٽاس 1.1

1. هيٺين مشغولي پوري ڪري هر وقتي مساوتن کي حل ڪريو.

$$5x + 3y = 9 \quad \text{-----} \quad (I)$$

$$2x - 3y = 12 \quad \text{-----} \quad (II)$$

مساوت (I) ۽ (II) کي جوڙ ڪريو

$$\begin{array}{r} 5x + 3y = 9 \\ + \\ 2x - 3y = 12 \\ \hline 7x = 21 \\ x = \frac{21}{7} \quad x = 3 \end{array}$$

$x=3$ ملهه پهرين مساوت ۾ رکيو

$$5 \times \boxed{} + 3y = 9$$

$$3y = 9 - \boxed{}$$

$$3y = \boxed{}$$

$$y = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \boxed{}$$

$(x, y) = (\boxed{}, \boxed{})$ اهو مساوتن جو حل آهي.

2. هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو :

- (1) $3a + 5b = 26; a + 5b = 22$ (2) $x + 7y = 10; 3x - 2y = 7$
 (3) $2x - 3y = 9; 2x + y = 13$ (4) $5m - 3n = 19; m - 6n = -7$
 (5) $5x + 2y = -3; x + 5y = 4$ (6) $\frac{1}{3}x + y = \frac{10}{3} \quad 2x + \frac{1}{4}y = \frac{11}{4}$
 (7) $99x + 101y = 499; 101x + 99y = 501$
 (8) $49x - 57y = 172; 57x - 49y = 252$

ذرا ياد ڪريون



ٻن ڦيرائين وارين ليڪي مساوتن جو گراف (Graph of a linear equation in two variables)


اڄ واري درجي ۾ توهان سکيا آهيو ته ٻن ڦيرائين ۾ ليڪي مساوت، هڪ ليڪ ڏيکاري ٿي. جيڪو انگن جو جوڙو ڏنل مساوتن کي صحيح جو حل آهي. گراف ۾ انهن جو جوڙو هڪ ٽپڪي وسيلي ڏيکاري سگهجي ٿو.

مثال : $2x - y = 4$ هن مساوت جو گراف ڪڍو.

حل : $2x - y = 4$ هن مساوت جو گراف ڪڍڻ لاءِ (x, y) جا 4 جوڙا حاصل ڪريو.

انگن جا جوڙا ٺاهڻ وقت x ۽ y جا ملهه 0 (ٻڙي) کڻڻ سهوليت ڀريا ٿيندا آهن.

x	0	2	3	-1
y	-4	0	2	-6
(x, y)	(0, -4)	(2, 0)	(3, 2)	(-1, -6)



ٻن ڦيرائتن ۾ ليکي مساوتن جا گراف ڪڍڻ وقت هيٺين ڏاڪن تي ڌيان ڏيو.

ڏنل مساوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 4
انگن جا جوڙا ڳولهيو

گراف پني تي x -محور ۽ y -محور ڪڍي
ٽپڪا نشان ڪريو.


سڀ ٽپڪا هڪ ليڪ ۾ هٽڻ گهرجن.
انهن سڀني ٽپڪن مان هڪ ليڪ ڪڍو.

ليڪ ڪڍڻ لاءِ ٻه ٽپڪا ڪافي آهن پر انهن مان هڪ ٽپڪو غلط نشان ڪرڻ سان، ليڪ ڪڍڻ ۾ ٽي غلط ٿي ويندي آهي. ٽي ٽپڪا نشان ڪرڻ سان جيڪڏهن هڪ ٽپڪو غلط نشان ڪيل آهي ته ٽيئي ٽپڪا هڪ ليڪ ۾ نه ايندا. ان مان اسانکي ڄاڻ ملندي ته هڪ ٽپڪو غلط نشان ٿيل آهي. پر ڪهڙو ٽپڪو غلط طريقي نشان ڪيل آهي، اهو ڳولڻ ۾ وقت لڳي ويندو آهي. چار ٽپڪا نشان ڪرڻ سان جيڪڏهن هڪ ٽپڪو غلط نشان ٿيل آهي ۽ باقي ٽي ٽپڪا هڪ ليڪ ۾ آهن ته غلطي ڪهڙو ٽپڪو نشان ڪرڻ ۾ ٿي آهي، اهو ڳولڻ سولو ٿي پوندو آهي. ان ڪري چار ٽپڪا نشان ڪرڻ فائديمند ٿيندو آهي.

$0x + y = 2$ اها مساوت $y = 2$ ان طريقي لکڻ وڌيڪ سهوليت ڀري آهي. هن مساوت جو گراف x -محور سان پورو ڇوٽ هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته x بڻائيندڙ انگن ڪهڙو به هجي، y بڻائيندڙ انگ سڀني ٽپڪن جو ساڳيو ٿي هوندو 2.

x	1	4	-3
y	2	2	2
(x, y)	(1, 2)	(4, 2)	(-3, 2)

ساڳي طرح $x + 0y = 2$ اها مساوت $x = 2$ ان طريقي لکڻ وڌيڪ سهوليت ڀري آهي ۽ هن مساوت جو گراف y -محور سان پورو ڇوٽ هوندو آهي.





هر وقتي مساوتن حل ڪرڻ جو گرافي طريقو
(Solution of simultaneous equations by Graphical method)

مثال $2x - y = 2$ ۽ $x + y = 4$ مساوتن جا گراف ڪڍي انهن جي چڪاس ڪريو.

$$x + y = 4$$

x	-1	4	1	6
y	5	0	3	-2
(x, y)	(-1, 5)	(4, 0)	(1, 3)	(6, -2)

$$2x - y = 2$$


x	0	1	3	-1
y	-2	0	4	-4
(x, y)	(0, -2)	(1, 0)	(3, 4)	(-1, -4)

گراف ۾ هر هڪ ٽپڪو جنهن مساوت جو گراف آهي ان کي نهڪائي ٿو. ٻئي ليڪون هڪ ٻئي کي .. هن ٽپڪي وٽ ڪپڻ ٿيون.

انڪري (2, 2) اهو آنگن جو جوڙو يعني ته $x=2$ ۽ $y=2$ اهي ملهه $2x-y=2$ ۽ $x+y=4$ انهن ٻنهي مساوتن کي نهڪائڻ ٿا.

ڏنل هر وقتي مساوتن کي جيڪو ملهه نهڪائي ٿو اهو ملهه ٻنهي مساوتن جو حل آهي:

$$x = 2 \quad \text{۽} \quad y = 2$$



اهي مساوتون ڦيرائڻو رد ڪرڻ واري طريقي سان حل ڪري انهن جي چڪاس ڪريون.

$x=2$ اهو ملهه مساوت (I) ۾ رکڻ

$$x + y = 4$$

$$\therefore 2 + y = 4$$

$$\therefore y = 2$$

$$x + y = 4 \quad \dots \quad (I)$$

$$2x - y = 2 \quad \dots \quad (II)$$

مساوتون (I) ۽ (II) جو جوڙو ڪريو.

$$3x = 6 \therefore x = 2$$

مشغولي I : $x - y = 1$; $5x - 3y = 1$ اهي هم وقتي مساوتون گرافي طريقي حل ڪرڻ لاءِ هيٺيان ڇجرا (ٽيبلون) پوريون ڪريو ۽ ٻڌائيندڙ انگهه پڻ حاصل ڪريو.

$$x - y = 1$$

x	0		3	
y		0		-3
(x, y)				

$$5x - 3y = 1$$

x	2			-4
y		8	-2	
(x, y)				

● گراف پني تي ٻڌائيندڙ (مساوي) طريقي سان ٽيڪا نشان ڪريو.

● مساوتن جا گراف ڪڍو.

● ليڪن جي ڪپيندڙ ٽيڪي جا مساو ڇڏيو. انهن تان هم وقتي مساوتن جو حل لکو.

مشغولي II : اهي مساوتون ڦيرائڻو رد ڪرڻ واري طريقي سان حل ڪري انهن جي چڪاس ڪريو.

ذرا سوچيو



$5x - 3y = 1$ مساوت جو گراف ڪڍڻ لاءِ هيٺين هڪ ٽيبل ۾ (ڇجري ۾) ٻڌائيندڙ انگ (مساو) ڏنل آهن انهن کي ڏسو.

x	0	$\frac{1}{5}$	1	-2
y	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{11}{3}$
(x, y)	$(0, -\frac{1}{3})$	$(\frac{1}{5}, 0)$	$(1, \frac{4}{3})$	$(-2, -\frac{11}{3})$

● ٽيڪا نشان ڪرڻ لاءِ اهي مساو سهوليت پريا آهن ڇا؟

● مساو ڳولڻ وقت ڪهڙي ڳالهه تي ڌيان ڏيڻ گهرجي جيئن ٽيڪا نشان ڪرڻ سهوليت پريا ٿي سگهن.

آپياس 1.2

1. هيٺيون مساوتون گرافي طريقي حل ڪرڻ لاءِ هيٺيون ٽيبلون پوريون ڪريو

$$x + y = 3 ; x - y = 4$$

$$x - y = 4$$

x		-1	0
y	0		-4
(x, y)			(0, -4)

$$x + y = 3$$

x	3		
y		5	3
(x, y)	(3, 0)		(0, 3)

2. هيٺيون مساوتون گرافي طريقي حل ڪريو

(1) $x + y = 6 ; x - y = 4$

(2) $x + y = 5 ; x - y = 3$

(3) $x + y = 0 ; 2x - y = 9$

(4) $3x - y = 2 ; 2x - y = 3$

(5) $3x - 4y = -7 ; 5x - 2y = 0$

(6) $2x - 3y = 4 ; y - x = 4$

اچو چرچا ڪريون



حل ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيل انگن جا جوڙا هيٺين ۾ ڏنل آهن. $x + 2y = 4$; $3x + 6y = 12$ هر وقتي مساوتون ڏنل آهن، انهن کي گرافي طريقي


$$x + 2y = 4$$

x	-2	0	2
y	3	2	1
(x, y)	$(-2, 3)$	$(0, 2)$	$(2, 1)$

$$3x + 6y = 12$$

x	-4	1	8
y	4	1.5	-2
(x, y)	$(-4, 4)$	$(1, 1.5)$	$(8, -2)$

انهن انگن جا جوڙا هيٺ ڏنل گراف ۾ نشان ڪيل آهن. انهن کي جاچيو ۽ گراف جي هيٺيان ڏنل سوالن جي باري ۾ چرچا ڪريو.



(1) مٿين پنهي مساوتن جو گراف ساڳيو آهي يا الڳ الڳ آهي؟

(2) $x + 2y = 4$ ۽ $3x + 6y = 12$ انهن هر وقتي مساوتن جا حل ڪهڙا آهن؟ اُهي ڪيترا آهن؟

(3) مٿين پنهي مساوتن ۾ x جي ضرب بندڙ y جي ضرب بندڙ ۽ اسٽر پڌن ۾ ڪهڙو لاڳاپو نظر اچي ٿو؟

(4) ٻن ڦيرائين ۾ ليکي مساوتون ڏنل آهن ته انهن مساوتن جي گراف هڪ ليڪ ڪڏهن ٿيندي آهي

اهو آسان ڪيئن ٻولهينداسين؟

هاڻي ٻيو مثال ڏسو

$x+2y=4$ ۽ $2x+4y=12$ انهن مساوتن جو گراف مٿين طريقي وانگر هڪ ٻئي گراف ڀني تي ڪڍو
گرافن جي ڇاڇ ڪريو $x+2y=4$ ۽ $2x+4y=12$ انهن هر وقتي مساوتن جي حل جي باري ۾ ويچار
ڪريو. x ۽ y جي ضربيندڙ ۽ استر پڌن انهن جي وچ ۾ لاڳاپي جو ويچار ڪري نتيجو ڪڍو.

ICT Tools or Links



Geogebra software جي مدد سان x -محور، y -محور ڪڍو. جدا جدا هر وقتي
مساوتن جا گراف ڪڍي انهن جا حل ڇاڇيو.

ڄاڻي ونون



مقرر ڪندڙ (Determinant)

اهو چار عددن جو مقرر ڪندڙ آهي. $(a, b), (c, d)$ اهي آڏيون قطارون آهن،

ساڳيءَ طرح $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ اهي اڀا عالم آهن. انهن ٻن پڌن وارا مقرر آهن، ڇاڪاڻ ته هر هڪ آڏي قطار ۾
2 پڌ (عدد) آهن. اهو مقرر هڪ عدد ليکيو ويندو آهي. اهو عدد $ad-bc$ آهي.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc \text{ يعني ته}$$

$$ad-bc \text{ اهو } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \text{ مقرر جو ملهه آهي.}$$

مقرر کي نالو ڏيڻ لاءِ عام طور $A, B, C, D, \dots$ اهڙا انگريزي الفابيٽس ڪم آندا ويندا آهن.



حل ڪيل مثال



مثال : هيٺين مقررن جا ملهه لھو

$$(1) A = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(2) N = \begin{vmatrix} -8 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(3) B = \begin{vmatrix} 2\sqrt{3} & 9 \\ 2 & 3\sqrt{3} \end{vmatrix}$$

حل :

$$(1) A = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = (5 \times 9) - (3 \times 7) = 45 - 21 = 24$$

$$(2) N = \begin{vmatrix} -8 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = [(-8) \times (4)] - [(-3) \times 2] = -32 - (-6) \\ = -32 + 6 = -26$$

$$(3) B = \begin{vmatrix} 2\sqrt{3} & 9 \\ 2 & 3\sqrt{3} \end{vmatrix} = [2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}] - [2 \times 9] = 18 - 18 = 0$$

جاڻي ونون



مقرر وارو طريقو (ڪرئمر جو قاعدو) (Determinant method (Crammer's Method))

ڏنل ھم وقتي مساوتون سؤلي طريقي سان ۽ گھٽ ۾ گھٽ جڳھ ڪم آڻي مقرر طريقي سان حل ڪري سگھجن ٿيون. ان کي ھم وقتي مساوتن کي حل ڪرڻ جو مقرر طريقو چئجي ٿو. اھو طريقو سوس (Swiss) ۾ رھندڙ آلجبرا جي ڄاڻ بڻو گيبريل ڪرئمر ٻولھي ڪڍيو. انڪري ھن طريقي کي ڪرئمر جو طريقو چئجي ٿو.

$$a_1x + b_1y = c_1 \quad \text{اھا ٻن ڦيرائين واري ليکي مساوت سھوليت جي خيال کان}$$

$$a_2x + b_2y = c_2 \quad \text{اھڙي طريقي لکجي ٿي.}$$

$$a_1x + b_1y = c_1 \quad \text{سمجھو ته، (I)}$$

$$a_2x + b_2y = c_2 \quad \text{۽ (II)}$$

اھي a_1, b_1, c_1 ۽ a_2, b_2, c_2 ڦيرائين وارا ھم وقتي مساوتون آھن.

آسان اھي ھم وقتي مساوتون حل ڪندا سين.

مساوت (I) کي b_2 سان ضرب ڪريو

$$a_1 b_2 x + b_1 b_2 y = c_1 b_2 \quad \text{(III)}$$

مساوت (II) کي b_1 سان ضرب ڪريو

$$a_2 b_1 x + b_2 b_1 y = c_2 b_1 \quad \text{(IV)}$$

مساوت (III) مساوت (IV) ڪٽ ڪريو :

$$\begin{array}{r} a_1 b_2 x + b_1 b_2 y = c_1 b_2 \\ - a_2 b_1 x + b_2 b_1 y = -c_2 b_1 \\ \hline (a_1 b_2 - a_2 b_1) x = c_1 b_2 - c_2 b_1 \\ x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \dots \dots (V) \end{array}$$

$$y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \dots \dots (VI) \text{ ساڳيءَ طرح ,}$$

مٿين حل ۾ $c_1 b_2 - c_2 b_1$, $a_1 b_2 - a_2 b_1$, $a_1 c_2 - a_2 c_1$ اهي ملهه ياد رکڻ لاءِ ۽
ٿوري جڳهه ۾ لکڻ لاءِ مقرر طريقي ۾ لکو.

هيٺين مساوتن جا ضربيندڙ (گڻڪ) ۽ اسٽر پڊ ڏسو

$$\left. \begin{array}{l} \text{هاڻي } \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \text{ اهي ٽي ڪالمر ملندا.} \\ a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{array} \right\} \text{ ۽}$$

مساوت (V) ۽ مساوت (VI) ۾ x ۽ y جا ملهه مقرر طريقي جي مدد سان لکو.

$$\begin{aligned} x &= \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \\ \text{۽ } y &= \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad (a_1 b_2 - a_2 b_1) \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = D, \quad \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = D_x, \quad \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = D_y \quad \text{اهي ياد رکڻ لاءِ}$$

$$\text{سان ڏيکاريو } x = \frac{D_x}{D} \text{ ۽ } y = \frac{D_y}{D} \text{ يعني ته ٿوري ۾}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \text{ اهي مقرر لکڻ لاءِ } D, D_x, D_y$$

انهن ڪالمن کي سلسليوار لکڻ جو طريقو ڏيان ۾ رکو.

انھن مساوتن مان $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ اھي ٿي ڪالمر ملندا آھن. $a_1 x + b_1 y = c_1$
 $a_2 x + b_2 y = c_2$

• $D = \begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \end{vmatrix}$ اھو ڪالمر ڇڏيو ويو آھي

• $D_x = \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix}$ جي ضربيندڙن جو ڪالمر ڇڏي اُن جي بدران اِستھر پڌن جو ڪالمر کنيو ويو آھي.

• $D_y = \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \end{vmatrix}$ جي ضربيندڙن جو ڪالمر ڇڏي اُن جي بدران اِستھر پڌن جو ڪالمر کنيو ويو آھي.

ياد رکڻو



ڪرئمر جو طريقو ڪم آڻي ھم وقتي مساوتن کي حل ڪرڻ جو طريقو

ڏنل مساوت $ax + by = c$ جي روپ ۾ لکڻو

D, D_x, D_y انھن مقرر ٿيا ملھ لھو.

$y = \frac{D_y}{D}$ ۽ $x = \frac{D_x}{D}$
 جي مطابق x ۽ y جا ملھ لھو.



گيبريل ڪرئمر (Gabriel Cramer)

(31 جولاءِ 1704 - 4 جنوري 1752)

ھن سِوز آئجبرا جي ڄاڻونءَ جو جنم جنميو ۾ ٿيو. حسابن جي وشيہ ۾ ھو ننڍپڻ کان ھوشيار ھو ارڙھن سالن عمر ۾ ھن کي ڊاڪٽريڪٽ جي پڌوي ملي. ھو جنميو ۾ پروفيسر ھو.

حل ڪيل مثال

مثال : ڪرئمر جي طريقي سان هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو :

$$5x + 3y = -11 ; 2x + 4y = -10$$

حل : ڏنل مساوتون

$$5x + 3y = -11$$

$$2x + 4y = -10$$

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (5 \times 4) - (2 \times 3) = 20 - 6 = 14$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -11 & 3 \\ -10 & 4 \end{vmatrix} = (-11) \times 4 - (-10) \times 3 = -44 - (-30) \\ = -44 + 30 = -14$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 5 & -11 \\ 2 & -10 \end{vmatrix} = 5 \times (-10) - 2 \times (-11) = -50 - (-22) \\ = -50 + 22 = -28$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-14}{14} = -1 \quad \Bigg| \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-28}{14} = -2$$

$\therefore (x, y) = (-1, -2)$ اهو ڏنل هر وقتي مساوتن جو حل آهي.

مشغولي 1 : ڏنل هر وقتي مساوتن کي مقرر طريقي سان حل ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل چوڪنڊا پورا ڪريو

$$y + 2x - 19 = 0 ; 2x - 3y + 3 = 0$$

حل : ڏنل مساوتون $ax + by = c$ هن طريقي سان لکون

$$2x + y = 19$$

$$2x - 3y = -3$$

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{} & \boxed{} \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = \boxed{} \times (-3) - 2 \times (\boxed{}) = \boxed{} - (\boxed{}) \\ = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 19 & \boxed{} \\ \boxed{} & -3 \end{vmatrix} = 19 \times (\boxed{}) - (\boxed{}) \times (\boxed{}) = \boxed{} - \boxed{} \\ = \boxed{}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} \boxed{} & 19 \\ 2 & \boxed{} \end{vmatrix} = [(\boxed{}) \times (\boxed{})] - [(\boxed{}) \times (\boxed{})]$$


$$= \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$x = \frac{D_x}{D} \qquad y = \frac{D_y}{D}$$

$$\therefore x = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \qquad y = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

$\therefore (x, y) = (\boxed{}, \boxed{})$ ٺهو ڏنل هر وقتي مساوتن جو حل آهي.

مشغولي 2 : هيٺين مشغولي پوري ڪريو :-



$\therefore (x, y) = (\boxed{}, \boxed{})$ حل آهي.



- جيڪڏهن $D = 0$ آهي ته حل ڪهڙو ٿيندو؟
- گڏيل حل ممڪن نه هجي ته ان مساوت جي ليڪ ڪهڙي روپ ۾ هوندي؟

آپياس 1.3

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times \square - \square \times 4 \quad 1.$$

$$= \square - 8$$

$$= \square$$

$$\begin{vmatrix} \frac{7}{3} & \frac{5}{3} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \quad (3) \quad \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & 0 \end{vmatrix} \quad (2) \quad \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \quad (1)$$

3. هيٺيون هر وقتي مساوتون ڪرئمر جي طريقي سان حل ڪريو:

(1) $3x - 4y = 10$; $4x + 3y = 5$ (2) $4x + 3y - 4 = 0$; $6x - 5y = 8$

(3) $x + 2y = -1$; $2x - 3y = 12$ (4) $6x - 4y = -12$; $8x - 3y = -2$

(5) $4m + 6n = 54$; $3m + 2n = 28$ (6) $2x + 3y = 2$; $x - \frac{y}{2} = \frac{1}{2}$

ٻن ڦيرائين وارين ليڪي مساوتن ۾ بدلائڻ جو ٻيون مساوتون
(Equations reducible to a pair of linear equations in two variables)

مشغولي : هيٺيون ڇجرو پورو ڪريو :

ليڪي آهي يا نه	ڦيرائين جو انداز	مساوتون
نه	2	$\frac{3}{x} - \frac{4}{y} = 8$
☐	☐	$\frac{6}{x-1} + \frac{3}{y-2} = 0$
☐	☐	$\frac{7}{2x+1} + \frac{13}{y+2} = 0$
☐	☐	$\frac{14}{x+y} + \frac{3}{x-y} = 5$



مٿين چڱري ۾ ٻن ڦيرائين وار يون ڪيتريون ئي مساوتون ڏنيون ويون آهن. اُهي ليکي
نه آهن پر انهن کي ليکي مساوتن ۾ بدلائي سگهجي ٿو ڇا؟



ڏنل ڦيرائين ۾ نهڪندڙ ملهه رکي اهڙين مساوتن کي ليکي مساوتن ۾ بدلائي
سگهجي ٿو. اُهي ملهه واپرائي مساوت کي ليکي مساوت ۾ لکو. ڪهڙو به $\frac{m}{n}$ اڻپور
جو ڇيڊ 0 ٿي سگهي ٿو. اهو نه وساريو.

حل ڪيل مثال

مثال (1) حل ڪريو: $\frac{4}{x} + \frac{5}{y} = 7$; $\frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 5$

حل: $\frac{4}{x} + \frac{5}{y} = 7$; $\frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 5$

$$4\left(\frac{1}{x}\right) + 5\left(\frac{1}{y}\right) = 7 \quad \dots \quad (I)$$

$$3\left(\frac{1}{x}\right) + 4\left(\frac{1}{y}\right) = 5 \quad \dots \quad (II)$$

مساوت (I) ۽ (II) ۾ $\left(\frac{1}{x}\right) = m$ ۽ $\left(\frac{1}{y}\right) = n$ ملهه رکڻ سان هيٺيون مساوتون ملنديون

$$4m + 5n = 7 \quad \dots \quad (III)$$

$$3m + 4n = 5 \quad \dots \quad (IV)$$

اهي مساوتون حل ڪرڻ سان

$m = 3$, $n = -1$ اهي حل ملن ٿا.

$$\therefore 3 = \frac{1}{x} \quad \therefore x = \frac{1}{3} \quad m = \frac{1}{x} \text{ هاڻي}$$

$$\therefore -1 = \frac{1}{y} \quad \therefore y = -1 \quad n = \frac{1}{y} \text{ ساڳيءَ طرح}$$

$$\therefore (x, y) = \left(\frac{1}{3}, -1\right) \text{ اهي ڏنل مساوتن جا حل آهن.}$$

مثال (2) حل ڪريو : $\frac{4}{x-y} + \frac{1}{x+y} = 3$; $\frac{2}{x-y} - \frac{3}{x+y} = 5$

حل : $\frac{4}{x-y} + \frac{1}{x+y} = 3$; $\frac{2}{x-y} - \frac{3}{x+y} = 5$

$$4\left(\frac{1}{x-y}\right) + 1\left(\frac{1}{x+y}\right) = 3 \dots (I)$$

$$2\left(\frac{1}{x-y}\right) - 3\left(\frac{1}{x+y}\right) = 5 \dots (II)$$

مساوت (I) ۽ (II) ۾ $\left(\frac{1}{x-y}\right) = a$ ۽ $\left(\frac{1}{x+y}\right) = b$ مله رکڻ سان هيٺيون مساوتون ملنديون

$$4a + b = 3 \dots (III)$$

$$2a - 3b = 5 \dots (IV)$$

مساوتون (III) ۽ (IV) حل ڪرڻ سان $a = 1$ ۽ $b = -1$ اهي حل ملن ٿا.

پر $a = \left(\frac{1}{x-y}\right)$ ۽ $b = \left(\frac{1}{x+y}\right)$

$$\left(\frac{1}{x-y}\right) = 1 \text{ ۽ } \left(\frac{1}{x+y}\right) = -1$$

$$x - y = 1 \dots (V)$$

$$x + y = -1 \dots (VI)$$

مساوتون (V) ۽ (VI) حل ڪرڻ سان $x = 0$ ۽ $y = -1$ اهي حل ملن ٿا.


$\therefore (x, y) = (0, -1)$ اهي ڏنل مساوتن جا حل آهن.

ياد رکڻو



مٿين مثالن ۾ بدلاو ڪري آندل هر وقتي مساوتن کي ڦيرائڻو رد ڪرڻ واري طريقي حل ڪيل آهن. اهي مساوتون ڪرئمر طريقي يا گرافي طريقي حل ڪري انهن جو حل ملندو ڇا؟ ڪري ڏسو.

مشغولي : چؤڪنڊي ڀرڏنل مساوتن جو حل حاصل ڪرڻ لاءِ هيٺين مشغولي ڪريو.



∴ $(x, y) = (,)$ مساوتون حل ڪرڻ سان

آپيلاس 1.4

1. هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو :

$$\frac{2}{x} - \frac{3}{y} = 15 ; \frac{8}{x} + \frac{5}{y} = 7 \quad (1)$$

$$\frac{10}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 4 ; \frac{15}{x+y} - \frac{5}{x-y} = -2 \quad (2)$$


$$\frac{27}{x-2} + \frac{31}{y+3} = 85 ; \frac{31}{x-2} + \frac{27}{y+3} = 89 \quad (3)$$

$$\frac{1}{3x+y} + \frac{1}{3x-y} = \frac{3}{4} ; \frac{1}{2(3x+y)} - \frac{1}{2(3x-y)} = -\frac{1}{8} \quad (4)$$



هم وقتي مساوتون جا اُپيگ Application of simultaneous equations

مشغولي : هيٺ چؤڪنڊي جي هيٺيان ڪجهه هدايتون ڏنل آهن. انهن مان ملندڙ مساوتون چؤڪنڊن ۾ لکو.



مثال (1) هڪ مستطيل جي گرد ماپ 40 س م آهي. مستطيل جي ڊيگهه، مستطيل جي ويڪر جي ٻيڻ کان 2 س م وڌيڪ آهي. مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر لھو.
حل سمجھو ته مستطيل جي ڊيگهه x س م ۽ ويڪر y س م آهي.
پهرين شرط موجب -

$$2(x + y) = 40$$

$$x + y = 20 \quad \dots \quad (I)$$

ٻئين شرط موجب -

$$x = 2y + 2$$

$$\therefore x - 2y = 2 \quad \dots \quad (II)$$

مساوتن (I) ۽ (II) کي مقرر طريقي سان حل ڪريو

$$x + y = 20$$

$$x - 2y = 2$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = [1 \times (-2)] - (1 \times 1) = -2 - 1 = -3$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 20 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = [20 \times (-2)] - (1 \times 2) = -40 - 2 = -42$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 20 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (1 \times 2) - (20 \times 1) = 2 - 20 = -18$$

$$x = \frac{D_x}{D} \text{ ۽ } y = \frac{D_y}{D}$$

$$\therefore x = \frac{-42}{-3} \text{ ۽ } y = \frac{-18}{-3}$$

$$\therefore x = 14 \text{ ۽ } y = 6$$

∴ مستطيل جي ڊيگهه 14 س م ۽ ويڪر 6 س م آهي.

مثال (2)

سيل! سيل!! سيل!!! فقط ٻه ڏينهن



مون وٽ ڪجهه ڪانٽن واريون ۽ ڪجهه ڊجيٽل واپون آهن. اُهي مان سستي آڱهه تي وڪڻڻ وارو آهيان.

ٻين ڏينهن جو وڪرو
ڪانٽن واريون واپون = 22
ڊجيٽل واپون = 5
مونڪي مليا 7330 رپيا.

پهرين ڏينهن جو وڪرو
ڪانٽن واريون واپون = 11
ڊجيٽل واپون = 6
مونڪي مليا 4330 رپيا.

ته مون دواران وڪڻيل هر هڪ واچ جي قيمت ڪيتري؟

حل : سمجهو ته ڪانٽن واري هڪ واچ جي قيمت آهي x رپيا ۽ هڪ ڊجيٽل واچ جي قيمت آهي y رپيا

پهرين شرط مطابق ،

$$11x + 6y = 4330 \quad \dots (I)$$

ٻين شرط مطابق ،

$$22x + 5y = 7330 \quad \dots (II)$$

مساوت 1 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان

$$22x + 12y = 8660 \quad \dots (III)$$

مساوت (II) مان (III) مساوت ڪٽ ڪرڻ سان

$$22x + 5y = 7330$$

$$-22x + 12y = -8660$$

$$-7y = -1330$$

$$\therefore y = 190$$

$y=190$ اهو ملهه مساوت (I) ۾ رکڻ سان

$$11x + 6y = 4330$$

$$\therefore 11x + 6(190) = 4330$$

$$\therefore 11x + 1140 = 4330$$


$$\therefore 11x = 3190$$

$$\therefore x = 290$$

$\therefore$ ڪانٽن واري هڪ واچ جي قيمت 290 رپيا

۽ هڪ ڊجيٽل واچ جي قيمت 190 رپيا آهي.

مثال (3)



اها ٽي ٻيڙي 13 ڪلاڪن ۾ مٿاهين وهڪري ۾ 36 ڪم ۽ هيٺائين وهڪري ۾ 48 ڪم مفاصلو طيءَ ڪري ٿي.

هڪ ٻيڙي 6 ڪلاڪن ۾ مٿاهين وهڪري ۾ 16 ڪم ۽ هيٺائين وهڪري ۾ 24 ڪم مفاصلو طيءَ ڪري ٿي.

ٻڌايو! بينل پاڻيءَ ۽ وهندڙ پاڻيءَ ۾ ٻيڙيءَ جي رفتار ڪيتري آهي؟

حل : سمجهو ته ٻيڙيءَ جي بينل پاڻيءَ ۾ رفتار x ڪم / ڪلاڪ ۽ وهڪري جي رفتار y ڪم / ڪلاڪ

ٻيڙيءَ جي هيٺاهين وهڪري ۾ رفتار $(x+y)$ ڪم / ڪلاڪ آهي.

ٻيڙيءَ جي مٿاهين وهڪري ۾ رفتار $(x-y)$ ڪم / ڪلاڪ آهي.

رفتار = وقت $\therefore$ وقت x رفتار = مفاصلو

ٻيڙيءَ کي مٿاهين وهڪري ۾ 16 ڪم مفاصلو پورو ڪرڻ ۾ لڳندڙ وقت $\frac{16}{x-y}$ ڪلاڪ

ٻيڙيءَ کي هيٺاهين وهڪري ۾ 24 ڪم مفاصلو پورو ڪرڻ ۾ لڳندڙ وقت $\frac{24}{x+y}$ ڪلاڪ
پهرين شرط مطابق

$$\frac{16}{x-y} + \frac{24}{x+y} = 6 \quad \dots \quad (I)$$

ٻين شرط مطابق

$$\frac{36}{x-y} + \frac{48}{x+y} = 13 \quad \dots \quad (II)$$

مساوت (I) ۽ (II) ۾ $\frac{1}{x-y} = m$ ۽ $\frac{1}{x+y} = n$ ملهه رکڻ سان هيٺيون مساوتون ملن ٿيون

$$16m + 24n = 6 \quad \dots \quad (III)$$

$$36m + 48n = 13 \quad \dots \quad (IV)$$

مساوت (III) ۽ (IV) کي حل ڪرڻ سان $m = \frac{1}{4}$, $n = \frac{1}{12}$ ملهه ملي ٿو.

m ۽ n جا ملهه واپس رکڻ سان هيٺيون مساوتون ملن ٿيون.

$$x - y = 4 \quad \dots (V)$$

$$x + y = 12 \quad \dots (VI)$$

مساوتون (V) ۽ (VI) حل ڪرڻ سان $x = 8$, $y = 4$ ملهه ملن ٿيون.

∴ ٻيڙيءَ جي بينل پاڻيءَ ۾ رفتار 8 ڪم / ڪلاڪ ۽ پاڻيءَ جي وهڪري جي رفتار 4 ڪم / ڪلاڪ آهي.

مثال 4: ڪا رقم ڪجهه ٻارن ۾ هڪجيتري ورهائي ويئي جيڪڏهن 10 ٻار وڌيڪ آهن ته هر هڪ ٻار کي 2 رپيا گهٽ ملن ٿا ۽ جيڪڏهن 15 ٻار گهٽ آهن ته هر هڪ ٻار کي 6 رپيا وڌيڪ ملن ٿا، ته ٻڌايو ته ڪل رقم ڪيتري آهي؟ اها رقم ڪيتري ٻارن ۾ ورهائي ويئي؟

حل: سمجهو ته ٻارن جو آندازو x آهي ۽ هر هڪ ٻار کي ملندڙ رقم y آهي ∴ ڪل ورهايل رقم xy رپيا آهي.

پهرين شرط مطابق،

$$(x + 10)(y - 2) = xy$$

$$\therefore xy - 2x + 10y - 20 = xy$$

$$\therefore -2x + 10y = 20$$

$$\therefore -x + 5y = 10 \quad \dots (I)$$

ٻين شرط مطابق،

$$(x - 15)(y + 6) = xy$$

$$\therefore xy + 6x - 15y - 90 = xy$$

$$\therefore 6x - 15y = 90$$

$$\therefore 2x - 5y = 30 \quad \dots (II)$$

مساوتون (I) ۽ (II) جوڙ ڪرڻ سان

$$-x + 5y = 10$$

$$+ 2x - 5y = 30$$

$$x = 40$$

$x=40$ هو ملهه مساوت (I) ۾ رکڻ سان

$$-x + 5y = 10$$

$$\therefore -40 + 5y = 10$$

$$\therefore 5y = 50$$

$$\therefore y = 10$$

$$\text{رپيا } xy = 40 \times 10 = 400 = \text{ڪل رقم}$$

$\therefore$ 40 ٻارن ۾ 400 رپيا هڪجيترا ورهايا ويا

مثال (5) هڪ ٽن انگن وارا عدد انگن جي جوڙ جي سترهون (17) آهي ان عدد ۾ 198 جوڙڻ سان انهن جي جوڙ اُپت، اصلي عدد تي انگن جي ادل بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد آهي. ساڳئي طرح ايڪن واري انگ ۽ سون واري انگ جي جوڙ اُپت وچين انگ کان 1 گهٽ آهي. اهو ٽن انگن وارو ان عدد لھو.

حل : سمجھو ته سون وارو انگ x آهي ۽ ايڪن وارو انگ y آهي.

ڏهاڪن وارو انگ (وچون انگ) باقي ٻن انگن جي جوڙ اُپت کان 1 وڌيڪ آهي.

ايڪا	ڏاڪا	سو
y	$x + y + 1$	x

$$\therefore \text{ٽن انگن وارو عدد} = 100x + 10(x + y + 1) + y$$

$$= 100x + 10x + 10y + 10 + y = 110x + 11y + 10$$

$$\text{انهن انگن جي جوڙ اُپت} = 2x + 2y + 1 = x + (x + y + 1) + y$$

$\therefore$ پھرين شرط مطابق ،

$$\text{ٽن انگن وارو عدد} = 17 \times (\text{انگن جي جوڙ اُپت})$$

$$\therefore 110x + 11y + 10 = 17 \times (2x + 2y + 1)$$

$$\therefore 110x + 11y + 10 = 34x + 34y + 17$$

$$\therefore 76x - 23y = 7 \quad \dots \quad (I)$$

ڏنل عدد ۾ انگن جي ادل بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد

$$= 100y + 10(x + y + 1) + x = 110y + 11x + 10$$

$$\text{ڏنل عدد} = 110x + 11y + 10$$

ڏنل ٻين شرط مطابق ، انگن جي ادل بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد = 198 + ڏنل عدد

$$\therefore 110x + 11y + 10 + 198 = 110y + 11x + 10$$

$$\therefore 99x - 99y = -198$$

$$\therefore x - y = -2$$

$$\text{يعني (II) } x = y - 2 \quad \dots$$

مساوت (II) ۾ مليل x جو ملهه مساوت (I) ۾ رکڻ سان ،

$$\therefore 76(y - 2) - 23y = 7$$

$$\therefore 76y - 152 - 23y = 7$$

$$53y = 159$$

$$\therefore y = 3 \quad \therefore \text{ايڪن وارو انگ} = 3$$

$$y = 3 \text{ ملهه مساوت (II) ۾ رکي}$$

$$x = y - 2$$

$$\therefore x = 3 - 2 = 1$$

$$\therefore x = 1$$

$$\therefore \text{سَوَن وارو انگ} = 1$$


$$\text{وچون انگ} = \text{ڏهاڪن وارو انگ} = 1 + 3 + 1 = 5$$

$$\therefore \text{ڏنل ٽن انگن وارو عدد} = 153$$

آپياس 1.5

1. ٻن طردن ۾ تفاوت 3 آهي وڏي عدد جي ٿيڻ ۽ ننڍي عدد جي ٻيڻ جي جوڙ اُپت 19 آهي ته اُهي عدد لھو.

2. مشغولي پوري ڪريو



3. پيءُ جي عمر ۾ پٽ جي ٻيڻ جوڙڻ سان جوڙ اُپت 70 ٿئي ٿي ۽ پٽ جي عمر ۾ پيءُ جي عمر جي ٻيڻ جوڙڻ سان جوڙ اُپت 95 ٿئي ٿي ته ٻنهي جي عمر لھو.

4. هڪ اُڳڀور جو چيڊ، اُنس جي ٻيڻ کان 4 وڌيڪ آهي. جيڪڏهن اُنس ۽ چيڊ ٻنهي مان 6 گهٽائجن ته چيڊ، اُنس جي ٻارھوڻ جي برابر آهي. ته اُڳڀور لھو.

5. 10 ٽن ڪٽي سڱهندڙ مال ڪٽندڙ ٽرڪ ۾ A ۽ B آهڙيون ٻن قسمن جون پٽيون ڀريون ويون آهن جيڪڏهن A قسمن جون 150 پٽيون ۽ B قسمن جون 100 پٽيون ڀريون وڃن ٿيون ته ٽرڪ جي 10 ٽن ڪٽي سڱهندڙ جي جڳهه پوري ڀرجي وڃي ٿي. جيڪڏهن A قسمن جون 260 پٽيون ڀرجن ٿيون ته ٽرڪ جي 10 ٽنن جي جڳهه ڀرڻ لاءِ B قسمن جون 40 پٽيون لڳنديون ته هر هڪ قسمن جي پٽيءَ جو وزن ڪيترو آهي؟

6. * وشال 1900 ڪ م جي ياترا جو ڪجهه مفاصلو بس رستي ۽ باقي مفاصلو جهاز رستي پورو ڪيو. بس جي سراسري رفتار 60 ڪ م في ڪلاڪ آهي ۽ جهاز جي سراسري رفتار 700 ڪ م في ڪلاڪ آهي جيڪڏهن هيءَ ياترا هن 5 ڪلاڪن ۾ پوري ڪئي آهي ته وشال بس رستي ڪيترو مفاصلو ياترا ڪئي؟

گڏيل آڀياس 1

1. هيٺين سوالن جا صحيح جواب چونڊيو

(1) $4x + 5y = 19$ جو گراف ڪيڊ لاءِ $x=1$ ملهه ڪٿڻ وقت y جو ملهه ڪيترو ٿيندو؟

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) -3

(2) x ۽ y قيرائن واري هڪ وقتي مساوتن ۾ جيڪڏهن $D_x = 49$ ، $D_y = -63$ ۽

$D = 7$ آهي $x =$ ڪيترو؟

- (A) 7 (B) -7 (C) $\frac{1}{7}$ (D) $-\frac{1}{7}$

(3) $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & -4 \end{vmatrix}$ ڏنل مقرر جو ملهه ڪيترو آهي؟

- (A) -1 (B) -41 (C) 41 (D) 1

(4) $3x-2y-4=0, x+y=3$ آهي هڪ وقتي مساوتون حل ڪرڻ وقت D جو ملهه ڪيترو آهي؟

- (A) 5 (B) 1 (C) -5 (D) -1

(5) $ax + by = c$; $mx + ny = d$ انهن ٻنهي هڪ وقتي مساوتن ۾ جيڪڏهن

$an \neq bm$ آهي ته ڏنل مساوتن جو

(A) فقط هڪ حل آهي (B) ڪوبه حل نه آهي

(C) بيحد حل آهن (D) فقط ٻه حل آهن.

2. $2x - 6y = 3$ مساوت جو گراف ڪيڊ لاءِ هيٺ ڏنل ڇڪرو پورو ڪريو

x	-5	
y		0
(x, y)		

3. هيٺ ڏنل هڪ وقتي مساوتون گرافي طريقي حل ڪريو :

(1) $2x + 3y = 12$; $x - y = 1$

(2) $x - 3y = 1$; $3x - 2y + 4 = 0$

(3) $5x - 6y + 30 = 0$; $5x + 4y - 20 = 0$

(4) $3x - y - 2 = 0$; $2x + y = 8$

(5) $3x + y = 10$; $x - y = 2$

4. هيٺين مقرر جو ملهه لھو

(1) $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$

(2) $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$

(3) $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

5. هيٺيون هر وقتي مساوتون ڪرڻم طريقن حل ڪريو :

$$(1) 6x - 3y = -10 ; 3x + 5y - 8 = 0$$

$$(2) 4m - 2n = -4 ; 4m + 3n = 16$$

$$(3) 3x - 2y = \frac{5}{2} ; \frac{1}{3}x + 3y = -\frac{4}{3}$$

$$(4) 7x + 3y = 15 ; 12y - 5x = 39$$

$$(5) \frac{x+y-8}{2} = \frac{x+2y-14}{3} = \frac{3x-y}{4}$$

6. هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو :

$$(1) \frac{2}{x} + \frac{2}{3y} = \frac{1}{6} ; \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 0 \quad (2) \frac{7}{2x+1} + \frac{13}{y+2} = 27 ; \frac{13}{2x+1} + \frac{7}{y+2} = 33$$

$$(3) \frac{148}{x} + \frac{231}{y} = \frac{527}{xy} ; \frac{231}{x} + \frac{148}{y} = \frac{610}{xy} \quad (4) \frac{7x-2y}{xy} = 5 ; \frac{8x+7y}{xy} = 15$$

$$(5) \frac{1}{2(3x+4y)} + \frac{1}{5(2x-3y)} = \frac{1}{4} ; \frac{5}{(3x+4y)} - \frac{2}{(2x-3y)} = -\frac{3}{2}$$

7. هيٺيان لفظي مثال حل ڪريو :

(1) هڪ ٻن انگن واري عدد ۽ اُنهن انگن جي آڏل بدل ڪري ملندڙ عدد جي جوڙ اُڀت 143 آهي.

جيڪڏهن ڏنل عدد ۾ ڏهاڪن واري جاءِ جو ملهه، ايڪن واري جاءِ جي ملهه کان 3 وڌيڪ آهي ته ڏنل اصلي عدد ڪهڙو آهي؟

سمجهو ته ايڪن واري جاءِ وارو انگ = x

ڏهاڪن واري جاءِ وارو انگ = y

$\therefore$ اصلي عدد = $y + x \square$

انگن جي آڏل بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد = $x + y \square$

پهرين شرط مطابق

انگن جي آڏل بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد ڏنل عدد

$$10y + x \square + \square = 143$$

$$\square x + \square y = 143$$

$$x + y = \square \dots \dots (I)$$

ٻين شرط مطابق

3 + ايڪن وارو انگ = ڏهاڪن وارو انگ

$$y = \square + 3$$

$$-x + y = 3 \dots \dots (II)$$

اچو ته سڪون



- ٻسڱهي مساوتون سڃاڻڻ
- ٻسڱهي مساوتن جي حلن جا قسم
- ٻسڱهي مساوتن جو اڀيوڱه
- ٻسڱهي مساوتن کي حل ڪرڻ جو طريقو
- حل (جزا) ۽ ضرب بندڙن جي وچ ۾ لاڳاپو

ذرا ياد ڪريون



وديارڻي دوستو، نائين درجي ۾ اسان گهڻپڻ جي باري ۾ سکيا آهيون. انهن ۾ سڱهه جي آڌار تي هوندڙ گهڻپڻ جو پڻ اسان آڀياس ڪيو آهي. هڪ ڦيرائڻي ۾ جيڪو گهڻپڻ هڪ سڱهه وارو هوندو آهي، ان کي ليڪي گهڻپڻ ۽ جنهن جي سڱهه به هوندي آهي ان کي ٻسڱهي گهڻپڻ چئبو آهي.

مشغولي: هيٺين گهڻپڻ کي ليڪي گهڻپڻ ۽ ٻسڱهي گهڻپڻ ۾ ورهايو.

$$5x + 9, \quad x^2 + 3x - 5, \quad 3x - 7, \quad 3x^2 - 5x, \quad 5x^2$$

ٻسڱهي گهڻپڻ

ليڪي گهڻپڻ

هاڻي اسان ٻسڱهي گهڻپڻ جو ملهه 0 کڻي جيڪي مساوتون ملنديون آهن جو آڀياس ڪندا سين. اهڙين مساوتن کي ٻسڱهي مساوتون چئبو آهي.

اسان روزمره جي زندگي ۾ ڪيترائي دفعا انهن ٻسڱهي مساوتن جو اڀيوڱه ڪندا آهيون.

مثال: سنڪيٽ 200 چورس ميٽر پڪيڙ وارو هڪ مستطيل پلاٽ خريد ڪيو. پلاٽ جي ڊيگهه سندس ويڪر کان 10 ميٽر وڌيڪ هئي ته ان پلاٽ جي ڊيگهه ۽ ويڪر ڪيتري هئي؟

سمجهو ته پلاٽ جي ويڪر x ميٽر آهي.

$$\therefore \text{ڊيگهه} = (x + 10) \text{ ميٽر}$$

$$\text{ويڪر } x \text{ ڊيگهه} = \text{مستطيل پلاٽ جي پڪيڙ}$$

$$\therefore 200 = (x + 10) \times x$$

$$\therefore 200 = x^2 + 10x$$

$$x^2 + 10x = 200 \text{ يعني ته}$$

$$\therefore x^2 + 10x - 200 = 0$$

هاڻي $x^2 + 10x - 200 = 0$ اها ٻسڻهي مساوت حل ڪري اسان پلاٽ جي ڊيگهه ۽ ويڪر ٻڌائي سگهون ٿا. ٻسڻهي مساوتون ڪيئن حل ڪجن انهن جو اسان آڀياس ڪندا سين.

ذرا ياد ڪريون



مشغولي: $5x^2$, $3x^2 - 5x$, $x^2 + 3x - 5$ اهي گهڻپدا سڱه واري روپ ۾ لکي انهن پدن جي ضرببنڊڙن (گڻڪ) جي ڇاڇ ڪري انهن کي خالي چوڪنڊن ۾ صحيح طريقي لکو.

$$x^2 + 3x - 5, \quad 3x^2 - 5x + 0, \quad 5x^2 + 0x + 0$$

♦ x^2 جا گڻڪ نمبر وار 1, 3 ۽ 5 يعني 0 نه آهن آهن

♦ x جا گڻڪ نمبر وار 3, ۽ ۽ آهن.

♦ اسٽر پڊ نمبر وار ۽ ۽ آهن.

هتي ٻين ۽ ٽين گهڻپدن ۾ اسٽر پڊ 0 آهي.

ٻسڻهي مساوت جو پرمائڪ روپ (Standard form of quadratic equation)

هڪ ڦيرائڻي ۾ جنهن مساوت جي ڦيرائڻي جي سڱه وڌ ۾ وڌ 2 آهي. انهن مساوتن کي ٻسڻهي مساوت چئجي ٿو.

اُهي پرمائڪ روپ ۾ $ax^2 + bx + c = 0$ جي روپ ۾ لکجن ٿا. a , b ۽ c حقيقي عدد آهن ۽ a جو مله 0 نه هئڻ گهرجي.

$ax^2 + bx + c = 0$ ان روپ ۾ مساوت کي ٻسڻهي مساوت جو پرمائڪ روپ چئجي ٿو.

مشغولي: هيٺيون تختو پورو ڪريو

c	b	a	پرمائڪ روپ	ٻسڻهي مساوت
-4	0	1	$x^2 + 0x - 4 = 0$	$x^2 - 4 = 0$
...	...	...	...	$y^2 = 2y - 7$
...	...	...	...	$x^2 + 2x = 0$

حل ڪيل مثال

مثال (1) ٻڌايو ته هيٺين مساوتن مان ڪهڙيون مساوتون ٻسڻهي مساوتون آهن.

$$(1) 3x^2 - 5x + 3 = 0$$

$$(2) 9y^2 + 5 = 0$$

$$(3) m^3 - 5m^2 + 4 = 0$$

$$(4) (l + 2)(l - 5) = 0$$

حل : (1) $3x^2 - 5x + 3 = 0$ هن مساوت ۾ ڦيرائڻي جي وڌ ۾ وڌ سڱه 2 آهي

∴ اها مساوت ٻه سڱه مساوت آهي.

$$(2) \quad 9y^2 + 5 = 0 \quad \square \quad \text{هن مساوت ڀر ڦيرائڻي جي وٽ ڀر سگهه} \quad \square \quad \text{آهي.}$$

∴ اها مساوت ٻه سگهي مساوت $\square$.

$$(3) \quad m^3 - 5m^2 + 4 = 0 \quad \text{هن مساوت ڀر ڦيرائڻي جي وٽ ڀر وٽ سگهه 2 نه آهي.}$$

∴ اها مساوت ٻه سگهي مساوت $\square$.

$$(4) \quad (l + 2)(l - 5) = 0$$

$$\therefore (l - 5) + 2(l - 5)l = 0$$

$$\therefore l^2 - 5l + 2l - 10 = 0$$

$$\therefore l^2 - 3l - 10 = 0 \quad \square \quad \text{هن مساوت ڀر ڦيرائڻي جي وٽ ڀر وٽ} \quad \square \quad \text{آهي.}$$

∴ ڏنل مساوت ٻه سگهي مساوت $\square$.

ڄاڻي ونئون



ٻسگهي مساوتن جا جزا (حل) (Roots of a quadratic equation)

اسان اڳين درجن ڀر ڏٺو آهي ته x جو ملهه a ڪٿي گهٽپدي جو ملهه 0 هجي ته $(x-a)$ گهٽپدي جو جزو آهي. يعني $p(x)$ هڪ گهٽپدو آهي ۽ $p(a)=0$ آهي ته $(x-a)$ اهو $p(x)$ جو جزو آهي. اهڙي حالت ۾ a اهو $p(a)=0$ جو هڪ حل (جزو) آهي يا a اهو $p(x)=0$ جو جزو آهي ائين چئجي سگهجي ٿو.

مثال طور :

$$x^2 + 5x - 6 \quad \text{هن گهٽپدي ۾ } x = 2 \quad \text{ڪٿي,}$$

$$x^2 + 5x - 6 = 2^2 + 5 \times 2 - 6$$

$$= 4 + 10 - 6$$

$$= 8 \neq 0$$

$$\therefore x = 2 \quad \text{اهو } x^2 + 5x - 6 = 0 \quad \text{هن مساوت جو حل نه آهي.}$$

$$x^2 + 5x - 6 \quad \text{هن گهٽپدي ۾ } x = -6 \quad \text{ڪٿي,}$$

$$x^2 + 5x - 6 = (-6)^2 + 5 \times (-6) - 6$$

$$= 36 - 30 - 6 = 0$$

$$\therefore x = -6 \quad \text{اهو هن مساوت جو حل آهي}$$

$$\text{يعني } -6 \quad \text{اهو عدد } x^2 + 5x - 6 = 0$$

هن مساوت جو جزو آهي.

حل ڪيل مثال

مثال $2x^2 - 7x + 6 = 0$ هن مساوت جا (i) $x = \frac{3}{2}$ ۽ (ii) $x = -2$ اهي حل آهن ڇا اهو ٻڌايو

حل (i) $2x^2 - 7x + 6 = 0$ هنن گهٽپدي ۾ $x = \frac{3}{2}$ اهو ملهه ڪٿي گهٽپدي جو ملهه لھو.

$$2x^2 - 7x + 6 = 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{3}{2}\right) + 6$$

$$= 2 \times \frac{9}{4} - \frac{21}{2} + 6$$

$$= \frac{9}{2} - \frac{21}{2} + \frac{12}{2} = 0$$

$$\therefore x = \frac{3}{2} \text{ هن مساوت جو حل آهي}$$

(ii) $2x^2 - 7x + 6$ هنن گهٽپدي ۾ $x = -2$ اهو مله ڪٿي گهٽپدي جو مله لھو.

$$2x^2 - 7x + 6 = 2(-2)^2 - 7(-2) + 6$$

$$= 2 \times 4 + 14 + 6$$

$$= 28 \neq 0$$

$\therefore x = -2$ اهو $2x^2 - 7x + 6$ هن مساوت جو حل نه آهي.

مشغولي : جيڪڏهن $x = 5$ اهو $kx^2 - 14x - 5 = 0$ هن مساوت جو هڪ جزو آهي ته جو مله لھڻ لاءِ هيٺين مشغولي پوري ڪريو :

حل : $kx^2 - 14x - 5 = 0$ هن مساوت جو هڪ جزو آهي .

$\therefore x = \text{$ اهو مله مٿين پسڻهي مساوت ۾ رکي.

$$\therefore k \text{$$

$$\therefore 25k - 70 - 5 = 0$$

$$\therefore 25k - \text{$$

$$\therefore 25k = \text{$$

$$\therefore k = \frac{\text{$$

ياد رکڻو



(1) $ax^2 + bx + c = 0$ اهو پسڻهي مساوت جو پرمائڪ روپ آهي. جتي a, b ۽ c

حقيقي عدد آهن ۽ a جو مله 0 نه آهي.

(2) ڦيرائڻي جي جنهن مله ۾ پسڻهي مساوت جا ٻيئي پاسا هڪجهڙا آهن (يعني

پسڻهي مساوت حل ٿي سگهي ٿي) اهو مله پسڻهي مساوت جو حل يا پسڻهي مساوت جو جزو آهي.

آپيلاس 2.1

1. ڪهڙيون به ٻه ٻسڱهي مساوتون لکو.
2. هيٺين مساوتن مان ڪهڙيون مساوتون ٻسڱهي مساوتون آهن ٻڌايو.

(1) $x^2 + 5x - 2 = 0$

(4) $x + \frac{1}{x} = -2$

(2) $y^2 = 5y - 10$

(5) $(m + 2)(m - 5) = 0$

(3) $y^2 + \frac{1}{y} = 2$

(6) $m^3 + 3m^2 - 2 = 3m^3$
3. هيٺيون مساوتون $ax^2 + bx + c = 0$ جي روپ ۾ لکو هر هڪ مساوت a, b, c جو ملهه ٻڌايو.

(1) $2y = 10 - y^2$

(4) $3m^2 = 2m^2 - 9$

(2) $(x - 1)^2 = 2x + 3$

(5) $p(3 + 6p) = -5$

(3) $x^2 + 5x = -(3 - x)$

(6) $x^2 - 9 = 13$
4. ٻسڱهي مساوت جي پاسي ۾ ڏنل ملهه ان مساوت جا جزا آهن يا نه، ٻڌايو.

(1) $x^2 + 4x - 5 = 0$, $x = 1, -1$

(2) $2m^2 - 5m = 0$, $m = 2, \frac{5}{2}$
5. جيڪڏهن $x = 3$ آهي ته $kx^2 - 10x + 3 = 0$ هن مساوت جو هڪ جزو آهي ته k جو ملهه ڪيترو آهي؟
6. $5m^2 + 2m + k = 0$ هن ٻسڱهي مساوت جو هڪ جزو $\frac{-7}{5}$ ته k جو ملهه لهڻ لاءِ هيٺين مشغولي پوري ڪريو.

حل : $5m^2 + 2m + k = 0$ هن مساوت جو هڪ جزو آهي.

$\therefore m =$ مٿين مساوت ۾ رکڻ سان

$$\therefore 5 \times \text{ }^2 + 2 \times \text{ } + k = 0$$

$$\therefore \text{ } + \text{ } + k = 0$$

$$\therefore \text{ } + k = 0$$

$$\therefore k = \text{ }$$

ذرا ياد ڪريون



اسان گذريل سال گهٽڻا باب ۾ $x^2 - 4x - 5$, $2m^2 - 5m$, $a^2 - 25$ آهنڙن ٻسڱهي گهٽڻن جا جزا ڪيڏن جو طريقو سکي چڪا آهيون. هيٺين مشغولي ڪري ان جو دؤر ڪريو.

مشغولي : هيٺين ٻسڱهي گهٽڻن جا جزا ڪڍو.

(3) $a^2 - 25$

$$= a^2 - 5^2$$

$$= (\dots) (\dots)$$

(2) $2m^2 - 5m$

$$= \dots \dots$$

(1) $x^2 - 4x - 5$

$$= \underline{x^2 - 5x} + \underline{1x - 5}$$

$$= x(\dots) + 1(\dots)$$

$$= (\dots) (\dots)$$



جزا لھڻ واري طريقي سان ٻسڱهي مساوت حل ڪرڻ
(Solution of a quadratic equation by factorisation)

آسان ڦيرائڻي کي آڻڻ ملهه ڏيئي ٻسڱهي مساوت جا جزا مقرر ڪيا پر اهو وڌيڪ وقت لڳڻ وارو طريقو آهي. انڪري آسان هن حصي ۾ ٻسڱهي مساوتن جا حل جزا لھڻ واري طريقي سان حاصل ڪرڻ جو آپياس ڪرڻ وارا آھيون.

$$x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$$

هتي $(x - 5)$ ۽ $(x + 1)$ آهي $x^2 - 4x - 5$ ٻه سڱهي گھڻپدي جا ٻه ليکي جزا آهن يعني $x^2 - 4x - 5$ اهو ٻه سڱهي گھڻپدو ملندڙ $x^2 - 4x - 5 = 0$ اها ٻه سڱهي مساوت هيٺين طريقي سان لکي سگهجي ٿي.

$$(x - 5)(x + 1) = 0$$

جيڪڏهن ٻن عددن جي ضرب اُڀت 0 آهي ته انهن ٻنهي عددن مان گھٽ ۾ گھٽ هڪ عدد 0 آهي.

$$\therefore x - 5 = 0 \text{ يا } x + 1 = 0$$

$$\therefore x = 5 \text{ يا } x = -1$$

$\therefore$ ڏنل ٻسڱهي مساوت جا جزا 5 ۽ -1 آهن.

اهو مثال حل ڪرڻ لاءِ آسان ٻسڱهي پڌ جا ٻه ليکي جزا مليا آهن ٻي طريقي ٻسڱهي مساوتن کي حل ڪرڻ جي طريقي کي جزا لھڻ واري طريقي سان مساوتون حل ڪرڻ چئجي ٿو.

حل ڪيل مثال

هيٺيون مساوتون جزا لھڻ واري طريقي سان حل ڪريو.

$$(1) m^2 - 14m + 13 = 0 \quad (2) 3x^2 - x - 10 = 0$$

$$(3) 3y^2 = 15y \quad (4) x^2 = 3 \quad (5) 6\sqrt{3}x^2 + 7x = \sqrt{3}$$

$$(1) m^2 - 14m + 13 = 0$$

$$\therefore \underline{m^2 - 13m} - \underline{1m + 13} = 0$$

$$\therefore m(m - 13) - 1(m - 13) = 0$$

$$\therefore (m - 13)(m - 1) = 0$$

$$\therefore m - 13 = 0 \text{ يا } m - 1 = 0$$

$$\therefore m = 13 \text{ يا } m = 1$$

$\therefore$ ڏنل ٻسڱهي مساوت جا جزا 13 ۽ 1 آهن.

$$(2) 3x^2 - x - 10 = 0$$

$$\therefore \underline{3x^2 - 6x} + \underline{5x - 10} = 0$$

$$\therefore 3x(x - 2) + 5(x - 2) = 0$$

$$\therefore (3x + 5)(x - 2) = 0$$

$$\therefore 3x + 5 = 0 \text{ يا } x - 2 = 0$$

$$\therefore x = -\frac{5}{3} \text{ يا } x = 2$$

$\therefore$

ڏنل ٻسڱهي مساوت جا جزا $-\frac{5}{3}$ ۽ 2 آهن.

$$(4) x^2 = 3$$

$$\therefore x^2 - 3 = 0$$

$$\therefore x^2 - (\sqrt{3})^2 = 0$$

$$\therefore (x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0$$

$$\therefore x + \sqrt{3} = 0 \text{ يا } x - \sqrt{3} = 0$$

$$\therefore x = -\sqrt{3} \text{ يا } x = \sqrt{3}$$

∴ ٻسڱهي مساوت جا جزا $\sqrt{3}$ ۽ $-\sqrt{3}$ آهن.

$$(3) 3y^2 = 15y$$

$$\therefore 3y^2 - 15y = 0$$

$$\therefore 3y(y - 5) = 0$$

$$\therefore 3y = 0 \text{ يا } y - 5 = 0$$

$$\therefore y = 0 \text{ يا } y = 5$$

∴ ڏنل ٻسڱهي مساوت جا جزا 0 ۽ 5 آهن.

$$(5) 6\sqrt{3}x^2 + 7x = \sqrt{3}$$

$$\therefore 6\sqrt{3}x^2 + 7x - \sqrt{3} = 0$$

$$\therefore 6\sqrt{3}x^2 + 9x - 2x - \sqrt{3} = 0$$

$$\therefore 3\sqrt{3}x(2x + \sqrt{3}) - 1(2x + \sqrt{3}) = 0$$

$$\therefore (2x + \sqrt{3})(3\sqrt{3}x - 1) = 0$$

$$\therefore 2x + \sqrt{3} = 0 \text{ يا } 3\sqrt{3}x - 1 = 0$$

$$\therefore 2x = -\sqrt{3} \text{ يا } 3\sqrt{3}x = 1$$

$$\therefore x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ يا } x = \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

∴ ٻسڱهي مساوت جا جزا $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۽ $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ آهن.

$$6\sqrt{3} \times -\sqrt{3} = -18$$

$$\begin{array}{c} -18 \\ \swarrow \searrow \\ 9 \quad -2 \end{array}$$

$$9 = 3\sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

آپيلاس 2.2

1. هيٺيون ٻسڱهي مساوتون جزا لهڻ واري طريقي سان حل ڪريو :

$$(1) x^2 - 15x + 54 = 0$$

$$(2) x^2 + x - 20 = 0$$

$$(3) 2y^2 + 27y + 13 = 0$$

$$(4) 5m^2 = 22m + 15$$

$$(5) 2x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$(6) 6x - \frac{2}{x} = 1$$

اها ٻسڱهي مساوت جزا لهڻ واري طريقي سان حل

ڪرڻ لاءِ هيٺين مشغولي پوري ڪريو.

$$\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0 \quad (7)$$

$$\text{حل (7)} \quad \sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$$

$$\therefore \sqrt{2}x^2 + \boxed{} + \boxed{} + 5\sqrt{2} = 0$$

$$\therefore x(\dots\dots) + \sqrt{2}(\dots\dots) = 0$$

$$\therefore (x + \sqrt{2})(\dots) = 0$$

$$\therefore 0 = (\dots) \text{ يا } (x + \sqrt{2}) = 0$$

$$\therefore x = -\sqrt{2} \text{ يا } \boxed{} = x$$

$$\therefore \text{بسڻهي مساوت جا جزا} \quad \boxed{} \quad \neq \quad -\sqrt{2} \text{ آهن.}$$

$$(8) \star 3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0 \quad (9) 2m(m - 24) = 50$$

$$(10) 25m^2 = 9$$

$$(11) 7m^2 = 21m$$

$$(12) m^2 - 11 = 0$$

ڄاڻي وٺون



پورن ٻين سڱهه ڪرڻ واري طريقي سان بسڻهي مساوتون حل ڪرڻ
(Solution of a quadratic equation by completing the square)

ماسٽر : $x^2 + 10x + 2 = 0$ اها بسڻهي مساوت آهي يا نه؟

يوڱيش : ها سر ڇا ڪاڻ ته اها $ax^2 + bx + c = 0$ ان روپ ۾ آهي. هتي x ڦيرائڻي

جي وڌ ڀر وڌ سڱهه آهي. a جو ملهه 0 نه آهي.

ماسٽر : اها مساوت توکي حل ڪرڻ ايندي ڇا؟

ورشا : نه سر ڇا ڪاڻ ته 2 هن عدد جا جزا نه ٿا ٻڌائڻي سڱهجن، جن جي ضرب اُڀت 10 بڻجي.

ماسٽر : يعني اهڙا مثال حل ڪرڻ لاءِ ٻيو طريقو ڪم آڻڻو پوندو اهو طريقو سمجھي وٺو.

$x^2 + 10x$ ان ملهه ۾ ڪو نهڪندڙ ڀڄڻ جوڙي هڪ پوري ٻي سڱهه وارا ڀڄڻ حاصل ڪريو.

$$x^2 + 10x + k = (x + a)^2 \text{ جيڪڏهن}$$

$$x^2 + 10x + k = x^2 + 2ax + a^2 \text{ ته}$$

$$\therefore \text{ساڳين ڀڄڻ جي ڀيٽ ڪري، } 10 = 2a \quad \& \quad k = a^2$$

$$\therefore a = 5 \quad \& \quad \text{انڪري } k = a^2 = (5)^2 = 25$$

$$\text{هاڻي، } x^2 + 10x + 2 = (x + 5)^2 - 25 + 2 = (x + 5)^2 - 23$$

$$x^2 + 10x + 2 = 0 \text{ اها مساوت هاڻي توهان حل ڪري سگهو ٿا ڇا؟}$$

ريهاننا : ها سر، مساوت جو ساڄو پاسو ٻن پوري ٻي سڱهه جي تفاوت جي روپ ۾ آڻي

ڪري ان جا جزا ڪڍي سگهجن ٿا.

$$(x + 5)^2 - (\sqrt{23})^2 = 0$$

$$\therefore (x + 5 + \sqrt{23})(x + 5 - \sqrt{23}) = 0$$

$$\therefore x + 5 + \sqrt{23} = 0 \text{ يا } x + 5 - \sqrt{23} = 0$$

$$\therefore x = -5 - \sqrt{23} \text{ يا } x = -5 + \sqrt{23}$$

حميد : سر، حل ڪڍڻ جو ٻيو طريقو مون سوچيو آهي.

$$(x + 5)^2 - (\sqrt{23})^2 = 0$$

$$\therefore (x + 5)^2 = (\sqrt{23})^2$$

$$\therefore x + 5 = \sqrt{23} \quad \text{يا} \quad x + 5 = -\sqrt{23}$$

$$\therefore x = -5 + \sqrt{23} \quad \text{يا} \quad x = -5 - \sqrt{23}$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) حل ڪريو : $5x^2 - 4x - 3 = 0$

: مساوت کي پوري ٻي سڳهه واري روپ ۾، ٻن پوري ٻي سڳهه وارن ٻڌ جي تفاوت ۾ آڻڻ لاءِ x^2 جو گڏ ڪرڻ سان سهوليت پريوڻيندو يعني ڏنل مساوت کي 5 سان ونڊ ڪريو.

$$x^2 - \frac{4}{5}x - \frac{3}{5} = 0$$

$$x^2 - \frac{4}{5}x + k = x^2 - 2ax + a^2 \quad \text{تہ} \quad x^2 - \frac{4}{5}x + k = (x - a)^2 \quad \text{هاڻي جيڪڏهن}$$

$$x^2 - 2ax \quad \text{جي پيٽ} \quad x^2 - \frac{4}{5}x \quad \text{سان ڪري}$$

$$- 2ax = -\frac{4}{5}x \quad \therefore a = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\therefore k = a^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

$$x^2 - \frac{4}{5}x - \frac{3}{5} = 0 \quad \text{هاڻي،}$$

$$\therefore x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{4}{25} - \frac{4}{25} - \frac{3}{5} = 0$$

$$\therefore \left(x - \frac{2}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{25} + \frac{3}{5}\right) = 0$$

$$\therefore \left(x - \frac{2}{5}\right)^2 - \left(\frac{19}{25}\right) = 0$$

$$\therefore \left(x - \frac{2}{5}\right)^2 = \left(\frac{19}{25}\right)$$

$$\therefore x - \frac{2}{5} = \frac{\sqrt{19}}{5} \quad \text{يا} \quad x - \frac{2}{5} = -\frac{\sqrt{19}}{5}$$

$$\therefore x = \frac{2}{5} + \frac{\sqrt{19}}{5} \quad \text{يا} \quad x = \frac{2}{5} - \frac{\sqrt{19}}{5}$$

$$\therefore x = \frac{2 + \sqrt{19}}{5} \quad \text{يا} \quad x = \frac{2 - \sqrt{19}}{5}$$

ٻسڻهي مساوت جا جزا $\frac{2 + \sqrt{19}}{5}$ يا $\frac{2 - \sqrt{19}}{5}$ آهن.

مساوت $x^2 + bx + c = 0$ هن روپ ۾ هوندي آهي اُن کي

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c = 0$$

هن روپ ۾ يعني

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$$

هن روپ ۾ ليکبو آهي.

مثال (2) حل ڪريو $x^2 + 8x - 48 = 0$

طريقو I : پوري ٻين سگهه وارو طريقو

$$x^2 + 8x - 48 = 0$$

$$\therefore x^2 + 8x + 16 - 16 - 48 = 0$$

$$\therefore (x + 4)^2 - 64 = 0$$

$$\therefore (x + 4)^2 = 64$$

$$\therefore x + 4 = 8 \quad \text{يا} \quad x + 4 = -8$$

$$\therefore x = 4 \quad \text{يا} \quad x = -12$$

$\therefore$ بسگهي مساوت جا جزا 4 ۽ -12.

طريقو II : جزا لهڻ وارو طريقو

$$x^2 + 8x - 48 = 0$$

$$\therefore x^2 + 12x - 4x - 48 = 0$$

$$\therefore x(x + 12) - 4(x + 12) = 0$$

$$\therefore (x + 12)(x - 4) = 0$$

$$\therefore x + 12 = 0 \quad \text{يا} \quad x - 4 = 0$$

$$\therefore x = -12 \quad \text{يا} \quad x = 4$$

آپياس 2.3

هيٺيون بسگهي مساوتون پوري ٻين سگهه واري طريقن حل ڪريو

$$(1) x^2 + x - 20 = 0$$

$$(2) x^2 + 2x - 5 = 0$$

$$(3) m^2 - 5m = -3$$

$$(4) 9y^2 - 12y + 2 = 0$$

$$(5) 2y^2 + 9y + 10 = 0$$

$$(6) 5x^2 = 4x + 7$$

ڄاڻي وٺون



بسگهي مساوتون حل ڪرڻ جو سوتر (Formula for solving a quadratic equation)

$ax^2 + bx + c$ هن حساب ڪي a سان ون ڪري $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ ($\because a \neq 0$) اهو حساب ملي ٿو.

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{ڪي ٻن پوري سگهه وارن پڌ جي تفاوت واري روپ ۾ ٺاهي}$$

هن مساوت کي يعني $ax^2 + bx + c = 0$ هن مساوت جو سولو حل ۽ جزا ملن ٿا.

$$ax^2 + bx + c = 0 \dots (I)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \dots \text{ٻنهي پاسي } a \text{ سان ونڊ ڪري}$$

$$\therefore x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0$$

$$\therefore \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

$$\therefore \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0 \quad \therefore \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\therefore x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \quad \text{يا} \quad x + \frac{b}{2a} = -\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$\therefore x = -\frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \quad \text{يا} \quad x = -\frac{b}{2a} - \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$\therefore x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{يا} \quad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

تہ اهو حل ٿوري ۾ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ائين لکجي ٿو ۽ α (آلفا)، β (بيتا)

$$\therefore \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{۽} \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \dots \dots (I)$$

$ax^2 + bx + c = 0$ هن مساوت ۾ a, b, c جا مله $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ هن روپ ۾ لکي،

حساب کي سولو روپ ڏنو، جيئن مساوت جو حل ملي. ان ڪري $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ کي پسڻهي مساوتن کي حل ڪرڻ جو سوتر چئجي ٿو.

(پسڻهي مساوت جي ٻن ملن مان ڪنهن به حل کي ڪهڙي به ڏيکاري سگهجي ٿي)

پهرين (I) وڌان بدران $\alpha = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ۽ $\beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ائين به مڃي سگهجي ٿو.

$$\alpha > \beta, \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \alpha = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{تہ} \quad \alpha < \beta \quad \text{اهو ڏيان ڏيو}$$

حل ڪيل مثال

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-14) \pm \sqrt{144}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{14 \pm 12}{2}$$

$$\therefore m = \frac{14+12}{2} \quad \text{يا} \quad m = \frac{14-12}{2}$$

$$\therefore m = \frac{26}{2} \quad \text{يا} \quad m = \frac{2}{2}$$

$$\therefore m = 13 \quad \text{يا} \quad m = 1$$

$\therefore$ پسڻهي مساوت جا جزا 1 ۽ 13 آهن.

سوتر ڪم آڻي هيٺين پسڻهي مساوت حل ڪريو

$$m^2 - 14m + 13 = 0 \quad (1) \quad \text{مثال}$$

حل : $m^2 - 14m + 13 = 0$ کي

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{سان پيٽ ڪري}$$

$$a = 1, b = -14, c = 13,$$

$$\therefore b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4 \times 1 \times 13$$

$$= 196 - 52$$

$$= 144$$

مثال (2) $x^2 + 10x + 2 = 0$

حل: $x^2 + 10x + 2 = 0$ جي

$ax^2 + bx + c = 0$ سان ڀيٽ ڪري

$a = 1, b = 10, c = 2,$

$\therefore b^2 - 4ac = (10)^2 - 4 \times 1 \times 2$

$= 100 - 8$

$= 92$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$= \frac{-10 \pm \sqrt{92}}{2 \times 1}$

$= \frac{-10 \pm \sqrt{4 \times 23}}{2}$

$= \frac{-10 \pm 2\sqrt{23}}{2}$

$= \frac{2(-5 \pm \sqrt{23})}{2}$

$\therefore x = -5 \pm \sqrt{23}$

$\therefore x = -5 + \sqrt{23}$ يا $x = -5 - \sqrt{23}$

$\therefore$ ٻسڻهي مساوت جا جزا $-5 + \sqrt{23}$ ۽ $-5 - \sqrt{23}$ آهن.

مثال (3) $x^2 - 2x - 3 = 0$

حل $ax^2 + bx + c = 0$ جي ڀيٽ ڪري

$a = 1, b = -2, c = -3,$

$\therefore b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$

$\therefore x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{16}}{2}$ يا $x = \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2}$

$= \frac{2+4}{2}$ يا $\frac{2-4}{2}$

$= 3$ يا -1

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ

$x^2 - 2x - 3 = 0$ اها ٻسڱهي مساوت هيٺ گرافي طريقي حل ڪئي ويئي آهي، اهو سمجهي وٺو

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \text{ معنيٰ } x^2 = 2x + 3$$

x جي جنهن ملهه سان $x^2 = 2x + 3$ هن مساوت جو حل نڪرندو، اهو ملهه ئي مساوت جو حل آهي.

$y = x^2 = 2x + 3$ سمجهو ته $y = x^2$ ۽ $y = 2x + 3$ انهن مساوتن جو گراف ڪڍو.

$$y = x^2$$

x	3	2	1	0	-1	-2	-3
y	9	4	1	0	1	4	9

$$y = 2x + 3$$

x	-1	0	1	-2
y	1	3	5	-1

اهي گراف هڪ ٻئي

کي $(-1, 1)$ ۽ $(3, 9)$ انهن ٽپڪن

وٽ ڪپين ٿا.

$\therefore x^2 = 2x + 3$ هن مساوت جو،

$x^2 - 2x - 3 = 0$ يعني جو حل

$x = 3$ ۽ $x = -1$ آهي.

گڏ ڏنل شڪل ۾ $y = 2x + 3$ ۽ $y = x^2$


انهن مساوتن جو گراف ڪڍيو ويو

آهي. انهن جي ڪپيندڙ ٽپڪي وٽ

$x^2 = 2x + 3$ هن مساوت جو، يعني

$x^2 - 2x - 3 = 0$ جو حل ڪيئن ملندو،

اهو سمجهي وٺو.



مثال (4) $25x^2 + 30x + 9 = 0$

حل $25x^2 + 30x + 9 = 0$ جي

$ax^2 + bx + c = 0$ سان پيٽ ڪري

$a = 25, b = 30, c = 9,$

$\therefore b^2 - 4ac = (30)^2 - 4 \times 25 \times 9$

$= 900 - 900 = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$= \frac{-30 \pm \sqrt{0}}{2 \times 25}$

$\therefore x = \frac{-30+0}{50}$ يا $x = \frac{-30-0}{50}$

$\therefore x = -\frac{30}{50}$ يا $x = -\frac{30}{50}$

$\therefore x = -\frac{3}{5}$ يا $x = -\frac{3}{5}$

ڌيان ڏيو، $25x^2 + 30x + 9 = 0$

هن مساوت جا ٻيئي جزا هڪجهڙا آهن.

ساڳي طرح $25x^2 + 30x + 9 = 0$

يعني $(5x + 3)^2 = 0$ اهو ڌيان ڏيو.

مثال (5) $x^2 + x + 5 = 0$

حل $x^2 + x + 5 = 0$ جي

$ax^2 + bx + c = 0$ سان پيٽ ڪري

$a = 1, b = 1, c = 5,$

$\therefore b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 1 \times 5$

$= 1 - 20$

$= -19$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$= \frac{-1 \pm \sqrt{-19}}{2 \times 1}$

$= \frac{-1 \pm \sqrt{-19}}{2}$

پر $\sqrt{-19}$ اهو حقيقي عدد نه آهي يعني ڏنل
بسڱهي مساوت جا جزا حقيقي عدد نه آهن.

مشغولي : $2x^2 + 13x + 15 = 0$ اها بسڱهي مساوت جزا ڪيڏن واري طريقي، پوري ٻي سڱهه وارو طريقو
۽ بسڱهي سوتر کي ڪم آڻي حل ڪريو. جواب ساڳيا آچن ٿا ڇا، اها ڇاچ ڪريو.

آپياس 2.4

1. هيٺين بسڱهي مساوتن کي پرمائڪ روپ سان پيٽ ڪري a, b, c جو ملهه لھو.

(1) $x^2 - 7x + 5 = 0$

(2) $2m^2 = 5m - 5$

(3) $y^2 = 7y$

2. هيٺين بسڱهي مساوتن کي سوتر ڪم آڻڻ واري طريقي سان حل ڪريو.

(1) $x^2 + 6x + 5 = 0$

(2) $x^2 - 3x - 2 = 0$


(3) $3m^2 + 2m - 7 = 0$

(4) $5m^2 - 4m - 2 = 0$

(5) $y^2 + \frac{1}{3}y = 2$

(6) $5x^2 + 13x + 8 = 0$

3. $x^2 + 2\sqrt{3}x + 3 = 0$ اها ٻسڱهي مساوت سوتر ڪم آڻڻ واري طريقي سان هيٺ ڏنل هڪ شڪل ۾ ڏنل ڄاڻ وسيلي حل ڪريو.



ڄاڻي وٺون



ٻسڱهي مساوتن جي حلن جا قسم (Nature of roots of a quadratic equation)

ٻسڱهي مساوت $ax^2 + bx + c = 0$ جا جزا $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ اهي هوندا آهن،
اھو آسان آڀياس ڪيو آھي.

(1) جيڪڏهن $b^2 - 4ac = 0$ آهي $\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{0}}{2a}$ ته $x = \frac{-b+0}{2a}$ ته $x = \frac{-b-0}{2a}$
ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ برابر آهن.

(2) جيڪڏهن $b^2 - 4ac > 0$ آهي ته $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

يعني $x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ۽ $x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ الڳ ساڳيا آهن.

(3) جيڪڏهن $b^2 - 4ac < 0$ آهي ته $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

اھو حقيقي عدد نہ آھي يعني ھنن ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي نہ آھن.

ٻسڱهي مساوت $ax^2 + bx + c = 0$ جي جزن جو قسم $b^2 - 4ac$ جي ملهه تي مقرر ٿيندو آهي.

انڪري $b^2 - 4ac$ کي ٻسڱهي مساوت جو ڊسڪريميننٽ (discriminant) چئجي ٿو اهو Δ

(ڊيلٽا) نشانيءَ سان ڏيکاربو آهي (Δ اهو هڪ ٽريڪ آکر آهي)

مشغولي: هيٺ ڏنل ڄاڻ وسيلي خال ڀريو :

ڊسڪريميننٽ جو ملهه	جزن جو قسم
50	(1)
-30	(2)
0	(3)

حل ڪيل مثال

مثال (1) $x^2 + 10x - 7 = 0$ ان ٻسڱهي مساوت جي ڊسڪریمیننٽ جو ملهه لھو

حل : $x^2 + 10x - 7 = 0$ جي پيٽ $ax^2 + bx + c = 0$ سان ڪرڻ سان

$$a = 1, b = 10, c = -7,$$

$$\therefore b^2 - 4ac = 10^2 - 4 \times 1 \times (-7)$$

$$= 100 + 28$$

$$= 128$$

مثال (2) ڊسڪریمیننٽ مان ٻسڱهي مساوتن جي جزن جو قسم ٻڌايو.

(ii) $x^2 + 2x - 9 = 0$

پيٽ سان $x^2 + 2x - 9 = 0$ حل

ڪري هتي $ax^2 + bx + c = 0$

$$a = \boxed{}, b = 2, c = \boxed{}$$

$$\therefore b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times \boxed{} \times \boxed{}$$

$$\therefore \Delta = 4 + \boxed{}$$

$$= 40$$

$$\therefore b^2 - 4ac > 0$$

$\therefore$ ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي عدد نه آهن.

(i) $2x^2 - 5x + 7 = 0$

پيٽ سان $2x^2 - 5x + 7 = 0$ حل

ڪري هتي $ax^2 + bx + c = 0$

$$a = 2, b = -5, c = 7$$

$$\therefore b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 7$$

$$\therefore \Delta = 25 - 56$$

$$= -31$$

$$\therefore b^2 - 4ac < 0$$

$\therefore$ ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ اڻساڻيا آهن.

(iii) $\sqrt{3}x^2 + 2\sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$

پيٽ سان $\sqrt{3}x^2 + 2\sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$ حل

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a = \sqrt{3}, b = 2\sqrt{3}, c = \sqrt{3},$$

$$\therefore b^2 - 4ac = (2\sqrt{3})^2 - 4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

$$= 4 \times 3 - 4 \times 3$$

$$= 12 - 12$$

$$= 0$$

$\therefore$ ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ ساڻيا آهن.



ٻسڻهي مساوت جي جزن ۽ گڻڪن جي وچ ۾ لاڳاپو
(Relation between roots and coefficients of a quadratic equation)

جيڪڏهن $ax^2 + bx + c = 0$ هن ٻسڻهي مساوت جا جزا α ۽ β هجن ته

$$\begin{aligned}\alpha \times \beta &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) \times (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a}\end{aligned}$$

$$\therefore \alpha \beta = \frac{c}{a}$$

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= -\frac{2b}{2a}\end{aligned}$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

مشغولي: هيٺ ڏنل چوڪنڊن ۾ مناسب انگ لکو

$$\text{۽ } \boxed{} = \alpha + \beta \quad \text{۾ } 10x^2 + 10x + 1 = 0$$

$$\boxed{} = \alpha \times \beta$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) α ۽ β هن $2x^2 + 6x - 5 = 0$ ٻسڻهي مساوت جا جزا آهن، ته $\alpha + \beta$ ۽ $\alpha \times \beta$ جا ملهه لھو.

حل: $2x^2 + 6x - 5 = 0$ جي ڀيٽ ۾ $ax^2 + bx + c = 0$ سان ڪرڻ سان

$$\therefore a = 2, b = 6, c = -5$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{2} = -3 \therefore$$

$$\text{۽ } \alpha \times \beta = \frac{c}{a} = \frac{-5}{2}$$

مثال (2) $x^2 - 13x + k = 0$ هن ٻسڻهي مساوت جي جزن ۾ فرق 7 آهي، ته k جو ملهه لھو.

حل : $x^2 - 13x + k = 0$ جي ڀيٽ $ax^2 + bx + c = 0$ ڪرڻ سان

$$a = 1, b = -13, c = k$$

سمجھو ته α ۽ β اهي ڏنل ٻسڻهي مساوت جا جزا آهن. $\alpha > \beta$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-13)}{1} = 13 \quad \dots \dots \dots (I)$$

$$\text{پر } \alpha - \beta = 7 \quad \dots \dots \dots (II) \text{ (ڏنل آهي)}$$

$$2\alpha = 20 \quad \dots \dots \dots (I) \text{ ۽ } (II) \text{ جوڙ ڪرڻ سان}$$

$$\therefore \alpha = 10$$

$$\therefore 10 + \beta = 13 \quad \dots \dots \dots (I) \text{ ۾}$$

$$\therefore \beta = 13 - 10$$

$$\therefore \beta = 3$$

$$\text{پر } \alpha \times \beta = \frac{c}{a}$$

$$\therefore 10 \times 3 = \frac{k}{1}$$

$$\therefore k = 30$$

مثال (3) $x^2 + 5x - 1 = 0$ ۾ α ۽ β اهي ٻسڻهي مساوت جا جزا آهن ته

ملهه لھو (i) $\alpha^3 + \beta^3$ (ii) $\alpha^2 + \beta^2$

$$\text{حل : } x^2 + 5x - 1 = 0$$

$$\text{هتي } a = 1, b = 5, c = -1$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-5}{1} = -5$$

$$\alpha \times \beta = \frac{c}{a} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\begin{aligned} (i) \quad \alpha^3 + \beta^3 &= (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \\ &= (-5)^3 - 3 \times (-1) \times (-5) \\ &= -125 - 15 \\ \alpha^3 + \beta^3 &= -140 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (-5)^2 - 2 \times (-1) \\ &= 25 + 2 \\ \alpha^2 + \beta^2 &= 27 \end{aligned}$$



جزا ڏنل هجڻ ته ٻسگهي مساوت ڪيئن حاصل ڪجي؟
(To obtain a quadratic equation having given roots)

سمجهو ته α ۽ β اهي x قيرائتي واري ٻسگهي مساوت جا جزا آهن.

$$\therefore x = \alpha \text{ يا } x = \beta$$

$$\therefore x - \alpha = 0 \text{ يا } x - \beta = 0$$

$$\therefore (x - \alpha)(x - \beta) = 0$$

$$\therefore x^2 - \alpha x - \beta x + \alpha\beta = 0$$

$$\therefore x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

يعني α ۽ β جزا هوندڙ مساوت

$$x^2 - \text{جزن جي ضرب اُپت } x + (\text{جزن جي جوڙ اُپت}) = 0 \text{ اهو سوتر ملي ٿو.}$$

مشغولي (I): جزن جي جوڙ اُپت 10 ۽ جزن جي ضرب اُپت 9 هوندڙ ٻسگهي مساوت لکو.

$$x^2 - \boxed{}x + \boxed{} = \boxed{}$$

مشغولي (II): $\alpha = 2$ ۽ $\beta = 5$ اهي جزا هوندڙ ٻسگهي مساوت ڪهڙي آهي؟

$$x^2 + (\boxed{} + \boxed{})x + \boxed{} \times \boxed{} = 0$$

$$x^2 - \boxed{}x + \boxed{} = 0 \text{ معنيٰ}$$

هن مساوت کي ڪهڙي به ٻڙي انگ سان ضرب ڪرڻ ملندڙ مساوت جا جزا α ۽ β هوندا، اهو ڏيان ٿي رکو.

حل ڪيل مثال

مثال: جنهن ٻسگهي مساوت جا جزا -3 ۽ -7 آهن، اها ٻسگهي مساوت تيار ڪريو.

حل: سمجهو ته $\alpha = -3$ ۽ $\beta = -7$

$$\therefore \alpha + \beta = (-3) + (-7) = -10 \quad \alpha \times \beta = (-3) \times (-7) = 21$$

$$\therefore \text{ملندڙ ٻسگهي مساوت } x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$\therefore x^2 - (-10)x + 21 = 0$$

$$\therefore x^2 + 10x + 21 = 0$$



(1) $ax^2 + bx + c = 0$ هن ٻسگهي مساوت جا جزا α ۽ β آهن ته

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{۽} \quad \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \alpha \quad (i)$$

$$\alpha \times \beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad (ii)$$

(2) $ax^2 + bx + c = 0$ ٻسگهي مساوت جي جزن جو قسم $b^2 - 4ac$ جي ملهه تي مدار رکي ٿو هن ملهه کي ڊسڪریمیننٽ (discriminant) چئجي ٿو. Δ گريڪ آکر سان ڏيکاربو آهي.

(3) جيڪڏهن $\Delta = 0$ آهي ته ٻسگهي مساوت جا ٻيئي جزا ساڳيا حقيقي عدد هوندا



آهن جيڪڏهن $\Delta > 0$ آهي ته ٻسگهي مساوت جا ٻيئي جزا الڳ ساڳيا حقيقي عدد

هوندا آهن جيڪڏهن $\Delta < 0$ ته ٻسگهي مساوت جا جزا حقيقي عدد نه هوندا آهن.


(4) جنهن ٻسگهي مساوت جا جزا α ۽ β آهن ته $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ آهي.

آپياس 2.5

1. مشغولي : هيٺيان چؤڪنڊا ڀريو.



(3) جيڪڏهن α ۽ β هيٺين ٻسگهي مساوت جا جزا آهن ته



2. هيٺين ٻسگهي مساوتن جي ڊسڪریمیننٽ جو ملهه لھو

(1) $x^2 + 7x - 1 = 0$ (2) $2y^2 - 5y + 10 = 0$ (3) $\sqrt{2}x^2 + 4x + 2\sqrt{2} = 0$

3. هيٺين مساوتن جي ڊسڪریمیننٽس مان جزن جا قسم ٻڌايو :

(1) $x^2 - 4x + 4 = 0$ (2) $2y^2 - 7y + 2 = 0$ (3) $m^2 + 2m + 9 = 0$

4. ٻسگهي مساوتون ٺاهيو جڏهن مساوتن جا جزا هيٺيان آهن.

(1) $0 \neq 4$ (2) $3 \neq -10$ (3) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ (4) $2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5}$

5. $x^2 - 4kx + k + 3 = 0$ ٻسگهي مساوت جي جنن جي جوڙا ۽ انجي ضرب اُپت جي ٻيٽ آهي ته k جو ملهه لھو.

6. جيڪڏهن α ۽ β هي $y^2 - 2y - 7 = 0$ ٻسگهي مساوت جا جزا آهن ته
(1) $\alpha^3 + \beta^3$ (2) $\alpha^2 + \beta^2$ جا ملهه لھو.

7. هيٺين ٻه سگهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ ساڳيا آهن ته k جو ملهه لھو.

(1) $3y^2 + ky + 12 = 0$ (2) $kx(x - 2) + 6 = 0$

جاڻي وٺون



ٻسگهي مساوتن جو اُپيوڱ (Application of quadratic equation)

روز مره جي زندگيءَ ۾ ڪيترن وڃين کي حل ڪرڻ لاءِ ٻسگهي مساوتن جي ضرورت پوندي آهي. اهو باب آسان هن حصي ۾ سڳو وارا آهيون.

مثال (1) توسا ۾ شرعي رتناڪر راو جي ڪپتيءَ ۾ گوني ڪنڊ واري چوڪنڊي بصر رکڻ جي پيتيءَ جي تري جي ڊيگهه، ويڪر کان 7 ميٽر وڌيڪ آهي ۽ اُڀر ڊيگهه کان 1 ميٽر وڌيڪ آهي ته ان بصر رکڻ واري پيتيءَ جي ڊيگهه ۽ ويڪر لھو.

∴ ڊيگهه $(x + 7)$ ميٽر اُڀر $= x + 7 + 1 = (x + 8)$ ميٽر

پٽٽاگورس جو نيمر ڪم آهي

$$x^2 + (x + 7)^2 = (x + 8)^2$$

$$x^2 + x^2 + 14x + 49 = x^2 + 16x + 64$$

$$\therefore x^2 + 14x - 16x + 49 - 64 = 0$$

$$\therefore x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$\therefore \underline{x^2 - 5x} + \underline{3x - 15} = 0$$

$$\therefore x(x - 5) + 3(x - 5) = 0$$

$$\therefore (x - 5)(x + 3) = 0$$


$$\therefore x - 5 = 0 \text{ يا } x + 3 = 0$$

$$\therefore x = 5 \text{ يا } x = -3$$

پر ويڪر ڪاٿو نٿي ٿي سگهي -3 ∴ $x \neq -3$

$$\therefore x = 5 \text{ ۽ } x + 7 = 5 + 7 = 12$$

∴ بصر جي پيتيءَ جي تري جي ڊيگهه 12 ميٽر ۽ ويڪر 5 ميٽر آهي.



بصر رکڻ جي پيتي

مثال: (2) هڪ ريل گاڏي يڪسان رفتار سان 360 ڪم مفاصلو طيءَ ڪري ٿي. پر هن جي رفتار 5 ڪم في ڪلاڪ وڌائڻ سان هن کي ساڳيو مفاصلو طيءَ ڪرڻ ۾ 48 منٽ گهٽ لڳندو، ته ريل گاڏيءَ جي شروعاتي رفتار لھو.

حل: سمجھو ته ريل گاڏيءَ جي شروعاتي رفتار x ڪم في ڪلاڪ آھي.

∴ رفتار وڌائڻ کانپوءِ هن جي رفتار $(x+5)$ ڪم في ڪلاڪ آھي.

$$360 \text{ ڪم مفاصلو طيءَ ڪرڻ لاءِ شروعاتي لڳندڙ وقت} = \frac{\text{مفاصلو}}{\text{رفتار}} = \frac{360}{x} \text{ ڪلاڪ}$$

$$\text{رفتار وڌائڻ کانپوءِ اُهو مفاصلو طيءَ ڪرڻ لاءِ لڳندڙ وقت ڪلاڪ} = \frac{360}{x+5}$$

ڏنل شرط مطابق

$$\frac{360}{x+5} = \frac{360}{x} - \frac{48}{60} \quad \text{--- (∵ 48 منٽ} = \frac{48}{60} \text{ ڪلاڪ)}$$

$$\therefore \frac{360}{x} - \frac{360}{x+5} = \frac{48}{60}$$

$$\therefore \frac{1}{x} - \frac{1}{x+5} = \frac{48}{60 \times 360} \quad \text{--- (ٻنهي پاسي 360 سان ونڊ ڪري)}$$

$$\therefore \frac{x+5-x}{x(x+5)} = \frac{4}{5 \times 360}$$

$$\therefore \frac{5}{x^2+5x} = \frac{1}{5 \times 90}$$

$$\therefore \frac{5}{x^2+5x} = \frac{1}{450}$$

$$\therefore x^2 + 5x = 2250$$

$$\therefore x^2 + 5x - 2250 = 0$$

$$\therefore \underline{x^2 + 50x} - \underline{45x - 2250} = 0$$

$$\therefore x(\underline{x + 50}) - 45(\underline{x + 50}) = 0$$

$$\therefore (x + 50)(x - 45) = 0$$

$$\therefore x + 50 = 0 \quad \text{يا} \quad x - 45 = 0$$

$$\therefore x = -50 \quad \text{يا} \quad x = 45$$

$$x \neq -50 \quad \therefore \text{پر رفتار ڪاٺو نه ٿئي سگھي}$$


$$\therefore x = 45$$

∴ ريل گاڏيءَ جي شروعاتي رفتار 45 ڪم في ڪلاڪ آھي.

$$\begin{array}{r} -2250 \\ +50 \quad -45 \end{array}$$


آپياس 2.6

- پرگنتيءَ جي 2 سال اڳهه جي 3 سال پوءِ جي عمرن جي ضرب اُڀت 84 آهي، ته هن جي هاڻوڪي عمر ڪيتري آهي؟
- ٻن لاڳيتن قدرتي ٻڌي عددين جي ٻي سگهه جي جوڙ اُڀت 244 آهي ته اهي عدد لھو.
- شري مڌو سوڏن جي نارنگين جي باغ ۾ آڌي قطار ۾ وڻن جو انداز اُڀي قطار ۾ وڻن جي انداز کان 5 وڌيڪ آهي. جيڪڏهن نارنگين جي باغ ۾ ڪل 150 وڻ آهن ته آڌي ۽ اُڀي قطار ۾ وڻن جو انداز لھو.



4. وويڪ، ڪشور کان 5 سال وڏو آهي، انهن جي عمر جي ضرب موجب اُڀتڙ انگن جو جوڙ $\frac{1}{6}$ آهي ته انهن جي هاڻوڪي عمر لھو.
5. سوپن کي حسابن ۾ پهرين ٽيسٽ ۾ ٻين ٽيسٽ کان 10 مارڪون وڌيڪ مليون. ٻين ٽيسٽ جي مارڪن جي پنجوڻ پهرين ٽيسٽ جي مارڪن جي ٻي سگهه جيتريون آهن، ته هن جون پهرين ٽيسٽ ۾ مارڪون ڪيتريون آهن؟
6. شري قاسم کي مٽيءَ جا برتن ٺاهڻ جو گهرو ڌنڌو آهي. هو هر روز مقرر انداز ۾ برتن ٺاهيندو آهي. هر هڪ برتن جي ٺاهڻ جي قيمت ۽ هڪ ڏينهن ۾ ٺاهيل برتنن جو انداز لھو.
7. پرتيڪ کي ٻيڙيءَ رستي 36 ڪم نديءَ ۾ مٿاهين طرف ۽ واپس اُنهيءَ جڳهه تي پهچڻ لاءِ 8 ڪلاڪ لڳن ٿا. جيڪڏهن بينل پاڻيءَ ۾ ٻيڙيءَ جي رفتار 12 ڪم في ڪلاڪ آهي ته نديءَ جي وهڪري جي رفتار لھو.
8. پنٿوءَ کي هڪ ڪم ڪرڻ لاءِ نشوءَ کان 6 ڏينهن وڌيڪ لڳن ٿا. ٻيئي گڏجي ڪم ڪن ٿا ته ڪم ڪرڻ لاءِ ڪي 4 ڏينهن لڳن ٿا. ته اهو ڪم اڪيلي سر پوري ڪرڻ لاءِ هر هڪ کي ڪيترا ڏينهن لڳندا؟
9. 460 عدد کي هڪ قدرتي انگ سان ونڊ ڪرڻ سان ونڊ اُڀت، ونڊيندڙ جي پنجوڻ کان 6 وڌيڪ ٿئي ٿي ۽ پاڇي 1 بچي ٿي ته ونڊ اُڀت ۽ ونڊيندڙ لھو.

ڏنل ٻڌور پاسي ٿرٿر نريمر $\square ABCD$ ۾
 $AB \parallel CD$ آهي ۽ ان جي پڪيٽ 33 چورس س
 م آهي، ته شڪل ۾ ڏنل جاڳ وسيلي چوڪنڊي جي
 چئني پاسن جي ڊيگهه لھو.



$$\therefore (3x + 10)(\text{----}) = 0$$

$$\therefore (3x + 10) = 0 \quad \text{يا} \quad \boxed{} = 0$$

$$\therefore x = -\frac{10}{3} \quad \text{يا} \quad x = \boxed{}$$

پر ڏيگهه ڪاٿو نه ٿي سگهي.

$$\therefore x \neq -\frac{10}{3} \quad \therefore x = \boxed{}$$

$$AB = \text{---}, CD = \text{---}, AD = BC = \text{---}$$

حل : $\square ABCD$ ٻيڙ پاسو ٽرئيزيڙ آهي $AB \parallel CD$

$$\boxed{} (AB + CD) \frac{1}{2} = (\square ABCD) A$$

$$\therefore 33 = \frac{1}{2} x + 2x + 1) \times \boxed{}$$

$$\therefore \boxed{} = (3x + 1) \times \boxed{}$$

$$\therefore 3x^2 + \boxed{} - \boxed{} = 0$$

$$\therefore 3x (\dots) + 10(\dots) = 0$$

گڏيل آڀياس 2

1. هيٺين سوالن ۾ صحيح جواب چونڊيو :

(1) هيٺين مان ڪهڙي ٻسگهي مساوت آهي؟

$$(A) \frac{5}{x} - 3 = x^2 \quad (B) x(x + 5) = 2 \quad (C) n - 1 = 2n \quad (D) \frac{1}{x^2} (x + 2) = x$$

(2) هيٺين مان ڪهڙي ٻسگهي مساوت نه آهي؟

$$(A) x^2 + 4x = 11 + x^2 \quad (B) x^2 = 4x \quad (C) 5x^2 = 90 \quad (D) 2x - x^2 = x^2 + 5$$

(3) $x^2 + kx + k = 0$ جا جزا حقيقي ۽ ساڳيا آهن ته هيٺين ملهن مان k جو ملهه ڪهڙو آهي؟

$$(A) 0 \quad (B) 4 \quad (C) 0 \quad \text{يا} \quad 4 \quad (D) 2$$

(4) $\sqrt{2}x^2 - 5x + \sqrt{2} = 0$ ۾ هيٺين مان ڊسڪريميننٽ جو ملهه ڪهڙو آهي؟

$$(A) -5 \quad (B) 17 \quad (C) \sqrt{2} \quad (D) 2\sqrt{2} - 5$$

(5) هيٺين مان ڪهڙي مساوت جا جزا 3 ۽ 5 آهن؟

$$(A) x^2 - 15x + 8 = 0 \quad (B) x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$(C) x^2 + 3x + 5 = 0 \quad (D) x^2 + 8x - 15 = 0$$

(6) هيٺين مان ڪهڙي مساوت جي جزن جي جوڙ اُپٽ -5 آهي؟

$$(A) 3x^2 - 15x + 3 = 0 \quad (B) x^2 - 5x + 3 = 0$$

$$(C) x^2 + 3x - 5 = 0 \quad (D) 3x^2 + 15x + 3 = 0$$

(7) $\sqrt{5}m^2 - \sqrt{5}m + \sqrt{5} = 0$ لاءِ هيٺين وڌاڻن مان ڪهڙو وڌاڻ لاڳو ٿئي ٿو؟

$$(A) \text{ حقيقي ۽ اڻ ساڳيا جزا} \quad (B) \text{ حقيقي ۽ ساڳيا جزا}$$

$$(C) \text{ جزا حقيقي اٽڪ نه آهن} \quad (D) \text{ ٽي جزا}$$

(8) $x^2 + mx - 5 = 0$ ٻسگهي مساوت جو هڪ جزو 2 آهي ته هيٺين مان m جو ملهه ڪيترو آهي.

$$(A) -2 \quad (B) -\frac{1}{2} \quad (C) \frac{1}{2} \quad (D) 2$$

2. هيٺين مان ڪهڙيون مساوتون ٻسڱهي مساوتون آهن؟

$$(1) m^2 + 2m + 11 = 0 \quad (2) x^2 - 2x + 5 = x^2 \quad (3) (x + 2)^2 = 2x^2$$

3. هيٺين مان هر هڪ مساوت جي ڊسڪريميننٽ جو ملهه لھو

$$(1) 2y^2 - y + 2 = 0 \quad (2) 5m^2 - m = 0 \quad (3) \sqrt{5}x^2 - x - \sqrt{5} = 0$$

4. $2x^2 + kx - 2 = 0$ ٻسڱهي مساوت جو هڪ جزو -2 آهي، ته k جو ملهه ڪيترو آهي؟

5. اهڙيون ٻسڱهي مساوتون ٺاهيو جن جا جزا هيٺيان آهن

$$(1) 10 \text{ ۽ } -10 \quad (2) 1-3\sqrt{5} \text{ ۽ } 1+3\sqrt{5} \quad (3) 0 \text{ ۽ } 7$$

6. هيٺ ڏنل ٻسڱهي مساوت جي جنر جو قسم ٻڌايو

$$(1) 3x^2 - 5x + 7 = 0 \quad (2) \sqrt{3}x^2 + \sqrt{2}x - 2\sqrt{3} = 0 \quad (3) m^2 - 2m + 1 = 0$$

7. هيٺيون ٻسڱهي مساوتون حل ڪريو :

$$(1) \frac{1}{x+5} = \frac{1}{x^2} \quad (x \neq 0, x+5 \neq 0) \quad (2) x^2 - \frac{3x}{10} - \frac{1}{10} = 0 \quad (3) (2x+3)^2 = 25$$

$$(4) m^2 + 5m + 5 = 0 \quad (5) 5m^2 + 2m + 1 = 0 \quad (6) x^2 - 4x - 3 = 0$$

8. $(m-12)x^2 + 2(m-12)x + 2 = 0$ ٻسڱهي مساوت جا جزا حقيقي ۽ ساڳيا آهن ته m جو ملهه لھو.

9. هڪ ٻسڱهي مساوت جي ٻن جنر جي جوڙ اُڀت 5 ۽ انهن جي ٽين سگهه جي جوڙ اُڀت 35 آهي، ته اها ٻسڱهي مساوت ڪهڙي آهي؟

10. اهڙي ٻسڱهي مساوت ٺاهيو جنهن جا جزا $2x^2 + 2(p+q)x + p^2 + q^2 = 0$ مساوت جي جنر جي جوڙ اُڀت جي ٻي سگهه ۽ تفاوت جي ٻي سگهه آهن.

11. مڪند وٽ سائڙ کان 50 رپيا وڌيڪ آهن. انهن وٽ جيڪي رقمون آهن انهن جي ضرب اُڀت 15000 آهي ته هر هڪ وٽ ڪيتري رقم آهي؟

12. ٻن عددن جي ٻي سگهه ۾ تفاوت 120 آهي ننڍي عددن جي ٻي سگهه، وڏي عدد جي ٻيٺ ڪيترو آهي ته اهي عدد لھو.

13. رنجنا کي جنم ڏينهن تي 540 نارنگيون ڪجهه وديار ٿين ۾ ورهائڻيون آهن جيڪڏهن 30 شاگرد وڌيڪ ٿي وڃن ٿا ته هر هڪ کي نارنگيون گهٽ ملن ٿيون ته وديار ٿين جو انداز لھو.

14. تڙويل ۾ هڪ ڪسان شري دنيس جي مستطيل ڪيتي جي ڊيگهه، ويڪر جي ٻيٺ کان 10 ميٽر وڌيڪ آهي هن اُن ڪيت ۾ برسات جو پاڻي ڪنو ڪري رکڻ لاءِ ڪيتي جي ويڪر جي $\frac{1}{3}$ حصي پاسي واري چورس شڪل واري ڪيت جو ترو ٺاهيو آهي هتي اصلي ڪيت جي پڪيڙ ڪيت جي ڪوهه جي تري جي پڪيڙ جي ويهڻ آهي ته اُن ڪيت جي ڊيگهه ۽ ويڪر ۽ چورس جي پاسي جي ڊيگهه لھو.



15. هڪ ٽانڪي ٻن نلڪن وسيلي ٻن ڪلاڪن ۾ پوري ٿي ٿي فقط ننڍي نلڪي سان ٽانڪي ۾ لڳندڙ وقت، فقط وڏي نلڪي سان ٽانڪي ۾ لڳندڙ وقت کان 3 ڪلاڪ وڌيڪ آهي ته هر هڪ نلڪي سان ٽانڪي ۾ لڳندڙ وقت ڇو ٿو؟ □□□

اچو ته سکون



- سلسلو
- آنگي پروگريشن سلسلي جو n پد
- آنگي پروگريشن جي سلسلي جي n پدن جي جوڙ اُپت

جاڻي ونون



سلسلو (Sequence)

آسان 1, 2, 3, 4, اهي عدد سلسليوار لکندا آهيون. اها عددن جي قطار آهي انهن عددن ۾ ڪهڙو عدد ڪهڙي جاءِ تي آهي اهو ٻڌائي سگهون ٿا جيئن 13 اهو عدد تير هيٺن نمبرن جي جاءِ تي آهي.

عددن جي ٻي قطار ڏسو. هتي 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, اهي عدد خاص سلسلي ۾ لکيل آهن هتي $16=4^2$ اهو عدد چوٿين نمبر جي جاءِ تي، ته $25=5^2$ اهو عدد 5 نمبر جي جاءِ تي آهي. $49=7^2$ اهو عدد ستين نمبر جي جاءِ تي آهي يعني هن قطار ۾، ڪهڙو عدد ڪهڙي جاءِ تي آهي، اهو ٻڌائي سگهجي ٿو. ڪنهن خاص قاعدي انوسار، خاص نموني بندوبست ڪيل انگن جي ميڙ کي سلسلو چئجي ٿو.

سلسلي ۾ خاص جاءِ تي خاص عدد لکيا وڃن ٿا. اهي عدد $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ اهڙي سلسلي ۾ لکڻ سان a_1 اهو پهريون a_2 اهو ٻيو، ... اهڙيءَ طرح a_n اهو n پد آهي اها جاڻ ملي ٿي عددن جو سلسلو $f_1, f_2, f_3, \dots$ اهڙن اکرن سان ڏيکاريو ويندو آهي. اهي مقرر سلسلي ۾ لکيل عدد آهن اهو سمجهيو ويندو آهي.

ڪنهن ڪلاس جا ٻار قواعد لاءِ ميدان تي وڃي هڪ قطار ۾ بيٺا هئا انهن جو سلسلو مقرر ڪيو ويو هو ان وقت انهن جو سلسلو تيار هو. ڪيترا ئي سلسما خاص نموني ۾ هوندا آهن اهو آسان آڀياس ڪري چڪا هيٺيون خاص نمونو وارو سلسلو پورو ڪريو :

									خاص سلسلو
					7	5	3	1	گولن جو انداز

				$\begin{array}{c} \triangle\triangle\triangle\triangle \\ \triangle \\ \triangle \\ \triangle \\ \triangle\triangle\triangle\triangle \end{array}$	$\begin{array}{c} \triangle\triangle\triangle \\ \triangle \\ \triangle \\ \triangle\triangle\triangle \end{array}$	$\begin{array}{c} \triangle\triangle \\ \triangle \\ \triangle\triangle \end{array}$	خاص سلسلو
				11	8	5	ٽڪنڊن جو انداز

عددن جو خاص سلسلو ڏسو پهرين عدد ۾ ڪهڙي ڪاروائي ڪجي جيئن ان کان پوءِ وارو عدد ملي؟ ان نيمر انوسار ان کانپوءِ ايندڙ سڀ عدد ٻڌائي سگهجن ٿا.

هينين عددن جو سلسلو ڏسو 2, 11, -6, 0, 5, -37, 8, 2, 61

هتي $a_1 = 2, a_2 = 11, a_3 = -6$. . . اها عدد جي ياداشت به هڪ سلسلو آهي پر خاص ڀڃ

ان جاءِ تي آهن يا نه اهو ٻڌائي نه ٿو سگهجي ساڳيءَ طرح انهن a_4, a_5 ۾ ڪهڙو ماڳاپو آهي، اهو چڱيءَ طرح ٻڌائي نه ٿو سگهجي.

رواجي طور جن سلسلن ۾ ٻيو ڀڃ مقرر ڪري سگهجي ٿو. اهڙا سلسلا ٽي ڌيان هيٺ آندا ويا آهن.

مثال طور: (1) 4, 8, 12, 16, . . . (2) 2, 4, 8, 16, 32, . . .

(3) $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}$

سلسلي ۾ ڀڃ (Terms in a sequence)

سلسلي ۾ $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ ڀڃ اهڙي طرح سلسليوار ڏيکاربا آهن. رواجي طور سلسلو $\{t_n\}$

اهڙيءَ طرح لکبو آهي. ان وقت هر هڪ n واڌو عدد هوندو آهي، ان جو ملهه ٻڌل يا مقرر آهي

اڳين سمجهيو ويندو آهي.

مشغولي I: هينيان سلسلا ڏسو انهن ۾ ڀڃن کي $t_1, t_2, t_3, \dots$ جي طريقي ڏيکاريو.

(1) 9, 15, 21, 27, . . . هتي $t_1 = 9, t_2 = 15, t_3 = 21, \dots$

(2) 7, 7, 7, 7, . . . هتي $t_1 = 7, t_2 = \square, t_3 = \square, \dots$

(3) -2, -6, -10, -14, . . . هتي $t_1 = -2, t_2 = \square, t_3 = \square, \dots$

مشغولي II: هيٺ ڪجهه سلسلا ڏنل آهن. انهن جي ڀڃن ۾ ڪو نيمر ملي ٿو ڇا اهو ڏسو. ٻن لاڳيتن ڀڃن






۾ هڪجهڙائي ٻولهيو

ان سلسلي جي ڀڃن ۾ ڪو نيمر ملي ٿو ڇا اهو ڏسڻ لاءِ هيٺ ڏنل بناوت ڏسو ۽ خالي ڇوڪڻا

(1) 1, 4, 7, 10, 13, . . . (2) 6, 12, 18, 24, . . . (3) 3, 3, 3, 3, . . .

(4) 4, 16, 64, . . . (5) -1, -1.5, -2, -2.5, . . . (6) $1^3, 2^3, 3^3, 4^3, \dots$

انهن سلسلن ۾ لاڳاپو ڳولهي، ان لاءِ ڪيل ويچار ڏسو



(6) 1^3 , 2^3 , 3^3 , ...

مٿي ڏنل عددن جو هر هڪ ياداشت، سلسلو آهي. هنن سلسلن (1), (2), (3), (5) ۾ اڳين پد ۾ مقرر ڪيل عدد ملائي، ان کانپوءِ ايندڙ پد ملي ٿو، انهن ۾ هڪجهڙائي آهي. اهڙي قسم جي سلسلن کي انگي

مٿيون (4) سلسلو انگي پروگريشن نه آهي. هن سلسلي ۾ اڳين پد ۾ مقرر ڪيل عدد سان ضرب ڪري، ان کانپوءِ ايندڙ پد ملي ٿو. اهڙي قسم جي سلسلي کي جاميٽرڪ پروگريشن چئجي ٿو.

مٿيون (6) سلسلو انگي پروگريشن نه آهي، گڏوگڏ جاميٽرڪ پروگريشن پڻ نه آهي.

هن سال اسان انگي پروگريشن جو اڀياس ڪرڻ وارا آهيون.

انگي پروگريشن (Arithmetic Progression)


هيٺ ڪجهه عدد ڏنل آهن. هر هڪ سلسلي جا اڳلا ٽي پد لھو.

(1) 100, 70, 40, 10, ...

(2) -7, -4, -1, 2, ...

(3) 4, 4, 4, ...

ڏنل سلسلن ۾ آڳاٽا پڌ لھڻ لاءِ ڇا ڪيو ويو آھي اھو ڏسو



مٿين عددن ۾ ھرھڪ ياداشت ۾ ھرھڪ پڌ ان کان آڳاٽو آيل پڌ ۾ خاص عدد ملائڻ سان تيار ٿيو آھي. ٻن لڳاتار پڌن جي وچ ۾ فرق مقرر آھي.

مثال (1) ۾ فرق ڪاٺو آھي، (2) ۾ فرق واڌو آھي. (3) مو فرق 0 آھي.

لڳاتار پڌن جي وچ ۾ تفاوت مقرر آھي ۽ انکي عام تفاوت چئجي ٿو. اھو فرق (Common difference) d آڪرن وسيلي ڏيکارجي ٿو.

ڏنل سلسلي جي ڪھڙن ٻن لڳاتار پڌن ۾ فرق $(t_{n+1} - t_n)$ مقرر ھجي تہ اھڙي سلسلي کي انگي پروگریشن (Arithmetic Progression) چئجي ٿو. $t_{n+1} - t_n = d$ اھو عام تفاوت (Common difference) ھوندو آھي. انگي پروگریشن ۾ پھريون پڌ a ۽ عام تفاوت d ھوندڙ انگي پروگریشن آھي.

$$t_1 = a, \quad t_2 = a + d, \quad t_3 = (a + d) + d = a + 2d$$

پھريون پڌ a ۽ عام تفاوت d ھوندڙ انگي پروگریشن

$$a, (a + d), (a + 2d), (a + 3d), \dots$$

انگي پروگریشن سان لاڳاپو رکندڙ ڪجهه مثال ڏسو.

مثال (1) آر ف ھر مھيني 100 ر بچت ڪئي. ھڪ سال ۾ ھرھڪ مھيني جي ڪل بچت ھيٺين ريت آھي.

مھينا	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
بچت (رپين ۾)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

مثال (2) پراڻو دوست کان 10000 ر اوڌارا ورتا ۽ هر مهني 1000 ر واپس ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ته هر هڪ مهني قرض جي باقي بچيل رقم هيٺين ريت ڏيکاريل آهي.

مهنا	1	2	3	4	5	...	...	...
قرض جي باري ۾ بچيل رقم ۽	10,000	9,000	8,000	7,000	...	...	2,000	1,000
	0							

(3) 5 جو کوڙو، يعني 5 سان ونڊيندڙ عدد ڏسو

50, 55, 60, 20, 15, 10, 5, اهو انگي پروگريشن وارو سلسلو آهي.

مٿيان (1) ۽ (2) مثال محدود انگي پروگريشن آهن. (3) انگي پروگريشن جو واحد سلسلو آهي.

ياد رکيو



(1) جيڪڏهن سلسلي ۾ $(t_{n+1} - t_n)$ اهو فرق مقرر آهي ته سلسلي کي انگي پروگريشن چئجي ٿو،

(2) انگي پروگريشن ۾ ٻن لڳيتن پدن ۾ عام تفاوت d آکر وسيلي ڏيکارجي ٿو.

(3) d جو تفاوت، واڌو، ڪاٽو يا ٿي سگهي ٿو.

(4) انگي پروگريشن ۾ پهرين پد a ۽ عام تفاوت d آهي ته ان سلسلي جا پد $a, (a + d), (a + 2d), \dots$ هوندا آهن.

مشغولي: محدود انگي پروگريشن ۽ واحد انگي پروگريشن جو هڪ مثال لکو.

حل ڪيل مثال

مثال (1) هيٺين مان ڪهڙا سلسلا انگي پروگريشن آهن؟ جيڪڏهن آهن ته انهن جا اڳلا ٻه پد لھو.

(i) 5, 12, 19, 26, ...

(ii) 2, -2, -6, -10, ...

(iii) 1, 1, 2, 2, 3, 3, ...

(iv) $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

حل: (i) 5, 12, 19, 26, ... هن سلسلي ۾

پهريون پد $t_1 = 5$, $t_2 = 12$, $t_3 = 19$, ...

$$t_2 - t_1 = 12 - 5 = 7$$

$$t_3 - t_2 = 19 - 12 = 7$$

هتي پهريون پد $d = 7$ آهي ۽ عام تفاوت $d = 7$ آهي ۽ اهو مقرر آهي.

اهو سلسلو انگي پروگريشن آهي. ان سلسلي جا اڳلا ٻه پد آهن

$$26 + 7 = 33, \quad 33 + 7 = 40.$$

هتي 33 ۽ 40 اهي ڏنل سلسلي جا اڳلا ٻه پد آهن.

(ii) $2, -2, -6, -10, \dots$ هن سلسلي ۾

$$t_1 = 2, \quad t_2 = -2, \quad t_3 = -6, \quad t_4 = -10 \dots$$

$$t_2 - t_1 = -2 - 2 = -4$$

$$t_3 - t_2 = -6 - (-2) = -6 + 2 = -4$$

$$t_4 - t_3 = -10 - (-6) = -10 + 6 = -4$$

انهن مان هر هڪ ٻن لڳاتار پڊ ۾ تفاوت يعني $t_{n+1} - t_n = -4$ آهي $d = -4$.
اهو ساڳيو فرق آهي. اهو مقرر آهي. اهو سلسلو انگي پروگريشن آهي.

هن سلسلي جا اڄڻا ٻه پڊ آهن. $(-10) + (-4) = -14$ ۽ $(-14) + (-4) = -18$

(iii) $1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots$ هن سلسلي ۾

$$t_1 = 1, \quad t_2 = 1, \quad t_3 = 2, \quad t_4 = 2, \quad t_5 = 3, \quad t_6 = 3 \dots$$

$$t_2 - t_1 = 1 - 1 = 0, \quad t_3 - t_2 = 2 - 1 = 1$$

$$t_4 - t_3 = 2 - 2 = 0, \quad t_5 - t_4 \neq t_3 - t_2$$

هن سلسلي ۾ ٻن لڳاتار پڊن ۾ فرق ساڳيو نه آهي. $\therefore$ ڏنل سلسلو انگي پروگريشن نه آهي.

(iv) $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ هن سلسلي ۾

$$t_1 = \frac{3}{2}, \quad t_2 = \frac{1}{2}, \quad t_3 = -\frac{1}{2}, \quad t_4 = \frac{3}{2}$$

$$t_2 - t_1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$t_3 - t_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$t_4 - t_3 = \frac{3}{2} - (-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

هتي عام تفاوت $d = 1$ - اهو ساڳيو آهي

$\therefore$ ڏنل سلسلو انگي پروگريشن آهي.

هن سلسلي جا اڄڻا ٻه پڊ آهن.

$$-\frac{3}{2} - 1 = -\frac{5}{2}, \quad -\frac{5}{2} - 1 = -\frac{7}{2}$$

$\therefore$ اڄڻا ٻه پڊ $-\frac{5}{2}$ ۽ $-\frac{7}{2}$ آهن.

مثال (2) هيٺ پهريون پد a ۽ عام تفاوت d ڏنل آهن. انهن مطابق پهريان چار پد لهي انگي پروگرشن ۾ لکو.

(i) $a = -3, d = 4$

(ii) $a = 200, d = 7$

(iii) $a = -1, d = -\frac{1}{2}$

(iv) $a = 8, d = -5$

(ii) $a = 200, d = 7$

$a = t_1 = 200$

$t_2 = t_1 + d = 200 + 7 = 207$

$t_3 = t_2 + d = 207 + 7 = 214$

$t_4 = t_3 + d = 214 + 7 = 221$

$\therefore$ انگي پروگرشن آهي. 200, 207, 214, 221, ...

(iv) $a = 8, d = -5$

$a = t_1 = 8$

$t_2 = t_1 + d = 8 + (-5) = 3$

$t_3 = t_2 + d = 3 + (-5) = -2$

$t_4 = t_3 + d = -2 + (-5) = -7$

$\therefore$ انگي پروگرشن آهي. 8, 3, -2, -7, ...

حل : (i) $a = -3, d = 4$ تان

$a = t_1 = -3$

$t_2 = t_1 + d = -3 + 4 = 1$

$t_3 = t_2 + d = 1 + 4 = 5$

$t_4 = t_3 + d = 5 + 4 = 9$

$\therefore$ انگي پروگرشن آهي. -3, 1, 5, 9, ...

(iii) $a = -1, d = -\frac{1}{2}$

$a = t_1 = -1$

$t_2 = t_1 + d = -1 + (-\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2}$

$t_3 = t_2 + d = -\frac{3}{2} + (-\frac{1}{2}) = -\frac{4}{2} = -2$

$t_4 = t_3 + d = -2 + (-\frac{1}{2})$

$= -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$

$\therefore$ انگي پروگرشن آهي. -1, $-\frac{3}{2}$, -2, $-\frac{5}{2}$, ...

آپياس 1 3

1. هينين مان ڪهڙا سلسلا انگي پروگرشن آهن؟ جيڪو سلسلو انگي پروگرشن آهي. انهن ۾ عام تفاوت لھو.

(1) 2, 4, 6, 8, ... (2) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$ (3) -10, -6, -2, 2, ...

(4) 0.3, 0.33, 0.333, ... (5) 0, -4, -8, -12, ... (6) $-\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots$

(7) $3, 3 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, 3 + 3\sqrt{2}, \dots$ (8) 127, 132, 137, ...

2. جيڪي انگي پروگرشن جو پهريون پد a ۽ عام تفاوت d آهي ته انگي پروگرشن لکو

(1) $a = 10, d = 5$ (2) $a = -3, d = 0$ (3) $a = -7, d = \frac{1}{2}$

(4) $a = -1.25, d = 3$ (5) $a = 6, d = -3$ (6) $a = -19, d = -4$

3. هيٺين انگي پروگرشن ۾ هر هڪ جو پهريون پد ۽ عام تفاوت لھو.

(1) $5, 1, -3, -7, \dots$

(2) $0.6, 0.9, 1.2, 1.5, \dots$

(3) $127, 135, 143, 151, \dots$

(4) $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \dots$

ذرا سوچيو



● اھو سلسلو انگي پروگرشن آھي ڇا؟ جيڪڏھن آھي تہ ان 5, 8, 11, 14 سلسلي جو 100 پد ڪھڙو آھي؟ ان سلسلي ۾ عدد 62 آھي ڇا؟ عدد 61 آھي ڇا؟

ڄاڻي وٺون



انگي پروگرشن جو n پد (n^{th} term of an A. P.)

5, 8, 11, 14 هن سلسلي ۾ ٻن لڳاتار پد ۾ تفاوت 3 آهي انڪري اهو سلسلو انگي پروگرشن آهي. هن ۾ پهريون پد 5 آهي. 3 جوڙڻ سان ٻيون پد 8 ملي ٿو. اهڙي طرح 100 پد حاصل ڪرڻ لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟

...
ٽيون پد ٻيون پد پهريون پد
... $8 + 3 = 11,$ $5 + 3 = 8,$ 5, عدد
اهڙي طرح 100 پد تائين پهچڻ لاءِ ڏاڍو وقت لڳندو ان لاءِ ڪو سوتر ملي ٿو ڇا اهو ڏسو.

5	8	11	14	...	...	...	...
5	$5 + 1 \times 3$	$5 + 2 \times 3$	$5 + 3 \times 3$	...	$5 + (n - 1) \times 3$	$5 + n \times 3$	...
پهريون پد t_1	ٻيون پد t_2	ٽيون پد t_3	چوٿون پد t_4	...	پد n t_n	پد $n + 1$ t_{n+1}	...

عام طور : $t_1, t_2, t_3, \dots$ اهي انگي پروگرشن ۾ پهريون پد a ۽ عام تفاوت d آهي ته

$$t_1 = a$$

$$t_2 = t_1 + d = a + d = a + (2 - 1)d$$

$$t_3 = t_2 + d = a + d + d = a + 2d = a + (3 - 1)d$$

$$t_4 = t_3 + d = a + 2d + d = a + 3d = a + (4 - 1)d$$

$$t_n = a + (n - 1) d \text{ سوٽر ملي ٿو.}$$

هاڻي ان سوٽر جو پريوڱم ڪري 5, 8, 11, 14, . . . ان انگي پروگريشن جو 100 پڌ لھو.
 $a=5$ ۽ $d=3$ ھتي

$$t_n = a + (n - 1) d$$

$$\therefore t_{100} = 5 + (100 - 1) \times 3$$

$$= 5 + 99 \times 3$$

$$= 5 + 297$$

$$= 302$$

ھن انگي پروگريشن جو 100 پڌ 302 آھي.

ھاڻي عدد 61 ان سلسلي ۾ آھي ڇا؟ ان جو جواب حاصل ڪرڻ لاءِ اھو سوٽر ڪم آڻيو

$$t_n = a + (n - 1) d$$

$$t_n = 5 + (n - 1) \times 3$$

جيڪڏھن 61 ھي n پڌ معنيٰ t_n ھوندو تہ عدد

$$61 = 5 + 3n - 3$$

$$= 3n + 2$$

$$\therefore 3n = 59$$

$$\therefore n = \frac{59}{3}$$

پر n ھڪ سڄو انگ نہ آھي.

∴ عدد 61 ھن سلسلي ۾ نہ آھي.

ويچار ڪريو



ڪبير جي مان اُن جي ھرھڪ جنم دن تي اوچائي لکي رکندڙ آھي. ھو ھڪ سال جو ھو تہ ھن جي اوچائي 70 س. م ھئي 2 سالن جو ٿيو تہ 80 س. م ھو، 3 سالن جو ٿيو تہ 90 س. م ٿيو. ھن جي ميران ماسي ڏھين درجي ۾ پڙھندي ھئي. اُن چيو ڪبير جي اوچائي انگي پروگريشن سلسلي انوسار وڌي ٿي. اِھو ڌيان ۾ رکي ڪبير ڏھين درجي ۾ ويندو تہ اُنجي اوچائي ڪيتري ھوندي اِھو ڪڍيو. اُنکي عجب لڳو توهان به ڪبير جي اوچائي انگي پروگريشن انوسار 15 سالن تائين ڪيتري ھوندي اِھو لھو.

حل ڪيل مثال

مثال (2) هيٺين انگي پروگريشن جو ڪهڙو پد 560 آهي؟

$$2, 11, 20, 29, \dots$$

حل : ڏنل انگي پروگريشن . . 2, 11, 20, 29,

$$a = 2, d = 11 - 2 = 9$$

هن سلسلي جو n پد 560 آهي. $t_n = 560$

$$t_n = a + (n - 1)d$$

$$\therefore 560 = 2 + (n - 1) \times 9$$

$$= 2 + 9n - 9$$

$$\therefore 9n = 567$$

$$\therefore n = \frac{567}{9} = 63$$

$\therefore$ ڏنل انگي پروگريشن سلسلي ۾ 63 پد 560 آهي.

مثال (1) هيٺين انگي پروگريشن لاءِ t_n لھو ۽ ان وسيلي ان سلسلي جو 30 پد لھو

$$3, 8, 13, 18, \dots$$

حل : ڏنل انگي پروگريشن . . 3, 8, 13, 18,

$$t_1 = 3, t_2 = 8, t_3 = 13, t_4 = 18, \dots$$

$$d = t_2 - t_1 = 8 - 3 = 5, n = 30$$

$$t_n = a + (n - 1)d \text{ ته } t_n = 3 + (n - 1) \times 5$$

$$\therefore t_n = 3 + (n - 1) \times 5 \therefore a = 3, d = 5$$

$$\therefore t_n = 3 + 5n - 5$$

$$\therefore t_n = 5n - 2$$

$$\therefore 30 = t_{30} = 5 \times 30 - 2 \\ = 150 - 2 = 148$$

مثال (4) ٻڌايو ته 4 سان ونڊجندڙ ٻن انگن وارا عدد ڪيترا آهن؟

حل : 4 سان ونڊجندڙ ٻن انگن وارا عدد جي ياداشت

$$96, 24, 20, 16, 12 \text{ آهي.}$$

اهڙا عدد ڪيترا آهن اهو لھو.

$$t_n = 96, a = 12, d = 4, n = ?$$

$\therefore$ سوتر وسيلي

$$96 = 12 + (n - 1) \times 4$$

$$= 12 + 4n - 4$$

$$\therefore 4n = 88$$

$$\therefore n = 22$$

$\therefore$ 4 سان ونڊجندڙ ٻن انگن وارا عدد 22 آهن.

مثال (3) ڏنل سلسلي 5, 11, 17, 23, . . . ۾ 301 اھو عدد آھي ڇا؟

حل : 5, 11, 17, 23, . . . سلسلي ۾

$$t_1 = 5, t_2 = 11, t_3 = 17, t_4 = 23, \dots$$

$$t_2 - t_1 = 11 - 5 = 6$$

$$t_3 - t_2 = 17 - 11 = 6$$

$\therefore$ اهو سلسلو انگي پروگريشن آهي هن

سلسلي جو پهريون پد $a = 5$ ۽ $d = 6$ آهي.

جيڪڏهن 301 هي n جو پد هجي ته

$$t_n = a + (n - 1)d = 301$$

$$\therefore 301 = 5 + (n - 1) \times 6$$

$$= 5 + 6n - 6$$

$$\therefore 6n = 301 + 1 = 302$$

$$n = \frac{302}{6}, \therefore \text{اهو پد سڄو انگ نه آهي}$$

تنهن ڪري ڏنل سلسلي ۾ عدد 301 ايندو.

مثال (5) جيڪڏهن هڪ انگي پروگريشن جو 10 پڌ 25 ۽ 18 پڌ 41 آهي ته ان سلسلي جو 38 پڌ لھو. ساڳي طرح n پڌ 99 آهي ته n جو ملھ لھو

حل : ڏنل انگي پروگريشن ۾ $t_{10} = 25$ ۽ $t_{18} = 41$ آهي.

$$t_n = a + (n - 1)d \text{ آھي ته } t_{10} = a + (10 - 1)d$$

$$\therefore t_{10} = a + (10 - 1)d$$

$$\therefore 25 = a + 9d \dots\dots\dots (I)$$

$$t_{18} = a + (18 - 1)d \text{ ساڳي طرح}$$

$$\therefore 41 = a + 17d \dots\dots\dots (II)$$

$$25 = a + 9d \dots\dots\dots (I)$$

$$a = 25 - 9d.$$

اھو ملھ مساوت II ۾ رکڻ سان

مساوت (II) $a + 17d = 41$ آھي.

$$\therefore 25 - 9d + 17d = 41$$

$$\therefore 8d = 41 - 25 = 16$$

$$\therefore d = 2$$

اھو ملھ مساوت I ۾ رکڻ سان $d = 2$

$$a + 9d = 25$$

$$\therefore a + 9 \times 2 = 25$$

$$\therefore a + 18 = 25$$

$$\therefore a = 7$$

$$\text{ھاڻي، } t_n = a + (n - 1)d$$

$$\therefore t_{38} = 7 + (38 - 1) \times 2$$

$$= 7 + 37 \times 2$$

$$= 7 + 74$$

$$= 81$$

n پڌ 99 آهي ته n جو ملھ ڪيڏو آهي

$$t_n = a + (n - 1)d$$

$$99 = 7 + (n - 1) \times 2$$

$$99 = 7 + 2n - 2$$

$$99 = 5 + 2n$$

$$\therefore 2n = 94$$

$$\therefore n = 47$$

$\therefore$ ڏنل سلسلي جو 38 پڌ 81 آهي ۽ 99 پڌ 47 آهي.

آپياس 3.2

1 هيٺ ڏنل انگي پروگرشن سلسلن ۾ چؤڪنڊن ۾ صحيح عدد لکو.

$$(1) 1, 8, 15, 22, \dots$$

$$\text{هتي } a = \square, t_1 = \square, t_2 = \square, t_3 = \square, \dots$$

$$t_2 - t_1 = \square - \square = \square$$

$$t_3 - t_2 = \square - \square = \square \therefore d = \square$$

$$(2) 3, 6, 9, 12, \dots$$

$$\text{هتي } t_1 = \square, t_2 = \square, t_3 = \square, t_4 = \square, \dots$$

$$t_2 - t_1 = \square, t_3 - t_2 = \square \therefore d = \square$$

$$(3) -3, -8, -13, -18, \dots$$

$$\text{هتي } t_1 = \square, t_2 = \square, t_3 = \square, t_4 = \square, \dots$$

$$t_2 - t_1 = \square, t_3 - t_2 = \square \therefore a = \square, d = \square$$

$$(4) 70, 60, 50, 40, \dots$$

$$\text{هتي } t_1 = \square, t_2 = \square, t_3 = \square, \dots$$

$$\therefore a = \square, d = \square$$

2. ٻڌايو ته هيٺيون سلسلو انگي پروگرشن آهي ڇا؟ جيڪڏهن آهي ته ان سلسلي جو ويهون پڌ لھو.

$$-12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, \dots$$

3. ڏنل سلسلو انگي پروگرشن آهي، 12, 16, 20, 24, ... ان سلسلي جو چوويهون پڌ لھو.

4. هيٺين انگي پروگرشن جو اڻويهون پڌ لھو.

$$7, 13, 19, 25, \dots$$

5. هيٺين انگي پروگرشن جو ستاويهون پڌ لھو

$$9, 4, -1, -6, -11, \dots$$

6. ٻڌايو ته 5 سان ونڊجندڙ ٽن انگن وارا قدرتي عدد ڪيترا آهن؟

7. هڪ انگي پروگرشن جو يارهون پڌ 16 ۽ اڪويهون پڌ 29 آهي، ته ان سلسلي جو اڪيٽاليهون پڌ لھو

8. انگي پروگرشن 2, 5, 8, 11, ... ۾ عدد 151-ڪاٿون پڌ آهي؟

9. 10 کان 250 تائين قدرتي انگن مان ڪيترن انگن کي 4 سان ونڊي سگهجي ٿو؟

10. هڪ انگي پروگرشن سلسلي ۾ 17 پڌ 10 پڌ کان 7 وڌيڪ آهي، ته عام تفاوت لھو.

سياڻي ٽيچر (Wise Teacher)

هڪ راجا هو. هن پنهنجي ٻارن ياشونت راجي ۽ گيتا ديويءَ کي گهوڙيسواري سيکارڻ لاءِ نمبروار تارا ۽ ميرا نالي ٽيچرس کي مقرر ڪيو. انهن ٻنهي کي سال ۾ ڪيتري پگهار گهرجي ان بابت پڇيو. تارا چيو، ”مون کي پهرين مهيني جي پگهار 100 مهرون ڏيو ۽ ان کانپوءِ هر مهيني منهنجي پگهار 100 مهرون وڌائي وڃي.“ ميرا چيو، ”مون کي پهرين مهيني جي پگهار 10 مهرون ڏيو ۽ پوءِ هر مهيني، ان کان اڳين مهيني جي پگهار کان ٻيڻي پگهار ڏيو.“

راجا اها ٻالھه مڃي. ٽن مهينن کانپوءِ ياشونت راجي پنهنجي ڀيڻ کي چيو، ”منهنجي ٽيچر تنهنجي ٽيچر کان وڌيڪ هوشيار آهي، هن وڌيڪ پگهار گهري آهي“ گيتا ديويءَ چيو ”مون کي به پهرينون ائين ئي لڳو انڪري مان ميرا کان پڇيو تو ائين پگهار ڇو گهري؟“ ته ڪلي هن ٻڌايو ته اُن مهيني جي پگهار لهي ڏني. تون پڻ لهي ڏس.

مهينو	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تارا جي پگهار	100	200	300	400	500	600	700	800	900	-	-	-
ميرا جي پگهار	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	-	-	-

توهان اهو چڱو ڀورو ڪريو

تارا جي پگهار 100, 200, 300, 400, ... انگي پروگریشن سلسلي ۾ آهي. ياد آيو؟

$$t_1 = 100, \quad t_2 = 200, \quad t_3 = 300, \dots \quad t_2 - t_1 = 100 = d$$

اهو عام تفاوت 100 آهي.

ميرا جي پگهار 10, 20, 40, 80, ... انگي پروگریشن سلسلي ۾ نه آهي. $20 - 10 = 10, 40 - 20 = 20, 80 - 40 = 40$ يعني عام تفاوت ساڳيو نه آهي.

فقت هن سلسلي ۾ هر هڪ ڀڏ، ان کان اڳهه آيل ڀڏ کان ٻيڻو ٿئي ٿو.

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{20}{10} = 2, \quad \frac{t_3}{t_2} = \frac{40}{20} = 2, \quad \frac{t_4}{t_3} = \frac{80}{40} = 2$$

$$\therefore \frac{t_{n+1}}{t_n} \text{ يعني اڳتي ڀڏ ۽ ان کان اڳهه وارا ڀڏ جي ونڊ اُپت ساڳي آهي. اهڙي طرح } \frac{t_{n+1}}{t_n}$$

سلسلي کي جاميٽرڪ پروگریشن چئجي ٿو. $\frac{t_{n+1}}{t_n}$ جي ونڊ اُپت 1 کان وڌيڪ هجي، ته جاميٽرڪ پروگریشن انگي پروگریشن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ تيز رفتار سان وڌي ٿو، اهو آڀياس ڪريو.

جيڪڏهن اها ونڊ اُپت 1 کان گهٽ هجي ته سلسلو ڪيئن بدلجندو، ان جو پڻ آڀياس ڪريو.

هن سال اسان فقط انگي پروگریشن جو آڀياس ڪرڻ وارا آهيون. انگي پروگریشن جو ڀڏ ڪيئن سڱهجي اهو اسان ڏٺو آهي هاڻي پهرين n ڀڏن جي جوڙ اُپت ڪيئن لهجي اهو اسان ڏسڻ وارا آهيون.

ٽرٽ جوڙ ڪرڻ

ٽي سؤ سال پھريون جي ڳالھ آھي. جرمنيءَ ۾ بيوٽنير (Buttner) نالي هڪ اُستاد جو اِسڪول هو. هن اُستاد کي جوهان مارٽن بارتيلس نالي هڪ سھايڪ هو هن جو ڪم هو ٻارن کي بنيادي سکيا ڏيڻ ۽ لکڻ سيکارڻ. بيوٽنير ڏاڍو سخت سپاءُ جو هو. بيوٽنير سر کي هڪ ڪم پورو ڪرڻو هو ڪلاس ۾ ٻار جڳھڙو نه ڪن اِٺڪري هن ڪم ۾ رڌل رکڻ لاءِ ٻارن کي اُنڱي حساب ڏيڻ ۾ ويچار ڪريو. هن ٻارن کي چيو 1 کان 100 تائين اُنڱه سڀيت تي لکو ۽ اُنهن جو جوڙ ڪريو. اُستاد پنهنجو ڪم شروع ڪيو. ٻارن اُنڱن لکڻ شروع ڪيا. پنجن منٽن ۾ هڪ سڀيت اُبتئي ٿيڻ جو آواز آيو. هن ڪارل گائوس ڏانڪن نيهاريو ۽ چيو، اِهو ڇا آهي؟ مان توکي 1 کان 100 تائين اُنڱه لکي اُنهن کي جوڙ ڪرڻ لاءِ چيو آهي. سڀيت اُبتئي ڪري چور کي ٿي ۽ توکي ڪجهه ڪرڻو نه آهي ڇا؟

ڪارل گائوس چيو ”مان جوڙ ڪيو آهي.“

اُستاد چيو ”ڇا؟ ايترو جلدي جوڙ ڪيئن ٿي ويو؟ اُنڱه به نه لکيا اُٿئي، جواب ڪيترو آيو؟

ڪارل گائوس چيو ”پنج هزار پنجاھ“


اُستاد عجب ۾ پئجي ويو ۽ چيو ”جواب ڪيئن ڪڍيئ؟“

ڪارل گائوس جي ٽرٽ جوڙ اُپت ڪرڻ جو طريقو

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 100 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \\
 \downarrow + & & & & & & & & & & & \downarrow + \\
 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 100 \\
 \downarrow + & & & & & & & & & & & \downarrow + \\
 101 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 101
 \end{array}$$

هر هڪ جوڙي جي جوڙ اُپت 101 آچي ٿي اِها جوڙ اُپت 100 دفعو آئي. اِٺڪري 100×101 اُنهن جي ضرب ڪئي. اِهو 10100 آيو. هتي 1 کان 100 تائين اُنڱن جو ٻه دفعا ويچار ڪيو ويو. اِٺڪري 10100 جو اڌ ڪيو. اِهو 5050 آيو. اِن ڪري $1, 2, 3, \dots, 100$ اُنهن اُنڱن جي جوڙ اُپت 5050 آهي اُستاد هنن کي شاباس ڏني.

هاڻي گائوس جي جوڙ ڪرڻ جي طريقي کي ڪم آڻي اُن کي پروگريشن جي n پدن جي جوڙ اُپت ڪرڻ جو سوتر ملندو.



جوهان فريڊرچ ڪارل گائوس 30 اپريل 1777 - 23 فيبروري 1855

ڪارل گائوس هڪ مھان جرمن حساب جو ڄاڻو هو. هن جو جنم برابن سوائڪ ۾ هڪ اڻ پڙهيل ڀرپوار ۾ ٿيو. بيوٽنير جي اِسڪول ۾ هن پنهنجي عقلمنديءَ جي جھلڪ ڏيکاري. اُن کانپوءِ بيوٽنير جي مدد سان جوهان مارٽن بارتيلس جي گائوس سان دوستي ٿي پنهني گڏجي اڌڪ شاستر جو هڪ ڪتاب ڇپائي پڌرو ڪيو. بارتيلس، گائوس جي اَساڌارڻ عقلمندي کي گھڻن ئي ماڻهن تائين پهچائي.



اُنڱي پروگريشن جي پهرين n ٻڌن جي جوڙ اُڀت (Sum of first n terms of an A. P.)

اُنڱي پروگريشن $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n - 1)d$

هن پروگريشن ۾ a پهريون ٻڌ آهي ۽ d عام تفاوت آهي. ان پروگريشن ۾ پهرين n ٻڌن جي جوڙ اُڀت S_n سان ڏيکارجي ٿي.

$$S_n = [a] + [a + d] + \dots + [a + (n - 2)d] + [a + (n - 1)d]$$

اهي ٻڌ اُڀتي سلسلي ۾ بناوت ڪري رکڻ سان

$$S_n = [a + (n - 1)d] + [a + (n - 2)d] + \dots + [a + d] + [a]$$

جوڙ ڪرڻ سان

$$2S_n = [a + a + (n - 1)d] + [a + d + a + (n - 2)d] + \dots + [a + (n - 2)d + a + d] + [a + (n - 1)d + a]$$

$$2S_n = [2a + (n - 1)d] + [2a + (n - 1)d] + \dots + [2a + (n - 1)d] \dots n \text{ دفعا}$$

$$2S_n = n [2a + (n - 1)d]$$

$$S_n = na + \frac{n(n - 1)}{2} d \text{ يا } S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

مثال طور $14, 16, 18, \dots$ اُنڱي پروگريشن جي پهرين 100 ٻڌن جي جوڙ اُڀت لھو.

$$a = 14, d = 2, n = 100 \text{ هتي}$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$\therefore S_{100} = \frac{100}{2} [2 \times 14 + (100 - 1) \times 2]$$

$$= 50 [28 + 198]$$

$$= 50 \times 226 = 11,300$$

$\therefore$ ڏنل سلسلي جي پهرين 100 ٻڌن جي جوڙ اُڀت 11,300 آهي.



ڏنل اُنڱي پروگريشن جو پهرين a ۽ عام تفاوت d هجي، ته

$$t_n = a + (n - 1)d$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] = na + \frac{n(n - 1)}{2} d$$

انگي پروگریشن جي پهرين n ٻڌن جو جوڙ ڪرڻ جو هڪ ٻيو سوتر پڻ ملي ٿو.

هاڻي هن پروگریشن ۾ $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, [a + (n - 1)d]$

$[a + (n - 1)d]$ ٻڌ آهي ۽ $t_1 = a$ پهرين ٻڌ آهي.

$$S_n = \frac{n}{2} [a + a + (n-1)d] \text{ هاڻي}$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [t_1 + t_n] = \frac{n}{2} [\text{پهرين ٻڌ} + \text{آخري ٻڌ}]$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) پهرين n قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت ڪريو.

حل : پهرين n قدرتي انگ $1, 2, 3, \dots, n$

$a = 1, d = 1, n$ ٻڌ = n هتي

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$S_n = \frac{n}{2} [\text{آخري ٻڌ} + \text{پهرين ٻڌ}]$$

$$= \frac{n}{2} [1 + n] = \frac{n(n+1)}{2}$$

$\therefore$ پهرين n قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت $\frac{n(n+1)}{2}$ آهي.

مثال (2) پهرين n ٻڌي قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت ڪريو

حل : پهرين n ٻڌي قدرتي انگ $2, 4, 6, 8, \dots, 2n$.

$$t_1 = \text{پهرين ٻڌ} = 2, t_n = \text{آخري ٻڌ} = 2n$$

طريقو III

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \\ &= \frac{n}{2} [2 \times 2 + (n-1)2] \\ &= \frac{n}{2} [4 + 2n - 2] \\ &= \frac{n}{2} [2 + 2n] \\ &= \frac{n}{2} \times 2 (1 + n) \\ &= n (1 + n) = n (n+1) \end{aligned}$$

طريقو II

$$\begin{aligned} S_n &= 2 + 4 + 6 \dots + 2n \\ &= 2(1 + 2 + 3 + \dots + n) \\ &= \frac{2[n(n+1)]}{2} \\ &= n (1 + n) \\ &= n (n+1) \end{aligned}$$

طريقو I

$$\begin{aligned} &= \frac{n}{2} [t_1 + t_n] \\ &= \frac{n}{2} [2 + 2n] \\ &= \frac{n}{2} \times 2 (1 + n) \\ &= n (1 + n) \\ &= n (n+1) \end{aligned}$$

$\therefore$ پهرين n ٻڌي قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت $n(n+1)$ آهي.

مثال (3) پهرين n اڪي قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت لھو.

حل : پھريان n اڪي قدرتي انگ

$$1, 3, 5, 7, \dots, (2n-1).$$

$$a = t_1 = 1 \text{ ۽ } t_n = (2n-1), d = 2$$

طريقو I

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} [t_1 + t_n] \\ &= \frac{n}{2} [1 + (2n-1)] \\ &= \frac{n}{2} [1 + 2n - 1] \\ &= \frac{n}{2} \times 2n \\ &= n^2 \end{aligned}$$

طريقو II

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \\ &= \frac{n}{2} [2 \times 1 + (n-1) \times 2] \\ &= \frac{n}{2} [2 + 2n - 2] \\ &= \frac{n}{2} \times 2n \\ &= n^2 \end{aligned}$$

طريقو III

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + 3 + \dots + (2n-1) \\ &= (1 + 2 + 3 + \dots + 2n) \\ &\quad - (2 + 4 + 6 + \dots + 2n) \\ &= \frac{2n(2n+1)}{2} - \frac{2n(n+1)}{2} \\ &= (2n^2 + n) - (n^2 + n) \\ &= n^2 \end{aligned}$$

∴ پھرين n اڪي قدرتي انگن جي جوڙ اُڀت n^2 آھي.

مثال (4) مشغولي : 1 کان 150 تائين سڀني اڪي انگن جي جوڙ اُڀت لھو.

حل : 1 کان 150 تائين سڀني 1, 3, 5, 7, ..., 149 اڪي انگن جي جوڙ اُڀت لھو.

ھتي $a=1$ ۽ $d=2$ پھريون 1 کان 150 تائين اڪي انگ ڪيترا آھن اھو لھو.

$$t_n = a + (n-1)d$$

$$149 = 1 + (n-1)2 \quad \therefore 149 = 1 + 2n - 2$$

$$\therefore n = 75$$

ھاڻي $1 + 3 + 5 + \dots + 149$ 75 انگن جو جوڙ ڪريو

$$d = 2, n = 75 \text{ ۽ } a = 1$$

$$S_n = \frac{n}{2} [t_1 + t_n] \quad \text{طريقو II}$$

$$S_n = \frac{75}{2} [1 + 149]$$

$$S_n = \boxed{} \times \boxed{}$$

$$S_n = \boxed{}$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \quad \text{طريقو I}$$

$$S_n = \boxed{}$$

$$S_n = \boxed{} \times \boxed{}$$

$$S_n = \boxed{}$$

آپياس 3.3

1. هڪ انگي پروگرشن جو پهريون پد 6 ۽ عام تفاوت 3 آهي ته S_{27} لھو.

$$a = 6, d = 3, S_{27} = ?$$

$$S_n = \frac{n}{2} [\square + (n-1)d]$$

$$S_{27} = \frac{27}{2} [12 + (27-1)\square]$$

$$= \frac{27}{2} \times \square$$


$$= 27 \times 45 = \square$$

2. پھرين 123 ٻڌي قدرتي انگن جي جوڙ اُپت لھو.

3. 1 ۽ 350 جي وچ ۾ سڀني ٻڌي انگن جي جوڙ اُپت لھو.

4. هڪ انگي پروگرشن جو اٽويھون پد 52 ۽ اٺٽيھون پد 128 آھي، ته اُنجي پھرين 56 پدن جي جوڙ اُپت لھو.

5. 1 ۽ 140 جي وچ ۾ چئن سان ونڊجندڙ قدرتي انگه ڪيترا آهن، اھو لھو انھن انگن جي جوڙ اُپت لھڻ لاءِ ھيٺين مشغولي پوري ڪريو



1 ۽ 140 جي وچ ۾ ايندڙ چئن سان ونڊجندڙ انگن جي جوڙ اُپت = $\square$

★ 6. هڪ انگي پروگرشن جي پھرين 55 پدن جي جوڙ اُپت 3300 آھي، ته ان جو 28 پد لھو.

7. هڪ انگي پروگریشن جي ٽن لڳاتار پڌن جي جوڙ اُڀت 27 آهي ۽ انهن جي ضرب اُڀت 504 آهي،
تہ اهي پڌ لھو. (ٽي لڳاتار پڌ $a-d, a, a+d$ کڻو)

8. هڪ انگي پروگریشن جي چئن لڳاتار پڌن جي جوڙ اُڀت 12 آهي ۽ انهن چئن لڳاتار پڌن مان ٽئين ۽
چوٿين پڌ جي جوڙ اُڀت 14 آهي، تہ چارئي پڌ لھو.
(چار لڳاتار پڌ $a-d, a, a+d, a+2d$ کڻو)

9. هڪ انگي پروگریشن جو نائون پڌ ٻڙي آهي، تہ ثابت ڪريو تہ اُڻٽيهون پڌ، اُڻويهين پڌ کان ٻيڻو آهي.

ڄاڻي وٺون



(Application of A.P.) انگي پروگریشن جو اُڀيوگ

مثال (i) هڪ مڪسر ٺاهيندڙ ڪمپنيءَ ٽئين سال 600 مڪسر ٺاهيا ۽ ستين سال 700 مڪسر ٺاهيا. هر هڪ سال
نھندڙ مڪسرن ۾ واٽ هڪجيتري رڪي هيٺيان انداز لھو. (i) پهرين سال جي پيدايش (ii) ڏهين سال جي
پيدايش (iii) پهرين ستن سالن ۾ ڪل پيدايش.

حل : ڪمپنيءَ ۾ نھندڙ مڪسرن ۾ واٽ هر سال هڪجيتري رڪي ويئي آهي.
انڪري لڳاتار سال ۾ نھندڙ مڪسرن جو انداز انگي پروگریشن جي روپ ۾ آهي.
(i) ڪمپنيءَ سال n ۾ t_n مڪسر ٺاهيا آهن. اھو مڃي، ڏنل ڄاڻ انوسار

$$t_3 = 600, t_7 = 700$$

$$t_n = a + (n-1)d \quad \text{آسانڪي ڄاڻ آهي تہ}$$

$$t_3 = a + (3-1)d$$

$$= 600 = a + 2d \quad \dots\dots\dots (I)$$

$$t_7 = a + (7-1)d$$

$$= a + 6d = 700 \quad \dots\dots\dots (II)$$

$$a + 2d = 600 \quad \therefore a = 600 - 2d \quad \text{اھو ملھ مساوت (II) ۾ رکي}$$

$$600 - 2d + 6d = 700$$

$$4d = 100 \quad \therefore d = 25$$

$$a + 2d = 600 \quad \therefore a + 2 \times 25 = 600$$

$$a + 50 = 600 \quad \therefore a = 550$$

$\therefore$ پهرين سال جي پيدايش 550 مڪسر آهي.

$$(ii) t_n = a + (n-1)d$$

$$t_{10} = 550 + (10-1) \times 25$$

$$= 550 + 225 = 775$$

$\therefore$ ڏهين سال ۾ پيدايش 775 آهي.

(iii) پهرين ستن سالن جي پيدائش لھڻ لاءِ S_n جو سوتر واپرائي

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$\therefore S_7 = \frac{7}{2} [1100 + 150] = \frac{7}{2} [1250] = 7 \times 625 = 4375$$

$\therefore$ پهرين ستن سالن جي ڪل پيدائش 4375 آهي.

مثال (2) قرض ڪنيل 3,25,000 رپيا چڪائڻ لاءِ آجيه سرما پهرين مهيني 30,500 رپيا ڀريا اٽڪانپوءِ هر مهيني آڳين مهيني کان 1500 رپيا گھٽ ڀرڻا پون ٿا ته قرض ڪنيل رقم چڪائڻ لاءِ ڪيس ڪيترا مهينا لڳندا؟

حل : سمجهو ته قرض ڪنيل پئسا چڪائڻ لاءِ n مهينا لڳن ٿا. 30,500 مان هر مهيني 1500 ر گھٽائڻا آهن.

$\therefore 30,500; 30,500 - 1500; 30,500 - 2 \times 1500, \dots$
اهي چڪائيندڙ رقمون انگي پروگريشن ۾ آهن.

پهريون ڀد $d = -1500$, $a = 30500$ قرض ڪنيل رقم $S_n = 3,25,000 =$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$3,25,000 = \frac{n}{2} [2 \times 30500 + (n-1) \times (-1500)]$$

$$= \frac{n}{2} [2 \times 30500 - 1500n + 1500]$$

$$3,25,000 = 30500n - 750n^2 + 750n$$

$$\therefore 750n^2 - 31250n + 325000 = 0$$

$$\therefore 3n^2 - 125n + 1300 = 0 \quad \dots \dots \dots \text{(ٻنهي پاسي 250 سان ونڊ ڪري)}$$

$$\therefore 3n^2 - 60n - 65n + 1300 = 0$$

$$\therefore 3n(n-20) - 65(n-20) = 0$$

$$\therefore (n-20)(3n-65) = 0$$

$$\therefore n-20=0, \text{ يا } 3n-65=0$$

$$n=20 \text{ يا } n=\frac{65}{3}=21\frac{2}{3}$$

انگي پروگريشن ۾ n ڀد قدرتي انگ هوندو آهي.

$$\therefore n \neq \frac{65}{3} \therefore n=20$$

$\therefore$ 20 مهينن ۾ سڄي 3,25,000 رپيا رقم چڪائي ويندي.

مثال (3) اَنور هر مهني مقرر رقم جي بچت ڪري ٿو. پهرين مهني هو 200 ر بچت ڪري ٿو
 ٻئين مهني 250 ر بچت ڪري ٿو. ٽئين مهني 300 ر بچت ڪري ٿو ته 1000 ر بچت ڪائين
 مهني ۾ ٿيندي؟ اُن مهني تائين هن جي ڪل بچت ڪيتري ٿيندي؟
 حل : پهرين مهني ۾ بچت 200 ر ٻئين مهني ۾ بچت 250 ر . . .

اهڙي طرح هر مهني ٿيندڙ بچت 200, 250, 300, . . . انگي پروگريشن ۾ آهي.

هتي $a = 200, d = 50$ جو سؤتر ڪر آڻي n جو ملهه لھو ۽ اُن مان S_n لھو.

$$\begin{aligned} t_n &= a + (n-1)d \\ &= 200 + (n-1)50 \\ &= 200 + 50n - 50 \end{aligned}$$

$$\therefore 1000 = 150 + 50n$$

$$150 + 50n = 1000$$

$$50n = 1000 - 150$$

$$50n = 850$$

$$\therefore n = 17$$


1000 ر بچت 17 مهني ۾ ٿيندي
 17 مھنن جي ڪل بچت ڪيتري اِها لھو

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \\ &= \frac{17}{2} [2 \times 200 + (17-1) \times 50] \\ &= \frac{17}{2} [400 + 800] \\ &= \frac{17}{2} [1200] \\ &= 17 \times 600 \\ &= 10200 \end{aligned}$$

17 مھنن جي ڪل بچت 10,200 ر آھي.

مثال (4) شکل ۾ ڏيکاريل طريقي هڪ ليک تي A مرڪز کڻي 0.5 س ۾ نيم قطر وارو P_1 آڌ گول ڪڍو. اهو

ان ليک کي B ٽپڪي وٽ ڪپي ٿو. هاڻي B مرڪز کڻي 1 س ۾ نيم قطر وارو P_2 آڌ گول ليک جي ٻي پاسي ڪڍو هاڻي وري A مرڪز کڻي 1.5 س ۾ نيم قطر وارو P_3 آڌ گول ڪڍو. اهڙيءَ طرح A ۽ B مرڪز کڻي نمبروار 0.5 س ۾، 1 س ۾، 1.5 س ۾، 2 س ۾، اهڙا نيم قطرن وارا آڌ گول ڪڍڻ کانپوءِ هڪ گول گهيري واري شڪل تيار ٿئي ٿي، ته اهڙيءَ طرح 13 آڌ گولن سان تيار ٿيل گول گهيري واري شڪل جي ڊيگهه ڪيتري آهي ($\pi = \frac{22}{7}$ کڻو)



حل : A, B, A, B, ... ان سلسلي ۾ مرڪز کڻي ڪڍيل آڌ گول گهيرن جي ڊيگهه نمبر وار $P_1, P_2, P_3, \dots$

سمجهو پهرين آڌ گول جو نيم قطر 0.5 س ۾ آهي. ٻين آڌ گول جو نيم قطر 1.0 س ۾ آهي. ان نموني ڄاڻ ڏنل آهي ان وسيلي $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{13}$ جو ملهه لھو.

$$P_1 = \pi r_1 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} = \text{پهرين آڌ گول جي گهيري جي ڊيگهه}$$

$$P_2 = \pi r_2 = \pi \times 1 = \pi$$

$$P_3 = \pi r_3 = \pi \times 1.5 = \frac{3}{2} \pi$$

$P_1, P_2, P_3, \dots$ آڌ گولن جا گهيرا يعني $\frac{1}{2} \pi, 1 \pi, \frac{3}{2} \pi, \dots$ اهي عدد انگي پروگرشن ۾ آهن.

هتي $a = \frac{1}{2} \pi, d = \frac{1}{2} \pi$ ان مان S_{13} لھو

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{13} = \frac{13}{2} \left[2 \times \frac{\pi}{2} + (13-1) \times \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= \frac{13}{2} [\pi + 6\pi]$$

$$= \frac{13}{2} \times 7\pi$$

$$= \frac{13}{2} \times 7 \times \frac{22}{7}$$

$$= 143 \text{ س ۾}$$

∴ 13 آڌ گولن سان تيار ٿيل گول گهيري جي ڊيگهه 143 س. ۾ هوندي.

مثال (5) هڪ ڳئون ۾ 2010 تائين 4000 ماڻهو پڙهيل هئا اهو عدد هر سال 400 وڌي ٿو ته 2020 سال ۾ ڪيترا ماڻهو پڙهيل هوندا؟

حل :

سال	2010	2011	2012	...	2020
پڙهيل ماڻهو	4000	4400	4800	...	

$$a = 4000, \quad d = 400 \quad n = 11$$

$$\begin{aligned} t_n &= a + (n-1)d \\ &= 4000 + (11-1)400 \\ &= 4000 + 4000 \\ &= 8000 \end{aligned}$$

2020 سال ۾ 8000 ماڻهو پڙهيل هوندا.

مثال (6) شريمني شيخ کي 2015 سال ۾ سالياني 1,80,000 رپيا پگهار واري نوڪري ملي آفيس وارن هن تي هر سال 10,000 پگهار وڌائڻ قبول ڪيو ته ڪهڙي سال ۾ هن جي سالياني پگهار 2,50,000 رٿيندي.

حل :

سال	پهرين سال (2015)	ٻين سال (2016)	ٽين سال (2017)	...
پگهار (رپيا)	[1,80,000]	[1,80,000 + 10,000]		...

$$a = 1,80,000, \quad d = 10,000 \quad n = ? \quad t_n = 2,50,000 \text{ رپيا}$$

$$\begin{aligned} t_n &= a + (n-1)d \\ 2,50,000 &= 1,80,000 + (n-1) \times 10,000 \end{aligned}$$

$$(n-1) \times 10000 = 70,000$$

$$n-1 = 7$$

$$n = 8$$

∴ آئين سال هن جي سالياني پگهار 2,50,000 رٿيندي.

آپياس 3.4

1. سانڪا جنوري 2016 تي فيصلو ڪيو ته پهرين ڏينهن 10 ر بين ڏينهن 11 ر، ٽين ڏينهن 12 ر آهڙيءَ طرح بچت ڪندي رهندي ته 31 ڊسمبر 2016 تائين هن ڪل بچت ڪيتري ٿي؟
2. هڪ ماڻهو 8000 ر قرض ڪيو ۽ ان تي 1360 ر وياج ڏيڻ قبول ڪيو. هڪ قسط آڱلي قسط کان 40 ر گهٽ ڏيئي سڄي رقم 12 ماهين قسطين ۾ پري، ته هن پهرين ۽ آخري قسط ۾ ڪيتري رقم پري؟
3. سچن راشن ۾ پهرين سال 5000 ر، ٻين سال 7000 ر، ٽين سال 9000 ر ان سلسلي ۾ رقم سڙائي ته هن جي 12 سالن ۾ ڪل سڙايل رقم ڪيتري آهي؟
4. هڪ سڀا گهر ۾ ڪل 27 قطارون آهن. پهرين قطار ۾ 20 ڪرسيون آهن، ٻين قطار ۾ 22 ڪرسيون، ٽين قطار ۾ 24 ڪرسيون ته پندرهنين قطار ۾ ڪل ڪيتريون ڪرسيون آهن ۽ سڀا گهر ۾ ڪل ڪيتريون ڪرسيون آهن؟
5. ڪارگل ۾ هڪ هفتي ۾ سومر کان چنڇر تائين سڀني ڏينهن جو گرمي پد ماپيو ويو. اهي ماپون انگي پروگريشن ۾ آهن سومر ۽ چنڇر جي گرمي پد جي جوڙا پٽ منڊل ۽ چنڇر جي گرمي پد جي جوڙا پٽ ڪي 5°C وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ٻڌر جو گرمي پد 30°C آهي ته هر هڪ ڏينهن جو گرمي پد لھو.
6. وشو پرياورڻ ڏينهن تي هڪ ٽڪنڊي شڪل واري پلاٽ تي وڻ پوکڻ جو ڪاريه ڪرم رکيو ويو. پهرين قطار ۾ هڪ وڻ، ٻي قطار ۾ 2 وڻ، ٽين قطار ۾ 3 وڻ آهڙيءَ طرح 25 قطارن ۾ وڻ پوکيا ويا، ته ڪل ڪيترا وڻ پوکيا ويا؟

گڏيل آپياس 3

1. هيٺين سوالن ۾ صحيح جواب چونڊيو
 - (1) $2, -2, -6, -10, \dots$ اهو سلسلو
 - (A) انگي پروگريشن آهي، ڇاڪاڻ ته $d = -16$ آهي. (B) انگي پروگريشن آهي، ڇاڪاڻ ته $d = 4$ آهي.
 - (C) انگي پروگريشن آهي، ڇاڪاڻ ته $d = -4$ آهي. (D) انگي پروگريشن نه آهي.
 - (2) جنهن انگي پروگريشن جو پهرين پڌ -2 آهي ۽ عام تفاوت 2- آهي، آهڙي انگي پروگريشن جا پهرين چار پڌ آهن.
 - (A) $-2, 0, 2, 4$ (B) $-2, 4, -8, 16$
 - (C) $-2, -4, -6, -8$ (D) $-2, -4, -8, -16$
 - (3) پهرين 30 قدرتي، انگن جي جوڙا پٽ هيٺين مان ڪهڙي آهي؟
 - (A) 464 (B) 465 (C) 462 (D) 461

(4) ڈنل اَنگي پروگریشن جو $n=7$ تہ 'a' لھو. $t_n = 4, d = -4$. . .

(A) 6 (B) 7 (C) 20 (D) 28

(5) هڪ انگي پروگریشن ۾ $a = 3.5, d = 0$ ، آهي ته $t_n = \dots$

(A) 0 (B) 3.5 (C) 103.5 (D) 104.5

(6) هڪ آٽو پريشن جا پهريان ٻه ڊڊ 3-4، آهن ته اڪويهون ڊڊ آهي.

(A) -143 (B) 143 (C) 137 (D) 17

(7) جيڪڏهن هڪ اَنگِي پروگریشن ۾ $d = 5$ آهي ته $t_{18} - t_{13} = \dots$

(A) 5 (B) 20 (C) 25 (D) 30

(8) 3 جي ڪوڙي ۾ پهرين پنجن انگن جي جوڙ اُپت ... آهي.

(A) 45 (B) 55 (C) 15 (D) 75

(9) $5, 10, 15$ ان انگي پروگریشن جي پهرين 10 پدن جي جوڙ اُپت ... آهي.

(A) -75 (B) -125 (C) 75 (D) 125

(10) هڪ اَنگي پروگرشن جو پهريون پد 1 آهي، n پد 20 آهي. جيڪڏهن $S_n = 399$ آهي ته $n =$

(A) 42 (B) 38 (C) 21 (D) 19

2. $-49, -5, -8, -11, \dots$ انگي پروگریشن آخري چوٿون پد لھو.

3. هڪ انگي پروگريشن جو ڏهون پد 46 آهي. پنجين ۽ ستين پد جي جوڙ اُپت 52 آهي. ته اهو سلسلو لھو.

4. جنهن انگي پروگریشن جو چوٿون پد 15- ۽ نائون پد 30- آهي ۽ پهرين چهن پدن جي جوڙ اُپت 36 آهي، ته پهرين ڏهن پدن جي جوڙ اُپت لھو.

5. به انگي پروگریشن ڏنل آهن 5, 7, 9, ۽ 18, 21, 24, جيڪڏهن ٻنهي انگي پروگریشن جو n پد ساڳيو آهي ته n جو ملهه لھو ۽ n پد لھو.

6. جيڪڏهن هڪ انگي پروگريشن جي ٽين ۽ اٺين پڌ جي جوڙ اُڀت 7 آهي ۽ ستين ۽ چوڏهين پڌ جي جوڙ اُڀ 3- آهي ته ڏهون پڌ لھو.

7. هڪ انگي پروگريشن جو پهريون پد 5- ۽ آخري پد 45 آهي جيڪڏهن انهن سڀني پدن جي جوڙ اُپٽ 120 آهي ته ڪيترا پد آهن؟ ۽ انهن جو عام تفاوت ڪيترو آهي؟

8. 1 کان n قدرتي انگن جي جوڙ اُپت 36 آهي ته n جو ملهه لھو.

9. 207 عدد جا ٿي حصا اهڙيءَ طرح ڪريو جيئن اُهي عدد انگي پروگريشن ۾ هجن ۽ ننڍن ٻن حصن جي ضرب اُپت 4623 هجي.

10. هڪ انگي پروگريشن ۾ 37 پڌ آهن سڀني جي وچوارن ٽن پڌن جي جوڙ اُپت 225 آهي ۽ آخري ٽن پڌن جي جوڙ اُپت 429 آهي ته انگي پروگريشن ڪڍو.

11. جن انگي پروگريشن جو پهريون پڌ a آهي ٻيون پڌ b آهي ۽ آخري پڌ c آهي ته ان سلسلي جي پڌن جي جوڙ اُپت $\frac{(a+c)(b+c-2a)}{2(b-a)}$ آهي اهو ثابت ڪري ڏيکاريو.

12. جيڪڏهن انگي پروگريشن جي پهرين p پڌن جي جوڙ اُپت، پهرين q پڌن جي جوڙ اُپت جي برابر آهي ته ان جي پهرين (p+q) پڌن جي جوڙ اُپت آهي اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ($p \neq q$)

13. جيڪڏهن ڪنهن انگي پروگريشن جي m پڌ جو n دفعا n پڌ جي (n+m) دفعا جي برابر آهي ته ثابت ڪريو ته ان انگي پروگريشن جو پڌ ٻڙي آهي.

14. 1000 ر رقم 10% سادي وياج تي سڙائي ويئي ته هر سال جي آخر ۾ ملندڙ وياج جي رقم انگي پروگريشن ۾ آهي ته 20 سالن کان پوءِ ملندڙ وياج جي رقم لھو ان لاءِ هيٺين مشغولي پوري ڪريو.

$$\frac{P \times R \times N}{100} = \text{سادو وياج}$$

$$\square = \frac{1000 \times 10 \times 1}{100} = \text{پهرين سال ملندڙ سادو وياج}$$

$$\square = \frac{1000 \times 10 \times 2}{100} = \text{ٻن سالن کانپوءِ ملندڙ سادو وياج}$$

$$300 = \frac{\square \times \square \times \square}{100} = \text{ٽن سالن کانپوءِ ملندڙ سادو وياج}$$

اهڙيءَ طرح 4, 5, 6 سال کانپوءِ ملندڙ سادو وياج نمبروار 400, $\square$, $\square$ آهي.

هن سلسلي ۾ $\square = d$, $\square = a$ آهي.

20 سالن کانپوءِ ملندڙ سادو وياج

$$t_n = a + (n-1)d$$

$$t_{20} = \square + (20-1)\square$$

$$t_{20} = \square$$

$$\square = \text{20 سالن کانپوءِ ملندڙ سادو وياج}$$



□□□

اچو ته سڪي ونون



- جي ايس ٽي واقفيت
- ٽئڪس انوائسز
- جي ايس ٽي ڪٽڻ ۽ ان پٽ ٽئڪس ڪريڊٽ
- شيئرس، مچيوئل فنڊ ۽ ايس آءِ پي

اچو ته چرچا ڪريون



ماسٽرياڻي :- وديارتي دوست، آسان جي ديش ۾ واپار لاءِ ڪهڙي ٽئڪس ويوسٽا هلندڙ آهي؟
آيوش :- آسان جي ديش ۾ جي ايس ٽي مطلب شيون ۽ سيوانئون ٽئڪس ويوسٽا هلندڙ آهي.

ماسٽرياڻي :- واھ، ان بابت توهان کي ڇا ڄاڻ آهي؟


آيان :- جي ايس ٽي معنيٰ Goods and Service Tax.

آيشا :- سڄي ديش ۾ هڪ ئي ٽئڪس عمل ۾ آندل آهي.

ماسٽرياڻي :- برابر اڳ ۾ جدا جدا راجين ۾ جدا جدا ٽئڪس لڳندي هئي اڄ وارين ٽئڪسن ۾ ڪهڙا ٽئڪس بدلايا ويا آهن اُهي هيٺ ڏنل چتر ۾ ڏسو

شفيق :- اُتپادن ڍل، حد ڍل، وٽ مرڪزي ڍل، سيوا ٽئڪس، ناڪو وغيره

ماسٽرياڻي :- اهي سڀ رد ڪري هاڻي فقط جي.ايس.ٽي خريدي- وڪرو تي لڳائي ويئي آهي. اها 1 جولاءِ 2017ع کان عمل ۾ آئي. انڪري چئجي ٿو هڪ ديش - هڪ ٽئڪس هڪ بازار.





شيء خريدي لاءِ ٽئڪس اِنوائِز (نمونو)										
SUPPLIER : A to Z SWEET MART						GSTIN :27ABCDE1234H1Z5				
143, Shivaji Rasta, Mumbai : 400001 Maharashtra										
Mob. No. 92636 92111 email : atoz@gmail.com										
Invoice No. GST/110						Invoice Date: 31-Jul-2017				
S. No.	HSN code	Name of Product	Rate	Quantity	Taxable Amount	CGST		SGST		Total Rs.
						Rate	Tax	Rate	Tax	
1	210690	پيڙا	400 ر	500 گرام	200.00	2.5%	5.00	2.5%	5.00	210.00
2	210691	چاڪليت	80 ر	1 پئڪ	80.00	14%	11.20	14%	11.20	102.40
3	2105	آئيسڪريم	200 ر	1 پئڪ (گرام 500)	200.00	9%	18.00	9%	18.00	236.00
4	1905	بريد	35 ر	1 گرام	35.00	0%	0.00	0%	0.00	35.00
5	210690	لوڻي	500 ر	250 پئڪ	125.00	6%	7.50	6%	7.50	140.00
ڪُل رقم							41.70		41.70	723.40

ويڊ : ان ۾ بل ۾ آسان ڪي ڪجهه نوان لفظ نظر اچن ٿا. انهن جو مطلب سمجهايو. ماسٽرياڻي : - CGST ۽ SGST اهي جي ايس ٿي جا ٻه ڀاڱا آهن. GST معنيٰ (Central Goods and Services Tax) مرڪزي شيون ۽ سڀو ٽيڪس اها مرڪزي سرڪار خزانن ۾ جمع ٿئي ٿي. GST معنيٰ (State Goods & Services Tax) راجيه شيون ۽ سڀو ٽيڪس اها راجيه سرڪار خزانن ۾ جمع ٿئي ٿي.

رييا : - مٿي نموني ۾ ساڄي پاسي اکرن ۽ انگن وڌيڪ قطار آهي اهو ڇا آهي؟ ماسٽرياڻي : - اهو CGST آهي مطلب واپاريءَ جو سڃاڻپ نمبر (GSTIN - GST Identification Number) جن واپارين جي آرٽڪل سال ۾ ٽن اوور 20 لکن کان وڌيڪ آهي انهن لاءِ اهو نمبر وٺڻ لازمي آهي PAN ۾ اهڙا ڏهه انگ - اکر هوندا آهن. اهڙي نموني ان GSTIN ۾ 15 انگ - اکر هوندا آهن. ان 15 انگ ۾ اکر واپاري جو PAN سمايل هوندو آهي.

(آخر وارو انگ يا انهن مان هڪ هوندو آهي) 27 A B C D E 1 2 3 4 H 1 Z مثال

10 انگ آڪري PAN رجسٽريشن نمبر

سڀني لاءِ ساڳيو (By default)

راجيه جو 2 انگي

چيڪ سر ڊجٽ

(چيڪ سر ڊجٽ اهو انٽرنيٽ ۾ GSTIN وجهڻ سان جاڳ پوندي ته اهو صحيح آهي يا غلط)

27 اهو مهاراشٽر جو ڪوڊ (State Code) آهي. ان مان سمجهه ۾ ايندو ته واپاريءَ جو نالو مهاراشٽر ۾ درج ٿيل آهي.

جيني :- ٽئڪس انوائز ۾ HSN اهو ڪوڊ ڇا آهي؟

ماسٽرياڻي :- HSN ڪوڊ مطلب اُن شيءِ جو ورگيڪرڻ ۾ خاص نمبر ڏنل آهي ٽئڪس انوائز ۾ اُن جو ملهه لڳائڻو هوندو آهي.

ايڇ ايس اين معنيٰ Harmonized System of Nomenclature.

جوسف :- ٽئڪس انوائز ۾ دڪان جو نالو، ايڊريس، تاريخ، انوائز نمبر، موبائيل نمبر، ٽي ميل آئيڊي آهي. ماسٽرياڻي :- هاڻي ان انوائز ۾ شيون ۽ سيواون ٽئڪس ڪهڙي سروي ۾ آهن، اهو ڏسون ان لاءِ هيٺ ڏنل جملن ۾ خالي چوڪنڊا ڀريو. انوائز ۾ پيڙن جو اگهه 400 ر في ڪلو گرام آهي. اڌ ڪلو گرام پيڙا ورتل آهن. انڪري اُنجو ملهه 200 ر آهي.

◆ ر = 2.5% پيڙن تي مرڪزي ٽئڪس، ان مٿان راجيه جي ٽئڪس اگهه سان 5 رپيا.

◆ ان مان پيڙن تي 5% = 2.5% + 2.5% 10 رپيا.

◆ ان نموني چاڪليٽ مٿان ٽئڪس اگهه % مطلب اُن تي ر ٽئڪس.

◆ آئيسڪريم مٿان GST اگهه % = اُن مٿان رپيا ٽئڪس.

◆ ڏهيءَ مٿان مرڪزي % ۽ راجيه % ملائي % آهي.

آدٽيم :- ڊپل روٽيءَ مٿان ٽئڪس 0% آهي ٻئي راجيه توڙي مرڪزي ٽئڪسون ساڳيون آهن.

نتاد :- شيءِ جي قسم جي آڌار تي ٽئڪس جدا جدا آهن. 28%، 18%، 12%، 5%، 0%

ماسٽرياڻي :- هر هڪ شيءِ مٿان اگهه سرڪاري مقرر ڪندي آهي. هاڻي هڪ سيوا انوائز نمونو ڏسون هن ڏنل ڄاڻ موجب اهو انوائز پورو ڪريو.

شيو ٽئڪس انوائز (نمونو)								
آها سونيڊري ڪيٽر - شوپر - ڀٽي						Invoice No. 58		
Mob. No. 7588580000 email – ahar.khed@yahoo.com								
GSTIN : 27 AAAAA5555B1ZA					Invoice Date : 25-Dec-2017			
S A Code (SAC)	Food items	Qty	Rate (in Rs.)	Taxable amount	CGST		SGST	
9963	Coffee	1	20	20.00	2.5%	0.50 رپيا	2.5%	...
9963	Masala Tea	1	10	10.00	...	...	2.5%	...
9963	Masala Dosa	2	60	...	2.5%	...	...	...
Total				...		...		...
Grand Total = ----- رپيا								

ماسٽرياڻي :- شيوا ۽ سيواون ٽئڪس جا ٻئي بل ڇاچي، ٻنهي بلن جي ڪوڊ ۾ فرق سمجهو.

هريش :- شين جي بل تي HSN ڪوڊ ڏنل آهي ته وري ناستا گهر بل تي SA ڪوڊ ڏنل آهي.
 ماسٽرياڻي :- SAC مطلب Service Accounting Code - SAC اهو سيواڻن جي ورگيڪرڻ
 ۾ خاص نمبر آهي SAC مطلب هيٺ ڏنل خاڪي ۾ ڪجهه شين ۽ سيواڻن جا اگهه ڏيکاريل آهن.

نمبر	قسم	ٽئڪس جو اگهه	شين ۽ سيوا قسم
I	بڙيءَ وارا (Nil rated)	0%	شين : اناج وغيره زندگيءَ لاءِ ضروري شين، پاجيون، قل، ڪير، لوڻ، مٽيءَ جا برتن وغيره سيواڻون : ڌارمڪ سنسٽائن جا پراجيڪٽ، پاڻيءَ جا واهڻ، رستا - پلن جو استعمال، تعليم تندرستي سيوا، عام پبلڪ لائبرري، ڪيتي سيوا وغيره.
II	گهٽ اگهه	5%	شين : عام ڪم ايندڙ شيو، ايل پي جي سليبڊر، چانهه، تيل، ماکي فروزن پاجين، لوڻنگ، مصالحا، مٺاڻي. سيواڻون : ريلوي، بس واهڻ، ٽئڪس سيوا، ومان (اڪنامي درجو) هاسٽل ۾ ڪاڌيه پڌارٽ وغيره.
III	پرمائ اگهه (سطح I)	12%	شين : گراهڪ استعمال شين، لسي، ڏهي، سُڪل ميوو، پاجين ۽ قلن مان رسون، مڙبو، جيلي، چٽڻي، موبائيل وغيره. سيواڻون : چپائي - ڪم، گيسٽ هائوس، ڪنستريڪشن وغيره
IV	پرمائ اگهه (سطح II)	18%	شين : ماربل گرٽنائيت، پرفيومس، ڌاتو، ڪمپيوٽر، پرنٽر، مانيتر سي سي ٽي وي وغيره. سيواڻون : ڪوريئر سيوا، آئوٽ ڊور ڪٽرنگ، سرڪس، ناٽڪ، نما، سنيما، شيئر ٽريڊنگ، دلاي وغيره
V	وڏو اگهه	28%	شين : لگڙي شين، موٽر سائيڪل، پرزا، ڪار، تماڪ، ٿڌا، پان، مصالحا، وٽڪيوم ڪلين، اي سي يونٽ، واشنگ مشين وغيره سيواڻون : پنچ تارا هوٽل، وندر - باغ، واٽر پارڪ، ٿيئر پارڪ، ڪئسينو، روس ڪورن، آءِ پي ايل، ومان (اوچو) وغيره.
0% کان 5% تائين شين مٿان جي ايس ٽي چڪاس ڪريو. (Central Board of Excise & Customs) www.cbec.gov.in ان سائيٽ تي وڃي			

ٽپ : اها سڀ جاڻ سرڪار طرفان منظور ٿيل % تي آهي.

مٿي ڏنل لسٽ ۾ تبديل اچي سگهي ٿي. بجلي، پيٽرول، ڊيزل اهي جي ايس ٽي ۾ نٿا اچن.

مشغولي - I: توهان جي استعمال ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڏهن شين جي لسٽ تيار ڪريو انهن مٿان جي ايس ٽي آگهه ڪيٽرو آهي اهو لکو. اها ڄاڻ اخبارن، انٽرنيٽ، جي ايس ٽي ڪتابن يا شين جي خريدي بابت وسيلي حاصل ڪريو پوءِ دوستن سان انهن جي چڪاس ڪريو.

شيءَ	جي ايس ٽي آگهه	شيءَ	جي ايس ٽي آگهه
1. اسڪيچ بڪ		6. - - - - -	
2. ڪمپاس		7. - - - - -	
3. - - - - -		8. - - - - -	
4. - - - - -		9. - - - - -	
5. - - - - -		10. - - - - -	

مشغولي - II: مشغولي - I وانگر ڏهه سيوائون (جئن - ريلوي ۽ ايس. ٽي بس سيوا وغيره) ملڻ لاءِ جي ايس ٽي جو آگهه ڳولهيو يا بل حاصل ڪري تڏهن پورو ڪريو.

سيوا	جي ايس ٽي آگهه	سيوا	جي ايس ٽي آگهه
1. ريلوي بڪنگ		6. - - - - -	
2. ڪوريئر سيوا		7. - - - - -	
3. - - - - -		8. - - - - -	
4. - - - - -		9. - - - - -	
5. - - - - -		10. - - - - -	

مشغولي - III: هيٺيون تڏهن ڏسو ۽ ٻيون شيون ۽ سيوا ڪوڊ ڳولهو لکو.

سيوا	SAC	GST آگهه	شيءَ	HSN Code	GST آگهه
ريلوي سيوا	996511	--	ڊيوئلز رنر	3208	28%
ومان (اڪانامي)	996411	--	بال بيئرنگ	84821011	28%
چلن سيوا	997157	--	اسپيڊوميٽر	8714	28%
دلالي سيوا	997152	--	پٽاڻا	0701	0%
ٽنگسي	996423	--	--	--	--
5 اسٽار سيوا	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

مشغولي - IV: ڪي به 5 شيون ۽ 5 سيواون انهن لاءِ HSN ۽ SAC ڪوڊ جا تختا تيار ڪريو شين ۽ سيواون جا چتر ڇپڪايو. ان شيءِ ۽ سيوا لاءِ GST جو آگهه ڳولهو لکو.

خاص ڳالهه شين ۽ سيواون بابت HSN, SAC, اها مشغولي فقط ڄاڻ لاءِ آهي اهو ياد ڪرڻ لاءِ نه آهي.

پروجيڪٽ: جدا جدا قسمن جا بل حاصل ڪريو جيئن شيون سپلائي، سيوا بل وغيره انهن بلن ۾ ... حوالي جدا جدا نظريي کان آڀياس ڪريو ۽ ڪلاس ۾ بحث ڪريو.

حل ڪيل مثال

مثال (1) آر تي گئس ايجنسي 545 ر مله جو هڪ LPG سليبڊر هڪ گراھڪ کي وڪيو جي ايس ٽي جو اگھ 5% آهي ته گراھڪ کي ڏنل انوائز ۾ مرڪز ۽ راجيه جي ڪيتري ٽئڪس ٿيندي گراھڪ کي ڪل ڪيترا رپيا ڏيڻا پوندا؟ آر تي گئس ايجنسي کي ڪل ڪيترا رپيا ٽئڪس ڏيڻي پوندي؟

حل : جي ايس ٽي ٽئڪس اگھ = 5% . راجيه 2.5% ۽ مرڪز = 2.5%

$$\text{سي جي ايس ٽي} = 13.63 = 13.625 = 545 \times \frac{2.5}{100} \text{ روپيا}$$

ايس جي ايس ٽي = ٽئڪس اگھ = 13.63 ر گراھڪن کي ڏيڻا پوندا

$$\text{گراھڪن کي ڏيڻا پوندا} = 545 + 13.63 + 13.63 = 572.26$$

$$13.63 = 27.26 = 13.63 + 13.63 \text{ راجيه لاء آر تيءَ کي ڏيڻا پوندا}$$

آر تي گئس ايجنسي کي سي جي ايس ٽي - 13.63 رپيا ۽ ايس جي ايس ٽي 13.63 ر پڻا پوندا. معنيٰ ڪل ٽئڪس 27.26 ر پڻا پوندا.

مثال 2 : ڪور ۽ رسيوا ڏيندڙ هڪ ايجنٽ هڪ پارسل ناسڪ کان ناگپور موڪلڻ لاء گراھڪ کان ڪل 590 ر ورتا ان ۾ 500 رپيا ٽئڪس لائق رقم تي 45 رپيا مرڪز جي ۽ 45 رپيا راجيه جي ٽئڪس آهي ته ان وهنوار ۾ GST اگھ لھو.

$$\text{حل : } 90 \text{ رپيا } 45 + 45 = \text{ڪل GST}$$

$$\therefore \text{GST اگھ} = 18\% = \frac{90}{500} \times 100$$

ڪوريئر سيوا ڏيندڙ ايجنٽ 18% سيوا ٽئڪس ورتي.

مثال (3) شريڊر 50000 ر ڇپيل قيمت وارو هڪ لٽپ ٽاپ وٺڻ جو سوچيو دڪاندار ان قيمت تي 10% چوٽ ڏني لٽپ ٽاپ مٿان جي ايس ٽي اگھ 18% آهي ته دڪاندار GST جو حساب ٿپائي اهو لٽپ ٽاپ شريڊر کي ڪيتري وڪيو؟

حل : پهريان چوٽ لھندا سين :

$$\text{رپيا } 5,000 = 10\% \text{ چوٽ } = 50,000 \text{ چوٽ}$$

$$\text{رپيا } 45,000 = 50,000 - 5,000 = \text{لٽپ ٽاپ جي ٽئڪس لائق رقم} \therefore$$

$$\therefore \text{GST } 18\% = \text{SGST } 9\% \text{ \& } \text{CGST } 9\%$$

$$\text{رپيا } 4050 = 9\% \text{ OF } 45000 = \text{SGST}$$

$$\therefore \text{رپيا } 4050 = \text{CGST}$$

$$\therefore \text{رپيا } 53,100 = 45000 + 4050 + 4050 = \text{لٽپ ٽاپ جي قيمت}$$

شريڊر 53,100 رپيا لٽپ ٽاپ ورتو

خاص ٻالھہ : ٽئڪس لائق رقم معنيٰ جنهن قيمت تي ٽئڪس لڳائي آهي. انوائز ملھہ مطلب ٽئڪس جوڙيل رقم مثال ۾ ڪجھہ مليل نہ هجي تہ وڪرو قيمت تي ٽئڪس لائق رقم سمجھڻ گھرجي جيڪا جي ايس تي مرڪز لاءِ آهي اُها ئي راجيہ لاءِ آهي.


آپياس 4.1

1. پاڻ مبيديڪلس دوائون سپلائي ڪندڙ آهي اُن جي دڪان ۾ ڪجھہ دوائن مٿان GST اگھہ 12% سيڪڙو آهي تہ CGST ۽ SGST لھو.
 2. هي شيءَ مٿان CGST 9% آهي تہ SGST لھو ۽ GST لھو.
 3. ميسرس ريئل پينٽ، 2800 ر في دٻي بہ دٻا لسٽر رنڱ جا وڪيا GST جو اگھہ 28% تہ انوائز ۾ CGST ۽ GST گھڻي لڳائي پوندي.
 4. هڪ واچ جي ٽئڪس لاءِ رقم قيمت 586 ر آهي GST اگھہ 18% آهي تہ اها واچ گراھڪ کي گھڻي ۾ پوندي؟
 5. راند ڪندڙ هڪ رموت رڪار ڪنٽرول جي GST جوڙيل قيمت 1770 ر آهي. GST جو اگھہ 18% آهي تہ اُن مٿان CGST ۽ SGST لھو.
 6. ٽپ ٽاپ اليڪٽرانڪس هڪ ڪمپني کي ڏيڊ ٽن جي AC مٿان ٽئڪس جوڙيل قيمت 51200 ر وڪي CGST جو اگھہ 14% آهي تہ هيٺ ڏنل سوالن جا جواب انوائز موجب لکو.
- (1) SGST جو اگھہ (2) AC مٿان GST جو اگھہ
- (3) AC جي ٽئڪس لائق رقم (4) SGST ڪل رقم (5) CGST (6) SGST
7. پرساد 'مھاراشٽر اليڪٽرانڪس گڊس' وٽان 40000 ر ڇپيل قيمت تي واشنگ مشين ورتي. دڪاندار 5% چوٽ ڏني GST جو اگھہ 28% آهي تہ پرساد گھڻن رپين ۾ اها خريد ڪئي؟ CGST ۽ SGST لھو.

ڄاڻي وٺون



واپاري - زنجير جي ايس تي (G.S.T. in Trading Chain)




واپار - زنجير (Trading Chain)

ساڳئي نموني واپاري زنجيرن ۾ GST سرڪار ۾ ڪيئن جمع ٿئي ٿي اهو هڪ مثال ۾ ڏسون.

مثال : سمجهو ته هڪ ٻڌي واپاريءَ کي اُتپادڪ هڪ گهڙيال نفعو ملائي 200 ر وڪيو اُن ٻڌي واپاري اهو گهڙيال هڪ ريزڪي واپاري کي 300 ر وڪيو. ريزڪي واپاري اهو گهڙيال گراهڪ کي 400 ر وڪيو. جي ايس ٽي 12% آهي اُتپادڪ، ٻڌو واپاري ۽ گراهڪ اِنپٽ ٽئڪس ڪريڊٽ (ITC) ڪيئن ڀري ٿو. اهو هيٺ ڏنل نمونو ڏسي آڀياس ڪريو.

سمجهاڻي :

اُتپادن ڪندڙ کان گهڙيال گراهڪ تائين پهچڻ ۾ ٽي وهنوار ٿين ٿا هر هڪ وهنوار ۾ ٿيل ٽئڪس سوروپ، جمع ٿيل ٽئڪس (راجير ۽ مرڪز) ڪيئن ٿئي ٿي. اهو آسان ڏسندا سين.



گهڙيال ريزڪي واپاري گهڙيال ٻڌو واپاري گهڙيال اُتپادڪ مٿي ڏنل وهنوار ۾ ٽي جدا جدا وهنوار هڪ ئي راجير ۾ ٿيا آهن. انهن جي هر هڪ ٽئڪس اِنوائٽر GST هيٺ ڏنل آهي.

GST ۾ A سُرورپ	GST ۾ B سُرورپ	GST ۾ C سُرورپ
گهڙيال جي قيمت = ₹ 200	گهڙيال جي قيمت = ₹ 300	گهڙيال جي قيمت = ₹ 400
CGST 6% = ₹ 12	CGST 6% = ₹ 18	CGST 6% = ₹ 24
SGST 6% = ₹ 12	SGST 6% = ₹ 18	SGST 6% = ₹ 24
ڪل قيمت = ₹ 224	ڪل قيمت = ₹ 336	ڪل قيمت = ₹ 448
گراهڪ ٽئڪس اِنوائٽر (B2B)	ٻڌو واپاري ٽئڪس اِنوائٽر (B2B)	اُتپادڪ ٽئڪس اِنوائٽر (B2C)



هن GSTIN ڌار ڪن ۾ ٿيندڙ وهنوار کي Business to Business ٿوري ۾ B2B چئبو آهي. آخرين ڪڙيءَ ۾ اها گراھڪ تائين پهچي ٿي. انکي Business to Consumer يعني B2C چئبو آهي.

هن واپار زنجير ۾ هر هڪ واپاري جي پيرل GST جي ورهاست هيئن ريت آهي :

	CGST	SGST	GST
• اتيادڪ	₹ 12 +	₹ 12 =	پيرل ₹ 24
• ٻڌو واپاري	₹ 6 +	₹ 6 =	پيرل ₹ 12
• ريزڪي واپاري	₹ 6 +	₹ 6 =	پيرل ₹ 12
	₹ 24 +	₹ 24 =	₹ 48

ٽپ : اِهو توهان کي ڏيان ۾ آيو؟ هر هڪ واپاري پنهنجي سطح تي انپٽ ٽئڪس ڪريڊٽ ۾ خريديءَ مهل ڏنل ٽئڪس ڪٽ ڪري GST پري ٿو آخر ۾ اِهو گهڙيال گراھڪ کي 448 ر مليو مليل 48 ر پين مان، ڏنل تختي موجب اِهو گراھڪ ئي GST پري ٿو. انڪري GST هڪ اُڻ سڌي ٽئڪس (Indirect Tax) آهي. پوءِ ٻڌو واپاري ۽ ريزڪي واپاريءَ کي انهن جي پاران پيرل ٽئڪس، ڪين واپس ملي ٿي.

خريديءَ وقت پيرل ٽئڪس ۾ ڪاٽ ITC (Credit Tax Input)

شيءَ جي اُتيادڪان کان، اُنجي گراھڪ تائين پهچڻ تائين، هر هڪ وهنوار ۾ GST لڳائي وڃي ٿي. شيءَ وڪڻڻ وقت مليل ٽئڪس مطلب آئوٽ پٽ ٽئڪس اُن واپاري شيءَ خريد ڪرڻ وقت ڏنل ٽئڪس مطلب انپٽ پٽ ٽئڪس اِها ٽئڪس آئوٽ پٽ ٽئڪس مان ڪٽ ڪبي اُن کي انپٽ ٽئڪس ڪريڊٽ چئبو آهي.

انپٽ ٽئڪس - آئوٽ پٽ ٽئڪس - جي ايس ٿي پيرل

ٽپ : ٿوري ۾ سرڪار ۾ ٽئڪس پيرل وقت هر هڪ واپاري خريدي وقت پيرل رقم، وڪڻڻ مهل حاصل ڪيل ٽئڪس مان ڪٽ ڪري باقي ٽئڪس جمع ڪري ٿو.

حل ڪيل مثال

مثال (1) شري روھت ھڪ ريز ڪي واپاري آھي مشين جي خريديءَ وقت 6500 ر GST ڏني. شين جي وڪڻڻ سان ھن کي 8000 ر ملي.

تم (i) ان پٽ ٽئڪس ۽ آئوٽ پٽ ٽئڪس ڪيتري؟ (ii) شري روھت کي Input Tax Credit گھڻي ملندي؟ (iii) ھن کي GST ڪيتري پرڻي پوندي؟ (iv) مرڪزي ۽ راجيہ جي ٽئڪس لھو.

حل : شري روھت لاءِ سرڪار کي پرڻ جي ٽئڪس

(1) وڪڻڻ مھل مليل (آئوٽ پٽ ٽئڪس) - 8000 ر

(2) خريديءَ وقت ڏنل ٽئڪس (انپٽ ٽئڪس) 6500 ر

(3) مطلب انپٽ ٽئڪس ڪريڊٽ : 8000 - 6500 = 1500 ر

(4) مرڪزي ٽئڪس $750 = \frac{1500}{2}$ ر راجيہ لاءِ ٽئڪس 750 ر

مثال (2) ميسرس جيه ڪيميڪل 8000 ر ٽئڪس لائق رقم تي پاڻيڪ صابن خريد ڪيو ۽ اُهو 10000 ر ٽئڪس ٽئڪس لائق رقم تي گراھڪ کي وڪيو GST جو اُھم 18% تي جيه ڪيميڪل مرڪز ۽ راجيہ لاءِ ڪيتري ٽئڪس پري؟

حل : خريديءَ وقت ڏنل ٽئڪس (Input) 8000 ر تي 18%

$$= \frac{18}{100} \times 8000$$

$$= 1440 \text{ ر}$$

$$\therefore \text{ITC} = 1440 \text{ ر}$$

وڪڻڻ وقت حاصل ڪيل ٽئڪس = آئوٽ پٽ ٽئڪس

$$= \frac{18}{100} \times 10000$$

$$= 1800 \text{ ر}$$

ITC آئوٽ پٽ ٽئڪس = ٽئڪس بل

$$= 1800 - 1440 = 360 \text{ ر}$$

مطلب مرڪز ٽئڪس 180 ر ۽ راجيہ ٽئڪس 180 ر

مثال (3) ميسرس جيه ڪيميڪل 8000 ر (ٽئڪس ملايل قيمت) ۾ پاڻيڪ صابن خريد ڪري گراھڪ کي 10000 ر (ٽئڪس ملايل قيمت) ۾ وڪيو ٻڌايو ته جيه ڪيميڪل مرڪز ۽ راجيہ جي ڪيتري ٽئڪس پري؟ GST جو اُھم 18% آھي. حل : ھتي قيمت ٽئڪس ملايل رقم آھي.

ٽئڪس + ٽئڪس لائق رقم = شيء جي ٽئڪس ملايل قيمت
 پاڻيڻ صابڻ جي قيمت (ٽئڪس لائق) 100 ر آهي ٽئڪس ملايل قيمت
 ٽئڪس سان گڏ اها ٿيندي 118 ر ٽئڪس لائق رقم = اهوريشو مقرر آهي.

سمجھو ته پاڻيڻ صابڻ جي ٽئڪس لائق قيمت 'x' رپيا آهي

$$\therefore \frac{x}{8000} = \frac{100}{118} \quad \text{اهڙي نموني 10000 رقم لاءِ ٽئڪس لائق رقم}$$

$$\therefore x = \frac{8000}{118} \times 100 = 6779.66 \text{ ر}$$

$$\therefore \text{GST} = 8000 - 6779.66 \text{ خريدي مهل ڀريل}$$

$$\therefore \text{ITC} = 1220.34 \text{ ر}$$

اهڙي نموني 10000 رقم لاءِ ٽئڪس لائق رقم 'Y'

$$\therefore \frac{y}{10000} = \frac{100}{118}$$

$$\therefore y = \frac{10,00,000}{118} = 8474.58 \text{ ر}$$

$$\therefore \text{GST} = \text{Output tax} \quad 10000.00 - 8474.58 =$$

$$= 1525.42 \text{ ر}$$

$$\therefore \text{GST} = \text{Output tax} - \text{Input Tax}$$

$$= 1525.42 - 1220.34 = 305.08$$

$$\therefore 305.08 \div 2 = 152.54 = \text{راجيم ٽئڪس} = \text{مرڪزي ٽئڪس}$$

جواب : جيم ڪيميڪلس جي راجيم ۽ مرڪز جي هر هڪ ٽئڪس 152.54 ر آهي.

ٽپ : مثال (2) ۽ (3) جو ڌيان سان آڀياس ڪريو وهنوار ۾ انهن ٻنهي جا انوائٽر ڏسڻ لاءِ ملندا. مطلب دڪاندار شيء جي ڇپيل قيمت ٽئڪس ملايل رقم ٻڌائي آهي يا ڇپيل قيمت تي ٽئڪس لڳائي آهي اهو سمجھي، پوءِ خريداري ڪريو.

ICT Tools or Links



مقرر ڪيل تاريخ Tax ڀري ان کان پوءِ ڏنل تاريخ اندر (GST Returns) داخل ڪرڻ لازمي آهي. اهو سڀ هاڻي On Line تي ٿيندو آهي www.gst.gov.in تي توهان آڀياس ڪري سگهو ٿا.

مثال (4) هڪ سائيڪل اُتپادڪ، ٻڌي واپاريءَ کي هڪ سائيڪل 4000 ر وڪي ٻڌي واپاري اُها سائيڪل هڪ ريزڪي واپاريءَ کي 4800 ر وڪي، ريزڪي واپاريءَ اُها سائيڪل گراهڪ کي 5200 ر وڪي سڀ ملهه ٽئڪس لائق رقمون آهن GST جو اُڪم 12% آهي ته وڪري تي هر ڏاڪي ته CGST ۽ SGST لاهو ان لاءِ هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو.

حل : واپار - زنجير



اُتپادڪ وڪڻڻ وقت Tax حاصل ڪئي. $4000 \times 12\% = \dots = 480$

ٻڌي واپاري Tax حاصل ڪئي $4800 \times 12\% = 576$ ر

$\therefore \text{GST} = \text{Output tax} - \text{Input Tax} = \text{ٻڌي واپاري تي GST}$

$= 576 - 480$

$= 96$ ر

$5200 \times 12\% = \dots$ دڪاندار جي GST

$\therefore \text{GST} = \text{Output tax} - \text{Input Tax} = \text{دڪاندار جي GST}$

$= \dots - \dots$

$= \dots$

واپار زنجير ۾ پيرل GST جي ورهاست

ماڻهو	ڪل GST	ڪل CGST	SGST
اُتپادڪ	₹ 480	₹ 240	₹
ٻڌو واپاري	₹ 96	₹	₹
دڪاندار	₹	₹	₹
ڪل	₹	₹	₹



- سمجھيو ته هڪ واپاري کي جولاءِ مهيني مليل آئوٽ پٽ ٽئڪس، سندس انپٽ ٽئڪس کان گهٽ آهي، ان حالت ۾ ٽئڪس ڪيئن ڪٽبي؟
- سمجھو هڪ واپاريءَ جي جولاءِ مهيني ۾ آئوٽ پٽ ۽ ان پٽ ٽئڪس برابر آهن ته ٽئڪس ڪيتري ڀري

آپياس 4.2

1. چيٽنا اسٽورس جولاءِ مهيني ۾ ڪيل خريديءَ تي 1,00,500 ر GST ڀري ۽ 1,22,500 ر تي GST حاصل ڪئي ته ان عرصي ۾ چيٽنا اسٽورس کي ڪيتري GST ڀرڻي پوندي؟
2. نجما GST قاعدي آندر درج ٿيل دڪاندار آهي هن خريديءَ تي ڪل GST 12500 ر ڀري ۽ وڪري تي GST 147,50 ر حاصل ڪئي ته ڇا هن کي Input ٽئڪس ڪريڊٽ ملندي ڇا؟ سندس کي GST ڪيتري ڀرڻي پوندي؟
3. امير انٽرپرائيز چاڪليٽ ساس بوتلون خريد ڪرڻ وقت 3800 ر GST ڀري هن اکبر بردرس کي وڪڻڻ مهل 4100 ر GST حاصل ڪئي مينڪ فوڊ ڪارنر اکبر بردرس کان اهي بوتلون 4500 ر GST ڏيئي خريد ڪيون ته هر هڪ وهنوار ۾ GST لھو CGST ۽ SGST لھو.
4. چنڊيگڙهه اهو مرڪز حد آندر آهي هتي ملڪ گئس ايجنسي گهرو آپيوگه لاءِ گئس ٽانڪيون 24,500 ر خريد ڪيون ۽ اهي گراهڪن کي 26,500 ر وڪيو GST اڪم 5% آهي ته GST لھو CGST ۽ SGST لھو. (مرڪز حد آندر لاءِ SGST کي UTGST چئبو آهي.)
5. ميسرس بيوٽي پراڊڪٽس 6000 ر تي GST ڏيئي سينگار جا سامان خريد ڪيا ۽ هڪ گراهڪ کي اهي 10,000 ر وڪيا ته ان وهنوار ۾ ميسرس بيوٽي پراڊڪٽس جي تيار ڪيل ٽئڪس انوائز ۾ CGST ۽ SGST ڀريون ۽ سيوائون ٽئڪس جي ڪيتري رقم ڏيکاريل آهي؟
6. هيٺ ڏنل ڄاڻ موجب دڪاندار کان گراهڪ (B2C) ان لاءِ ٽئڪس انوائز تيار ڪريو

نالو، انڊريس، تاريخ وغيره توهان پنهنجي پسند انوسار لکو

سپلائز - - - - - انڊريس - - - - - راجيه - - - - - تاريخ

انوائز نمبر - - - - - GSTIN - - - - -

شين جا تفصيل موبائيل بٽري ملهه - 200 ₹ هڪ GST ملهه 12% HSN 8507, 1 pc.

هيڊ فون جو ملهه - 750 ₹ هڪ GST ملهه 18% HSN 8518, 1 pc.

7. هيٺ ڏنل ڄاڻ موجب هڪ واپاري کان ٻئي واپار (B2B) جو ٽئڪس انوائز تيار ڪريو نالو، ايڊريس تاريخ وغيره پنهنجي پسنديءَ انوسار لکڻو.

بل نمبر GSTIN تاريخ ايڊريس نالو : سپلائر
GSTIN ايڊريس، نالو، حاصل ڪندڙ

شين جا تفصيل (1) پينسل باڪس 100، HSN 3924، 20 GST 12%

(2) جڳهه - ساپزلز 50 HSN9503 آگهه 100 GST 12%

(3) (4)

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ

ڪمپوزيشن يوجنا (Composition Scheme)

جن ماڻهن جي گذريل سال ۾ ترن اوور 1.5 ڪروڙ رپين کان گهٽ آهي. انهن لاءِ ڪمپوزيشن يوجنا آهي ان يوجنا تحت ٽئڪس پريندڙ سرڪار طرفان مقرر ڪيل آگهه تي ئي ٽئڪس پريندو.

ڪمپوزيشن يوجنا جا آگهه (GST rates for composition Scheme)

نمبر	سپلائر ڪندڙ	GST	(CGST + SGST)
1.	ريستارنٽ	5%	2.5% + 2.5%
2.	اُتپادڪ ۽ وڪرو ڪندڙ	1%	0.5% + 0.5%

ڪمپوزيشن يوجنا جي واپارين لاءِ نيمر

- واپارين کي گراهڪ کان ڪابه ٽئڪس حاصل ڪرڻي نه آهي. واپارين کي ٽئڪس انوائز نه پر (Bill of supply) ڏيڻو آهي.
- واپارين کي هر ٽي مهيني ڏنل وقت انوسار سرڪار ۾ ٽئڪس جمع ڪرائڻي آهي.
- ان يوجنا ۾ هو ٻئي راجيم ۾ ڪجهه به وڪڻي نه ٿو سگهي پر ٻئي راجيم مان خريد ڪري سگهي ٿو.
- ان يوجنا ۾ واپارين کي به ڪوبه ITC فائدو نه ملڻو آهي.
- واپارين کي دڪان جي بورڊ مٿان لکائڻو آهي. ”ڪمپوزيشن يوجنا واپاري“

(Composition taxable person)

- واپارين کي (Bill of supply) تي چئن اڪرن ۾ چپائڻو آهي ته سپلائر ته ڪابه ٽئڪس نه وٺڻي آهي (Composition taxable person not eligible to collect tax on supplies)

جي ايس ٽي جون خاصيتون (Features of GST)

- جدا جدا اڻ سڌيون ٽئڪسون مليل
- شين ۾ سيوا ٽون هڪ ٽي روپ ۾
- واپارين ۾ راجيه حوالي درج ٿيڻ
- GST حاصل ڪندڙ واپارين کي سهوليت سان GST ڀرڻ
- وهنوار ۾ شفاف پڻو
- سادي ۽ سمجهه ۾ ايندڙ
- ٽئڪس مٿان ٽئڪس نٿي سا لڳي جنهن ڪري شين ۽ سيوا ٽن جي قيمت اُستَر رهي ٿي.
- شين ۽ سيوا ٽن ۾ انٽر اسٽريٽ بازار سان پيٽ ڪرڻ ۾ سندن جنهن ۾ واڌ
- ميڪان انڊيا لاءِ رفتار
- ٽيڪنيڪ ٿيڻ تي آڌار ڪندڙ سرشتو جنهن ڪري فيصلو وٺڻ سولو
- شيون ۽ سيوا ٽون ٽئڪس اهو پٽيرو ماڊل (Dual model) ڪري راجيه ۽ مرڪز لاءِ برابر ٽئڪس

شيوا ۽ سيوا ٽئڪس جي اندر ايندڙ ٽئڪس

1. CGST-SGST (UTGST):

هڪ راجيه ۾ خريدي

وڪرو وهنوار لاءِ

2. ڪمپوزيشن يوجنا (composition)

: (Scheme

جنهن جي ٽرن اوور 20 لکن کان 1.5

ڪروڙ روپين تائين آهي انهن کي ان


يوجنا جو لاڀ ملندو. انهن کي SGST

۽ CGST آڻهڻ سان ڏيئي آهي.

3. IGST :

(Inter State)

انٽر راجيه وهنوار ڪندڙ واپارين لاءِ



وڌيڪ ڄاڻ لاءِ

تڪ ميل شيون ۽ سيوائون ٽئڪس - IGST (Integrated GST)

جڏهن وڪرو وهنوار ٻن راجين (Inter State) هوندو آهي اُن وقت GST کي IGST چئبو آهي اها سڄي مرڪزي سرڪار ۾ جمع ڪرائبي آهي هڪ راجهه جي واپاري، ٻئي راجهه مان شيون خريد ڪري پنهنجي راجهه ۾ وڪيائين ته اُن وقت IGST ڀرڻ وقت ITC ڪيئن لهبي، اهو ڏسندا سين.

مثال : هڪ واپاري M (مهاراشتر جو) 20,000 جا اسڪوٽر جا پرزا واپاري P (پنجاب) کان ورتا. اُن وقت 28% آگهه سان هن 5600 رپيا IGST اها P واپاريءَ کي ڏنا. M اهي سڀ پرزا مڪاني گراهڪن کي 25000 ر وڪيا اُن وقت 28% آگهه سان 7000 ر حاصل ڪئي. گراهڪ کان حاصل ڪيا.

هاڻي سرڪار کي 5600 ر مان ڪٿ ITC لاءِ ڪيئن ڪبي، اهو سمجهندا سين.

نوٽ :- IGST جي ڪريڊٽ ونڻ لاءِ پهريائين آهي IGST لاءِ، پوءِ CGST لاءِ ۽ بچيل SGST لاءِ ونبي. هتي M لاءِ IGST ڪانهي مطلب CGST لاءِ ڪريڊٽ ونبي ۽ بچيل SGST لاءِ ڪريڊٽ ونبي.


$$CGST = 3500 - 3500 = 0$$

مطلب 5600 ر مان 3500 ر ڪريڊٽ ونبي بچيل
 $5600 - 3500 = 2100$ اها SGST لاءِ ٿيندي.

M کي 1400 ر SGST ڀرڻي پوندي

ڌيان ڏيو ته M واپاريءَ کي خريدي تي ڏنل 5600 ر جي سموري ڪريڊٽ ملي مطلب Input Tax جي ڪريڊٽ ملي.

ITC حاصل ڪيل ٽئڪس






آسان گذريل سال بچت ۽ سيڙپ بابت ڄاڻ حاصل ڪئي آهي اُن موجب توهان جيڪو ممڪن آهي اُهو عمل ڪيو هوندو هميشه تندرست رهڻ لاءِ جيئن سرير جا سڀ عضوا رڻا ۾ هئڻ گهرجن تيئن مالي تندرستيءَ لاءِ بچت ۽ سيڙپ جو تال ميل هئڻ گهرجي. سيڙپ جا ڪيترائي قسم آهن انهن جو اڀياس ۽ آزمودو پئي ضروري آهن.



شويتا هڪ ڪمپنيءَ ۾ نوڪري ڪندي آهي هن مهيني کان سندس پگهار 5 سيڪڙو وڌي ۽ ايندڙ مهيني



ڪيس بونس به ملڻو آهي. هوءَ وڌيل رقم سني هنڌ سيڙپ ڪرڻ چاهي ٿي پنهنجي ساهيڙي نيهه کان هوءَ صلاح وٺي ٿي نيهه چيو، ”سيڙپ لاءِ جيون ويما، ميڊي ڪليمر، پنهنجو گهر، بئنڪ F.D، رڪرنڱ کاتو انهن بابت ويچار ڪر“ شويتا چيو، ”مونکي ويمو ٿيل آهي ۽ بئنڪ ۾ پڻ .. ڪيل آهي پگهار مان به ڪڍندو آهي. اڃان ٻيا ڪهڙا رستا آهن؟

نيهه چيو، ”شيئرس، مڇيل فنڊ (MF)، ڊيبنچرس، بانڊ وغيره به سيڙپ ڪرڻ جا رستا آهن.

. جيڪي اڄ وڌيل به آهن. S.I.P. لاءِ ماڻهن جو رخ وڌيو آهي. توکي هاڻي هر مهيني مقرر رقم وڌيڪ ملڻ واري آهي. ان ڪري اُها SIP (Systematic Investment Plan - SIP) ۾ تون مقرر ٿيل رقم رکين سگهين ٿي. اهڙا گفتگو آسان جدا جدا هنڌن تي ٻڌندا آهيون جي نقص ڄاڻ ٿي سڀني لاءِ مفيد ٿيندي. اچو ته آسان شيئرس، مڇيل فنڊ ۽ SIP بابت ڄاڻ حاصل ڪريون.



شيئرس (Shares)

ماڻهوءَ جو پنهنجو دڪان آهي ته انڪي مالڪپڻو (پروپرائيٽرشپ) چئبو ۽ چار ماڻهون ملي واپار ڪن ته انڪي پائيوار (پارٽنرشپ) چئبو پر ڪا ڪمپني، ڏندو يا ڪارخانو شروع ڪرڻ لاءِ وڏي سيڙپ ڪپي، اها سيڙپ سماج مان ڪئي ڪجي ٿي.

ڪارخانو يا ڪمپني شروع ڪندڙ ماڻهن نه گڏ ٿي سماج مان پئسا حاصل ڪرڻ لاءِ ڪمپني ٺاهيندا آهن. پارتيم ڪمپني 1956 اَنوسار ڪمپني پهرين درج ڪرائبي آهي. ڪمپني ٺاهيندڙن کي پروموترس چئبو آهي. اها ڪمپني پبلڪ لميٽيڊ ڪمپني هوندي آهي.

ڪمپني شروع ڪرڻ لاءِ جيڪي پئسا ڪپن، اُن کي سيڙپ چئبو آهي اُن سيڙپ جا ننڍا ننڍا حصا 100 ر وغيره ملهه وارا هوندا آهن هر هڪ حصي کي شيئر چئبو آهي اهي شيئر وڪڻي ڪمپني سيڙپ ڪئي ڪندي آهي.

شيئر : ڪمپني جي سيڙپ جي هڪ حصي کي شيئر چئبو آهي. شيئر سرٽيفڪيٽ مٿان شيئر جو ملهه، شيئرن جو انداز ۽ نمبر وغيره ڇپيل هوندا آهن.

شيئر هولڊر (شيئر ڌارڪ) : شيئر خريد ڪندڙ کي شيئر هولڊر (Share Holder) چئبو آهي. ائين چئجي ته شيئر هولڊر اُن ريشي موجب ڪمپنيءَ جو مالڪ آهي.

اسٽاڪ ايڪسچينج (Stock Exchange) : اها جڳهه جتي شيئرس خريد ڪيا ويندا آهن يا وڪيا ويندا آهن انڪي شيئر بازار (اسٽاڪ ايڪسچينج يا اسٽاڪ مارڪيٽ يا اڪوٽي مارڪيٽ يا ڪئپيٽال مارڪيٽ يا شيئر مارڪيٽ) چئبو آهي. پبلڪ لميٽيڊ ڪمپنيءَ جو شيئر بازار ۾ درج ڪرائڻ (Listed Company) ضروري آهي.

درسني ملهه (Face Value-FV) : ڪمپنيءَ جي شيئر سرٽيفڪيٽ تي ڇپيل هڪ شيئر جي قيمت کي درسني ملهه (FV) چئبو آهي. بازار ملهه (Market Value-MV) جنهن قيمت تي شيئر بازار ۾ شيئر جي خريدي - وڪرو ٿيندو آهي انڪي بازار ملهه (MV) چئبو آهي.

ڪمپني ٺهڻ بعد جيڪڏهن ڪمپنيءَ سٺي نموني ترقي ڪئي ته اُن ڪمپنيءَ جي شيئرن جي بازار ۾ گهرج (Demand) وڌندي وڃي ٿي. جئن ته ڪمپني طرفان شيئرن جو انداز مقرر ٿئي ٿو ته اُن جي انداز ۾ واڌ ڪري نه ٿي سگهجي اُن ڪري اُن ڪمپنيءَ جي شيئرن جو ملهه وڌندڙ رهي ٿو. جيڪڏهن ڪمپني گهٽي ۾ آهي ته شيئرن جو بازار ملهه گهٽجندو رهي ٿو. اُن واڌ - لاهه کي نمبروار ▲، ▼ نشانين وسيلي ڏيکارجي ٿو. اُن واڌ لاهه جي ڪري شيئر بازار جو عدد وڌندو يا گهٽجندو رهي ٿو.

شيئرن جو آگهه هر پل بدلجندڙ رهي ٿو.

نفعو - حصو (Dividend) ڪمپني جي مالي سال ۾ ٿيل نفعو شيئر ڌار ڪن ۾ شيئرس انداز موجب ورهايو ويندو آهي. انڪي ڊوينڊ چئبو آهي.

ڪمپني سٺي نموني هلندي رهي ته ڪمپنيءَ جي پراپرٽي وڌندي رهي ٿي ۽ شيئر هولڊرن کي فائدو ملندو رهي ٿو اهو ياد رهي ته ڊوينڊ تي انڪم ٽئڪس نه لڳندي آهي.

اهو ڏيان ڇر ڪو



شيئرس جو آگهه پل، بازار ۾ وڌندو يا گهٽجندو رهي پر نفعو حصو (ڊوينڊ) اهو درستي ملهه (FV) تي ئي ملندو آهي.

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ

ممبئيءَ جي شيئر بازار (بامبي اسٽاڪ ايڪسچينج BSE) ۽ راشٽريه شيئر بازار (نئشنل اسٽاڪ ايڪسچينج NSE) اهو ڀارت جو ٻه مکيه شيئر بازارون آهن ممبئيءَ جي شيئر بازار جهوني ۾ جهوني ۽ راشٽريه شيئر بازار اها وڏي ڀروڙي شيئر بازار آهي.

شيئر بازار ۾ واڌ - لاهه سمجهڻ لاءِ SENSEX (سينسيڪس) ۽ NIFTY (نفتي) اهي ٻه مکيه فوٽ نمائون آهن. SENSEX اهو SENSEX = SENSEX + INDEX سڏبو آهي. انهن ٻن لفظن مان تيار ٿيل آهي. BSE 1.1.1986 کان SENSEN ڏيڻ شروع ڪيو. سڀني کان وڏي سيڙپ وارين درج ٿيل آهڙين 30 ڪمپنين جا آگهه ٻڌائيندي رهي ٿي. NIFTY اهو NIFTY + FIFTY NSE لفظن مان ٺهيل آهي. اها سڀني کان ترقي ڪيل اوچ آهڙين 50 ڪمپنين بابت ٻڌائي ٿي.

ICT Tools or Links



SEBI انٽرنيٽ تي وڃو BSE، NSE ۽ دور درشن جي چئنلس يا نيٽ تي شيئر بازار ڄاڻ ڏيندڙ ويڊيو ڏسو، ان کي سمجهو شيئرن ۾ واڌ لاهه.. تي لڳاتار ڏيکاريا ويندا آهن. عام طور مٿي ڏنل پتي BSE ممبئي ۽ هيٺ واري پتي NSE شيئرن جو آگهه ٻڌائي ٿي شيئرن جي بوڪ وئليو (Book value) بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.

درستي ملهه ۽ بازار ملهه وچ پريت (Comparison of FV and MV) :

(1) جيڪڏهن $MV > FV$ ته شيئر وڌيڪ ممهه اگهه تي (share is at premium) آهي ائين چئبو آهي.

(2) جيڪڏهن $MV = FV$ ته شيئر برابر ملهه تي آهي (share is at par) ائين چئبو آهي.

(3) جيڪڏهن $MV < FV$ ته شيئر گهٽ ملهه تي آهي (share is at discount) ائين چئبو آهي

مثال (1) سمجهه $FV = 10$ ۽ $MV = 15$ اهو شيئر جو اگهه آهي

شيئر پريميم تي آهي. $15 - 10 = 5$

(2) سمجهه $FV = 10$ ۽ $MV = 10$

$10 - 10 = 0$ مطلب شيئر اٽل پار آهي.

(3) سمجهو ته $FV = 10$ $MV = 7$

$10 - 7 = 3$ ته شيئر ڊسڪائونٽ تي آهي.

ڪل سيڙپ : شيئرس خريديءَ لاءِ ڪل لڳل رقم

مطلب ڪل سيڙپ

هڪ شيئر جو بازار ۾ ملهه x شيئرن جو انداز = ڪل سيڙپ

مثال 100 رپيا FV واري شيئر جي قيمت 120 ر MV جي حساب سان 50 شيئر خريد ڪيا ويا ته ڪل

سيڙپ ڪيتري؟

حل : هڪ شيئر جو $MV \times$ شيئرن جو انداز = ڪل سيڙپ

$6000 \text{ رپيا} = 50 \times 120$

شيئرس جو موٽ (Rate of Return) :

اگهه آسان جي شيئرن ۾ لڳايل سيڙپ عرصي بعد ڪيتري موٽ ڏيئي ٿي اهو سمجهڻ اهميت واري آهي.

مثال (1) راجيش 100 ر FV هڪ شيئرن 120 ر MV جي حساب سان خريد ڪيو ڪمپني 15% ڏيڊنڊ

ڏنو ته شيئرس جو موٽ اگهه لھو.

حل : $Dividend = 15\%, MV = 120, FV = 100$ سمجهو ته موٽ اگهه $x\%$ آهي.

هتي سمجهو ته 120 ر سيڙپ تي 15% ملن ٿا

15 : 120 جيڪڏهن
x : 100 ته

$$\therefore \frac{15}{120} = \frac{x}{100}$$

$$\therefore x = \frac{15 \times 100}{120} = \frac{25}{2} = 12.5\%$$

جواب : راجيش کي موٽ اگهه 12.5% مليو.

مثال (2) $FV = 100$ ر، $Premium = 65$ ر ته MV لھو ؟

حل : $MV = FV + Premium = 100 + 65 = 165$ ر

شيئر جو بازار ملھ 165 رپيا آھي.

مثال (3) هيٺ ڏنل تختو مناسب عدد ڀري پورو ڪريو

نمبر	FV	ملھ جو قسم	بازار ملھ
(i)	₹ 10	وڌيڪ اڳھ ₹ 7	
(ii)	₹ 25		₹ 16
(iii)		برابر اڳھ	₹ 5

حل : (i) $17 = 10 + 7$ ر، (ii) $9 = 25 - 16$ ر، (iii) 5 ر

مثال (4) نيٽج هن جدا جدا ڪمپنين ۾ شيئرس ۾ سيڙپ ڪئي

ڪمپني A : 350 شيئرس، $FV = ₹ 10$ ، شيئر وڌيڪ اڳھ $₹ 7 =$

ڪمپني B : 2750 شيئرس، $FV = ₹ 5$ ، شيئر وڌيڪ اڳھ $₹ 4 =$

ڪمپني C : 50 شيئرس، $FV = ₹ 100$ ، شيئر وڌيڪ اڳھ $₹ 150 =$

حل : ڪمپني A : شيئرس $₹ 7 =$ وڌيڪ اڳھ $FV + Premium$

$$17 = 10 + 7 =$$

$$\therefore 5950 = 350 \times 17 = \text{شيئرس جو انداز} = \text{سيڙپ}$$

ڪمپني B $M.V = 2750 \times 4 = ₹ 11,000$ شيئرس جو انداز = سيڙپ

ڪمپني C $M.V = 50 \times 150 = ₹ 7,500$ شيئرس جو انداز = سيڙپ

$$24450 = 5950 + 11000 + 7500 = \text{ڪل سيڙپ}$$

مثال (5) سميتا 12,000 ر + سيڙپ 10 ر F.V وارا شيئر 2 ر پريميم اڳھ سان ورتا. ٻڌايو ته هن

ڪل ڪيترا شيئرس خريد ڪيا. ان لاءِ هيٺئين مشغولي پوري ڪريو.

حل : $Premium = 2$ ر، $FV = 10$ ر

$$\boxed{} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} + FV = MV \therefore$$

$$\therefore \text{شيئرس جو انداز} = \frac{\text{ڪل سيڙپ}}{MV} = \frac{12000}{\boxed{}} = \text{شيئرس} \boxed{}$$

جواب : سميتا $\boxed{}$ شيئرس خريد ڪيا

مثال (6) FV 10 ر ملهه وارا 50 شينئرس MV ر في شينئر سان خريد كيا ويا كمپني ان تي 30% دويدينڊ ظاهر كيو ته (1) كل سينڙپ (2) مليل دويدينڊ (3) شينئرس جو موت اگهه لھو

حل : شينئرس جو FV = 10 ر MV = 25 ر ۽ شينئرس جو انداز = 50

$$\therefore 250 = 25 \times 50 = \text{كل سينڙپ}$$

$$\text{دويدينڊ} = 10 \times \frac{30}{100} = 3 \text{ ر هرھڪ شينئر تي}$$

$$\therefore 50 \text{ شينئرس تي دويدينڊ} = 50 \times 3 = 150 \text{ ر}$$

$$\therefore \text{موت اگهه} = \frac{\text{كل دويدينڊ}}{\text{كل سينڙپ}} \times 100$$

$$= \frac{150}{1250} \times 100 = 12\%$$

جواب (1) كل سينڙپ : 1250 ر (2) 50 شينئرس تي مليل كل دويدينڊ 150 ر (3) موت اگهه 12%

آپياس 4.3

1. هيٺ ڏنل تختو مناسب عدد ڀري پورو ڪريو

نمبر	FV	اگهه جو قسمر	MV
(1)	رپيا 100	برابر اگهه	...
(2)	...	وڌيڪ اگهه = 500 رپيا	رپيا 575
(3)	رپيا 10	...	رپيا 5

2. بازار اگهه (MV) 80 رپئي FV 100 ر وارا 50 شينئرس خريد ڪيا ويا ان سال 20% دويدينڊ ڏنو ته سينڙپ تي موت اگهه لھو.

3. جوسف جدا جدا ڪمپنين ۾ شينئرس وٺي سينڙپ ڪئي ته سندس كل سينڙپ لھو.

ڪمپني A: 500 ر FV پريمير شينئرس ڪمپني شينئرس

ڪمپني B: 500 ر MV هڪ شينئر

4. شريمني ديشپانڊي 20000 ر سينڙپ ڪري 5 رپئي درسني ملهه وارا 20 ر وڌيڪ اگهه تي شينئرس خريد ڪيا ٻڌايو ته هن ڪل ڪيترا شينئرس خريد ڪيا؟

5. ڪمپني 7% دويدينڊ ظاهر ڪرڻ تي شري شانتي لعل 100 ر درستي ملهه، 120 ر بازار ملهه تي 150 شينئرس خريد ڪيا ته سندس سينڙپ تي موت - اگهه ڪيترو؟

6. هيٺ ڏنل ڪمپنين مان ڪنهن به سڙپ فائدي واري ٿيندي؟ ٻنهي ڪمپنين ۾ شيئر جو درستي ملهه ساڳيو آهي ڪمپني A جو بازار ملهه 80 رپيا ۽ ڊويڊنڊ 16% ڪو ڪمپني B جو بازار ملهه 120 رپيا ۽ ڊويڊنڊ 20% آهي.

ICT Tools or Links



انٽرنيٽ تي يا ٻئي ڪنهن ملهه ذريعي پنجن ڪمپنين جا درسي ملهه ۽ بازار ملهه شيئرس جا چاچيو انهن جو گڏيل ڪالمر گراف ڪڍو ۽ پيٽ ڪريو. (ممڪن هجي ته ▲, ▼ ٻنهي قسمن جا شيئرس ڏسو)

ڄاڻي وٺون



شيئرس جي خريدي وڪرو تي دلالي ۽ ٽئڪس (Brokerage and taxes on share trading)

دلالي (بروڪريج Brokerage) شيئرس جي خريدي وڪرو خانگي نموني نٿو ڪجي، اهو شيئر بازار جي منظور ٿيل شخص يا سنسٽا پاران ڪيو ويندو آهي. انهن کي **شيئر دلال (Share Broker)** چئبو آهي. دلال ذريعي شيئرس جي خريدي ۽ وڪرو ڪندي بازار ملهه انوسار جيڪو ملهه دلال وٺندو آهي انکي دلالي چئبو آهي. معنيٰ شيئرس خريدي ڪندڙ ۽ وڪرو ڪندڙ ٻنهي کي دلالي ڏيڻي پوي ٿي. مثال: 1 سمجهو 100 ر FV ۽ 150 ر MV وارا شيئر آهن. دلاليءَ جو اگهه 0.5% آهي. اهڙن 100 شيئرن خريد ڪرڻ لاءِ ڪيتري رقم ڏيڻي پوندي؟ اهڙا 100 شيئر وڪڻڻ سان ڪيتري رقم ملندي؟

شيئرس خريد ڪرڻ مهل

دلالي = $MV +$ هڪ شيئر جي خريدي

$$= 150 + 0.5\% \text{ ر } 150 = 150.75$$

هڪ شيئر جي خريدي قيمت = 150.75

$$15075 \text{ ر} = 100 \times 150.75 = 100 \text{ شيئرس جي خريدي}$$

هتي 15000 ر جا شيئرس 75 ر دلالي آهي.

شيئرس - وڪرو مهل

دلالي - $MV =$ هڪ شيئر جو وڪرو

$$= 150 - 0.5\% \text{ ر } 150 = 149.25$$

هڪ شيئر جي وڪرو قيمت = 149.25

$$\therefore 100 \text{ شيئرس جي وڪرو قيمت} = 14925 = 149.25 \times 100$$

$\therefore$ 100 شيئرس وڪڻڻ سان 14925 ر ملندا.



- دلالي هميشه بازار آگهه تي لهبي آهي
- شيئر خريد يا وڪڻڻ مهل دلاليءَ لاءِ هڪ شيئر تي حساب ڪيو ويندو آهي.

مشغولي I: پنهنجي علائقي ۾ شيئر دلالي سڀوا ڏيندڙ شخص يا سنسٽا بابت ڄاڻ حاصل ڪريو انهن جي دلالي آگهن وچ ۾ پيٽ ڪريو.

مشغولي II: ڊي - مٽ کاتو (Demat A/c) ۽ ٽريڊنگه کاتي جا تفصيل (Statement) حاصل ڪريو ان ۾ ڪهڙا ڪهڙا مُدا هوندا آهن ان بابت نيت جا دلال کان حاصل ڪريو. دوستن ۾ چرچا ڪريو.

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ: هر هڪ شيئر دلال کي سڀبي (SEBI - Securities and Exchange Board of India)

قاعده 1962 تحت درج ڪرائڻو آهي ۽ ان مٿان SEBI جو ظابطو هوندو آهي

شيئرس، بانڊس، مڇيئل فنڊ وغيره جي درج ڪرائڻ لاءِ ڊي - مٽ کاتو ۽ خريدي وڪري ٽريڊنگه کاتو (Dematerialized Account, Trading Account) کولڻ ضروري آهن اِهي کاتا بئنڪ يا دلالن معرفت ڪوليا ويندا آهن DP Depository Participants اِهي NSDL, DP ۽ CDSL انهن ٻن جي هيٺ هوندا آهن ڊي - مٽ کاتي ۾ شيئرس جي خريدي ۽ وڪرو جو حساب رکيو ويندو آهي اِهو بئنڪ کاتي وانگر ئي هوندو آهي وڪيل شيئرس جو خرچ Debit ۽ خريد ڪيل شيئرس جو جمع Credit ۾ درج ڪيو آهي. انهن جا تفصيل (Statement) گهرڻ سان ملندي آهي ان لاءِ مقرر في ڀري آهي ان کاتي ۾ توهان جا شيئرس اليڪٽرانڪ فارمن ۾ جمع رهندا آهن. انهن ٻنهي کاتن سان توهان جي بئنڪ جي بچت کاتي سان جوڙيو ويندو آهي شيئرس جي خريديءَ وقت پئسا ان مان ڪٽجندا رهن ٿا ۽ شيئرس جي وڪرو وقت ان ۾ پئسا جمع ٿيندا آهن. دلال ۽ بئنڪ عملو انهن بابت مارگدرشن ڪندا آهن.



دلالي مٿان دلالي سڀوا جو GST (GST on brokerage services)

مارگه درشن شيئر دلال انهن جي خاتيدارن پاران شيئرس جي خريدي وڪرو جي سڀوا ڏيندا آهن. دلالي سڀوا جو GST آگهه 18% آهي انهن جو SAC نمبر ڄاڻيو.

ٽپ: گراهڪن جي سلامتيءَ لاءِ GST کانسواءِ شيئرس جي خريدي - وڪرو تي اڃا به ڪجهه ننڍيون ٽئڪسون آهن مثال سبڪيورٽي ٽرانزيڪشن ٽئڪس (STT) SEBI چارج، اسٽئمپ ڊيوٽي وغيره انهن بابت اسان هتي ويچار نه ڪنداس فقط دلاليءَ مان بابت ويچار ڪنداسين.

مثال (2) مثال (1) ۾ هڪ ماڻهو 15075 ر جا شيئرس خريد ڪيا. ان رقم تي 75 ر دلالي آهي ته هنڪي 75 ر تي 18% آگهه سان ڪيتري ٽئڪس لڳندي اها لھو ۽ انجي Statement تيار ڪريو.

$$\text{حل : سمجھو 75 ر تي GST} = 75 \times \frac{18}{100} = 13.50 \text{ ر}$$

B شيئرس خريديءَ جو تفصيل نوٽ

شيئرس جي ڪُل خريدي قيمت	9% دلالي SGST	9% دلالي CGST	دلالي 0.5%	شيئرس جي FV	شيئرس MV	شيئرس جو تعداد
ر 15088.50	ر 6.75	ر 6.75	ر 75	ر 15000	ر 150	100(B)

مثال (3) بشير خان 40 ر MV تي 100 شيئرس خريد ڪيا دلاليءَ جو آگهه 0.5% ۽ GST آهي ته 100 شيئرس تي ڪل ڪيترو خرچ ٿيو؟

$$\begin{aligned} \text{حل : 100 شيئرس جي قيمت} &= 40 \times 100 = 4000 \text{ ر} \\ \text{هڪ شيئر تي دلالي} &= 40 \times \frac{0.5}{100} = 0.20 \text{ ر} \\ \therefore \text{هڪ شيئر جي خريدي قيمت} &+ \text{شيئرس جو آگهه} = \text{دلالي} \\ &= 40 + 0.20 = 40.20 \text{ ر} \\ \therefore 100 \text{ شيئرس جي قيمت} &= 40.20 \times 100 = 4020 \text{ ر} \\ 100 \text{ شيئرس جي دلالي} &= 0.20 \times 100 = 20 \text{ ر} \\ \therefore \text{دلاليءَ تي} &= \frac{18}{100} \times 20 = 3.60 \text{ ر} \end{aligned}$$

$$\text{جواب : بشير خان 100 شيئرس خريد ڪيا ر 4020 + 3.60 = 4023.60}$$

مثال (4) پنڪچ 1,25,295 ر سيٽپ ڪري 10 درسني ملهه وارا ۽ 125 ر بازار ملهه وارا شيئرس خريد ڪيا دلاليءَ جو آگهه 0.5% ۽ GST 18% آهي. (1) ڪل ڪيترا شيئر خريد ڪيا؟ (2) ڪل ڪيتري دلالي ڏني؟ (3) GST ڪيتري پري؟

$$\begin{aligned} \text{حل : ڪل سيٽپ 1,25,295 ر بازار ملهه 125 ر} \\ \text{دلالي 0.2% ۽ GST 18\%} \end{aligned}$$

$$\text{هڪ شيئر جي دلالي} = 0.25 = 125 \times \frac{0.2}{100}$$

$$\text{هڪ شينئر دلالي تي GST} = 0.25 \times 18\% = 0.045 \text{ ر}$$

∴ هڪ شينئر جي ڪل خريدي = بازار آگهه + دلالي + GST

$$= 125 + 0.25 + 0.045 = 125.295 \text{ ر}$$

$$\text{∴ شينئرس جو انداز} = 1000 = \frac{125295}{125.295} \text{ شينئرن}$$

$$\text{∴ ڪل دلالي} = 0.25 \times 1000 = 250 \text{ رپيا}$$

$$\text{ڪل GST} = 1000 \times 0.045 = 45 \text{ رپيا}$$

جواب (1) 1000 شينئرس خريد ڪيا (2) دلالي 250 ر (3) جي ايس ٽي 45 ر مثال (5) نليني ٻائي 10 ر درسني ملهه ۽ بازار آگهه 60 ر ڊويڊنڊ ملڻ بعد 50 ر بازار آگهه سان وڪڻي ڇڏيا هر وهنوار ۾ دلالي 0.4% آهي ته هنڪي نفعو ٿيو يا نقصان اهو خالي چوڪنڊا ڀري لھو.

حل : هتي ٽئڪس جو آگهه ڏنل نه آهي انڪري هتي GST جو ويچار نه ڪيل آهي ۲0 ر درسني ملهه جو شينئر 60 ر خريد ڪيو.

$$\text{هر هڪ شينئر جي دلالي} = 60 \times \frac{0.4}{100} = \text{رپيا } \boxed{}$$

$$\text{∴ هڪ شينئر جي قيمت} = 60 + 0.24 = \text{رپيا } \boxed{}$$

$$\text{∴ هڪ شينئرس جو انداز} = 100 = \frac{6024}{60.24} \text{ شينئرس خريد ڪيا}$$

10 ر درسني ملهه وارا شينئرس 50 ر بازار ملهه تي وڪيا ويا

$$\text{∴ هر هڪ شينئر تي دلالي} = 0.20 = \frac{0.4}{100} \times 50 = \text{رپيا}$$

$$\text{∴ هڪ شينئر جي وڪرو قيمت} = 50 - 0.20 = \text{رپيا } \boxed{}$$

$$\text{∴ 100 شينئرس جو ڊويڊنڊ قيمت} = 100 \times 49.80 = \text{رپيا } \boxed{}$$

فائدو - حصو 60% مليو

$$\text{∴ هڪ شينئر تي ڊويڊنڊ} = 6 = \frac{60}{100} \times 10 = \text{رپيا}$$

$$\text{∴ 100 شينئرس جو ڊويڊنڊ قيمت} = 6 \times 100 = \text{رپيا } \boxed{}$$

$$\text{∴ نليني ٻائي ڪي مليا (شينئرس وڪرو + ڊويڊنڊ)} = \boxed{} + \boxed{} = 5580 \text{ رپيا}$$

نليني ٻائيءَ جي ڪل سيٽپ = 6024 رپيا

$$\text{∴ نقصان} = \boxed{} - \boxed{} = \text{رپيا } \boxed{}$$

جواب نليني ٻائي ڪي ڪل 444 ر نقصان ٿيو.

مشغولي : خريدي وڪرو تي GST 18% تہ مثال (5) موجب نقصان ڪڍو. توهان جو جواب 451.92 ر آچي ٿو ڇا؟ ڇا ڪريو

ڄاڻي وٺون



مڇئل فنڊ (Mutual Fund - MF)

شيئرس جو آپياس ڪندي آسان سمجھو تہ ڪمپني ٺاهڻ لاءِ ڇاهڪ ماڻھو گڏ ٿي. سماج جي سھڪار سان وڏي لاڳت جمع ڪن ٿا. جيڪڏھن ڪمپني سٺي ھلي تہ سڀني ماڻھن جو فائدو ٿيندو. شيئرس جو بازار ملھ وڌڻ سان فائدو ٿي ٿو. ڪمپنيءَ جي ڪئپيٽل وڌي ٿي. ديش جي ترقي ٿئي ٿي. ٿوري ۾ سماج شاستر جو تنو آھي 'Together we can progress' پر ھر سڪي کي بہ پاسا ھوندا آھن. شيئرس ۾ ڪڏھن ڪڏھن فائدي بدران نقصان ٿيندو آھي. اھو نقصان گھٽائي سگھجي ٿو ڇا؟ سيڙپ ڪندڙن لاءِ اھو خطرو گھٽائي سگھجي ٿو ڇا؟ ھا. آڄڪلھ ڪيترائي ماڻھو مڇئل فنڊ ۾ سيڙپ ڪندا آھن.

مڇئل فنڊ مطلب گھڻين ئي سيڙپ ڪندڙن جا پئسا گڏ ڪري ٺاھيل رقم : اھا رقم شيئرس ۾ سيڙپ نہ ڪري، سيڙپ جي ٻين قسمن ۾ سيڙپيا ويندا آھن جو ڪم گھٽ ۽ فائدو سڀني کي ورھايو ويندو آھي مڇئل فنڊ ۾ سيڙپ ڪيئن ڪجي؟ اُن مان موٽ ڪيئن ملندي آھي؟ ڪيتري عرصي لاءِ رقم سيڙپائي؟ انھن سوالن جا جواب مالي - ماھر صلاح ڏيئي ٻڌائي سگھندو.

Investments in Mutual Funds are subject to Market risks. Read all scheme related documents carefully.

اھو جملو توهان ڪيترائي دفعا ٻڌو يا ڏٺو ھوندو ان جو مطلب سمجھي وٺو. ڪيترائي دفعا MF ۾ فائدي بدران نقصان بہ ٿي سگھي ٿو. اھو سيڙپ ڪندڙن کي سوچڻ گھرجي.

MF مطلب ماھر پروفیشنل ماڻھن طرفان ٺاھيل فنڊ يوجنا انھن ماھرن کي AMC مطلب Company Asset Management چئبو آھي. بازار کي سمجھي ھي سيڙپ ڪندڙن جا پئسا لڳائيندا آھن جدا جدا ڪمپنين، شيئرس، اڪوٽي، فنڊ ۾، ڊيٽيڪس، بانڊس وغيرھ ۾.

شيئر بازار ۾ پئسا لڳائڻ سان آسان کي شيئرس يونٽس ملندا آھن. MF ۾ آسان کي ملندا آھن

ھر يونٽ جو بازار اگھ، اُنجي Net asset Value - Units آھي.

ھڪ يونٽ جو NAV x يونٽن جو انداز = ڪل سيڙپ ملھ.

ٽپ : شيرس وانگر MF جا يونٽ پڻ بازار آڱهه ۾ گهٽجندا وڌندا رهندا آهن. انهن جي ڊمانڊ تي اهي خريد ڪيا وڃن ٿا.

بئنڪ يا پارٽي پوسٽ سيوا ۾ سيڙپ وڌيڪ سلامتيءَ واري آهي اهو ڏيان رڪن گهرجي ته صحيح ڊننگ سان پئسا سيڙپ ڪرڻ گهرجن ان کي چئبو آهي مالي يوجنا (Financial Planning) ان ڪري مناسب ويچار ڪري ئي پئسا سيڙپ ڪرڻ گهرجن.

نيمٽ سيڙپ يوجنا (SIP -Systematic Investment Plan)

سمجھو ته MF ۾ هڪ وقت وڏي رقم آسان سيڙپي نٿا سگھون ته هر مهيني ننڍي قسط سيڙپ ڪري سگھجي ٿي. گھٽ ۾ گھٽ 500 روپيا ڊنڊ ۾ سيڙپي سگھجن ٿا. ان نموني ماهوار يا ٽماهي قسط سيڙپي سگھجي ٿي. ان ۾ بچت ٿيندي رهي ٿي ۽ اڳتي به مالي مقصد پورا ٿين ٿا. وڏي عرصي لاءِ به سيڙپ ڪرڻ فائديمند آهي ان ۾ جو ڪم گھٽ آهي. گھٽ ۾ 3 کان 5 سال، وڌ ۾ وڌ 10-15 سال مدو هئڻ گھرجي.

MF جا فائدا

- آزمودگار ماهر مئنيجر
- شفاف پٽو
- سيڙپ ۾ جدا جدا ماڌير (diversifications of funds)
- وڪڻڻ جي سهوليت
- گھٽ ۾ گھٽ 500 روپيا وڌ عرصي ۾ فائدا
- ڪجهه مقرر ٿيل فنڊ (ELSS) ۾ 80c انڪم ٽئڪس رعايت

حل ڪيل مثال

مثال (1) هڪ مڇنڊل فنڊ 15 بازار آڱهه 200 ڪروڙ ر ۾ 8 ڪروڙ يونٽس آهن ته هڪ يونٽ جو NAV لھو.

حل : هڪ يونٽ جو NAV ر = 200 ڪروڙ رپيا / 8 ڪروڙ يونٽ = 25 ر يونٽ

مثال (2) مثال (1) ۾ توهان 10000 جي سيڙپ ڪئي ته توهان کي ڪيترا يونٽ ملندا؟

حل : يونٽس جو انداز = 400 = 10,000 / 25 يونٽس ملندا.

آپياس 4.4

1. هڪ شيئر جو بازار آگهه 200 ر ۽ دلاي 0.3% آهي ته ان شيئر جي خريدي ڪهڙي؟
2. هڪ شيئر جي بازار ملهه 1000 ر ۽ دلاي 0.1% آهي ته ان شيئر جو وڪرو ڪيترو؟
3. هيٺ شيئر خريدي جو تختو پورو ڪريو (B = خريد ڪيا، S = وڪيا)

ڪل قيمت	دلاي جي SGST 9%	دلاي جي CGST 9%	دلاي 0.2%	شيئرس قيمت	بازار ملهه	شيئرس انداز
					ر 45	B 100
					ر 200	S 75

4. شريعتي ديسائي 100 ر درسي ملهه جا شيئرس بازار ملهه 50 ر هوندي وڪيا ته انکي 4988.20 ر مليا. دلاي 0.02% ۽ دلاي تي GST 18% آهي ته ان گهڻا شيئرس وڪيا اهو لهو.
5. مسٽر ڊسوزا 50 درسي ملهه جا 200 شيئرس 100 رپئي وڌيڪ آگهه تي خريد ڪيا. ان تي ڪمپني 50% ڊيوڊنٽ ڏنو. ڊيوڊنٽ ملڻ کانپوءِ 100 شيئرس 10 ر گهٽ قيمت تي وڪيا ۽ بچيل 75 شيئرس وڌيڪ آگهه تي وڪيا. هر هڪ وهنوار 20 ر دلاي ڏني. ته ان ۾ هنڪي فائدو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

گڏيل آپياس 4 A

1. مناسب متبادل جواب چونڊي لکو
- (1) جيون لاءِ ضروري شين جو GST آگهه آهي.
(A) 5% (B) 12% (C) 0% (D) 18%
- (2) هڪ ئي راجيه ۾ واپار لاءِ مرڪزي ٽئڪس آهي.
(A) IGST (B) CGST (C) SGST (D) UTGST
- (3) اسان جي ديش ۾ کان جي ايس ٽي شروع آهي.
(A) مارچ 31 2017 (B) اپريل 1 2017
(C) جنوري 1 2017 (D) جولاءِ 1 2017
- (4) اسٽيل برتنن تي جي ايس ٽي 18% آهي ته ان مٿان راجيه جي جي ايس ٽي آهي.
(A) 18% (B) 9% (C) 36% (D) 0.9%
- (5) GSTIN ۾ ڪل انگهه - اکر هوندا آهن.
(A) 15 (B) 10 (C) 16 (D) 9

(6) هڪ درج ڪيل واپاريءَ جو ٻئي درج ڪيل واپاري جي وهنوار کي چئبو آهي.

(A) BB (B) B2B (C) BC (D) B2C

2. 25000 ر هڪ شوبيز تي واپاريءَ 10% چوٽ ڏيئي، بچيل رقم تي 28% جي ايس تي لڳائي ته ڪل بل گهڻن رپين جو ٿيندو؟ اُن ۾ CGST ۽ SGST ڪالمن ۾ گهڻي رقم پري؟

3. هڪ ريڊيمپڊ ڪپڙن جي دڪان ۾ 1000 ر قيمت جي ڊريس تي 5% چوٽ ڏيئي باقي رقم تي 5% GST لڳائي ويو ته اُن لاءِ گهڻا رپيا لڳندا؟

4. سورت، گجرات جي هڪ واپاري 2.5 لک ر ٽئڪس لائق رقم جا سوڻي ڪپڙا راجڪوٽ، گجرات ۾ وڪيا ته ٻئي واپاري کي 5% GST تي ڪينٽرا رپيا لڳندا؟

5. شريمني ملهوتر 85,000 ر هڪ سولار سيٽ خريد ڪري 90,000 ر وڪيو GST 5% حساب سان ڪيس ڪينٽرا روپيا واپس ملندا؟

6. Z سيڪيورٽي ڏيندڙ ڪمپني 64,500 ر ٽئڪس لائق رقم جون سيواون ڏنيون GST 18% آهي اُن ڪمپني لائڊري سروس لاءِ 1550 ر پري آهي. اُن ڪمپني جو ITC ڪيترو؟ CGST ۽ SGST لھو.

7. هڪ واپاري پوليس ڪنٽرول روم لاءِ ٽئڪس سيمٽ 84000 ر قيمت جا واکي ٽاڪي وڪيا GST 12% آهي ته CGST ۽ SGST لھو.

8. هڪ ٻڌي واپاريءَ ٽئڪس لائق 50,000 ر جا بجلي اوزار خريد ڪيا اُن اهي سڀ ريزڪي واپاريءَ کي ٽئڪس لائق رقم 1,80,000 ر وڪيا 2,20,000 ر ته هر هڪ وهنوار ٽئڪس اِنوائز ۾ CGST ۽ SGST ڪٽيو ۽ هر هڪ واپاري لاءِ CGST ۽ SGST لھو.


9. آڻا پاٽل (ٿاڻي، مهاراشٽر) 14000 ر ٽئڪس لائق رقم تي هڪ وٽڪيوم ڪلينر (مميئي) جي هڪ واپاريءَ کي وڪيو GST 28% آهي ته وسڻيءَ جي واپاري اهو گرا هڪ کي 16800 ر وڪيو ته

(1) آڻا پاٽل جي CGST ۽ SGST لھو.

(2) وسڻيءَ جي واپاريءَ جي گرا هڪ جي CGST ۽ SGST لھو

(3) وسڻيءَ جي واپاريءَ جي CGST ۽ SGST لھو.

10. هين هڪ واپار - زنجير ۾ A, B, C ۾ GST 12% سان لهو.



(1) ڀڄاڊڪ، ڊسٽريبيوٽر، ريزڪي واپاري سرڪار ۾ GST ڪهڙي سري هن ڏيکاري آهي اهڙو تختو تيار ڪريو.

(2) آخر ۾ اها گراھڪ ڪي گھڻن رپين ۾ پيئي؟

(3) هن زنجير ۾ B2B ۽ B2C انوائز ڪهڙا؟ اهي لکو.

گڏيل آپياس 4 B

1. هين ڏنل متبادل جوابن مان مناسب جواب چونڊيو

(1) درسني ملهه (FV) 100 ر، بازار ملهه (MV) 75 ر ته ڪهڙو جملو صحيح آهي.

(A) 175 ر وڌيڪ اگھ (B) 25 ر گھٽ اگھ

(C) 75 ر گھٽ اگھ (D) 25 ر وڌيڪ اگھ

(2) 50% ڊويڊنڊ ظاهر ڪيل ڪمپني جو 10 ر FV لاءِ هڪ شيئر جو ڊويناڊ ڪيترو؟

(A) 50 ر (B) 5 ر (C) 500 ر (D) 100 ر

(3) هڪ مچيئل فنڊ جي هڪ يونٽ جو NAV 10.65 آهي ته 500 يونٽس جي قيمت ڪيتري؟

(A) 5325 (B) 5235 (C) 532500 (D) 53250

(4) دلالي تي GST اگھ آهي.

(A) 5% (B) 12% (C) 18% (D) 28%

(5) شيئرس خريد ڪرڻ وقت هڪ شيئر جي قيمت لهڻ لاءِ بازار اگھ، دلالي ۽ GST جو ڪرڻو پوندو.

(A) وڻڊ (B) ڪٽ (C) ضرب (D) جوڙ

2. 100 ر ٿي وي وارا شيئر 30 ر وڌيڪ اگھ تي خريد ڪيا ويا دلالي 0.3% ته هڪ شيئر جي قيمت لهو.

3. پرشانت 100 FV وارا 180 MV تي 50 شيئر خريد ڪيا ڪمپني 40% ڊويڊينڊ ڏنو ته پرشانت جو سيڙپ موت آگهه لھو.

FV. 100 FV ۽ 30 ر گهٽ آگهه تي 300 شيئرس وڪيا ته ڪل ڪيترا رپيا ملندا؟

5. 100 FV ۽ 120 MV ر 60000 سيڙاڻي شيئرس خريد ڪيا ويا شيئرس جو انداز لھو.

6. شريمتي گيتا آگروال 100 MV تي 10,200 شيئرس خريد ڪري 60 شيئرس 125 MV ۽ بچيا شيئر 90 ر MV تي وڪيا کيس فائڊو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترا رپيا؟

7. 100 ر، درستي ملهه وارن ٻن ڪمپنين جا MV ۽ ڊويڊينڊ ڏنل آهن ٻڌايو ته ڪهڙي ڪمپني ۾ سيڙپ فائڊيواري ٿيندي؟

16% ر -A ڪمپني (2) 12% ر -A ڪمپني (1)

8. آڌتبه 100 FV، 50 MV تي 50118 ر جا شيئرس خريد ڪيا دلالي 0.2% ڏني ۽ اُن تي 18% GST آهي ته اُنکي 50118 رپئي ۾ گهٽ شيئرس ملندا.

9. شري باٿلي والا 303.50 ر جا شيئرس وڪيا ۽ 69650 ر جا شيئرس خريد ڪيا اُن ڏينهن خريدي / وڪري تي 0.1% دلالي ۽ اُن تي 18% GST ڏنو. اِن وهنوار ۾ دلالي ۽ تي GST لھو.

10. شريمتي اروڻا نڪر هڪ ڪمپنيءَ جا 100 شيئرس 1200 ر خريد ڪيا دلالي 0.3% ۽ اُن تي 18% GST پري ته

(1) ڪل سيڙپ ڪيتري؟ (2) سيڙپ تي دلالي ڪيتري؟

(3) دلاليءَ تي GST ڪيتري؟ (4) 100 شيئرن تي ڪل ڪيترو خرچ آيو؟

11. شريمتي انگما دوشي 661 ر بازار آگهه تي 22 شيئرن ورتا. هن جي ڪل ڪيتري سيڙپ؟ انهن شيئرس تي

20% ڊويڊينڊ وٺي 100 ر درسي قيمت جو 650 ر بازار آگهه تي وڪيا. هر هڪ وهنوار ۾ دلالي 0.1% هئي اِن وهنوار ۾ نفعو يا نقصان سيڪڙو لھو.



□□□

آچو ته سکون



- امکان : سڃاڻپ
- اٽڪل وارو تجربو ۽ نتيجو
- جنس آوڪاش گهٽنا
- گهٽنا جو امکان

هلو ته چرچا ڪريون



ماسٽر : وديارڻي دوستو، اسان جي ڪلاس ۾ جيترا شاگرد آهن، اوتريون چنيون هن ڪوڪي ۾ وڌل آهن. هر هڪ کي هڪ چني ڪٽڻ آهي. چنيءَ تي ٻوٽن جا نالا لکيل آهن ڪنهن به چنيءَ تي ساڳيو ٻوٽو نه ڏنل آهي. سڀ چٽا رول نمبر موجب قطار ۾ بيھو. سڀني کي چني ملڻ کانپوءِ ئي توهان پنهنجي چني پڙهندا. اسان ڏسنداسين ته تلسي ٻوٽي واري چني ڪنهن کي ٿي ملي؟

آروڻا : سر، مان قطار ۾ پهرين نمبر تي آهيان. مان پهرين چني نه کڻندس ڇو ته اينٽرن چنين ۾ مون کي اها ئي چني ملي، ان جو امڪان تمام گهٽ آهي.

جهرينا : سر، مان ته بلڪل آخر ۾ آهيان مان آخرين چني نه کڻندس ڇو ته تلسي واري چني ته اڳ ۾ ئي ڪنيل هوندي ٿوري ۾ پهرين ۽ آخرين شاگرد کي اها چني ملي، ان جو امڪان گهٽ آهي. مٿي ڏنل گفتگو مان امڪان گهٽ يا امڪان وڌيڪ بابت ويچار ڪيل آهي. اسان روزاني زندگيءَ ۾ ڳالهائڻ ۾ هيٺيان لفظ واپرائيندا آهيون.

- ممڪن آهي
- ممڪن
- اڪثر
- گهڻو ڪري
- ٿي سگهي ٿو
- 50-50
- پڪ، لڳ ڀڳ

ٿيندڙ ڳالهين بابت هيٺ ڏنل بيان ڏسو

- گهڻو ڪري اڄ برسات پوندي
- مهنڻائي وڏي سگهي ٿي
- ڀارت کي ڪرڪيٽ ۾ ورلڊ ڪپ ملڻ ممڪن آهي.
- پڪ ٿي مان پهريون نمبر ايندس
- ٻارن کي پوليو ڊوز ڏبو ته پوليو جي بيماري ٿيڻ ممڪن نه آهي.



پير واري شڪل ۾ ڪرڪيٽ رانديگر سڪو
ڦٽي ڪري رهيا آهن ڇا ايندو؟

يا



مطلب سڪو ڦٽي ڪرڻ تي اچي سگهي ٿو

مشغولي 1 ڪلاس ۾ هر هڪ شاگرد هڪ سڪو اڇلائيندو ته ڇا ايندو. (ماسٽر بورڊ تي
تختو تيار ڪري جواب لکي ٿو)

ممڪن	(H) ٻُڙ	(T) ڪر
شاگردن جو آنداز	...	...

مشغولي 2 هاڻي هر هڪ شاگرد اهو سڪو ٻه دفعا اڇلائي ڇا ممڪن ٿيندو؟

ممڪن	HH	HT	TH	TT
شاگردن جو آنداز				

مشغولي 3 پنهنجي ويجهو ڍارو اڇلايو اُن جي مٿاڇڙي تي ڇا ايندو. انجو جو ويچار ڪريو.



(هتي ڍاري جو، مٿان وارو پاڻو ڏيکاريل آهي.)

ڄاڻي وٺون



آٽڪل وارو تجربو (Random Experiment)

اهو تجربو جنهن ۾ سڀ ممڪن نتيجا آڳاوت ٿي ڄاتل رهن پر ڪنهن به نتيجي جي خاطري نه هجي،
اُن کي آٽڪل وارو تجربو چئبو آهي. مثال: سڪو اڇلائڻ، ڍارو اڇلائڻ، 1 کان 50 انگن جي سيٽ مان هڪ
ڪارڊ ڪڍڻ، راند ۾ 52 پٽن مان هڪ پٽو ڪڍڻ وغيره.

نتيڄو (Outcome)

اٽڪل واري تجربي ۾ ايندڙ جواب حاصل ٿيل ٻالهيون کي نتيجا چئبو آهي.

مثال (1) هڪ سڪو اڇلائڻ سان ٻه نتيجا اچن ٿا

(1) مان ڪر (T) ۽ ٻُڙ (H)


(2) هڪ ڍارو ڦٽي ڪرڻ سان 6 نتيجا ايندا ٿيڪن جي عددن تان 6 نتيجا ممڪن آهن.

1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6

(3) هڪ کان 50 انگهه لکيل ڪارڊن مان هڪ ڪارڊ ڪڍڻ وقت 50 نتيجا ممڪن آهن.

(4) راند جي پتن مان هڪ پتو ڪڍڻ، ان اٽڪل واري تجربي ۾ 52 پتا آهن، اهو هيٺ

ڏيکاريل آهي.



برابر ممڪن نتيجا (Equally Likely Outcomes)

جيڪڏهن اسان هڪ ڍارو اڇلايون ٿا ته هر هڪ انگهه اچڻ جي سمپاونا ساڳي آهي. مطلب 1 کان 6 تائين

ڪوبه انگهه مٿئين مٿاڇڙي تي اچڻ جو امڪان ساڳيو آهي. جيڪڏهن ڪو ڍارو اهڙي نموني نهيل آهي

جو ڪو خاص انگهه هر گهڙي اچي ٿو ته اهو ڍارو غلط (biased) آهي انڪري اهي نتيجا برابر ممڪن نه

آهن انڪري اٽڪل واري تجربي ۾ گهٽنا (Fair يا Unbiased) هئڻ گهرجي.

جيڪڏهن ممڪن نتيجن مان ڪوبه نتيجو ٻين جي پيٽ ۾ وڌيڪ دفعا حاصل نٿو ٿئي ته اهڙن نتيجن کي برابر ممڪن نتيجا چئجي ٿو. مثال آسان سڪو اڇلايون ٿا ته ڪر يا ٻُڙ جا نتيجا برابر عدد ۾ اچڻ جو امڪان آهي يا ڍارو ڦٽي ڪرڻ سان 1 کان 6 تائين نتيجا برابر عدد ۾ اچن.

آپياس 5.1

1. هيٺ ڏنل تجربن ۾ ڪيترو امڪان آهي؟

- (i) ونيتا کي مهاراشٽر جي سُر جڳهين بابت ڄاڻ آهي هن کي ميءَ جي مهيني ۾ موڪلڻ ۾ اُنهي وڃڻو آهي آجنتا، مهابليشور، لورڊنڊ، تادونا ون، آمبولي، رائڳڙهه، مئٿيرا، آندون.
- (ii) هڪ هفتي ۾ اٽڪل واري تجربي مان هڪ ڏينهن چونڊڻ
- (iii) پتن مان اٽڪل واري تجربي مان هڪ پتو چونڊڻ
- (iv) هر هڪ ڪارڊ تي هڪ انگه اُن موجب 10 کان 20 تائين انگه لکيل آهن. انهن مان هڪ ڪارڊ اٽڪل واري تجربي موجب چونڊڻ.

ويچار ڪريو



هيٺ ڏنل تجربن ۾ ڪهڙي تجربي ۾ نتيجي ملڻ جو امڪان وڌيڪ آهي؟



- (i) هڪ ڍارو ڦٽي ڪرڻ سان 1 ملڻ
- (ii) هڪ ناٿو اڇلائڻ سان H ملي.

ڄاڻي وٺون



جنس آوڪاش (Sample Space)

اٽڪل واري تجربي جي ممڪن سڀني نتيجن جي سڀت کي جنس آوڪاش چئجي ٿو. اهو S يا Ω (گريڪ آڪر اومگيا) نشاني وسيلي ڏيکارجي ٿو. جنس آوڪاش جي هر هڪ نتوڪي جنس ٽپڪو چئجي ٿو. 'S' سڀت ۾ نتون جو تعداد $n(S)$ وسيلي ڏيکارجي ٿو. جيڪڏهن $n(S)$ محدود آهي ته ان کي محدود جنهن آوڪاش چئجي ٿو. هيٺ محدود جنس آوڪاش جا مثال ڏنل آهن.

نمبر	آٽڪل تجربو	جنس آوڪاش	جنس ٽپڪا
1	هڪ سڪو اُڇلائڻ	$S = \{H, T\}$	$n(S) = 2$
2	ٻه سڪا اُڇلائڻ	$S = \{HH, HT, TH, TT\}$	$n(S) = \square$
3	ٽي سڪا اُڇلائڻ	$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$	$n(S) = 8$
4	هڪ ڍارو اُڇلائڻ	$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	$n(S) = \square$
5	ٻه ڍارا اُڇلائڻ	$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$	$n(S) = 36$
6	1 کان 25 تائين آنگهه لکيل ڪارڊن مان 1 ڪارڊ ڪڍڻ	$S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 25\}$	$n(S) = \square$
7	چڱيءَ طرح ڊاڀ ڏنل 52 پتن مان هڪ پتو ڪڍڻ	غلام، راڻي، راجا، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ايڪا : ايت غلام، راڻي، راجا، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ايڪا : پان غلام، راڻي، راجا، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ايڪا : ڪڍو غلام، راڻي، راجا، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ايڪا : چڱيا	$n(S) = 52$

اهو ڏيان ڇر ڇو



(i) سڪو ٻه دفعا اُڇلائڻ يا 2 سڪا هڪ دفعو اُڇلائڻ ٻنهي تجربن ۾ جنس آوڪاش ساڳيو رهندو.


(ii) هڪ ڍارو ٻه دفعا اُڇلائڻ يا 2 ڍارا هڪ دفعو اُڇلائڻ ٻنهي تجربن ۾ جنس آوڪاش ساڳيو رهندو.

آپياس 5.2

1. هيٺ ڏنل هر هڪ تجريبي ۾ آوڪاش 'S' ۽ ان ۾ سمايل جنس ٽپڪا $n(S)$ لکو.

(1) هڪ سڪو ۽ هڪ ڍارو هڪ ئي وقت اُڇلائڻ

(2) 5, 3, 2 آنگن مان بنا دهرائڻ جي ٻن آنگن وارا عدد تيار ڪرڻ.



(2) ڇهن رنگن واري گول ڦرندڙ ڦرڻي مٿان
ڪهڙي رنگ تي تير چپڪندو؟

(3) سال 2019 جي مارچ مهيني ۾ 5 جي
ضربجندڙ جون تاريخون حاصل ڪرڻ.
(ڏنل ڪلينڊر جو پتو ڏسو)

MARCH - 2019						
M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

(4) ٻن چوڪرن (B1, B2) ۽ ٻن چوڪرين (G1, G2) انهن مان هڪ رستو - سلامتي سميت ٺاهڻ آهي. ان لاءِ
جنس اوڪاش (S) لکڻ لاءِ مشغولي پوري ڪريو.

- (1) = ٻن چوڪرين جي سميت (2) = ٻن چوڪرن جي سميت
- (3) = هڪ چوڪرو ۽ هڪ چوڪري ٻن چوڪرن جي سميت
- (4) جنس اوڪاش = {.....,}

ڄاڻي وٺون



گهٽنا (Event)

ڏنل شرط جو پورا ٿيڻ ڪندڙن نتيجن کي سٺاوا نتيجا (favourable outcome) چئبو آهي.
جنس اوڪاش ڏنل آهي. گهٽنا جنس اوڪاش جو آپ سيت اهي گهٽنائون انگريزي وڌن اکرن
A, B, C, D وغيره روپ ۾ ڏيکاريندڙ آهن.

مثال: ٻه سڪا اڇلايا A گهٽنا ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ T اچي

$$A = \{TT, TH, HT\}$$

گهٽنا A جي نتون جو تعداد n(A) ڏيکاربو آهي. $n(A) = 3$

گهٽنا جا قسم		وڌيڪ ڄاڻ لاءِ
(i) يقيني گهٽنا (Certain event)	(iv) پورڪ گهٽنا (Complement of an event)	
(ii) ناممڪن گهٽنا (Impossible event)	(v) الڻ ميللاڻي گهٽنائون (Mutually exclusive events)	
(iii) هڪ نتوي گهٽنا (Simple event)	(vi) سمپورن گهٽنائون (Exhaustive events)	

حل ڪيل مثال

مثال (1) ٻه سڪا اڇلائڻ واري تجربي ۾ جنس اوڪاش 'S' لکو $n(S)$ لکو هن ڏنل گهٽتائين جا سيٽ $n(S)$ تئون جو انداز لکو

(i) گهٽتاءِ A: گهٽ ۾ گهٽ هڪ 'H' هئڻ گهرجي.

(ii) گهٽتاءِ B: هڪ H هئڻ گهرجي.

(iii) گهٽتاءِ C: وڌ ۾ وڌ هڪ T هئڻ گهرجي.

(iv) گهٽتاءِ D: هڪ به H نه هئڻ گهرجي.

حل: ٻه سڪا هڪ وقت اڇلائڻ

$$S = \{HH, HT, TH, TT\} \quad n(S) = 4$$

(i) گهٽتاءِ A: گهٽتاءِ گهٽ ۾ گهٽ هڪ H هئڻ گهرجي

$$A = \{HH, HT, TH\} \quad n(A) = 3$$

(ii) گهٽتاءِ B: هڪ H هئڻ گهرجي

$$B = \{HT, TH\} \quad n(B) = 2$$

(iii) گهٽتاءِ C: وڌ ۾ وڌ هڪ T هئڻ گهرجي

$$C = \{HH, HT, TH\} \quad n(C) = 3$$

(iv) گهٽتاءِ D: هڪ به H نه هئڻ گهرجي

$$D = \{TT\} \quad n(D) = 1$$

مثال (2) هڪ ٽيلهيءَ ۾ 1 کان 50 اَنگهه لکيل ڪارڊ آهن. اُن مان هڪ ڪارڊ ڪڍڻو آهي ته S لھو $n(S)$ لھو. A ۽ B گهٽتائون ۽ تئون جو انداز لکو.

(i) گهٽتاءِ A: عدد 6 سان ونڊجندڙ هجي

(ii) گهٽتاءِ B: ۾ عدد پورڻ ٻي سگهه هجي

$$S = \{1, 2, 3, \dots, 49, 50\} \quad n(S) = 50 \quad \text{حل:}$$

(i) گهٽتاءِ A: عدد 6 سان ونڊجندڙ هجي

$$A = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48\}, \quad n(A) = 8$$

(ii) گهٽتاءِ B: عدد پورڻ ٻي سگهه هجي

$$B = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49\}, \quad n(B) = 7$$

مثال (3) 3 چوڪرن ۽ ٻن چوڪرين، انهن مان ٻن شاگردن جي صفائي سميتي ٺاهڻي آهي 'S' ۽ $n(S)$ لکو هيٺ ڏنل گهٽتائين لاءِ جنس ٽپڪا لھو.

(i) گهٽتائين A: گهٽ ۾ گهٽ هڪ چوڪري هئڻ گهرجي

(ii) گهٽتائين B: سميتي ۾ هڪ چوڪرو ۽ هڪ چوڪري هئڻ گهرجي

(iii) گهٽتائين C: فقط چوڪرا هئڻ گهرجن

(iv) گهٽتائين D: وڌ ۾ وڌ هڪ چوڪري هئڻ گهرجي

حل: سمجھو ٽي چوڪرا آهن B_1, B_2, B_3 ۽ ٽي چوڪريون آهن G_1, G_2

$$S = \{B_1B_2, B_1B_3, B_2B_3, B_1G_1, B_1G_2, B_2G_1, B_2G_2, B_3G_1, B_3G_2, G_1G_2\} \quad n(S) = 10$$

(i) گهٽتائين A ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ چوڪري هئڻ گهرجي

$$A = \{B_1G_1, B_1G_2, B_2G_1, B_2G_2, B_3G_1, B_3G_2, G_1G_2\} \quad n(A) = 7$$

(ii) گهٽتائين B ۾ هڪ چوڪرو ۽ هڪ چوڪري هئڻ گهرجي

$$B = \{B_1G_1, B_1G_2, B_2G_1, B_2G_2, B_3G_1, B_3G_2\} \quad n(B) = 6$$

(iii) گهٽتائين A ۾ فقط چوڪرا هئڻ گهرجن

$$C = \{B_1B_2, B_1B_3, B_2B_3\} \quad n(C) = 3$$

$$D = \{B_1B_2, B_1B_3, B_2B_3, B_1G_1, B_1G_2, B_2G_1, B_2G_2, B_3G_1, B_3G_2\} \quad n(D) = 9 \quad (iv)$$

مثال (4) ٻه ڌارا اُچلائڻ ۾ 'S' ۽ $n(S)$ لھو.

هن شرط پورا ڪندڙ گهٽتائين جا سيٽ ۽ تنهن جو تعداد لکو

(i) متعين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ مفرد عدد هئڻ گهرجي

(ii) متعين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ 5 جو ضربجندڙ هئڻ گهرجي

(iii) متعين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ 25 هئڻ گهرجي

(iv) پهرين ڌاري جو انگ ٻئي ڌاري جي انگ کان ننڍو هئڻ گهرجي.

حل جنس آوكاش

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), \\ (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), \\ (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), \\ (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\} \quad n(S) = 36$$

(i) سمجھو ته E گھٽنا ۾ انگن جو جوڙ مفرد عدد آهي

$$E = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 4), \\ (4, 1), (4, 3), (5, 2), (5, 6), (6, 1), (6, 5)\} \quad n(E) = 15$$

(ii) سمجھو ته F گھٽنا ۾ انگن جو جوڙ 5 جو ضربجندڙ هجي

$$F = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (4, 6), (5, 5), (6, 4)\} \quad n(F) = 7$$

(iii) سمجھو ته G گھٽنا ۾ انگن جو جوڙ 25 آهي.

$$G = \{ \} = \phi \quad n(G) = 0$$

(iv) سمجھو ته H گھٽنا ۾ پهرين ڌاري جو انگ ٻئي ڌاري جي انگ کان ننڍو آهي.

$$H = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\} \quad n(H) = 15$$

آپياس 5.3

1. هيٺ هر هڪ اٽڪل واري تجربي ۾ S, n(S) ساڻئي نموني، C, B, A ۽ n(A), n(B), n(C) لکو.

(i) هڪ ڌارو اڇلائڻ

گھٽنا A: مٿئين مٿاڇري تي ٻڌي عدد هئڻ گھرجي

گھٽنا B: مٿئين مٿاڇري تي اڪي عدد هئڻ گھرجي

گھٽنا C: مٿئين مٿاڇري تي مفرد عدد هئڻ گھرجي

(2) ٻه ڌارا اڇلائڻ

گھٽنا A: مٿئين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ 6 ضربجندڙ هئڻ گھرجي

گھٽنا B: مٿئين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ گھٽ ۾ گھٽ 10 ضربجندڙ هئڻ گھرجي

گھٽنا C: ٻنهي ڌارن تي ساڳيو انگ هئڻ گھرجي.

(3) ٽي سڪا هڪ ئي وقت اُچلائڻ

گهٽنا A : گهٽ ۾ گهٽ ٻه دفعا H اچڻ گهرجي

گهٽنا B : هڪ به H نه هئڻ گهرجي

گهٽنا B : ٻئي سڪي تي H هئڻ گهرجي

(4) : 0, 1, 2, 3, 4, 5 انگه بنا دھراوت واپرائي ٻن انگن وارا عدد ٻڌي هئڻ گهرجي.

گهٽنا A : ملندڙ عدد ٻڌي هئڻ گهرجي.

گهٽنا B : 4 سان ونڊجندڙ عدد هئڻ گهرجن.

گهٽنا B : ملندڙ عدد 50 کان وڏا هئڻ گهرجن.

(5) ٽن مردن ۽ ٻن عورتن مان ٻن چئن جي 'پرياورڻ سمٽي' ٺاهڻي آهي.

گهٽنا A : سمٽي ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ عورت هئڻ گهرجي.

گهٽنا B : سمٽي ۾ هڪ مرد ۽ هڪ عورت هئڻ گهرجي.

گهٽنا C : سمٽي ۾ هڪ به عورت نه هئڻ گهرجي.

(6) هڪ سڪو ۽ هڪ ڍارو هڪ ئي وقت اُچلائڻ

گهٽنا A : H ۽ اِڪي عدد هئڻ گهرجي.

گهٽنا B : H يا T ۽ ٻڌي عدد هئڻ گهرجي.

گهٽنا C : T ۽ عدد 7 کان وڏو هئڻ گهرجي.

ڄاڻي ونون



گهٽنا جو امڪان (Probability of an event)

هڪ سولو تجربو سوچيون ٿا هڪ ٽيلهي ۾ ساڳئي آڪار جا چار بال آهن.

انهن ۾ ٽي اچي رنگه ۽ هڪ ڪاري رنگه جو آهي.

انهن مان اڪيون بند ڪري هڪ بال ڪڍڻو آهي اچي رنگه جو بال هئڻ جو وڌيڪ امڪان آهي.

علم رياضي ۾ هڪ گهٽنا جو ممڪن هئڻ کي گهٽنا جو امڪان چئجي ٿو.

ڪنهن اٽڪل واري تجربي ۾ جنس اوڪاش S ۽ A هڪ گهٽنا آهي ته اُن گهٽنا جو امڪان P(A) نموني

ڏيکاربو آهي. اهو سوتر وسيلي لھجي ٿو.

$$P(A) = \frac{\text{جنس ٽڪن جو عدد } A}{\text{۾ ٽڪن جو عدد } S} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

مٿي ڏنل تجربي ۾ سمجھو A گھٽنا ۾ اڃا بال آهن. $n(S) = 4$ $n(A) = 3$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{4} \quad \therefore \text{A ته جو اِمكان :}$$

$$B \text{ گھٽنا ۾ سمجھو ڪارو بال آهي ته B گھٽنا جو اِمكان } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{4} \quad \therefore P(B) = 1$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) هڪ سڪو اڇلائڻ ۾ هيٺ ڏنل گھٽنائڻ جو اِمكان لھو

ملڻ H (i) ملڻ T (ii)

حل : سمجھو ته S جنس اوڪاش آهي

$$S = \{H, T\} \quad n(S) = 2$$

(i) سمجھو A گھٽنا ۾ H ملي ٿي

$$A = \{H\} \quad n(A) = 1$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{2}$$

(ii) سمجھو B گھٽنا ۾ T ملي ٿي

$$B = \{T\} \quad n(B) = 1$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{2}$$

مثال (2) هڪ ڍارو اڇلائڻ ۾ هيٺ ڏنل گھٽنائڻ جو اِمكان لھو.

(i) مٿئين مٿاڇڙي تي مفرد عدد هجي. (ii) مٿئين مٿاڇڙي تي عدد ٻڌي هجي.

حل : سمجھو ته جنس اوڪاش 'S' آهي

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad n(S) = 6$$

(i) سمجھو گھٽنا A ۾ مفرد عدد آهي.

$$A = \{2, 3, 5\} \quad n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(ii) گھٹنا B ۾ مٿئين مٿاڇري تي ٻڌي عدد هجي

$$B = \{2, 4, 6\} \quad n(B) = 3$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$$

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

مثال (3) سٺي نموني ٽاپيل 52 پتن مان هڪ پتو ڪڍڻ. انهن گھٽنائن جو اِمكان لھو.

(i) پتو ٻاڙھو هجي (ii) درشتي پتو هجي .

حل : سمجھو ته جنس اوڪاش S آھي $\therefore n(S) = 52$

گھٽنا A: ۾ ٻاڙھو پتو آھي

13 ايت + 13 پان = 26 ٻاڙھا پتا

$$n(A) = 26$$

$$P(A) = \frac{26}{52} \quad \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{2}$$

(ii) گھٽنا B ۾ درشتي پتو آھي

ڪل بادشاھ، راڻي ۽ غلام جا 12 درشتي پتا آھن $\therefore n(B) = 12$

$$P(B) = \frac{12}{52} \quad \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{13}$$

مثال (4) هڪ ڪوڪي ۾ 5 اِسترايري، 6 ڪافي ۽ 2 ٻيپرمنت جا ڇاڪليٽ آھن ته

(i) ڪافي ڇاڪليٽ

(ii) ٻيپرمنت ڇاڪليٽ انهن جو اِمكان لھو

$$\therefore n(S) = 5 + 6 + 2 = 13$$

حل : سمجھو ته جنس اوڪاش S آھي

گھٽنا B ۾ ٻيپر مينٽ ڇاڪليٽ

$$n(B) = 2$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$$

$$P(B) = \frac{2}{13}$$

گھٽنا A ۾ ڪافي ڇاڪليٽ

$$n(A) = 6$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{6}{13}$$



- امڪان ٻڌائڻ يا لکڻ وقت اڻڀرو يا سيڪڙو واپرائجي ٿو
- ڪنهن به گهٽتاءَ جو امڪان 0 کان 1 يا 0% کان 100% هوندو آهي.
- مطلب $0 \leq P(E) \leq 1$ يا $0\% \leq P(E) \leq 100\%$
مثال $\frac{1}{4}$ امڪان 25% لکي سگهجي ٿي.
- باب جي شروعات ۾ ڪلاس ۾ ٻارن کي ٻوٽن جي نالن واريون چٽيون کڻڻ لاءِ چيو ويو اُن وقت
تلسي ٻوٽي اِهو نالو هوندڙ شاگرد جي امڪان بابت ويچار ڪيو ويو هڪ ئي چٽيءَ تي
تلسيءَ جو نالو آهي 40 شاگردن کي اِن تلسيءَ واري نالي کڻڻ جي چٽيءَ جو امڪان هر هڪ
شاگرد لاءِ $\frac{1}{40}$ آهي. شروعاتي، وچ ۾ يا آخر ۾ چٽي کڻندڙ ٻار جو امڪان ساڳيو ئي آهي.

آپياس 5.4

1. ٻن سڪن جي اڇلاڻ سان هيٺ ڏنل گهٽتائن جو امڪان لھو.
 - (1) گهٽ ۾ گهٽ هڪ H ملڻ
 - (2) هڪ به H نه ملڻ
2. ٻه ڍارا اڇلاڻ سان هيٺ گهٽتائن جو امڪان لھو
 - (1) مٿئين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ گهٽ ۾ گهٽ 10 هئڻ
 - (2) مٿئين مٿاڇري تي انگن جو جوڙ 33 هئڻ
 - (3) پهرين ڍاري جو انگ، ٻئي ڍاري جي انگ کان وڏو هئڻ
3. هڪ پيٽيءَ ۾ 15 ٽڪيٽون آهن هر هڪ ٽڪيٽ تي 1 کان 15 مان هڪ عدد لکيل آهي اُن ۾ هڪ ڪڍڻي آهي ته
 - (1) ٻڌي عدد هئڻ
 - (2) 5 جو ضربجندڙ عدد انهن جو امڪان لھو
4. 2, 3, 5, 7, 9 اِهي انگهه بنا دهرائڻ جي هڪ دفعو ڪم آڻي ٻن انگن وارا عدد تيار ڪيا ته گهٽتائن جو امڪان لھو.
 - (1) عدد اڪي آهي
 - (2) 5 جو ضربجندڙ عدد آهي.
5. چٽيءَ طرح ٽاپيل 52 پٽن مان هڪ پٽو ڪڍڻ سان هيٺ ڏنل گهٽتائن جو امڪان لھو
 - (1) يڪو ملڻ
 - (2) گڏو پٽو ملڻ

گڏيل آڀياس - 5

1. هيٺ هر هڪ سوال جو مناسب متبادل چونڊيو
(1) هيٺ ڏنل جوابن مان ڪهڙو امڪان ناممڪن آهي .
(A) $\frac{2}{3}$ (B) 1.5 (C) 15% (D) 0.7
- (2) هڪ ڍارو اڇلائڻ سان 3 کان گهٽ ايندڙ انگن جو امڪان آهي .
(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 0
- (3) 1 کان 100 تائين ڪنيل منفرد عددن جو امڪان آهي .
(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{6}{25}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{13}{50}$
4. هڪ ٽيلهي ۾ 1 کان 40 انگ لکيل ڪارڊ آهن. انهن ڪارڊن مان هڪ ڪارڊ ڪڍڻ وقت اهو 5 جو ضرب ٻڌندڙ آهي ته ان گهٽنا جو امڪان ٿيندو.
(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{1}{3}$
- (5) جيڪڏهن $n(A) = 2$ ، $P(A) = \frac{1}{5}$ ، ته $n(S) = ?$
(A) 10 (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{3}$
2. باسڪيٽ بال رانديگر جان، واسر ۽ آڪاش هڪ مقرر جڳهه تي راند جو آڀياس ڪن ٿا باسڪيٽ بال ۾ بال وجهڻ ۾ جان جو امڪان $\frac{4}{5}$ ، واسر جو 0.83 ۽ آڪاش جو 58% آهي ته انهن مان سڀ کان وڌيڪ امڪان ڪنهن جو آهي؟
3. هڪ هاڪي ٽيم ۾ 6 بچاءُ ڪندڙ، 4 ڇملو ڪندڙ ۽ 1 گول ڪيپر آهي اٽڪل تجربتي ۾ هڪ ڪپٽين چونڊڻو آهي ته امڪان لھو. (1) گول ڪيپر ڪپٽين آهي (2) بچاءُ ڪندڙ رانديگر ڪپٽين آهي .
4. جوسف ٽوپيءَ ۾ 26 ڪارڊ، هر هڪ تي انگريزيءَ جو هڪ اکر وارو ڪارڊ رکيو ان مان سيور (vowel) واري ڪارڊ جو امڪان لھو.
5. ڦوڪڻي واري وٽ 2 ٻاڙها، 3 نيرا ۽ 4 ساوا انهن رنگن جا ڦوڪڻا آهن. هڪ ڦوڪڻو پرڻائيءَ کي ڏيئي ٿو گهٽائڻ جو امڪان لھو.
- (1) حاصل ٿيل ڦوڪڻو ٻاڙهو هئڻ
- (2) حاصل ٿيل ڦوڪڻو نيرا هئڻ
- (3) حاصل ٿيل ڦوڪڻو ساڻو هئڻ.

6. هڪ باڪس ۾ 5 ٻاڙهي رنگ، 8 نيري رنگ ۽ 3 سائي رنگ جون پينيون آهن اٽڪل واري تجربتي ۾ ريتا کي هڪ ٻين ڪڍڻي نيري رنگ واري ڪڍڻي آهي ته ان گهٽنا جو امڪان لھو.

7. هڪ ڌاري ۾ ڇهن مٿاڇڙا هيٺ ڏنل نموني موجب آهن.



هڪ دفعو ڌارو اُچلائڻ سان هيٺ گهٽنائڻ جو امڪان لھو.


(1) مٿئين مٿاڇڙي تي 'A' هئڻ (2) مٿئين مٿاڇڙي تي D هئڻ

8. هڪ ڪوڪي ۾ 1 کان 30 لکيل آهڙيون 30 ٽڪيٽون آهن.

هيٺ ڏنل گهٽنائڻ جو امڪان لھو

(1) ٽڪيٽ جو عدد اڪي آهي (2) ٽڪيٽ تي عدد پورڻ ٻي سگهه آهي.

77 م



9 هڪ مستطيل باغ جي ڊيگهه ۽ ويڪر نمبر وار 77 م ۽


50 م آهي باغ ۾ 14 م قطر وارو تلاءُ آهي باغ جي ڀرسان

هڪ عمارت مان هڪ نوال باغ ۾ اچي ڪريو ته باغ ۾ تلاءُ

۾ اُن جي ڪرڻ جو امڪان لھو.

10. چٽاڀيٽي راند ۾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 انهن مان هڪ انگ تي تير

هڻڻو آهي هيٺ ڏنل گهٽنائڻ جو امڪان لھو



(1) اهو تير 8 انگ تي پوي ٿو

(2) اهو پٿر اڪي انگ تي پوي ٿو

(3) تير 2 کان وڌي انگ تي پوي ٿو.

(4) تير 9 کان گهٽ انگ تي پوي ٿو.

11. هڪ ڪارڊ تي 0 کان 5 تائين انگ لکيل 6 ڪارڊ آهن ته هيٺ ڏنل گهٽنائڻ جو امڪان لھو.

(i) ڪڍيل ڪارڊ تي قدر تي عدد آهي.

(ii) ڪڍيل ڪارڊ تي 1 کان گهٽ عدد آهي.

(iii) ڪڍيل ڪارڊ تي سڄو عدد آهي.

(iv) ڪڍيل ڪارڊ تي 5 کان گهٽ عدد آهي

12. هڪ بئگ ۾ 3 ٻاجڙا ، 3 آڇا ۽ 2 ساڻي رنگ جا بال آهن. 1 بال ڪڍڻ لاءِ گهٽتائين جو امڪان لھو.

(1) ڪڍيل بال ٻاجڙهي رنگ جو آهي

(2) ڪڍيل بال ٻاجڙهي رنگ جو نه آهي

(3) ڪڍيل بال ٻاجڙهو يا آڇو آهي.

13. هر هڪ ڪارڊ تي Mathematics ان لفظ جا سڀ آکر ڪٿي ڪارڊ تيار ڪيا ويا ۽ اُهي اُبتا رکيا ويا ته اُن مان 'm' آکر واري ڪارڊ ڪڍڻ جو امڪان لھو.

14. هڪ اسڪول ۾ 200 شاگردن مان 135 شاگردن کي ڪپٽي راند پسند آهي باقي ٻين ٻارن کي اِها راند پسند نه آهي. سڀني ٻارن مان هڪ شاگرد چونڊڻ ۾ راند کي نه پسند ڪرڻ امڪان لھو.

15. 4, 3, 2, 1, 0 اِهي انگه بنا دھرائڻ جي ٻن انگن جا عدد تيار ڪرڻا آهن ته هيٺ ڏنل گهٽتائين جو امڪان لھو.

(i) اهو عدد مفرد آهي

(ii) اهو عدد 4 جو ضربجنڊڙ آهي.

(iii) اهو عدد 11 جو ضربجنڊڙ آهي.

16. هڪ ڌاري تي مٿاڇڙن تي 5, 4, 3, 2, 1, 0 اِهي انگه آهن اِهو ڌارو ٻه دفعا اڇلائڻ سان مٿين مٿاڇڙن تي ملندڙ انگن جو ضرب اُپت بڙي آڇي، ان گهٽنا جو امڪان لھو.

17. هيٺيون مشغوليون ڪريو.

مشغولي : ا توهانجي ڪلاس جو ڪُل تعداد $n(S) = \boxed{}$

ڪلاس ۾ عينڪ وارا ٻار $n(A) = \boxed{}$

سڀني ٻارن مان هڪ عينڪ وارو ٻار اٽڪل وارو تجربتي ذريعي ٻولھڻ جو امڪان $P(A) = \boxed{}$

سڀني ٻارن ۾ عينڪ واپرائڻ وارو هڪ ٻار اٽڪل واري تجربتي ذريعي ٻولھڻ جو امڪان $n(S) = \boxed{}$

مشغولي II جنس اوڪاش مقرر ڪري هيٺيان چؤڪت ڀريو.

جنس اوڪاش

گهٽنا A لاءِ برابر عدد ملڻ ضروري

$S = \{ \}$

$A = \{ \}$

$n(S) = \boxed{}$

$P(A) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

$n(A) = \boxed{}$



□ □ □

اچو ته سڪي وٺون



- مرڪزي رُخ جون ماپون - گروھيل جھجھائي چڄري ۾ سراسري، وچون عدد، چڄري جو ڏنگه
- عددي ڄاڻ جو شڪل وسيلي پيشڪش - هستوگرام، جھجھائي گھڻڪندو، گول گراف (پاء ڊائگرام)

انسان جي زندگيءَ ۾ عدد شاستر جو انيڪ ڪيترن ۾ اُپيوگه آهي مثال ڪيتي، آرٽ شاستر، واپار، ميڊيڪل، علم نباتات، علم حيات - ٽڪنيڪ، علم ڪيميا، عام سڪيا، سماج وگيان، بندوبست وغيره هڪ تجرببي مان ڪيترائي نتيجا ممڪن آهن جڏهن انهن جو امڪان ڄاڻو آهي، اُن وقت وڏي پئماني تي تجربو ڪري سڀ ڄاڻ سٺي نموني درج ڪبي آهي. اِن درج جو استعمال ڪري جدا جدا نتيجا ڄاڻيا وڃن ٿا. اِن ڪري عدد شاستر ۾ ڪجهه عددي نيمر ٺاهيا ويا آهن.



فرانسز گالٽن

فرانسز گالٽن (1822-1911) برٽش سائنسدان عدد شاستر ۾ بنيادي ڪم ڪيو. هو سوال تيار ڪري عام ماڻهن ۾ ورهائيندو هو ۽ سوالن جا جواب ڀرڻ لاءِ عرض ڪندو هو. اهڙي ريت ڄاڻ حاصل ڪري، انهن ماڻهن جي آبه حالت، آرٿڪ دشا، بيماريون، تندرستي وغيره جي ڄاڻ نوت ڪندو هو. گالٽن ڪيترن ئي ماڻهن جي آڱرين جا نشان حاصل ڪري انهن جو ورگيڪرڻ ڪرڻ جو بنياد وڌو.

اهو ڏيکاريو ته ڪن به ٻن ماڻهن جي آڱرين جا نشان ساڳيا نه هوندا آهن. آڱرين جي نشانن سان ماڻهوءَ جي سڃاڻپ ممڪن ٿي. گناهه ڪندڙن کي سڃاڻڻ ۾ اهو طريقو ڪورٽن ۾ پڻ منظور ٿيل آهي. انسان ۽ جانورن جي آڏ-شاستر ۾ هن خوب ڪم ڪيو

ڄاڻي وٺون



سروي مان حاصل ٿيل عددي ڄاڻ مان هڪ خاصيت ته ظاهر آهي ته سڀ مليل ڪٽنون ڪنهن خاص ڪٽ چوگرد يا اُن جي آسپاس مرڪزي ٿيل جو ڏنگه اها خاص ڪٽ سڄي گروهه جو عيوضي عدد هوندي آهي اِن ملهه کي مرڪزي رخ جي ماپ چئبو آهي. اُن گروھيل چڄري ۾ سراسري (Mean) وچون عدد (Median) ۽ ڏنگه (Mode) بابت آسان سڪي چڪا آهيون.

عملي ڪم 1 : توهان جي ڪلاس ۾ سڀني ٻارن جي اوچائي س ۾ درج ڪريو. آسان ڪي ائين لڳندو ته ڪيترن ئي ٻارن جي اوچائي ڪنهن خاص عدد جي چوگرد يا آسپاس مرڪزي ٿيندڙ نظر ايندي.

عملي ڪم 2 : ڀڄل جا هيٺ ڪريل پن جمع ڪريو هر هڪ شاگرد کي هڪ پن ڏيو هر هڪ کي پن جي ڊيگهه ماپڻ لاءِ چئو سڄي ڄاڻ درج ڪريو. توهان ڏسندا ته مليل عدد (ڪٽون) ڪنهن خاص عدد جي چوگرد يا مرڪزي هوندي.

هاڻي آسان عددي ڄاڻ جي مرڪزي رخ جون ماپون سراسري (Median) وچون عدد (Mean) ۽ ڊنگه (Mode) بابت ڄاڻ حاصل ڪندا سين.

عددي ڄاڻ جي سراسري = $\frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$ = سڀني ڪٽن جو جوڙ / ڪل ڪٽون

سراسري $\bar{X}$ وسيلي ڏيکاريل آهي اها عددي ڄاڻ جي سراسري آهي

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

ڄاڻي ونون



(Mean from classified frequency distribution)

گروهيٺل چجري مان سراسري

جيڪڏهن ڪٽن جو انداز وڏو هوندو آهي ته سراسري لھڻ لاءِ مٿي ڏنل فارمولا ڪم آڻبي آهي. ڪڏهن ڪڏهن وڏي ڄاڻ گروهيٺل چجري ۾ حاصل ٿيل هوندي آهي. اهڙي وقت مٿي ڏنل فارمولا وسيلي سراسري نه لھي سگھي ان هي هيٺ ڏنل طريقا ڪم آڻي سگھجن ٿا.

سڌو طريقو (Direct Method)

هاڻي گروهيٺل عددي ڄاڻ مان سراسري لھڻ جو طريقو سمجھندا سين.

مثال : هيٺ ڏنل چجري ۾ هڪ ڪم پورو ڪرڻ ۾ مزورن جو جھجائي جو لڳل وقت ڏنل آهي ته هڪ مزور جو ڪم ۾ لڳل وقت جي سراسري لھو.

هر هڪ کي ڪم پورو ڪرڻ لاءِ لڳل وقت (ڪلاڪن ۾)	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
مزورن جو تعداد	10	15	12	8	5

حل :

کلاس درج x_i وقت (کلاڪن ۾)	جھجھائي f_i	$x_i f_i$
15-19	10	170
20-24	15	330
25-29	12	324
30-34	8	256
35-39	5	185
ڪُل	$\sum f_i = 50$	$\sum x_i f_i = 1265$

- (1) چار کالمر هوندي ڇڏڻ ڇڏڻ تيار ڪيو
- (2) پهرين کالمر ۾ ڪلاس وٺي ڪم ۾ لڳل وقت آهي.
- (3) ٻئي کالمر ۾ ڪلاس وچ ٽپڪو (ڪلاس نشان) x_i لکيو
- (4) ٽئين کالمر ۾ مزورن جي جھجھائي (f_i) لکيو.
- (5) چوٿين کالمر ۾ هر هڪ ڪلاس لاءِ ($x_i \times f_i$) اها ضرب اپت لکي
- (6) ڪم جا ڪل ڪلاڪ : $\sum_{i=1}^N x_i f_i$ لکي.
- (7) فارمولا ڪم آڻي سراسري ڪڍي

$$\text{سراسري} = \bar{X} = \frac{\sum x_i f_i}{N} = \frac{1265}{50} = 25.3 \quad \because \sum f_i = N$$

هڪ مزور کي لڳندڙ وقت 25.3 ڪلاڪ آهي. (اٽڪل)

حل ڪيل مثال

مثال (1) هيٺ ڏنل ڇجري ۾ 50 شاگردن جو يونٽ آزمائش ۾ مارڪن جو سيڪڙو ڏنل آهي ته مارڪن جي سيڪڙو جي سراسري لھو.

مارڪن جو سيڪڙو	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
شاگردن جو انداز	3	7	15	20	5

حل : ڏاڪن جي آڌار تي ڇجرو تيار ڪيو

ڪلاس (مارڪن جو سيڪڙو)	ڪلاس نشان x_i	جھجھائي (شاگردن جو انداز) f_i	ڪلاس نشان $x_i f_i$
0-20	10	3	30
20-40	30	7	210
40-60	50	15	750
60-80	70	20	1400
80-100	90	5	450
ڪُل		$N = \sum f_i = 50$	$\sum x_i f_i = 2840$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} \\ &= \frac{2840}{50} \\ &= 56.8 \\ &\text{مارڪن جي} \\ &\text{سيڪڙو جي} \\ &\text{سراسري} = 56.8 \end{aligned}$$

مثال (2) گذريل سال مهاراشتر جي 30 جدا جدا شهرن اونھاري ۾ هڪ ڏينھن جو وڏو گرمي پد C° هيٺ چڱري ۾ ڏنل آهي. ته اُن گرمي پد جي سراسري لھو.

وڏو گرمي پد	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44
شھرن جو تعداد	4	5	7	8	6

حل :

ڪلاس (گرمي پد C°)	ڪلاس نشان x_i	جھجھائي f_i	ڪلاس $\times$ ڪلاس نشان $x_i f_i$
24-28	26	4	104
28-32	30	5	150
32-36	34	7	238
36-40	38	8	304
40-44	42	6	252
ڪُل		$N = \sum f_i = 30$	$\sum x_i f_i = 1048$

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{1048}{30} = 34.9^{\circ}C = \text{سراسري}$$

مڃيل سراسري طريقو (Assumed Mean Method)

مٿي حل ڪيل مثالن ۾ ڪڏهن ڪڏهن $x_i f_i$ اها ضرب اُپت تمام وڏي ٿئي ٿي. انڪري سڌي طريقي سراسري ڪيڏ ڪجهه اوکي ٿئي ٿي. ان لاءِ هڪ طريقو مڃيل سراسري طريقو سمجهي وٺون. ان طريقي ۾ سراسري لھڻ لاءِ ننڍن عددن جو جوڙي وٺڻ ڪرڻ سولو آهي.

مثال : 40, 42, 43, 45, 47, 48 اهي ڪٿون آهن انهن جو سراسري لھڻي آهي.

ان مثال کي ڇاڇڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته سراسري 40 کان وڌيڪ آهي. اسان سمجهو 40 کي سراسري مڃيون ٿا

اها مڃيل سراسري آهي, $40 - 40 = 0$, $42 - 40 = 2$, $43 - 40 = 3$, $45 - 40 = 5$, $47 - 40 = 7$, $48 - 40 = 8$

اهي فرق ڏسو انهن کي ڦيريل چئبو آهي. انهن فرقن جي سراسري لھي انهن ۾ 40

ملائيندا ته اسان کي سڃي ڄاڻ جي سراسري ملندي.

ڦيريلن جي سراسري + مڃيل سراسري = سراسري

$$\bar{X} = 40 + \left(\frac{0+2+3+5+7+8}{6} \right) = 40 + \frac{25}{6} = 40 + 4\frac{1}{6} = 44\frac{1}{6}$$

سمجھو ته مڃيل سراسري A مڃيل سراسري جا ڦيريل d ۽ ڦيريلن جي سراسري $\bar{d}$ آهي.

$$\bar{X} = A + \bar{d}$$

ساڳيو مثال آسان مڃيل سراسري 43 ڪري ڏسون

$$40 - 43 = -3, 42 - 43 = -1, 43 - 43 = 0, 45 - 43 = 2, 47 - 43 = 4, 48 - 43 = 5$$

$$-3 - 1 + 0 + 2 + 4 + 5 = 7 = \text{ڦيريلن جو جوڙ}$$

$$\bar{X} = A + \bar{d} \quad \text{هاڻي}$$

$$= 43 + \left(\frac{7}{6}\right) \quad (\text{هتي ڪُل 6 ڦيريل آهن})$$

$$= 43 + 1\frac{1}{6}$$

$$= 44\frac{1}{6}$$

ان مان سمجھ ۾ اچي ٿو ته مڃيل سراسري ڪهڙي به ڪٽ ڪٽي ته سراسري ۾ ڪابه تبديل نه ايندي. هاڻي اها

گروھيل جھجھائيءَ ۾ اهو طريقو ڪيئن ڪم آڻيو، مثال وسيلي سمجھندا سين.

مثال : 100 ڀاڄي وڪڻندڙ جو روز جو وڪرو هيٺ ڏنل آهي. مڃيل سراسري طريقي سان روزاني وڪرو جي

سراسري لھو.

روزانو وڪرو	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000
وڪڻندڙ جو آنداز	15	20	35	30

حل : سمجھيو $A = 2250$ مڃيل $d_i = x_i - A$ سراسري

ڪلاس روزانو وڪرو (رڀين ۾)	ڪلاس نشان x_i	$d_i = x_i - A$ $= x_i - 2250$	وڪڻندڙن جو آنداز f_i	جھجھائي × ڦيريل $f_i d_i$
1000-1500	1250	-1000	15	-15000
1500-2000	1750	-500	20	-10000
2000-2500	2250 → A	0	35	0
2500-3000	2750	500	30	15000
ڪُل			$N = \sum f_i = 100$	$\sum f_i d_i = -10000$

هيٺيان ڏاڪا ڪم آڻي ڇڏيو ٿي.

(1) مڃيل سراسري $A = 2250$ ڪٿين (رواجي طرح وڌيڪ جهجهائي وارو ڪلاس نشان ڪٽڻ گهرجي)

(2) پهرين ڪالمر ۾ وڪرو ڪلاس ۾ لکيو.

(3) ٻئين ڪالمر ۾ ڪلاس نشانو لکيو.

(4) ٽئين ڪالمر ۾ $d_i = x_i - A = x_i - 2250$ ملهه لکيو.

(5) چوٿين ڪالمر ۾ هر هڪ ڪلاس جي وڪنڊڙن جو انداز ۽ جوڙ $\sum f_i$ لکيو

(6) پنجين ڪالمر ۾ $(f_i \times d_i)$ لکيو ۽ جوڙ $\sum f_i d_i$ ڪيو

سوٽر ڪم آڻي $\bar{d}$ ڪڍي.

$$\bar{d} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} = -\frac{10000}{100} = -100 \quad \therefore \bar{X} = A + \bar{d} = 2250 - 100 = 2150$$

روزانو وڪرو سراسري 2150 ر

مشغولي : اهو مثال سڌي طريقي حل ڪريو

حل ڪيل مثال

مثال (1) هيٺ ڏنل ڇڄري ۾ هڪ ڪارخانيدار وٽ 50 مزدورن جي روزاني پگهار جهجهائي ڏنل آهي هڪ مزدور جي روزاني سراسري ڪمائي مڃيل سراسري طريقي لھو.

روزانو پگهار رپين ۾	200-240	240-280	280-320	320-360	360-400
مزدورن جو انداز	5	10	15	12	8

حل : سمجهو ته $A = 300$ مڃيل سراسري :

مزدورن جو انداز	ڪلاس نشان x_i	$d_i = x_i - A$ $d_i = x_i - 300$	ڪلاس پگهار (رپين ۾) f_i	$f_i d_i$
200-240	220	-80	5	-400
240-280	260	-40	10	-400
280-320	300 → A	0	15	0
320-360	340	40	12	480
360-400	380	80	8	640
ڪُل			$\sum f_i = 50$	$\sum f_i d_i = 320$

$$\overline{d} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} = \frac{320}{50} = 6.4$$

$$\overline{X} = A + \overline{d} \text{ , سراسري}$$

$$= 300 + 6.4$$

$$= 306.40$$

روزانو سراسري پڻهار 306.40 ر

ڦيرائيل ڏاڪي وارو طريقو (Step deviation method)

آسان سراسري لھڻ لاءِ سڌو طريقو ۽ مڃيل سراسري طريقو آڀياس ڪيو وڌيڪ سهوليت لاءِ سراسري لھڻ لاءِ هڪ ٻيو طريقو سمجھندا سين.

• پھريائين A اھا مڃيل سراسري ڪٽ ڪري d_i وارو ڪالم تيار ڪندا سين.

• سڀ d_i جي اوچائي g ملندي ته $u_i = \frac{d_i}{g}$ وارو ڪالم تيار ڪندا سين.

• u_i انھن عددن جي سراسري $\overline{u}$ لھندا سين

• $\overline{X} = A + \overline{u} g$ اھو سوتر ڪم آڻي سراسري لھندا سين

نمونو مثال : 100 ڪٽنبن جي صحت لاءِ انشورنس رقم هيٺ جھجھائي چڱري ۾ ڏنل آھي. ڦيرائيل ڏاڪي واري طريقي سالياني انشورنس جي سراسري لھو.

ويما رقم رپين ۾	800-1200	1200-1600	1600-2000	2000-2400	2400-2800	2800-3200
ڪٽنبن جو انداز	3	15	20	25	30	7

حل : سمجھو ته مڃيل سراسري $A = 2200$ سڀئي d_i ڏسي هتي $g = 400$

ڪلاس ويما رقم (رپيا)	ڪلاس نشان x_i	$d_i = x_i - A$ $= x_i - 2200$	$u_i = \frac{d_i}{g}$	جهجھائي ڪٽنب جو انداز f_i	$f_i u_i$
800-1200	1000	-1200	-3	3	-9
1200-1600	1400	-800	-2	15	-30
1600-2000	1800	-400	-1	20	-20
2000-2400	2200 → A	0	0	25	0
2400-2800	2600	400	1	30	30
2800-3200	3000	800	2	7	14
ڪُل				$\sum f_i = 100$	$\sum f_i u_i = -15$

مٿي ڏنل چجر هينٽ ڏاڪن تي تيار ڪيل آهي.

(1) پهرين ڪالمر ۾ ويما رقم ڪلاس ۾ لکي

(2) ٻئين ڪالمر ۾ ڪلاس نشان x_i لکيو.

(3) ٽئين ڪالمر ۾ $d_i = x_i - A$ ملهه لکيو

(4) چوٿين ڪالمر ۾ سڀ عدد 400 جا ضرب بند ٿي آهن انگري 400-ان ڪالمر ۾ $u_i = \frac{d_i}{g} = \frac{d_i}{400}$ جو ملهه لکيو

(5) پنجين ڪالمر ۾ جهجھائي لکي.

(6) ڇهين ڪالمر ۾ $f_i \times u_i$ جو ملهه لکيو.

u_i جي سراسري فارمولا ڪر آڻي ڪڍي.

$$\bar{u} = \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} = \frac{-15}{100} = -0.15$$

$$\bar{X} = A + \bar{u} g$$

$$= 2200 + (-0.15) (400)$$

$$= 2200 + (-60.00)$$

$$= 2200 - 60 = 2140$$

ڪٽنب جي ويما رقم جي سالياني سراسري 2140 ر آهي.

ڌيان ڏيو: سڌي طريقي. مڃيل سراسري طريقي يا ڦيريل ڏاڪي واري طريقي ڪڍيل سراسري ساڳي هوندي آهي.

حل ڪيل مثال

مثال (1) اسڪول جي 50 شاگردن ٻوڏ راحت لاءِ ڏنل چندي جو جھجھائي چڪرو هيٺ ڏنل آهي. جمع ڪيل چندي جي سراسري ڦيريل ڌاڪو طريقو ڪر آڻي لھو.

چندو (روپيا)	0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000
شاگرد	2	4	24	18	1	1

ٻن لاڳيتن ڪلاس ۾ ڪٽنون تمام گھٽ هجن ته اُهي ٻئي ملائي هڪ ڪلاس ڪرڻ سولو ٿيندو
 0-500 ۽ 500-1000 جو هڪ ڪلاس ۽ 2000-2500 ۽ 2500-3000 جو هڪ ڪلاس ڪيو.

چندو رقم (رپين ۾)	0-1000	1000-1500	1500-2000	2000-3000
شاگرد	6	24	18	2

حل : سمجهو ته $A=1250$ سڀ d_i جاچي $g=250$ ڪيو.

ڪلاس چندو رقمون رپين ۾	ڪلاس نشان x_i	$d_i = x_i - A$ $= x_i - 1250$	$u_i = \frac{d_i}{g}$	جھجھائي f_i	$f_i u_i$
0-1000	500	-750	-3	6	-18
1000-1500	1250 → A	0	0	24	0
1500 - 2000	1750	500	2	18	36
2000-3000	2500	1250	5	2	10
				$\sum f_i = 50$	$\sum f_i u_i = 28$

$$\bar{u} = \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} = \frac{28}{50} = 0.56,$$

$$\bar{u} g = 0.56 \times 250 = 140$$

$$\bar{X} = A + g \bar{u} = 1250 + 140 = 1390$$

∴ ڪنو ڪيل چندو سراسري 1390 رپيا آهي

مشغولي -

1. اهو مثال سڌي طريقي حل ڪريو.

2. مٿين مثال ۾ ڪڍيل سراسري مڃيل سراسري طريقي لھي ڇاچ ڪريو.

3. $A=1750$ ڪٽي مٿيون مثال حل ڪريو.

آپياس 6.1

1. ڏهين درجي جي 50 شاگردن جو روزانو آپياس ڪرڻ ۾ گذاريل ڪلاڪ ۽ شاگردن جو تعداد جو جهجهائي چڱرو ڏنل آهي ڪلاڪن جي سراسري سڌي طريقي لھو.

وقت (ڪلاڪن ۾)	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
شاگرد	7	18	12	10	3

2. هڪ هاءِ وي ٽول ناڪي تي صبح جو 6 کان شام جو 6 تائين جمع ٿيل ٽئڪس ۽ واهڻن جو انداز هيٺ جهجهائي چڱري ۾ ڏنل آهي مڃيل سراسري طريقي جمع ٽئڪس جي سراسري لھو.

جمع ٽئڪس (رپيا)	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800
واهن انداز	80	110	120	70	40

3. هڪ کير وڪرو ڪندڙ مرڪز تان 50 گراهڪن ۾ ورهايل کير (ليٽرن ۾) ان جو جهجهائي چڱرو هيٺ ڏنل آهي ته کير جو ليٽرن ۾ سڌي طريقي سراسري لھو.

کير ورهاست (ليٽرن ۾)	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
گراهڪ - انداز	17	13	10	7	3

4. باغ مالڪن ۽ نارنگين جي پيدائش جو جهجهائي چڱري مان مڃيل سراسري طريقو ڪم آڻي سراسري لھو.

اٽپادن (هزار رپين ۾)	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
باغ مالڪ انداز	20	25	15	10	10

5. هڪ ڪمپنيءَ ۾ 120 ڪم ڪندڙن ڏکار لاءِ رقم جمع ڪئي ان جي سراسري ڦيريل ڏاڪي طريقي لھو.

جمع رقم	0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500
ڪم ڪندڙ	35	28	32	15	10

6. هڪ ڪارخاني ۾ 150 مزدورن جي هفتيوار پگهار جي جهجهائي چڱري مان ڦيريل ڏاڪي وارو طريقو ڪم آڻي سراسري لھو.

هفتيوار پگهار	1000-2000	2000-3000	3000-4000	4000-5000
مزدور انداز	25	45	50	30



وگيان نماؤ لاء پاڻه وٺڻ لاء هڪ اسڪول مان 4 شاگرد، ٻه ڇوڪرا ۽ ٻه ڇوڪريون ٻن ڏينهن لاء ٻئي شهر ۾ ويا. رات جو روئي ڪٿي ڪائجي ڪم واري جڳهه کان هڪ ڪلوميٽر اندر 10 هوٽلون هيون. انهن هوٽلن جو اگهه وڌندڙ سلسلي ۾ ڏنل آهي.

500 ۽ 40, 45, 60, 65, 70, 80, 90, 100

$$\text{انهن اگهن جي سراسري} = 113 = \frac{1130}{10}$$

500 ر اگهه کي ڇڏي باقي اگهه 113 ر کان گهٽ هئا انڪري شاگردن وچون عدد سوچيو پهرين ڏينهن 70

ر ۽ ٻئي ڏينهن 80 ر اگهه واري روئي ڪاڏي گهٽيئي دفعا سراسري بدران وچون عدد واپرائبو آهي.

گذريل سال توهان اٺ گروهيڻ ڄاڻ مان وچون عدد (Madian) ڪڍڻ سکيا آهي.

• ڏنل ڪٽن کي وڌندڙ يا گهٽجندڙ سلسلي ۾ رکي وچ واري ڪٽ کي وچون عدد چئبو آهي.

• وچون عددن ڪٽن کي برابر ٻن حصن ۾ ورهائي ٿو.

• ڏنل ڪٽن $k_1 \leq k_2 \leq k_3 \dots \dots \leq k_n$

• ڪٽن جو عدد اڪي هوندو ته $\frac{n+1}{2}$ اهو وچون عدد ٿيندو ڇو ته $k_{\frac{n+1}{2}}$ کان اڳ ۽ پوءِ $\frac{n-1}{2}$ ايتريون ڪٽن هونديون. $n = 2m + 1$ ڪٽي ڇڏيو

• مليل ڪٽن n اهو ٻڌي آهي ته وچ واريون ٻه ڪٽن ڪٽي اُنجي سراسري وچون عدد ٿيندو ڇاڪاڻ ته

$$k \frac{n}{2} \text{ کان اڳ ۽ پوءِ } k \frac{n+2}{2} \text{ ايتريون ڪٽن هونديون } n = 2m \text{ ڪٽي ڇڏيو.}$$

• مطلب $\frac{n}{2}$ يا $\frac{n+2}{2}$ انهن جي سراسري وچون عدد ٿيندو.

مثال (1) 32, 33, 38, 40, 43, 48, 50 ڪٽن جو وچون عدد لھو انهن ڪٽن ۾ 40 وچون عدد آهي.

مثال (2) 61, 62, 65, 66, 68, 70, 74, 75 ۾ ڪل ڪٽن 8 يعني ٻڌي آهي ۽ 66 ۽ 68

$$\text{انھن انڪري وچون عدد } 67 = \frac{66+68}{2} \text{ آھي.}$$



گروھيل جھجھائي ورهاست جو وچون عدد (Median from classified frequency distribution)

ڪٽنون تمام گھڻيون هجن ته انهن کي گروھن ۾ ورهائي وچون عدد لھبو. آسان گورھيل جھجھائي ورهاست جو وچون عدد لھڻ سگھنداسين.

مثال 6, 8, 10.4, 11, 15.5, 12, 18 انهن جو وچون عدد لھو.

جھجھائي	ليڪا نشان	ڪلاس
2	II	6-10
2	II	11-15
1	I	16-20

جھجھائي	ليڪا نشان	ڪلاس
3	III	5.5-10.5
2	II	10.5-15.5
2	II	15.5-20.5

پھرين ڇجري ۾ 10.4 ۽ 15.5 اھي ٻه ڪٽنون شامل نه ڪيل آھن ڇو ته اھي 6-10, 11-15, 16-20 عدد

ڪنھن به ڪلاس ۾ نمائي نه ٿيون سگھجن

آسان کي ڪلاس لاڳيتا ٺاھڻ جي ڄاڻ آھي

. ان ڇجري ۾ ھيٺئين حد (Lower Limit) مان 0.5 ڪٽ ڪري ۽ مٿئين حد (Upper Limit) ۾ 0.5 جوڙ ڪري

ٻيو ڇجرو تيار ڪيو.

ان ۾ 15.5 اھا ڪٽ 15.5-20.5 ڪلاس ۾ شامل آھي. لاڳيتا ڪلاس بدلجڻ سان جھجھائي به بدلجي ٿي.

اھو ڌيان ۾ رکو



$$\text{مٿئين ڇجري ۾ 6-10 ڪلاس ۾ ڪلاس نشان} = \frac{6+10}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

$$\text{ساڳئي نموني 5.5-10.5 ان جو ڪلاس نشان} = \frac{5.5+10.5}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

مطلب ڪلاس جي رچنا بدلائڻ سان ڪلاس - نشان نه بدلجندو آھي اھو ڌيان ۾ رکو.

نمونو مثال

درجي ڏھين جي اڀياس امتحان ۾ 100 شاگردن جي مارڪن جو جھجھائي ڇجرو ھيٺ ڏنل آھي مارڪن جو وچون عدد لھو.

امتحان ۾ ڪنيل مارڪون	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
شاگردن جو تعداد	4	20	30	40	6

حل : $N = 100$

$\frac{N}{2} = 50$ مطلب 50 اهو وچون عدد آهي انڪري اهو عدد ڪهڙي ڪلاس ۾ اچي ٿو، اهو ٻولهڻو آهي انڪري مٿين حد کان گهٽ گڏيل جهجهائي ڪٿي پوندي انڪري ڇجري ۾ گڏيل جهجهائي (کان گهٽ) جو ڪالمر تيار ڪرڻو پوندو.

مارڪون ڪلاس	شاگرد جو انداز f_i	گڏيل جهجهائي کان گهٽ cf
0-20	4	4
20-40	20	24
40-60	30	54
60-80	40	94
80-100	6	100

ان ڇجري ۾

• $\frac{N}{2} = 50$ اهو عدد 40-60 ڪلاس ۾ آهي. جنهن ڪلاس ۾ وچون عدد هوندو آهي ان کي مڌيڪ ڪلاس چئبو آهي. اتي مڌيڪ ڪلاس (Median Class) 40-60 آهي.

• 40-60 ڪلاس ۾ هيٺين حد 40 ۽ اُنجي جهجهائي 30 آهي

• ان ڪلاس کان اڳ 24 ڪٽون 40 کان گهٽ آهي. 50 تائين بچيل $50 - 24 = 26$ ڪٽون (40-60) ان ڪلاس ۾ آهن. انڪري 50 جي ڪٽن جو انداز هيٺين نموني لهنداسين.

• ان ڪلاس ۾ ڪل 30 مان 26 ڪٽون 50 کان وڌيڪ ۽ پوءِ 20 ڪٽون آهن مطلب 50 اها ڪٽ 40 جي پيٽ ۾ $20 \times \frac{26}{30}$ اوڻ آهي.

$$40 + \frac{26}{30} \times 20 = 40 + \frac{52}{3} = 57\frac{1}{3}$$

انڪري $57\frac{1}{3}$ وچون عدد.

- سوتر روپ ۾ آسان هيٺين نموني لکندا

$$\text{وچون عدد} = L + \left[\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right] \times h$$

N = ڪل جهجهائي L = مڌيڪ ڪلاس جي هيٺين حد

f = مڌيڪ ڪلاس جي جهجهائي h = ڪلاس وڌي

cf = مڌيڪ ڪلاس کان اڳ ڪلاس جي گڏيل جهجهائي

$$\frac{N}{2} = 50, cf = 24, h = 20, f = 30, L = 40, \text{ مٿئين مثال ۾}$$

$$\begin{aligned} \text{وچون عدد} &= L + \left[\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right] \times h \quad \dots \dots \dots \text{سوتر} \\ &= 40 + \left(\frac{50 - 24}{30} \right) \times 20 \\ &= 40 + \frac{26 \times 20}{30} \\ &= 40 + 17 \frac{1}{3} \\ &= 57 \frac{1}{3} \end{aligned}$$

اهو ڏيان ۾ رکو



♦ وچون عدد لھو لاءِ لاڳيتا ڪلاس هئڻ گھرجن

♦ ڪٽنن جو آنداز وڏو هئڻ ڪري ڪلاس ٺاهي ڇڄرو تيار ڪرڻ گھرجي وچون عدد لھڻ لاءِ هيٺ ڏنل سوتر ڪر آڻجي

$$\text{وچون عدد} = L + \left[\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right] \times h$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) عام پبلڪ سڀوا ۾ 60 بسين جو هڪ ڏينهن ۾ ڪيل مفاصلي جو جهجهائي چڱرو ڏنل آهي. هڪ ڏينهن ڪيل مفاصلي جو وچون عدد لھو.

مفاصلو (ڪ.م)	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249
بسين جو آندازو	4	14	26	10	6

حل (1) ڪلاس لاڳيتا نه آهن. انڪري آهي لاڳيتا ڪرڻا پوندا.

هتي هڪ ڪلاس جي مٿين حد ۽ ٻئي ڪلاس جي هيٺين حد ۾ فرق آهي $10.5 = 1 \div 2$ هو ملهه هر هڪ ڪلاس ۾ مٿين حد مان ڪٽ ڪرڻ ۽ مٿين حد جو جوڙ ڪرڻ سان لاڳيتا ڪلاس تيار ڪيا. پوءِ کان گهٽ واري گڏيل جهجهائي ڪالهر تيار ڪبو.

ڏنل ڪلاس	لاڳيتا ڪلاس	جهجهائي f_i	گڏيل جهجهائي (ڪان گهٽ)
200-209	199.5-209.5	4	4
210-219	209.5-219.5	14	$18 \rightarrow cf$
220-229	219.5-229.5	$26 \rightarrow f$	44
230-239	229.5-239.5	10	54
240-249	239.5-249.5	6	60

هتي ڪل جهجهائي $\therefore \frac{N}{2} = 30$. $\therefore \sum f_i = N = 60$ هو وچون عدد 30 ڪٽ آهي.

پهريائين 18 ڪٽن 219.5 کان گهٽ ۽ بچيل $30 - 18 = 12$ آهي ڪٽن 219.5-229.5

ڪلاس ۾ آهن. انڪري هو مڌيڪ ڪلاس آهي.

219.5-229.5 ان ڪلاس جي گڏيل جهجهائي 44 آهي.

سوٽر موجب

$h = 10$ ڪلاس وٽي، $L = 219.5$ مڌيڪ ڪلاس جي هيٺين حد

$18 =$ مڌيڪ ڪلاس کان اڳ ڪلاس جي گڏيل جهجهائي cf

$26 =$ مڌيڪ ڪلاس جي جهجهائي f

$$\text{وچون عدد} = L + \left[\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right] \times h$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{وچون عدد} &= 219.5 + \left(\frac{30-18}{26} \right) \times 10 \\
 &= 219.5 + \left(\frac{12 \times 10}{26} \right) \\
 &= 219.50 + 4.62 \\
 &= 224.12
 \end{aligned}$$

بس جو هڪ ڏينهن مفاصلي جو وچون عدد = 224.12 ڪ م
 مثال (2) هيٺ ڇجري ۾ هڪ ڏينهن ميوزم ۾ ويل ماڻهن جي ڪمر ڏنل آهي. ماڻهن جي عمر جو وچون
 ٽپڪو لھو.

ماڻهن جو انداز	عمر (سال)
3	10 کان گھٽ
10	20 کان گھٽ
22	30 کان گھٽ
40	40 کان گھٽ
54	50 کان گھٽ
71	60 کان گھٽ

حل : هتي گڏيل جهجهائي (کان گھٽ) ڏنل آهي. سڀ کان پهريائين ڪلاس ٺاهڻا پوندا آسان ڪي ڄاڻ
 آهي ته گڏيل جهجهائي (کان گھٽ) اها ڪلاس جي مٿين ڪلاس تي آڌارت آهي. پهرين ڪلاس جي
 مٿين حد 0 آهي. انڪري پهرين ڪلاس 0-10 ٿيندو ۽ مٿين ڪلاس جي مٿين حد 20 آهي. انڪري ٻيو
 ڪلاس 10-20 ٿيندو ۽ اهڙي نموني 10 جو فرق کڻي ڪلاس تيار ڪيا آخرين ڪلاس 50-60 ٿيندو.

گڏيل جهجهائي (کان گھٽ)	ماڻهن جو انداز	ڪلاس	عمر (سال)
3	3	0-10	10 کان گھٽ
10	$10 - 3 = 7$	10-20	20 کان گھٽ
$22 \rightarrow cf$	$22 - 10 = 12$	20-30	30 کان گھٽ
40	$40 - 22 = 18 \rightarrow f$	30-40	40 کان گھٽ
54	$54 - 40 = 14$	40-50	50 کان گھٽ
71	$71 - 54 = 17$	50-60	60 کان گھٽ

$$10 = h \text{ ۽ } N = 71 \therefore \frac{N}{2} = 35.5 \text{ هتي}$$

$$cf = 22, L = 30, f = 18.$$

$$\begin{aligned} \text{وچون عدد} &= L + \left[\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right] \times h \\ &= 30 + (35.5 - 22) \frac{10}{18} \\ &= 30 + (13.5) \frac{10}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 30 + 7.5 \\ &= 37.5 \end{aligned}$$

∴ ماڻهن جي عمرن جو وچون عدد = 37.5 سال

آپياس 6.2

1. هيٺ ڇڄري ۾ هڪ سافٽ ويئر ڪمپني جي روزاني ڪمن جا ڪلاڪ ۽ اُهي ڪلاڪ عمر ڪندڙن جو آنداز ڏنل آهي. روزاني ڪلاڪن جو وچون ٽيڪو لھو.

ڪم (ڪلاڪن ۾)	8-10	10-12	12-14	14-16
ڪم ڪندڙن جو آنداز	150	500	300	50

2. هڪ باغ ۾ آڻين جا وڻ ۽ آڻين جو آنداز جھجھائي ڇڄري ۾ ڏنل آهي ته مليل ڄاڻ جو وچون عدد لھو.

آڻين جو آنداز	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
وڻن جو آنداز	33	30	90	80	17

3. ممبئي - پٽي تيز هاءِ وي (E-way) تي واهڻ تي ضابطو ڪرڻ لاءِ پوليس طرفان سروي ڪئي ويئي ان سروي موجب هيٺين ڄاڻ حاصل ٿي. ان ڄاڻ جو وچون ٽيڪو لھو.

رفتار ڪم	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
ڪلاڪ واهڻ جو آنداز	10	34	55	85	10	6

4. جدا جدا ڪارخانن ۾ ڏيئڻ جو اُتپادن (هزارن ۾) ڏنل آهي اُتپادن جو وچون ٽپڪو لھو.

ڏيئڻا (هزارن ۾)	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ڪارخانا	12	35	20	15	8	7	8

ڄاڻي وٺون



گروھيل جھجھائي ورھاست مان ڍنگم (Mode from classified frequency distribution)

ڏنل ڪٽن مان وڌيڪ وڌيڪ دفعا اچڻ واري ڪٽ مطلب اُن گروھ جو ڍنگم (Mode) ھوندو آھي اھا آسان ڪي ڄاڻ آھي. مثال بہ ڦيٽي اُتپادڪ ڪمپني جدا جدا رنگن جو گاڏيون تيار ڪري ٿي. ڪھڙي رنگ جي وڌيڪ ڊمانڊ آھي، اھو ڄاڻڻ ڪمپنيءَ لاءِ ضروري آھي. اھڙي نموني جدا جدا شين جي لاءِ اُتپادن ڪندڙن ڪي جنھن شيء جو واھپو يا گھرج وڌيڪ آھي، اھا وڌيڪ ٺاھڻي پوندي ان وڌيڪ واري ڪٽ ڪي ڍنگم چئبو آھي.

آسان اڻ گروھيل جھجھائيءَ مان ڍنگم ڪڍڻ سکيا آھيون ھاڻي آسان گروھيل جھجھائي ورھاست مان ڍنگم ڪيئن لھجي، اھو فارمولا ڪم آڻي سگھنداسين.

$$\text{ڍنگم سوتر ۾} = L + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right] \times h$$

ڍنگم ڪلاس جي ھيٺين حد، L ، ڍنگم سوتر ۾

f_1 = ڍنگم ڪلاس جي جھجھائي

f_0 = ڍنگم ڪلاس جي مٿئين ڪلاس جي جھجھائي

f_2 = ڍنگم ڪلاس جي ھيٺين ڪلاس جي جھجھائي

h = ڪلاس جي وڌي.

ھن سوتر جو استعمال ڪري اندازي ڍنگم ھن مثال مان سگھنداسين.

حل ڪيل مثال

مثال (1) هيٺ جهجهائي ورهاست ۾ ميدان تي راند ڪندڙن ۽ اُنهن جي عمر گروهه ڏنل آهي ته راند ڪندڙ ٻارن جي عمر ڍنگهه لھو.

عمر (سالن ۾)	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16
ٻارن جو آنداز	43	$58 \rightarrow f_0$	$70 \rightarrow f_1$	$42 \rightarrow f_2$	27

مٿئين چچري ۾ 10-12 عمر گروهه ۾ شاعردن جو آنداز وڌو آهي.

حل : هتي $f_1 = 70$ مطلب 10-12 ۾ اهو ڍنگهه ڪلاس آهي.

∴ ڏنل مثال ۾

$$L = \text{ڍنگهه ڪلاس جي هيٺين حد} = 10$$

$$h = \text{ڪلاس وڌي} = 2$$

$$f_1 = \text{ڍنگهه ڪلاس جي جهجهائي} = 70$$

$$f_0 = \text{ڍنگهه ڪلاس اڳ ۾ جهجهائي} = 58$$

$$f_2 = \text{ڍنگهه ڪلاس پوءِ ڪلاس جهجهائي} = 42$$

$$\begin{aligned}
 \text{ڍنگهه} &= L + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right] \times h \\
 &= 10 + \left[\frac{70 - 58}{2(70) - 58 - 42} \right] \times 2 \\
 &= 10 + \left[\frac{12}{140 - 100} \right] \times 2 \\
 &= 10 + \left[\frac{12}{40} \right] \times 2 \\
 &= 10 + \frac{24}{40} \\
 &= 10 + 0.6 \\
 &= 10.6
 \end{aligned}$$

∴ راند ڪندڙ ٻارن جي عمر جو ڍنگهه = 10.6 سال

مثال (2) هيٺ جهجهائي ورهاست چجري ۾ هڪ پيٽرول پمپ تي پيٽرول ڀرڻ لاءِ واهڻن جو تعداد ۽ پيٽرول جي ڄاڻ ڏنل آهي. پيٽرول جي گنجائش جو ڏينءَ لھو.

پيٽرول (ليٽر)	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
واھڻن جو تعداد	33	40	27	18	12

حل : ڪلاس لاڳيتا نه آهن انڪري پھريان ڪلاس لاڳيتا ڪرڻا پوندا آھڙي نموني چچرو تيار ڪندا سين.

ڪلاس	حقيقي حد	جهجهائي
1-3	0.5-3.5	$33 \rightarrow f_0$
4-6	3.5-6.5	$40 \rightarrow f_1$
7-9	6.5-9.5	$27 \rightarrow f_2$
10-12	9.5-12.5	18
13-15	12.5-15.5	12

هتي $f_1 =$ ڏينءَ ڪلاس = 40، ڏينءَ 3.5-6.5

$$\text{ڏينءَ} = L + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right] \times h$$

$$\text{ڏينءَ} = 3.5 + \left[\frac{40 - 33}{2(40) - 33 - 27} \right] \times h$$

$$= 3.5 + \left[\frac{7}{80 - 60} \right] \times 3$$

$$= 3.5 + \frac{21}{20}$$

$$= 3.5 + 1.05$$

$$= 4.55$$

∴ واهڻن ۾ ڀريل پيٽرول جي گنجائش جو ڏينءَ = 4.55 ليٽر

آپياس 6.3

1. هڪ ڪير گڏ ڪندڙ مرڪز تي گڏيل ڪيل ٿانءِ جو ڪير ۽ لئڪٽوهرٽر وسيلي ماپيل ملائي هيٺ ڏنل چچري ۾ ڏنل آهي ملائيءَ جو ڍنگهه لھو.

ملائي (%)	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7
ڪير ليٽرن ۾	30	70	80	60	20

2. ڪن ڪٽنبن جو ماهوار بجلي واهپو هٿ چچري ۾ ڏنل آهي. بجلي واهپو جو ڍنگهه لھو.

بجلي (يونٽ)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
ڪٽنب	13	50	70	100	80	17

3. چانهه جي 100 هوٽلن ۾ ڪير ۽ هوٽلن جو تعداد هيٺ ڏنل آهي ڪير جو ڍنگهه لھو.

ڪير ليٽر	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11	11-13
هوٽلون	7	5	15	20	35	18

4. هيٺ جھجھائي چچري ۾ 200 مريضن جي عمر ۽ علاج ڪرائيندڙن جي عمر ڏنل آهي. عمر جو ڍنگهه لھو.

عمر (سال)	5 کان گھٽ	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
مريضن کان ڪٽڻ	38	32	50	36	24	20

مشغولي :-

- پنهنجي ڪلاس ۾ 20 شاگردن جي وزن جي سراسري لھو.
- ڪلاس ۾ ڇوڪرن جي شرٽ جي ماپ جو ڍنگهه لھو.
- هر هڪ شاگرد جو هڪ منٽ ۾ دل جي دڙ ڪن ماپي، اُن ماپ جو ڍنگهه لھو.
- ڪلاس ۾ هر هڪ شاگرد جي اوچائي لھو اُنهن جو وچون عدد لھو.



مرڪزي رخ ۾ آسان سراسري، وچون عدد ۽ ڊنگه بابت آڀياس ڪيو. ان ڪري مرڪزي رخ ۾ آسان کي ڇا لهڻ گهرجي، ان جي آسان کي ڄاڻ هئڻ گهرجي.


سمجھو ته هڪ اسڪول ۾ ڏهين درجي جا 5 ڪلاس آهن انهن پنجن ڪلاس مان ڪهڙو ڪلاس سٺو آهي. انڪري آسان کي امتحان ۾ ڪنيل مارڪن جي سراسري ڪڍڻي پوندي.

ڪنهن ڪلاس ۾ مارڪن جي آڌار تي شاگردن جا ٻه گروهه ڪري، مارڪن جو وچون عدد لهڻ صحيح ٿيندو. ڇاڪ تيار ڪرڻ وقت اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته ڪهڙي رنگ جو ڇاڪ مارڪيٽ ۾ وڌيڪ دمانڊ وارو آهي، ان لاءِ آسان کي ڊنگه لهڻ گهرجي.

عددي ڄاڻ جي شڪلي پيشڪش (Pictorial representation of statistical data)


عددي ڄاڻ مان سراسري وچون عدد ۽ ڊنگه انهن مان يا ڄاڻ جو چيد ڪرڻ سان خاص نتيجا ڪڍي سگهجن ٿا.

عددي ڄاڻ کي هڪ خاص روپ، چجري ۾ بدلائڻ جو طريقو آسان سڀي ڇڪا آهيون پر چجري مان سڌو نتيجو ڪڍڻ ممڪن نه آهي عام ماڻهن کي نتيجو سمجھ ۾ اچي، ان لاءِ جدا جدا روپ ڪم آڻيا آهن. انهن جو استعمال آرٽ شاستر، راندين جي ڄاڻ وغيره ۾ ٿئي ٿو.



جاڻ جي پيش ڪش (Presentation of Data)

چتر روپ ۽ گراف اِهي جاڻ جي پيش ڪش ڪرڻ جا ماڌير آهن ان جو وڻ چارٽ (Tree Chart) هيٺ ڏنل آهي.



گذريل سال اسان ڪجهه گراف ۽ ٻيا طريقا سکيا آهين هاڻي اسان هستو گرام، جهڙائي، گهٽڪندو ۽ گول گراف سکنداسين

فلورينس ناٽينگل (1820-1910)



هن بهادر عورت کي اُتم ۽ مقصد شرڏا دوت ڪري سڃاتو وڃي ٿو. سيمين لڙائيءَ ۾ ڪيترن ئي زخمي سولجرن جي سبوا ڪري انهن جي جان بچائي. عدد شاستر ۾ فلورينس بنيادي ڪم ڪيو آهي. سپاهين جي حالت انهن جو ڪيل علاج، ۽ انهن جو اُپيوگ اِهي سڀ باقاعدي درج ڪري، خاص نتيجا ڪڍيا.

سپاهين جو موت زخمن کان وڌيڪ ٿايفائڊ، ڪالرا ڪري ٿيو. انهن بيمارين جا ڪارڻ پسگردائيءَ جي گندگي، پيئڻ جو پاڻي غلاظتن وارو، مريضن جي گهڻي تعداد ۾ گڏ ميڙ ۾ رهڻ وغيره هئا. انهن ڪارڻن کي سمجهي فلورينس چارٽ جهڙا گراف تيار ڪيا. برابر صفائي ۽ صحت جا نيم سمجهي، سپاهين جو موت اڳهه گهٽايو. انجا نتيجا جهڙوڪ شهر جي صفائي، صحیح نيڪال شرطن، صاف پيئڻ جو پاڻي اِهي نگر پالڪا مڃيا. ڪيترن ئي سروي جاچن مان درج ڪيل نيم، عددن جي آڌار تي درج ڪيا ويا جيڪي مددگار ٿيا اِهو فلورينس جي ڪمن ۾ نظر آيو.



هستوگرام ڪيڊ لاءِ هڪ مثال سمجھي ونون


Histogram : هستوگرام

مثال : هيٺ خاڪي ۾ جدا جدا ڪمپنين جي مڇڻل فنڊ جي هڪ يونٽ جو نيٽ ملهه (Net asset Value) مليل آهي. اُن جو هستوگرام ڪڍو.

نيٽ ملهه ر (NAV)	8-9	10-11	12-13	14-15	16-17
مڇڻل فنڊ جو تعداد	20	40	30	25	15

حل :- چچري جا ڪلاس لاڳيتا نه آهن پھريائين ڪلاس لاڳيتا ڪرڻا پوندا.

وڌايل ڪلاس	7.5-9.5	9.5-11.5	11.5-13.5	13.5-15.5	15.5-17.5
جهجھائي	20	40	30	25	15



شکل 6.1

هستوگرام ڪيڊ جي مشغولي

- (1) سڀ ڪلاس لاڳيتا ڪرڻ گھرجن انهن کي وڌايل ڪلاس (Extended Class Intervals) چئجي ٿو.
- (2) اهي ڪلاس محور -X تي مناسب پيمانو کڻي ڏيکارس.
- (3) محور -Y تي جهجھائي مناسب پيمانو کڻي ڏيکارس.
- (4) محور -X تي وڌايل ڪلاس اهو پايو کڻي مستطيل ڪڍبو ان جي اوچائي جهجھائي تائين هئڻ گھرجي.

ڌيان ۾ رکو

محور X تي منڊ ٽپڪو ۽ پهريون ڪلاس وچ ۾ — نشان آهي. ان کي ڪرنڪ نشان (Krink Mark) چئبو آهي. ان جو مطلب آهي ته منڊ ٽپڪي کان پهرين ڪلاس تائين ڪابه جهجهائي نه آهي. محور X کي سسائڻ ڪري اهو نشان آهن ضرورت انوسار محور Y تي پڻ اهو نشان ڪڍي سگهجي ٿو.

اڀياس 6.4

1. هيٺ ڏنل ڄاڻ هسٽوگرام وسيلي ڏيکاريو

شاگردن جي اوچائي (س م)	135-140	140-145	145-150	150-155
شاگردن جو انداز	4	12	16	8

2. هيٺ جوئر جي پيداوار هيڪٽرن ۾ ڏنل آهي ان جو هسٽوگرام ڪڍو

جوئر (ڪٽڻال) هيڪٽر	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
ڪسانن جو انداز	30	50	55	40	20

3. هيٺ چجري ۾ 210 ڪٽنبن جي سالياني سيڙپ ڏنل آهي. ان جو هسٽوگرام ڪڍو.

سيڙپ (هزارن ۾)	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
ڪٽنب جو انداز	30	50	60	55	15

4. هيٺ شاگردن جو امتحان جي پڙهائي لاءِ ڏنل منٽ جي ڄاڻ آهي ان جو هسٽوگرام ڪڍو.

وقت (منٽن ۾)	60-80	80-100	100-120	120-140	140-160
شاگردن جو انداز	14	20	24	22	16

ڄاڻي وٺون




جهجهائي گهٽڪندو (Frequency polygon)

جهجهائي چجري ۾ جدا جدا ڄاڻ ڏيکاري سگهجي ٿي. اسان هسٽوگرام جو اڀياس ڪيو ٻيو قسم

”جهجهائي گهٽڪندو آهي“ جهجهائي گهٽڪندو ڪيڏل لاءِ ٻه طريقا اڀياس ڪندا سين

(1) هسٽوگرام جي مدد سان (2) بنا هسٽوگرام جي

(1) شڪل 6.1 مثال ڪم آڻي اسان جهجهائي گهٽڪندو ڪيڏل سکندا سين.




شکل 6.2

1. هستوگرام ۾ هر هڪ مستطيل جي مٿئين پاسي جو مڌيم - ٽپڪو لھو.
 2. پھرين مستطيل کان آڳڻه بڙي ڏيگھه وارو مستطيل آھي. ان جو به مڌيم ٽپڪو لھند اسين اھي X -محور تي ٿي ھوندو.
 2. سڀ مڌيم ٽپڪا ھڪ ليڪ وسيلي ملائيند اسين
 3. آخري مستطيل کان پوءِ بڙي ڏيگھه وارو مستطيل جو مڌيم ٽپڪو .. ليڪ سان ملائيند اسين.
- ھڪ محدود شڪل ٿيندو جھجھائي گھڻڪندو.
- (2) هستوگرام جي مدد بنا جھجھائي گھڻڪندو ڪيڏل لاءِ ٽپڪن جا مساوا مقرر ڪندا اسين اھو ھيٺ ڏنل چجري مان سمجھي وٺو.


ٽپڪي جا مساوا	جھجھائي	کلاس - نشان	لاڳيتا کلاس	کلاس
$(6.5, 0)$	0	6.5	5.5 - 7.5	6 - 7
$(8.5, 20)$	20	8.5	7.5 - 9.5	8 - 9
$(10.5, 40)$	40	10.5	9.5 - 11.5	10 - 11
$(12.5, 30)$	30	12.5	11.5 - 13.5	12 - 13
$(14.5, 25)$	25	14.5	13.5 - 15.5	14 - 15
$(16.5, 15)$	15	16.5	15.5 - 17.5	16 - 17
$(18.5, 0)$	0	18.5	17.5 - 19.5	18 - 19

چجري جي پنجن ٽنڀي ۾ مليل ٽپڪن جا مساوا گراف پني تي ڪڍيا. اھي سلسلي ۾ ملائڻ سان جھجھائي گھڻڪندو ملندو. اھو شڪل 6.3 ۾ ڏيکاريل آھي.



شكل 6.3

حل ڪيل مثال



شكل 6.4

مثال (1) پرواري شكل ۾ هڪ جهجهائي گهٽڪندو
ڏنل آهي اُن جي آڌار تي سوالن جا جواب ڏيو.
جهجهائي

- (1) 50-60 کلاس جي جهجهائي لکو
- (2) ڪهڙي کلاس جي جهجهائي 14 آهي؟
- (3) 55 اهو ڪهڙي کلاس جو مڌي ٿيڪو آهي؟
- (4) ڪهڙي کلاس جي جهجهائي وڌيڪ آهي؟
- (5) ٻڌي جهجهائيءَ وارا کلاس لکو.

حل :

1. 50-60 ڪلاس جو مڌيم ٽپڪو 55 آهي ۽ ان نشان تي Y-محور وٽ اوچائي ڏسبي ته اها 10 آهي 60-50 ڪلاس جي جهجهائي 10 آهي .

2. Y-محور تي 14 اهو جهجهائي نشان ڏنو ان ٽپڪي کان X-محور تي گروهه ڏسو ته اهو 20-30 ڪلاس آهي مطلب 20-30 ڪلاس جي جهجهائي 14 آهي .

3. 55 اهو ڪلاس 50-60 جو مڌيم ٽپڪو آهي .

4. سڀ کان اوچي ۾ اوچو ٽپڪو گهٽڪندي تي ڏسو اهو ڪلاس 30-40 ۾ ملي ٿو. مطلب 50-40 ڪلاس جي جهجهائي وڌيڪ آهي .


5. 0 جهجهائيءَ وارا ڪلاس آهن 0-10 ۽ 60-70

مثال (2) هيٺ ڏنل چجري ۾ ٻارن جو وزن ۽ تعداد ڏنل آهي . ان جهجهائيءَ جو گهٽڪندو لھو.

وزن (ڪ.گم)	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
ٻارن جو تعداد	4	13	15	25	17	6

جهجهائي گهٽڪندو ڪيٽ لاءِ هيٺ ڏنل چجرو تيار ڪيو.


ڪلاس	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
ڪلاس نشان	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5
جهجهائي	4	13	15	19	17	6
ٽپڪن جا مساوا	(18.5, 4)	(19.5, 13)	(20.5, 15)	(21.5, 19)	(22.5, 17)	(23.5, 6)



شڪل 6.5

اڀياس 6.5

1. پرواري شڪل ۾ گهڻڪنڊو ڄاڇي سوالن جا جواب لکو.



شڪل 6.6

- وڌ ڀر وڌ مارڪون ڪٿندڙ شاگردن جو ڪهڙو ڪلاس؟
- ٻڙي جهجهائي وارا ڪلاس لکو.
- 50 شاگردن واري ڪلاس جو مڌيہ ٽيڪو ڪهڙو؟
- ڪلاس ٽيڪو 85 جي ڪلاس جي هيٺن حد ۽ مٿين حد لکو.
- 80-90 مارڪون ڪٿندڙ گهڻا شاگرد؟

2. هيٺ ڏنل ڄاڻ موجب جهجهائي گهڻڪنڊو

بجلي بل (رپيا)	0-200	200-400	400-600	600-800	800-1000
ڪٽنب	240	300	450	350	160


3. هڪ امتحان ۾ ظاهر نتيجي جي ڄاڻ هيٺ چڱري ۾ ڏنل آهي ان ڄاڻ تي جهجهائي گهڻڪنڊو ڪڍو.

نتيجو (سيڪڙو)	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
شاگردن جو	7	33	45	65	47	18	5




ٻاءُ شڪل (گول گراف) (Pie diagram)

گذريل سال آسان جاگرافي ۽ سائنس ۾ هيٺ ڏنل گراف بابت سکيا آهيون اهڙي گراف کي گول گراف چئبو آهي.




(ڌرتيءَ تي زمين پاڻيءَ جو ريشو)



(هوا ۾ گئس جو ريشو)

شڪل 6.7



شڪل 6.8

گول گراف ۾ عددي جاڳ سڄي گول ۾ ڏيکارجي ٿي. جاڳ جي جدا جدا حصن کي گول جي قطاع دائرن وسيلي ڏيکارجي ٿو.

شڪل 6.8 ۾ گول جو مرڪز O آهي.


OA ۽ OB اهي نيم قطر آهن.

$\angle AOB$ مرڪزي ڪنڊ آهي.

O-AXB اهو قطاع دائر هم (Sector Of a circle) آهي.



پاءِ شڪل پڙهڻ Reading of Pie diagram




شڪل 6.9

گول گراف مان سڌي ڄاڻ ڪيئن ملندي آهي. اهو مثال وسيلي سمجهندا سڀين

مثال (1) 10 درجي جي 120 ٻارن کان 'توهان کي ڪهڙي راند وٺندي آهي' سوال پڇيو ويو اها ڄاڻ گول گراف وسيلي ڏيکاريل آهي. سڀ کان وڌيڪ ڪهڙي راند وٺندڙ آهي؟

ڪو-ڪو راند ڪيترو سيڪڙو ٻار پسند ڪن ٿا ڪبڙي پسند ڪندڙ ٻارن جو ڪيترو انهن سوالن جا جواب آساني هڪ نظر سان ملن ٿا هڪ ٻيو به گول گراف جو مثال ڏسون.



شڪل 6.10

پير واري شڪل ۾ هڪ اسڪول جي سالياني مالي - يوجنا ڏنل آهي. ان مان آسان سمجهون ٿا ته

- 45% سيڪڙو رقم تعليمي سامان لاءِ رکيل آهي.
- 35% سيڪڙو راندين جي سامان لاءِ رقم بچايل آهي.
- 10% سيڪڙو رقم پسگردائيءَ لاءِ رکيل آهي.
- 10% سيڪڙو رقم صفائي لاءِ رکيل آهي.


اهڙي نموني هڪ نظر ۾ آسان کي گول گراف مان ڄاڻ ملي

پاءِ شڪل (گول گراف) پڙهڻ اخبارن ۾ ڪيترائي دفعا جدا جدا خبرون جيئن سالياني بجيٽ، آلمپڪ راندين ۾ جدا جدا ديشن جي حاصلات، ديش جو پئسو ڪيئن اچي ٿو، ڪيئن وڃي ٿو وغيرهه انڪري آسان پاءِ شڪل ڪيئن پڙهڻ گهرجي، اهو سکندا سڀين.

نمونو مثال :

هڪ سروبي ۾ ماهر ڪاريگرن جي ڄاڻ هيٺ ڀاءُ شڪل ۾ ڏنل اُتپادن ۾ لڳل ڪل 4500 ماڻهو آهن هيٺ سوالن جا جواب لکو.

- (i) سڀني ڪيترن ۾ ڪل ڪيترا ماڻهو آهن؟
 (ii) گهر آڏاوت ۾ ڪم ڪندڙن جو انداز لھو.
 (iii) ڪيتي ڪم ۾ لڳل ڪيترا ماڻهو؟
 (iv) اُتپادن ۽ گهر آڏاوت ۾ ڪم ڪندڙن ۾ ڪيترو تفاوت؟



شڪل 6.11

حل (1) سمجهو سڀني ڪيترن ۾ ڪل ڪم ڪندڙن جو انداز x آهي.

$$\therefore x \text{ انگري } = 360^\circ \text{ لاءِ}$$

$$360 \times \frac{\text{اُتپادن ڪندڙ ماڻهو}}{\text{مرڪزي ڪنڊ}} = \frac{\text{ڪل ماڻهو}}{\text{مرڪزي ڪنڊ}}$$

$$90 = \frac{4500}{x} \times 360$$

$$\therefore x = 18000$$

$\therefore$ سڀني ڪيترن ۾ ڪم ڪندڙ ڪل ماڻهو = 18000

(ii) گهر آڏاوت ۾ ڪم ڪندڙن جي مرڪزي ڪنڊ 72° سيڪڙو آهي

$$360 \times \frac{\text{گهر آڏاوت ڪم ڪندڙ}}{18000} = 72$$

$$\therefore \text{گهر آڏاوت ڪم ڪندڙ} = \frac{72 \times 18000}{360}$$

$$= 3600 \text{ گهر آڏاوت ڪم ڪندڙ آهن}$$

(iii) ڪيتي ۾ ڪم ڪندڙ 24° آهي

$$24 = \frac{\text{اُتپادن ڪندڙ ماڻهو}}{\text{ڪيتي ۾ ڪم ڪندڙ}} \times 360$$

$$24 = \frac{\text{اُتپادن ڪندڙ ماڻهو}}{18000} \times 360$$

$$\therefore \frac{24 \times 18000}{360} = \text{ڪيتي ۾ ڪم ڪندڙ آهي}$$

$$1200 =$$

(iv) سمجھو اُتيادڻ ۽ گهر آڏاوت ۾ ڪم ڪندڙن ۾ تفاوت Q آهي $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$

$$360 \times \frac{\text{ٻنهي ڪيترن جي ماڻهن ۾ فرق}}{\text{ڪل ماڻهو}} = \frac{18}{360} = \frac{P}{18000}$$

= ٻنهي جي مرڪزي ڪنڊن ۾ تفاوت

$$\begin{aligned} & \frac{\text{ٻنهي ڪيترن جي ماڻهن ۾ فرق}}{18000} \times 360 \\ &= \frac{18 \times 360}{18000} \\ &= 0.36 \\ &= 36\% \end{aligned}$$

فرق = 900

اهو ڏيان ۾ رکو



- مليل ڄاڻ جا حصا هميشه گول جي قاطع دائرن ۾ پيش ڪبا آهن.
- مرڪزي ڪنڊ. اُن نسبتتي حصي سان خاص ريشي ۾ هوندي آهي.
- مرڪزي ڪنڊ جي ماپ $(\theta) = 360^\circ \times \frac{\text{چونڊيل حصو}}{\text{ڪل حصا}}$
- مناسب نيم قطر کڻي گول ڪڍبو آهي برابر مرڪزي ڪنڊ کڻي، گول کي ماپ اَنوسار قاطع دائرن ۾ ورهائبو آهي.

ڄاڻي وٺون



پاءَ شڪل ڪڍڻ (To draw Pie diagram)

1. ڪڍيل پاءَ شڪل تان ڄاڻ ڪيئن حاصل ڪجي اهو اسان ڏٺو. هاڻي پاءَ شڪل ڪيئن ڪڍجي اهو ڏسنداسين.
2. پاءَ شڪل ڪڍڻ وقت گول کي برابر ماپ اَنوسار قاطع دائرن ۾ ورهائبو آهي.
- هر هڪ سيڪٽر لاءِ مرڪزي ڪنڊ ڪڍڻ گهرجي

$$\text{مرڪزي ڪنڊ } \theta = 360^\circ \times \frac{\text{حصي جو تعداد}}{\text{ڪل تعداد}}$$

مناسب نيم قطر کڻي گول کي برابر ماپ سيڪٽرن ۾ ورهائجي. هڪ مثال جي آڌار تي اسان پاءَ شڪل ڪڍڻ سمجهنداسين.

پاءَ شڪل ڪڍڻ جي مشغولي هيٺ ڏنل مثال ذريعي سمجهي وٺنداسين.

حل ڪيل مثال

نمونو مثال (1) هڪ ٻه ڦيٽي ٽاڙي جي دڪان تان جدا جدا رنگن ۾ ٽاڙي جو وڪرو هيٺ ڏنل آهي اها ڄاڻ پاءِ
شڪل ڪيڊ لاءِ هر هڪ رنگ جي مرڪزي ڪنڊ لھو.

مرڪزي ڪنڊ	گهرج	رنگ
$\frac{10}{36} \times 360^\circ = 100^\circ$	10	اچو
$\frac{9}{36} \times 360^\circ = 90^\circ$	9	ڪارو
60°	6	نيرو
70°	7	ٽاڳيري
40°	4	ٻاڙهو
360°	36	ڪل

حل : ٻه ڦيٽي ٽاڙي جي ڪل گهرج 36 آهي.

انهن مان 10 ٽاڙي اچي رنگن جون آهن.


$$\begin{aligned} \text{اچي رنگ جي} &= \frac{\text{ٽاڙي جو تعداد}}{\text{ڪل ٽاڙيون}} \times 360 \\ &= \frac{10}{36} \times 360 = 100 \end{aligned}$$

اهڙي نموني سوتر ڪم آڻي ٻين رنگن جي ٽاڙي
جون نسبتي مرڪزي ڪنڊون لهنداسين.

نمونو مثال (2) هڪ ٻوٽ ۾ جدا جدا جڳهين تي بجلي رسد هيٺ چڱري ۾ ڏنل آهن پاءِ شڪل ڪيو

جڳهه	ڪارخانا	گهر	رستا	دڪان	آفيسون	ٻيا
بجلي رسد (هزار يونٽ)	24	14	7	5	6	4

حل : ڪل بجلي رسد 60 هزار يونٽ آهي ان مان پهرين مرڪزي ڪنڊون لهنداسين



شڪل 6.12

مرڪزي ڪنڊ	يونٽ	بجلي رسد
$\frac{24}{60} \times 360 = 144^\circ$	24	ڪارخانا
$\frac{14}{60} \times 360 = 84^\circ$	14	گهر
$\frac{7}{60} \times 360 = 42^\circ$	7	رستا
$\frac{5}{60} \times 360 = 30^\circ$	5	دڪان
$\frac{6}{60} \times 360 = 36^\circ$	6	آفيسون
$\frac{4}{60} \times 360 = 24^\circ$	4	ٻيا
360°	60	ڪل

پاءِ شکل کیط جا ڈاکا :

(1) پهريائين ٻول ۾ هڪ نيم قطر ڪڍي، پوءِ ٻيا نيم قطر، ڇڄري موجب ڪڍيا، مرڪزي ڪنڊون (24° ، 36° ، 30° ، 42° ، 84° ، 144°) اهي ڪنڊون ڪٽي گهڙيال جي ڪانٽن طرف ڪڍيا. سيڪٽر هڪ تان پوءِ ٻيو ڪڍو.

(2) هر هڪ سيڪٽر ۾ نالا ۽ ماپ لکبي .

مشغولي :

هڪ ڪٽنب جو جدا جدا اسمن تي ٽيندڙ ماهوار خرچ ڏنل آهي پاءِ شڪل ڪڍو

مرکزي ڪنڊ	خرچ سيڪڙو	اِسَر
$\frac{40}{100} \times 360 = \boxed{}$	40	اناڄ
$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$	20	ڪپڙا
$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$	15	مسواڙ
$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$	20	تعليم
$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$	05	ٻيا خرچ
360°	100	ڪل

آپياس 6.6

1. هڪ رت دان ڪئمپ ۾ 200 ماڻهن جدا جدا عمر گروھ وارن رت دان ڪيو. اُن تي پاءُ شڪل ڪڍو.

عمر گروہ	20-25	25-30	30-35	35-40
ماٹھن جو انداز	80	60	35	25

2. هڪ شاگرد جون جدا جدا وشين مان گذريل مارڪون هيٺ ڏنل آهن. اها ڄاڻ پاءِ شڪل وسيلي ڏيکاريو.

هندي	اتِھاس	حساب	سائنس	مراني	انگريزي	وشيہ
50	60	90	80	70	50	مارڪون

3. ٻوٽا پوکڻ ڪاريم ڪرم ۾ جدا جدا ڪلاس ۾ پڙهندڙ شاگردن هيٺ ڏنل چجري موجب ٻوٽا لڳايا. اها جاڻ پاءِ شڪل وسيلي ڏيکاريو.


درجو	5	6	7	8	9	10
ٻوٽن جو آنداز	40	50	75	50	70	75

4. هڪ ميوا وڪندڙ وٽ گهرج انوسار سيڪڙي ۾ ميوا. اها جاڻ چجري ۾ ڏنل آهي. پاءِ شڪل ڪڍو.


نارنگي	چڪون	صوف	موسمبي	آنب	ميوا
10	20	25	15	30	گهرج (سيڪڙي ۾)

5. هڪ ٻوٽ ۾ جدا جدا هنرن ۾ ڪم ڪندڙن جي جاڻ سيڪڙي ۾ ڏنل آهي پاءِ شڪل جاچي جاچي سوالن جا جواب ڏيو.

1. ماڻهو 10000 آهن ته آڏاوت ۽ ڪيترا ماڻهو ڪم ڪندڙ آهن؟
- (2) پرشاسن ۾ ڪيترا ماڻهو ڪم ڪندڙ آهن؟
- (3) اُٺپادن ۾ ڪيترو سيڪڙو ڪم ڪندڙ آهن.



شڪل 6.13



شڪل 6.14

6. هڪ ڪٽنب جي سالياني سيڙپ، پاءِ شڪل ۾ ڏيکاريل آهي ته
 - (i) شيئرس ۾ سيڙپ 2000 ر ته ڪل سيڙپ ڪيتري؟
 - (ii) بئنڪ جي سيڙپ ڪيتري؟
 - (iii) مچئل فنڊ ۾ شيئرس کان وڌيڪ ڪيتري رقم؟
 - (iv) پوسٽ ۾ ڪيتري سيڙپ؟

گڏيل آڀياس 6

1. گھڻ متبدل سوالن جا جواب چونڊي لکو
(1) O - گروهر رت ڏيندڙ 40° آهن ته اُنجي مرڪزي ڪنڊ ڪيتري؟

- (A) 114° (B) 140° (C) 104° (D) 144°

(2) عمارت جي اڏاوت جي جدا جدا خرچن حساب ۾ ڀاءُ شڪل ۾، سيمينٽ جي مرڪزي کنڊ 75° ۽ خرچ 45000 ر آهي ته ڪل خرچ

- (A) 2,16,000 (B) 3,60,000 (C) 4,50,000 (D) 7,50,000

(3) گروھیل جھجھائي چڙجي ۾ گڏيل جھجھائيءَ جو استعمال لھڻ لاءِ ڪبو آھي.

- (A) سراسري (B) وچون عدد (C) ڊينگه (D) اهي سڀ

$$\overline{X} = A + \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \times g \quad (4) \text{ گروھیل جھجھائي چڙھي ۾ سراسري لھڻ جي فارمولا}$$

- $$(A) \quad \frac{x_i + A}{g} \quad (B) \quad (x_i - A) \quad (C) \quad \frac{x_i - A}{g} \quad (D) \quad \frac{A - x_i}{g}$$

هڪ ليٽر ۾ مفاصلو	12-14	14-16	16-18	18-20
موٽرن جو آنداز	11	12	20	7

(5)

متئين ڇڄري ۾ موٽر جو مائليج جي سراسري ... ڪلاس ۾ آهي

- (A) 12-14 (B) 14-16 (C) 16-18 (D) 18-20

هرهك شائرد جا لبائيل ٻوٽا	1-3	4-6	7-9	10-12
شائرد	7	8	6	4

(6)

مٽي ڏنل ڇڄري ۾ جهجهائي گهٽڪندو ڪيڏو آهي 3-5 ڪلاس جا شاگرد ڏيکارڻ لاءِ ٽپڪن جا مساوا

- (A) (4, 8) (B) (3, 5) (C) (5, 8) (D) (8, 4)

2. انگورن جي مند ۾ باغباني ڪندڙ جي پيداوار هيٺ چڱري ۾ ڏنل آهي پيداوار جي سراسري لھو.

پیداوار ہزار رپین ۾	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
باغباني ڪندڙ	10	11	15	16	18	14

3. هيٺ گروهييل جهجهائي چچري ڏهه کيتي لاءِ هڪ بئنڪ جو ڏنل قرض (هزار رپين ۾) ڏنل آهي ته ان جي سراسري لهو.

قرض (هزار رپین ۛ)	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
کسان	13	20	24	36	7

4. هڪ ڪارخاني ۾ 120 مزدورن جي هفتيوار پگهار هيٺ جهجهائي چڄري ۾ ڏنل آهي ان جي سراسري لھو

هفتيوار پگهار (رپين ۾)	0-2000	2000-4000	4000-6000	6000-8000
مزدورن جو تعداد	15	35	50	20

5. هيٺ گروھيل جهجهائي چڄري ۾ 50 ٻوڏ پيڙت پريوارن کي مليل مدد (هزار رپين ۾) ڏنل آهي مدد رقم جي سراسري لھو.

مدد - رقم	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ڪٽنب جو انداز	7	13	20	6	4

6. هيٺ گروھيل جهجهائي چڄري ۾ 250 بسن جو هڪ ڏينھن ۾ ڪيل مفاصلو (ڪ.م) ڏنل آهي. هڪ ڏينھن مفاصلي جو وچون عدد لھو.

مفاصلو	200-210	210-220	220-230	230-240	240-250
بسن جو انداز	40	60	80	50	20

7. هڪ جنرل اسٽور ۾ جدا جدا شين جي اگھن اُنھن جي قيمت جو گروھيل جهجهائي چڄرو ڏنل آهي شين جي قيمت جو وچون عدد لھو.

قيمت (رپين ۾)	20	20-40	40-60	60-80	80-100
شين جو انداز	140	100	80	60	20

8. هيٺ گروھيل جهجهائي چڄري ۾ هڪ منائيءَ واري دڪان ۾ جدا جدا وزن وارين مناين جي گھرچ ڏنل آهي وزن جو ڍنگه لھو.

وزن (گرامن ۾)	0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250
گراھڪن جو تعداد	10	60	25	20	15

9. هيٺ ڏنل جهجهائي چڄري جو هستوگرام ڪڍو

بجلي واھپو	50-70	70-90	90-110	110-130	130-150	150-170
ڪٽنب جو انداز	150	400	460	540	600	350

10. هڪ هٽنڊلور ڪارخاني ۾ 140 مزدورن جو هڪ ساڙهي ٺاهڻ ۾ ڏينهن جو ڇجرو هيٺ ڏنل آهي جهجهائي گهٽڪندو ڪيو.

ڏينهن	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
مزدورن جو انداز	5	16	30	40	35	14

11. هڪ ڪلاس جي شاگردن جو وڳيان تجربو ڪرڻ ۾ لڳل وقت جو جهجهائي ڇجرو هيٺ ڏنل آهي. ان مان هستوگرام ڪڍي، جهجهائي گهٽڪندو ڪيو.

تجربو (منٽن ۾)	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
شاگردن جو انداز	8	16	22	18	14	12

12. هيٺ ڏنل گروهيل جهجهائي ڇجري تي جهجهائي گهٽڪندو ڪيو

رت دان عمر (سال)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
رت دان ڏيندڙن جو انداز	38	46	35	24	15	12

13. هيٺ ڇجري ۾ 150 ٻون جي سالياني برسات جي سراسري ڏنل آهي. ان تي جهجهائي گهٽڪندو ڪيو.

برسات (س م ۾)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100

ٻون جو انداز	14	12	36	48	40
--------------	----	----	----	----	----

14. صبح 8 بجي کان 10 بجي تائين هڪ شهر جي


چونڪ کان سگنل کان آڻي ويندڙ واهڻ جي

پاءُ شڪل ڏنل آهي ته

(1) هر هڪ واهڻ جي مرڪزي ڪنڊ لھو.

(2) ٻه ڦيٽي گاڏين جو انداز 1200 آهي ته ڪل

واهڻ جو انداز لھو.




شڪل 6.15

15. هيٺ ڇجري ۾ آواز پردوش ڪندڙ اسر ڏنل آهن ان جو پاءُ شڪل ڪيو

اڏاوت	گھر	هوائي جهاز	ڪارخانا	ريلوي
10%	50%	9%	20%	11%

16. هڪ سروِي موجب اسڪولن جي شاگردن جي راندين بابت پسندگي ۾ واري ٻاءِ شڪل ۾ ڏنل آهي ڪل 1000 شاگرد آهن ته



شڪل 6.18

(1) ڪرڪيٽ ڪندڙ شاگرد ڪيترا؟

(2) گھٽ - شاگردن کي فوٽ بال وڻندڙ آهن؟

(3) ٻيون رانديون پسند نڪندڙ شاگرد ڪيترا؟

17. هڪ ٻوٽ ۾ 180 عورتن جي آروڱيه مرڪز ۾ ٽپاس ٿي. انهن مان 50 عورتن ۾ هيٺو گلوبن جي گھٽتائي، 10 عورتن ۾ موتيو بندو تڪليف ۽ 25 عورتن کي ساهه کڻڻ جي تڪليف هئي. باقي بچيل عورتن تندرست هيون اها ڄاڻ ڏيکارڻ لاءِ ٻاءِ شڪل ڪڍو.

18. وڻ پوکيو پروجيڪٽ ۾ هڪ اسڪول جي شاگردن پرياورڻ - ڏينهن تي 120 وڻ پوکيا اها ڄاڻ هيٺ چجري ۾ ڏنل آهي اها ڄاڻ ڏيکارڻ لاءِ ٻاءِ شڪل ڪڍو.

نمبر	بگڙ	ارجن	بيھڙا	ڪرنج	وڻن جا نالا
26	22	24	28	20	وڻن جو انداز



□□□

جواب

1. ٻن قيرائتن ۾ ليکي مساوتون

آپياس 1.1

- (1) (2, 4) (2) (3, 1) (3) (6, 1) (4) (5, 2) .2
(5) (-1, 1) (6) (1, 3) (7) (3, 2) (8) (7, 3)

آپياس 1.2

- (1) (2) .1

x	3	-2	0
y	0	5	3
(x, y)	(3, 0)	(-2, 5)	(0, 3)

x	4	-1	0
y	0	-5	-4
(x, y)	(4, 0)	(-1, -5)	(0, -4)

- (1) (5, 1) (2) (4, 1) (3) (3, -3) (4) (-1, -5) (5) (1, 2.5) (6) (8, 4) .2

آپياس 1.3

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times \boxed{5} - \boxed{2} \times 4 = \boxed{15} - 8 = \boxed{7} .1$$

- (1) -18 (2) 21 (3) $-\frac{4}{3}$.2

- (1) (2, -1) (2) (-2, 4) (3) (3, -2) (4) (2, 6) (5) (6, 5) (6) $(\frac{5}{8}, \frac{1}{4})$.3

آپياس 1.4

1. (1) $(\frac{1}{9}, 1)$ (2) (3, 2) (3) $(\frac{5}{2}, -2)$ (4) (1, 1)

آپياس 1.5

1. اٺيڪا 112 = گرد ماپ ڇ . اي 640 = ايراضي 8 $x = 12$, $y = 8$ 2. 5 ۽ اهي عدد

3. پيءُ جي عمر 40 ، ٻار جي عمر 15 4. $\frac{7}{18}$

5. $A = 30$ ڪ. 6. 150 ڪ. 7. $B = 55$ ڪ. 8. $A = 30$

گڏيل آپياس 1

1. (1) B (2) A (3) D (4) C (5) A

2.

x	-5	$\frac{3}{2}$
y	$-\frac{13}{6}$	0
(x, y)	$(-5, -\frac{13}{6})$	$(\frac{3}{2}, 0)$

$$3. \quad (1) (3, 2) \quad (2) (-2, -1) \quad (3) (0, 5) \quad (4) (2, 4) \quad (5) (3, 1)$$

$$4. \quad (1) 22 \quad (2) -1 \quad (3) 13$$

$$5. \quad (1) \left(-\frac{2}{3}, 2\right) \quad (2) (1, 4) \quad (3) \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad (4) \left(\frac{7}{11}, \frac{116}{33}\right) \quad (5) (2, 6)$$

$$6. \quad (1) (6, -4) \quad (2) \left(-\frac{1}{4}, -1\right) \quad (3) (1, 2) \quad (4) (1, 1) \quad (5) (2, 1)$$

$$7. \quad (2) \text{ چانهه جو آگهه } 300 \text{ ر في ڪلو}$$

$$\text{ڪنڊ جو آگهه } 40 \text{ ر پيا في ڪلو}$$

$$(5) \text{ سڪيل روزگار } 450 \text{ ر}$$

$$\text{آڻ سڪيل روزگار } 270 \text{ ر}$$

$$(3) 100 \text{ ر وارا } 20 \text{ نوٽ}$$

$$50 \text{ ر وارا } 10 \text{ نوٽ}$$

$$(6) \text{ همبدا جي رفتار } 18 \text{ ڪم / ڪلاڪ}$$

$$\text{جوسف جي رفتار } 72 \text{ ڪم / ڪلاڪ}$$

$$(4) \text{ منيشا جي عمر } 23 \text{ ر}$$

$$\text{سوينا جي عمر } 8 \text{ سال}$$

2. ٻسگهي مساوت

2.1 آڀياس

$$1. \quad m^2 + 5m + 3 = 0, \quad y^2 - 3 = 0 \quad (\text{انهن مان ڪون})$$

$$2. \quad (1), (2), (4), (5) \text{ آهي ٻسگهي مساوتون آهن.}$$

$$3. \quad (1) y^2 + 2y - 10 = 0, \quad a = 1, b = 2, c = -10$$

$$(2) x^2 - 4x - 2 = 0, \quad a = 1, b = -4, c = -2$$

$$(3) x^2 + 4x + 3 = 0, \quad a = 1, b = 4, c = 3$$

$$(4) m^2 + 0m + 9 = 0, \quad a = 1, b = 0, c = 9$$

$$(5) 6p^2 + 3p + 5 = 0, \quad a = 6, b = 3, c = 5$$

$$(6) x^2 + 0x - 22 = 0, \quad a = 1, b = 0, c = -22$$

$$4. \quad (1) 1 \text{ آهي}, -1 \text{ نه} \quad (2) \frac{5}{2} \text{ آهي}, 2 \text{ نه}$$

$$5. \quad k = 3 \quad 6. \quad k = -7$$

2.2 آڀياس

$$1. \quad (1) 9, 6 \quad (2) -5, 4 \quad (3) -13, -\frac{1}{2} \quad (4) 5, -\frac{3}{5}$$

$$(5) \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \quad (6) \frac{2}{3}, -\frac{1}{2} \quad (7) -\frac{5}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2} \quad (8) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$(9) 25, -1 \quad (10) -\frac{3}{5}, \frac{3}{5} \quad (11) 0, 3 \quad (12) -\sqrt{11}, \sqrt{11}$$

2.3 اپیاس

- $$\begin{array}{lll} 1. (1) 4, -5 & (2) (\sqrt{6} - 1), (-\sqrt{6} - 1) & (3) \frac{\sqrt{13} + 5}{2}, \frac{-\sqrt{13} + 5}{2} \\ (4) \frac{\sqrt{2} + 2}{3}, \frac{-\sqrt{2} + 2}{3} & (5) -\frac{5}{4}, -\frac{5}{2} & (6) \frac{2 + \sqrt{39}}{5}, \frac{2 - \sqrt{39}}{5} \end{array}$$

2.4 اپیاس

1. (1) 1, -7, 5 (2) 2, -5, 5 (3) 1, -7, 0
2. (1) -1, -5 (2) $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$, $\frac{3-\sqrt{17}}{2}$ (3) $\frac{-1+\sqrt{22}}{3}$, $\frac{-1-\sqrt{22}}{3}$
 (4) $\frac{2+\sqrt{14}}{5}$, $\frac{2-\sqrt{14}}{5}$ (5) $\frac{-1+\sqrt{73}}{6}$, $\frac{-1-\sqrt{73}}{6}$ (6) -1, $-\frac{8}{5}$
3. $-\sqrt{3}, -\sqrt{3}$

2.5 اپیاس

1. 5 مول حقیقی عدد آهي ، 5- مول حقیقی عدد آهي (1)
- (2) $x^2 + 7x + 5 = 0$ (3) $\alpha + \beta = 2, \alpha \times \beta = -\frac{3}{2}$
2. (1) 53 (2) -55 (3) 0
3. حقیقی نه آهي (3) حقیقی ۽ غير برابر (2) حقیقی ۽ برابر (1)
4. (1) $x^2 - 4x = 0$ (2) $x^2 + 7x - 30 = 0$
- (3) $x^2 - \frac{1}{4} = 0$ (4) $x^2 - 4x - 1 = 0$
5. $k = 3$ 6. (1) 18 (2) 50
7. (1) $k = 12$ ۽ $k = -12$ (2) $k = 6$

2.6 اپیاس

1. 9 سال
2. 10 ۽ 12
3. 15 اُپي قطار ۽ 10 آڏي قطار
4. ڪشور جي عمر 10 سال ۽ ويڪ جي عمر 15 سال
5. مارڪون 10
6. 6 برتن جو عدد برتن جو عدد
7. 6 ڪ م / ڪلاڪ
8. نشوؤ 6 ڏينهن ۽ پنٽو 12 ڏينهن
9. 5 س م AD = BC = 15 س م CD = 7 س م AB = 51 س م ونڊ اُپت = 9 س م ونڊينڊز

گذیل آپاس 2

1. (1) B (2) A (3) C (4) B (5) B (6) D (7) C (8) C
2. (1) ۶ (3) بَسْغَهِی مَسَاوَتُونِ آهِن.

3. (1) -15 (2) 1 (3) 21
4. $k = 3$ 5. (1) $x^2 - 100 = 0$ (2) $x^2 - 2x - 44 = 0$ (3) $x^2 - 7x = 0$
6. حقيقي ۽ برابر (3) حقيقي ۽ غير برابر (2) حقيقي عددن (1)
7. (1) $\frac{1+\sqrt{21}}{2}, \frac{1-\sqrt{21}}{2}$ (2) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{5}$ (3) 1, -4
(4) $\frac{-5+\sqrt{5}}{2}, \frac{-5-\sqrt{5}}{2}$ (5) مفرد نه آهن (6) $(2 + \sqrt{7}), (2 - \sqrt{7})$
8. $m = 14$ 9. $x^2 - 5x + 6 = 0$ 10. $x^2 - 4pqx - (p^2 - q^2)^2 = 0$
11. ساگر وٽ 100 رپيا ۽ مڪند وٽ 150
12. 12 يا $\sqrt{24}$ ۽ $-\sqrt{24}$ 13. شاگردن جو تعداد 60
14. ويڪر 45 م ڊيگهه 100 م پاسو 15 م
15. وڏو نل 3 ڪلاڪ ۽ ننڍو نل 6 ڪلاڪ

انگريزي پروگريشن 3.

آپياس 3.1

1. (1) $d = 2$ آهي (2) $d = \frac{1}{2}$ آهي (3) $d = 4$ آهي (4) نه
(5) $d = -4$ آهي (6) $d = 0$ آهي (7) $d = \sqrt{2}$ آهي (8) $d = 5$ آهي
2. (1) 10, 15, 20, 25, ... (2) -3, -3, -3, -3, ... (3) -7, -6.5, -6, -5.5, ...
(4) -1.25, 1.75, 4.75, 7.75, ... (5) 6, 3, 0, -3, ... (6) -19, -23, -27, -31
3. (1) $a = 5, d = -4$ (2) $a = 0.6, d = 0.3$ (3) $a = 127, d = 8$ (4) $a = \frac{1}{4}, d = \frac{1}{2}$

آپياس 3.2

1. (1) $d = 7$ (2) $d = 3$ (3) $a = -3, d = -5$ (4) $a = 70, d = -10$
2. 121 آهي 3. 104 4. 115 5. -121 6. 180
7. 55 8. 55 جو 9. 60 10. 1

آپياس 3.3

1. 1215 2. 15252 3. 30450 5. 5040
5. 2380 6. 60 7. 4, 9, 14 يا 14, 9, 4 8. -3, 1, 5, 9

آپياس 3.4

1. 70455 رپيا 2. 560 رپيا آخري هفتو، 1000 رپيا پهرين هفتو 3. 1,92,000 رپيا
4. 48, 1242 5. $-20^\circ, -25^\circ, -30^\circ, -35^\circ, -40^\circ, -45^\circ$ 6. 325

گڏيل آپياس 3

1. (1) B (2) C (3) B (4) D (5) B (6) C (7) C (8) A (9) A (10) B
2. 40 3. 1, 6, 11, ... 4. -195 5. 16, -21 6. -1 7. 6, 10
8. 8 9. 67, 69, 71 10. 3, 7, 11, ... 147. 14. 2000 رپيا

4. مالي رٿا

691.48

4.1 آڀياس

1. CGST 6%, SGST 6%
2. SGST 9%, GST 18%
3. CGST ₹ 784 ۽ SGST ₹ 784
4. اهو بليٽ گراھڪ کي 691.48 روپئي ملندو
5. CGST ₹ 135 SGST ₹ 135 ان تي 1500 ₹ رانديڪن واري ڪار جي قيمت
6. (1) SGST 14% (2) GST 28% اي سي
(3) 40,000 ₹ اي سي جي قيمت (4) GST 11,200 ₹ ڪل رقم
(5) CGST 5600 ₹ (6) SGST 5600 ₹
7. CGST 5320 ₹ بل تي ۽ ملندي روپئي 48,640 ₹ ڀرمود کي واشنگ مشين ۽ SGST 5320 ₹

4.2 آڀياس

1. GST 22000 روپيا اسٽور کي آهي
2. 12,500 روپيا ڪي 12,500 روپيا انپٽ ٽئڪس ملندي ته انجو GST 22,50 روپيا
3. امير انٽرپرائيز 300 GST روپيا ان مان 150 CGST روپيا ۽ 150 SGST روپيا
اڪبري بردرس 400 GST روپيا ان مان 200 CGST روپيا ۽ 200 SGST روپيا
4. GST ₹ 100, CGST ₹ 50, UTGST ₹ 50.
5. CGST = SGST = ₹ 900

4.3 آڀياس

1. روپيا 5 اگھ (3) روپيا 75 ظاهري اگھ (2) روپيا 100 بازار اگھ (1)
2. 25%
3. 37,040 روپيا
4. 800 شيئرس
5. 5.83% موت اگھ
6. A ڪمپني جي سيڙپ فائدي واري آهي.

4.4 آڀياس

1. روپيا 200.60
2. روپيا 999
- 3.

شيئرس جي ڪل قيمت	دلالي SGST 9%	دلالي CGST 9%	دلالي 0.2%	شيئرس قيمت	شيئرس بازار اگھ	شيئرس جو تعداد
₹ 4510.62	₹ 0.81	₹ 0.81	₹ 9	₹ 4500	₹ 45	100 B
₹ 14964.60	₹ 2.70	₹ 2.70	₹ 30	₹ 15000	₹ 200	75 S

4. شيئرس وڪيا 100
5. روپيا 8560 نقصان

4A گڏيل آڀياس

1. (1) C (2) B (3) D (4) B (5) A (6) B
2. روپيا 3150 SGST روپيا 3150 CGST روپيا 28,800 ڪل بل

3. ₹ 997.50 4. ₹ 12,500 5. ₹ 4250 ITC ₹ 250 بل تي ٽئڪس

6. ITC ₹ 1550 CGST ₹ 5030, SGST 5030 روپيا

7. ₹ 75,000, CGST ₹ 4500, SGST ₹ 4500 ريزڪي واپاري

8. (1) روپيا CGST 16200 ₹ SGST 16200 ٻڌي واپاري

روپيا SGST 19,800 روپيا CGST 19,800 ريزڪي واپاري

(2) (CGST) 2700 (SGST) 2700, ٻڌو واپاري

(CGST) 3600 ₹ (SGST) 3600 ريزڪي واپاري

9. (1) CGST ₹ 1960, SGST ₹ 1960 آڱا پائيل ڏنل

(2) CGST ₹ 2352 ₹ SGST 2352 وسڻي جي واپاري گراهڪ کي لڳايل

(3) CGST ₹ 392 ₹ SGST 392 وسڻي جي واپاري جو بل

10.

(1) ماڻهو	CGST بل (₹)	SGST بل (₹)	GST بل (₹)
اڏپاٽڪ	300	300	600
ٻڌو واپاري	360-300 = 60	60	120
دڪاندار	390-360 = 30	30	60
ڪُل	390	390	780

(2) آخر گراهڪ کي اها شيء 7280 ملندي

(3) B2C دڪاندار ۽ گراهڪ B2B ٻڌو واپاري ۽ دڪاندار B2B اڏپاٽڪ ۽ ٻڌو واپاري

گڏيل آپيلاس 4B

1. (1) B (2) B (3) A (4) C (5) A

2. ₹ 130.39

3. 22.2%

4. 21,000 روپيا ملندا

5. 500 شيئرس ملندا

6. 1058.52 روپيا فائدو

7. B ڪمپني

8. 1000 شيئرس ملندا

9. 118 روپيا

10. (1) 1,20,000 روپيا (2) 360 روپيا (3) 64.80 روپيا (4) 120424.80 روپيا

11. 1% فائدو

5. آپيلاس

5.1 آپيلاس

1. (1) 8 (2) 7 (3) 52 (4) 11

5.2 آپيلاس

1. (1) $S = \{1H, 1T, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, 5H, 5T, 6H, 6T\}$ $n(S) = 12$

$$(2) S = \{23, 25, 32, 35, 52, 53\} \quad n(S) = 6$$

$$2. S = \{\text{گجڙهو، واڻڻائي، ڪيسري، پيلو، نيرو، سائو}\} \quad n(S) = 6$$

$$3. S = \{\text{منڱل، آرتوار، جمع، ٻڌڻ، سومر، ڇنڇر}\} \quad n(S) = 6$$

$$4. (1) B_1B_2 \quad (2) G_1G_2 \quad (3) B_1G_1 \quad B_2G_1 \quad B_1G_2 \quad B_2G_2$$

$$(4) S = \{B_1B_2, B_1G_1, B_1G_2, B_2G_1, B_2G_2, G_1G_2\}$$

آپياس 5.3

$$1. (1) S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad n(S) = 6$$

$$A = \{2, 4, 6\} \quad n(A) = 3, \quad B = \{1, 3, 5\} \quad n(B) = 3, \quad C = \{2, 3, 5\} \quad n(C) = 3$$

$$(2) S = \{(1,1), \dots, (1,6), (2,1), \dots, (2,6), (3,1), \dots, (3,6), (4,1), \dots, (4,6), (5,1), \dots, (5,6), (6,1), \dots, (6,6)\} \quad n(S) = 36$$

$$A = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1), (6,6)\} \quad n(A) = 6$$

$$B = \{(4,6), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6)\} \quad n(B) = 6$$

$$C = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\} \quad n(C) = 6$$

$$(3) S = \{HHH, HHT, HTT, HTH, THT, TTH, THH, TTT\} \quad n(S) = 8$$

$$A = \{HHH, HHT, HTH, THH\} \quad n(A) = 4$$

$$B = \{TTT\} \quad n(B) = 1$$

$$C = \{HHH, HHT, THH\} \quad n(C) = 3$$

$$(4) S = \{10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54\} \quad n(S) = 25$$

$$A = \{10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54\} \quad n(A) = 13$$

$$B = \{12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54\} \quad n(B) = 9$$

$$C = \{51, 52, 53, 54\} \quad n(C) = 4$$

$$(5) S = \{M_1M_2, M_1M_3, M_1F_1, M_1F_2, M_2M_3, M_2F_1, M_2F_2, M_3F_1, M_3F_2, F_1F_2\} \quad n(S) = 10$$

$$A = \{M_1F_1, M_1F_2, M_2F_1, M_2F_2, M_3F_1, M_3F_2, F_1F_2\} \quad n(A) = 7$$

$$B = \{M_1F_1, M_1F_2, M_2F_1, M_2F_2, M_3F_1, M_3F_2\} \quad n(B) = 6$$

$$C = \{M_1M_2, M_1M_3, M_2M_3\} \quad n(C) = 3$$

$$(6) S = \{H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6\} \quad n(S) = 12$$

$$A = \{H1, H3, H5\} \quad n(A) = 3$$

$$B = \{H2, H4, H6, T2, T4, T6\} \quad n(B) = 6$$

$$C = \{\} \quad n(C) = 0$$

آپياس 5.4

$$1. (1) \frac{3}{4}, (2) \frac{1}{4}$$

$$2. (1) \frac{1}{6} \quad (2) 0 \quad (3) \frac{5}{12}$$

3. (1) $\frac{7}{15}$ (2) $\frac{1}{5}$ 4. (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{1}{5}$ 5. (1) $\frac{1}{13}$ (2) $\frac{1}{4}$

گڏيل آپياس - 5

1. (1) B (2) B (3) C (4) A (5) A 2. وسير جي 3. (1) $\frac{1}{11}$ (2) $\frac{6}{11}$
 4. $\frac{5}{26}$ 5. (1) $\frac{2}{9}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{4}{9}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{6}$
 8. (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{6}$ 9. $\frac{1}{25}$ 10. (1) $\frac{1}{8}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) 1
 11. (1) $\frac{5}{6}$ (2) $\frac{1}{6}$ (3) 1 (4) 0 12. (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{2}{3}$ 13. $\frac{2}{11}$
 14. $\frac{13}{40}$ 15. (1) $\frac{3}{10}$ (2) $\frac{3}{10}$ (3) $\frac{1}{5}$ 16. $\frac{11}{36}$

6. عدد شاستر

آپياس 6.1

- (1) 4.36 ڪلاڪ (2) 521.43 رپيا (3) 2.82 ليٽر (4) 35310 رپيا
 (5) 985 رپيا يا 987.5 رپيا (6) 3070 رپيا يا 3066.67 رپيا

آپياس 6.2

- (1) 11.4 ڪلاڪ (2) 184.4 انڊازي (3) 74.558 $\approx$ 75 (4) 52.75 $\approx$ 53 ڏيا

آپياس 6.3

1. 4.33 ليٽر 2. 72 يونٽ 3. 9.94 ليٽر 4. 12.31 سال

آپياس 6.5





1. (1) 60-70 (2) 20-30 ۽ 90-100 (3) 55 (4) 80 ۽ 90 (5) 15

آپياس 6.6

5. (1) 2000 (2) 1000 (3) 25%
 6. (1) 12000 رپيا (2) 3000 رپيا (3) 2000 رپيا (4) 1000 رپيا

گڏيل آپياس 6

1. (1) D (2) A (3) B (4) C (5) C (6) C
 2. 52,500 رپيا 3. 65,400 رپيا 4. 4250 رپيا
 5. 72,400 رپيا 6. 223.13 ڪم 7. 32 رپيا 8. 397.06 گرام
 14. 144° - ٻه ڦيٽي، 36° - رڪشا، 29° - بس، 43° - ٽينپو، 108° - ڪار (1)
 3000 - گاڏين جو ڪل تعداد (2)
 16. 200 - ٻيون رانديون وڻندڙ (3) 175 - فوٽ بال وڻندڙ (2) 225 - ڪرڪيٽ وڻندڙ (1)



- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.





पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.



ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर - ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९५५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपूर - ☎ २५४७७९६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५



महाराष्ट्र राजीव पानिपे पुस्तक नरुमती
वापिासकरु सनशुदन मनुदल

₹ 80.00

पुठुी - 411004



सुंधी (अरे.) गणलत इ. १० वी भाग-१