

حساب

پاڻو-II

درجو ڏهون



پارتيه سنوڌان

باب - چوٿون الف

بنيادي فرض

قلم 51A

بنيادي فرض : پارت جي هر هڪ ناگرڪ جو فرض آهي ته :

(الف) هو پارت جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي تراني، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.

(ب) آدرش ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اُتساه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.

(پ) پارت جي ايڪتا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.

(پ) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سيوا ۾ ٽپي پوندو.

(پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪتا جي پاونا پٽڏا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪيترواد جي پيڊپاءِ کان پري هوندي. اهڙيون رسمون جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.

(ت) پارت جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجھندو.

(ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندو.

(ت) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، چاچ جوڇ ۽ سڌاري جي پاونا کي اهميت ڏيندو.

(ث) عام ملڪيت کي سلامت رکندو ۽ هنسا کان پري رهندو.

(ت) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ۾ اڳتي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جنهن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.

(ڪر) ماءُ يا پيءُ يا ڀالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر چهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

سرڪاري فيصلو نمبر : آڀياس ۲۱۱۶ (پر.ڪر ۱۶/۴۳) ايس.ڊي ۴ تاريخ ۲۰۱۶-۴-۲۵ موجب اسٽاڀت ڪيل ڪو آرڊينينٽنگ ڪاميٽيءَ جي تاريخ ۲۰۱۶-۱۲-۲۹ جي ميٽنگ ۾ هن درسي ڪتاب کي سنه ۱۹-۲۰۱۸ کان مختصر طور منظوري ڏني ويئي آهي.

حساب

پاڻو - II

درجو ڏهون



مهاراشٽر راجيه پائيم ڀسٽڪ نرمٽي واپياسڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي -411004



پنهنجي سمارٽ فون ۾ DIKSHA APP ذريعي درسي ڪتاب جي پهرين صفحي واري Q.R. Code ذريعي Digital درسي ڪتاب ۽ هر هڪ سبق ۾ آيل Q.R. Code ذريعي ان سبق بابت پڙهڻ / پڙهائڻ لاءِ ڪارائتيون لنڪس ملنديون.

چاپو پهریون : 2018

سڌاريل چاپو : 2022

© مهاراشتر راجيه پانيم پُستڪ نرمتي و اپياس ڪرم سنشودن منڊل،
پڻي - ۴۱۱۰۰۴.

مهاراشتر راجيه پانيم پُستڪ نرمتي و اپياس ڪرم سنشودن منڊل، هن
ڪتاب جا سڀ حق واسطا محفوظ ٿورڪي. منڊل جي ڊائريڪٽر جي لکيل
اجازت کان سواءِ هن ڪتاب جو ڪوبه ٽڪر، ڇپائي نٿو سگهجي.

حساب و شيم ماهر ڪاميٽي

ڊاڪٽر منڱلا نارڙيڪر (اڌيڪش)
ڊاڪٽر جڻشري آتري (ميمبر)
شري رماڪانت سرودي (ميمبر)
شري وناٿڪ گوڙ بولي (ميمبر)
شريمتي پراجڪٽا گوکلي (ميمبر)
شري سنديپ پنج پاڻي (ميمبر)
شريمتي پوجا جاڏو (ميمبر)
شريمتي اڄولا گوڙ بولي (ميمبر - سيڪريٽري)

حساب و شيم ڪاربه گنت ميمبر

شري اميش رنڌري	شري شريڪانت رنڌپارڪي
شري سنبل شريواستو	شري ارونڊ ڪمار توارڀي
شريمتي جڻشري پُرنڌڙ	شري سرپش دانتي
شريمتي تروبين پوپٽ	شريمتي سورناديشپانڊي
شري اڳياپريٽ	شري پرڪاش ڪاپسي
شري انساري عبدال حميد	شريمتي آريا پڙي
شري سنديش سوناوڻي	شري ملند پاڪري
شري وسنت شيوآڙي	شري گيانيشور ماشاڙڪر
شري ملبيشام بيتي	شري لڪشمڻ داوڻڪر
شري شريپاد ديشپانڊي	شري سڌير پاتيل
شري پرتاپ ڪاشد	شري گڻيش ڪولتي
شريمتي سواتي ڌرم اڌڪاري	شريمتي روھڻي شرڪي
ڊاڪٽر يارتي شهسٽرڊي	شري بنسي هوالي
شري انسار شيخ	شري رويندر ڪنداري
شري راما وهنباڙڪر	شري راجيندر چوڌري
شري ڀرمود ڊومبري	
شري پرڪاش جهينڊي	

مڪيم سنيوچڪ: شريمتي اڄولا شريڪانت گوڙ بولي

انچارج آفيسر حساب،
پانيم پُستڪ منڊل پڻي
ٻاهريون صفحو ۽ ڪمپيوٽر آريڪن:
شري سنديپ ڪوڙي
ممنبي

سنيوچڪ: شريمتي ڪينٽڪي جاني

انچارج آفيسر سنڌي،
سنيوچن: شريمتي گيتا گڻيش ناڪر

ڪاپي رائٽر سنڌي

شري سچيتانند آڙي، مڪيم نرمتي اڌڪاري
شري سنجي ڪانڊلي، نرمتي اڌڪاري
شري پرشانت هرڻي، نرمتي سهايڪ اڌڪاري
ترجمو ڪندڙ: شري اشوڪ ڪملداس مڪتا
چڪاس ڪندڙ: شري وجيه راجڪمار منڱلاڻي.

ڪاغذ: 70 جي. ايس. ايم ڪريمر وو.

چاپيندڙ: N/PB/2018-19/1,000

پرنٽنگ آرڊر:

ٽائيپسٽنگ:

شريمتي شويلا لالچنداڻي

پرڪاشڪ

ووئڪ ائمر گوساوي، ڪنٽرولر
پانيم پُستڪ نرمتي منڊل،
پرياديوي، مممنبي - ۲۵.

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور
خودمختيار سماجواڊي سَرو ڌرم ۽ سر-ڀاؤ وارو
لوڪشاهي گُڙاجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو
ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگرڪن کي :

سماجڪ، آرٿڪ ۽ راجنيتڪ نياءَ، ويچار، اظهار،
وشواس، شرڌا ۽ اڀاسنا جي آزادي؛ درجي ۽ موقعي
جي سمانتا؛ خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن
سڀني ۾ شخصي سؤمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي
اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ ڀائپچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ چويهين
نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءُ سنوڌان
سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي
ارڀڻ ڪريون ٿا.

راشتر گيت

جَنَ گَنَ مَنَ اَڌيناڻڪَ جِيَهَ هِي،
پَارَتَ پَاڳِيَهَ وَڌاتا
پَنجابَ، سنڌَ، گُجراتَ، مَراڻا،
دراوڙَ، اُتڪَلَ، بَنگَ،
ونڌِيَهَ، هَماچَلَ، يَمُنا، گَنڌا،
اُچِڪَلَ، جَلِ ڌَ تَرَنگَ،
تَوَ شُپَ نامي جاڳي،
تَوَ شُپَ آشيس ماڳي،
گاهي تَوَ جِيَهَ - گاتا،
جَنَ گَنَ - مَنَڱَلِ داڻڪَ جِيَهَ هِي
پارت پَاڳِيَهَ وَڌاتا،
جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي،
جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ هِي،

پرڻگيا

’پارت منهنجو ديش آهي. سڀ
پارتواسي منهنجا ڀائر ۽ ڀينر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي گورو آهي. مان سدائين ان جي
لائق ٿيڻ جو جتن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن مائٽن، اُستادن ۽
سڀني بزرگن جو سمنان ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرڻگيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سڄو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
۾ ئي منهنجو سک سمايل آهي.’

پرسنونا

شاگرد دوستو،

درجي ڏهين ۾ توهان سڀني جو سوانت!

حساب پاڻو I- ۽ حساب پاڻو II- انهن ڪتابن جو توهان کي آڀياس ڪرڻو آهي.

حساب پاڻو II- ۾ توهان جاميٽري، علم مثلث، مساوي جاميٽري ۽ علم پيمائش مکيه ڪيترن بابت پڙهندا. درجي نائين ۾ انهن يونٽن بابت سڃاڻپ ڏنل آهي هاڻي وڌيڪ آڀياس توهان ڪندا. انهن ڪيترن جو وهنوار ۾ استعمال مثالن وسيلي سمجهايل آهي. جتي نوان حصا آهن يا نوان سوٽر آهن، انهن جي چٽيءَ طرح سمجهاڻي ڏنل آهي. هر هڪ مسودي ۾ حل ڪيل مثال، آڀياس لاءِ مثال ڏنل آهن. ان کان سواءِ قابل شاگردن لاءِ خاص تارو - شڪل ڏنل ڪجهه حساب ڏنل آهن. اهي شاگرد جيڪي ڏهين درجي کان پوءِ شايد حساب وڌيڪ نه ڪڍن انهن لاءِ پڻ حساب جي بنيادي ويچار ڌارائين، وهناري مثال ڏنا ويا آهن. ٻين ڪيترن ۾ ڪم ڪندڙ اهي شاگرد سڪيل حساب ڪم آڻي سگهن، ان جو به ڪتاب ۾ جوڳو ڌيان ڏنل آهي. ”وڌيڪ ڄاڻ لاءِ خاص مسودو اڳتي هلي انهن ٻارن لاءِ ڪارگر ٿيندو جيڪي اوچي تعليم ۾ ماهر حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. ان ڪري اهڙن ٻارن کي اها ڄاڻ ضرور پڙهڻ گهرجي. اٽپ جي ماڌير وسيلي ڪيو. آر. ڪوڊ ذريعي هر هڪ سبق جي وڌيڪ ڄاڻ توهان کي ملندي. ان جو آڀياس توهان لاءِ ضرور ڪمائڻو ٿيندو.“

ڏهين درجي جو امتحان اهميت وارو مڃيو ويندو آهي. اها حقيقت آهي پر بنا تناؤ جي توهان چٽيءَ طرح آڀياس ڪري جس توهان حاصل ڪندا. ان لاءِ توهان کي شپ ڪامنائون.



(د. سنييل مگر)

سنچالڪ

مهاراشٽر راجپه پائيه پستڪ

نرمي و آڀياس ڪم سنشودن منڊل پڻي.

پڻي

۱۸ مارچ ۲۰۱۸، ڪڙي پاڙو

پارٽيه سوريه تاريخ: ۲۷ ڦاڳڻ ۱۹۳۹

درجي ڏهون حساب پاڻو - II آپياس ڪرم بعد شاگرد هيٺ ڏنل لياقتون حاصل ڪندا

کيتر	يونٽ	لياقت
1. جاميٽري	1.1 هڪ جهڙائي 1.2 گول	• هڪ جهڙن ٽڪنڊن جون خاصيتون، پاڻاڻاگورس جو سڌيان، مثال • هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي جوڙجڪ • گول - قطر، نيئر قطر، ڇهڙي جون خاصيتون • ڇهڙي جوڙجڪ
2. مساوي جاميٽري	2.1 مساوي جاميٽري	• ٻن ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو لهڻ • ورهائيندڙ ٽپڪي جا مساوا لهڻ • ليڪ جو سلوپ لهڻ
3. علم پيمائش	3.1 متاڇڙو ايراضي ۽ مقدار	• گول - ڪمان جي ڊيگهه لهڻ • گول سيڪٽر ۽ گول - ٽڪر جي ايراضي لهڻ • ڏنل جاميٽري شڪلين جي ايراضي ۽ مقدار لهڻ
4. علم مثلث	4.1 علم مثلث	• ٽڪنڊي جا بنيادي ريشا لهڻ مثال حل ڪرڻ • وٺ، عمارت، ندي وغيره جي اوچائي، ڊيگهه لهڻ

ماسٽرن لاءِ سوچنا

پهريان سڄي ڪتاب جو آپياس ڪري سمجهڻ علحدن يونٽن جي سمجهاڻي ڏيڻ ۽ سوترن جي چڪاس ڪرڻ مکيه مشغلي ڪرائڻ ۾ مدد ڪرڻ عملي روپ ۾ ملهه ماپڻ ڪرڻو آهي. ان لاءِ مشغولي ڪرائڻي آهي شاگردن کي پنهنجن ويچارن ظاهر ڪرڻ لاءِ همٿايو. ڪو شاگرد الڳ نموني حساب جو صحيح حل ڪري ته هن کي شاباسي ڏيو.

جاميٽريءَ جي سڌيانن کي ڌيان ۾ رکندي انهن جو اُپ يوجن ڪري مثال حل ڪرڻ جي قابليت وڌائڻ لاءِ ڪتاب ۾ ڏنل مشغولين کان سواءِ ٻيون مشغوليون تيار ڪريو.

عملي ڪم (لسٽ)

- (1) پاني تي هڪ ٽڪنڊو ڪپي وٺو ميز تي مڀل بتي يا هڪ ننڍڙو ڏيئو رکو. پٽ ۽ مڀل بتي / ڏيئي وچ ۾ ٽڪنڊو رکو. ان ٽڪنڊي جو پاڇو ڇاپيو. پاڇو ۽ اصلي ٽڪنڊو، اهي هڪ جهڙا آهن اهو ڇاپيو (اصلي ٽڪنڊو ۽ ان جو پاڇو پاڻ ۾ هڪ جهڙا آهن، ان وقت ڇا ڌيان ۾ رکڻ گهرجي؟)
- (2) هڪ ساڳي ماپ وارا ٻه گوني ڪنڊ ٽڪنڊا ڪپيو. ٽپڪن کي C, B, A نالا ڏيو. هڪ ٽڪنڊي جي هٿپاڻينوز تي عمود ڪڍو. ان عمودي ڇيڙي کي D نالو ڏيو. هڪ عمود تي ڪپي ٻه ٽڪنڊا ملن ٿا. هاڻي ٽيئي ٽڪنڊا هڪ جهڙا آهن. اها چڪاس ڪريو.
- (3) هڪ گول ڪڍو. اندريون پاڻو، ٻاهريون پاڻو ۽ گول تي هڪ هڪ ٽپڪو کڻو انهن ٽپڪن مان گول ڏانهن گهڙيون ڇهڙيون نڪري سگهن ٿيون. اها ياداشت تيار ڪريو.
- (4) 'ٻن ٽپڪن مان بيشمار گول ڪڍي سگهجن ٿا' اهو ڏيکارڻ لاءِ ٻن ٽپڪن مان لنگهندڙ گهٽ ۾ گهٽ 5 گول ڪڍو.
- (5) گول جو خاصيتون ڄاڻڻ لاءِ جيئو بورڊ کڻو. رٿڙ بڻند ڪم آڻي ڪوبه هڪ سڌيان جيئو بورڊ تي ڪڍو (شڪل)
 - (i) گول اندر سمايل ڪنڊ (ii) ڇهڙي ڪنڊ سڌيان (iii) مخالف ڪنڊن جو سڌيان
- (6) هڪ گول ۽ هڪ ڪنڊ کڻي جدا جدا اندر سمايل ڪمانون تيار ڪريو.
- (7) هڪ ڪنڊ جا چار برابر حصا ڪريو. ڪمپاس ۽ فوٽي استعمال ڪريو.
- (8) هڪ مخروط گهڙهي کڻو ان جي اوچائي ۽ نيم قطر ماپيو. ان ۾ ڪيترو پاڻي ماپندو اهو سوتر وسيلي لھو. اهو پاڻي ۽ سان پري، ماپ - اوزار وسيلي ماپيو. انهن نتيجن جي پيٽ ڪريو.
- (9) هڪ فرسٽر شڪل جو پيالو کڻو. ان جا ٻه نيم قطر ماپيو اوچائي ماپيو ان ۾ ڪيترو پاڻي ماپي ٿو اهو سوتر وسيلي لھو. ساڳئي وقت ماپ اوزار وسيلي به مقدار لھو. ٻنهي نتيجن جي پيٽ ڪريو.
- (10) ٿلهي پاني تي ٻه هڪ جهڙا ٽڪنڊا ڪپي کڻو. انهن جي ايراضي جو ريشو (i) انهن جي گرد ماپن جو ريشو يا (ii) انهن جي مٿيانن جو ريشو برابر آهي، اهو عملي روپ ۾ ڪريو.

فهرست

باب	صفح
1. هڪجهڙائي	1 کان 29
2. پائتاگورس جو سڌيان	30 کان 46
3. گول	47 کان 90
4. جاميٽري جا جوڙجڪ	91 کان 99
5. مساوي جاميٽري	100 کان 123
6. علم مثلث	124 کان 139
7. علم پٽماش	140 کان 163
• جواب	164 کان 168

اچو ته سڳي وٺون.



- ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي جو ريشو
- بنياد تناسب سڌيان جو اُبتڙ
- ٽن پوروچوٽ ليڪن وسيلي ٺهيل انٽرچيڊن جي خاصيت
- ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائي لاءِ آزمائشون
- بنياد تناسب سڌيان
- ٽڪنڊي جي ڪنڊ جي اڌڪ جي خاصيت
- هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي ايراضي جو ريشو.

ذرا ياد ڪريو.



آسان ريشو ۽ پروپورشن انهن بابت آڀياس ڪيو آهي ان ويچار ڌارا ۾ آسان واڌو حقيقي عددن بابت سوچيندا آهيون. آسان ڪي ڄاڻ آهي ته ليڪ - ٽڪر جي ڊيگهه ۽ ڪنهن شڪل جي ايراضي، اهي واڌو حقيقي عدد هوندا آهن. آسان ڪي ٽڪنڊي جي ايراضي لهڻ جو عام سوتر معلوم آهي.

$$\text{اوچائي} \times \text{پايو} = \frac{1}{2} \times \text{ٽڪنڊي جي ايراضي}$$


ڄاڻي وٺون.




ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي جو ريشو (Ratio of areas of two triangles)

ڪهڙا به ٻه ٽڪنڊا ڪٽي، انهن جي ايراضي جو ريشو لهنداسين.

مثال $\triangle ABC$ ۾ BC پايو آهي ۽ AD اوچائي آهي



شڪل 1.1



شڪل 1.2

$\triangle PQR$ ۾ QR پايو آهي ۽ PS اوچائي آهي

$$\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle PQR)} = \frac{\frac{1}{2} \times BC \times AD}{\frac{1}{2} \times QR \times PS}$$



$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AD}{QR \times PS}$$

تنهن ڪري ٻن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو، سندن پائين ۽ نسبتي اوچاين جي ضرب اُپٽ جي ريشو جي برابر آهي.


هڪ ٽڪنڊي جو پايو b_1 ۽ اوچائي h_1 آهي ۽ ٻئي ٽڪنڊي جو پايو b_2 ۽ اوچائي h_2 آهي ته

$$\frac{b_1 \times h_1}{b_2 \times h_2} = \text{انهن جي ايراضيون جو ريشو}$$


انهن ٻن ٽڪنڊن بابت، ڪي شرط ڪٿا ته

شرط 1 : ٻنهي ٽڪنڊن جون اوچايون برابر هجن ته

:



شڪل 1.3




شڪل 1.4

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times h}{QR \times h} = \frac{BC}{QR}$$

$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{b_1}{b_2}$$

خاصيت : برابر اوچاين وارن ٻن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو، سندن نسبتي پائين جي ريشو جي برابر آهي

شرط 2 : ٻنهي ٽڪنڊن جا پايا برابر هجن ته




شڪل 1.5

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APB)} = \frac{AB \times h_1}{AB \times h_2}$$

$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APB)} = \frac{h_1}{h_2}$$


خاصيت : برابر پايي وارن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو، سندس نسبتي اوچاين جي ريشو جي برابر آهي.

هيٺ ڏنل چوڪنڊن ۾ مناسب جواب ڀريو.



شکل 1.6

$$\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle APQ)} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square}$$



شکل 1.7


$$\frac{A(\triangle LMN)}{A(\triangle DMN)} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{\square}$$

(iii) AB ٽڪر جو M مڌيه ٿيڻ آهي.

ٽڪر CM، اهو $\triangle ABC$ جو مڌيان آهي.

$$\therefore \frac{A(\triangle AMC)}{A(\triangle BMC)} = \frac{\square}{\square}$$

$$= \frac{\square}{\square} = \square$$



شکل 1.8

حل ڪيل مثال


مثال (1)

پرواري شکل ۾ ٽڪر $AE \perp BC$,

ليڪ $DF \perp BC$ ٽڪر

$$AE=4, DF=6$$

$$\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DBC)} \text{ ته لھو}$$




شکل 1.9

$$\text{حل : } \frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DBC)} = \frac{AE}{DF} \dots \dots \dots \text{برابر پائين وارن ٽڪنڊن جي ايراضي جو ريشو}$$

$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

مثال (2) $\triangle ABC$ جي پاسي BC تي ٽپڪو D آهي ته ، $BC = 15$, $DC = 6$.

$A(\triangle ADC) : A(\triangle ABC) :: A(\triangle ABD) : A(\triangle ABD)$ لھو .



شکل 1.10


حل : $\triangle ABD$ انھن ٽنھي ٽڪنڊن جو عام نوڪي A ٽپڪو آھي ۽ انھن جا پايو هڪ ئي ليڪ تي آھن مطلب ٽنھي ٽڪنڊن جي اوچائي برابر آھي .

$$BC = 15, DC = 6 \therefore BD = BC - DC = 15 - 6 = 9$$

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots \frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ABC)} &= \frac{BD}{BC} \\ &= \frac{9}{15} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots \frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ADC)} &= \frac{BD}{DC} \\ &= \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$\square ABCD$ هڪ پوروچوٽ پاسو چوڪنڊو آھي پاسي BC مٿان P هڪ ٽپڪو آھي ته برابر ايراضي واري ٽڪنڊن جون ٻه جوڙيون ٻولھيو .



شکل 1.11

حل : $\square ABCD$ هڪ پوروچوٽ پاسو چوڪنڊو آھي .

$$\therefore AD \parallel BC \text{ ۽ } AB \parallel DC$$

$$\triangle BDC \text{ ۽ } \triangle ABC \text{ سوچيو}$$

اھي ٻه ٽڪنڊا ٻن پوروچوٽ ليڪن وچھڻڪٽل آھن مطلب پوروچوٽ ليڪن وچھڻ مفاصلو انھن ٻن ٽڪنڊن جي اوچائي آھي .

$$\triangle ABC \text{ ۽ } \triangle BDC \text{ پاسو } BC, \text{ عام پايو ۽ برابر اوچائي آھي .}$$

$$\text{يعني } A(\triangle ABC) = A(\triangle BDC)$$

پاسو AB عام پايو آھي ۽ برابر اوچائي آھي .

$$\therefore A(\triangle ABC) = A(\triangle ABD)$$


پير واري شڪل ۾ $\triangle ABC$ پاسي AC تي D هڪ ٽپڪو آهي.

$$AC = 16, DC = 9$$

$BP \perp AC$ هيٺ ڏنل ريشا لھو.

$$i) \frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ABC)} \quad ii) \frac{A(\triangle BDC)}{A(\triangle ABC)}$$

$$iii) \frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle BDC)}$$



شڪل 1.12

مثال : $\triangle ABC$ ۾ پاسي AC مٿان P ۽ D ٽپڪا آهن. $\triangle APB$, $\triangle ABC$, $\triangle BDC$, $\triangle ABD$ انهن ۾ B اهو عام نوڪي ٽپڪو آهي. انهن جا پايا AP , AC , DC , AD هڪ ليڪ تي آهن انهن سڀني ٽڪنڊن جي اوچائي برابر آهي. انڪري انهن ٽڪنڊن جي ايراضي سندن پايي جو ريشو آهي.

$$AC = 16, DC = 9$$

$$\therefore AD = 16 - 9 = 7$$

$$\therefore \frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ABC)} = \frac{AD}{AC} = \frac{7}{16} \quad (\text{برابر اوچائيءَ وارا ٽڪنڊا})$$

$$\frac{A(\triangle BDC)}{A(\triangle ABC)} = \frac{DC}{AC} = \frac{9}{16} \quad (\text{برابر اوچائيءَ وارا ٽڪنڊا})$$

$$\frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle BDC)} = \frac{AD}{DC} = \frac{7}{9} \quad (\text{برابر اوچائيءَ وارا ٽڪنڊا})$$

اهو ڏيان ڀر ڪو.



● ٻن ٽڪنڊن جي ايراضين جو ريشو، سندن پايي ۽ نسبتي اوچاين جي ضرب اُپت جي ريشو جي برابر آهي.


● برابر اوچائي وارن ٽڪنڊن جي ايراضين جو ريشو، انهن جي نسبتي پايي جي ريشو جي برابر آهي.

● برابر پايي وارن ٽڪنڊن جي ايراضين جو ريشو، انهن جي نسبتي اوچاين جي ريشو جي برابر آهي.

آپيلاس 1.1

1. هڪ ٽڪنڊي جو پايو 9 ۽ اوچائي 5 آهي ٻئي ٽڪنڊي جو پايو 10 ۽ اوچائي 6 آهي ته

انهن ٽڪنڊن جي ايراضين جو ريشو لھو.



شکل 1.13

2. ڏنل شڪل 1.13 ۾ $BC \perp AB$ ۽


تہ $AD \perp AB$, $BC = 4$, $AD = 8$

$$\text{لهو } \frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle ADB)}$$


3. پير واري شڪل 1.14 ۾ ٽڪر $PS \perp RQ$ ۽ ٽڪر

آهي ٽڪر $PR \perp QT$ جيڪڏهن

$PR = 12$, $PS = 6$, $RQ = 6$ ته QT لهو .



شڪل 1.14



شڪل 1.15

4. پير واري شڪل ۾ $AD \parallel BC$ ۽ $AP \perp BC$

تہ $A(\triangle ABC) : A(\triangle BCD)$ لهو .

5. پير واري شڪل ۾ $AD \perp BC$ ۽ $PQ \perp BC$


تہ هيٺ ڏنل ريشا لهو.

i) $\frac{A(\triangle PQB)}{A(\triangle PBC)}$

ii) $\frac{A(\triangle PBC)}{A(\triangle ABC)}$

iii) $\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle ADC)}$

iv) $\frac{A(\triangle ADC)}{A(\triangle PQC)}$




شڪل 1.16



بنيادي تناسبيت سڌيان (Basic Proportionality Theorem)

سڌيان : جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پورچوٽ ليڪ ٻين ٻن پاسن کي جدا جدا ٿيڪن وٽ ڪپي ٿي ته اها ليڪ انهن پاسن کي ساڳئي ريشي ۾ ورهائي ٿي.



شکل 1.17

ڏنل : $\triangle ABC$ ۾ ٽڪر $BC \parallel l$ ليڪ

۽ ليڪ l اها پاسي AB کي P تي ۽ پاسي AC کي Q وٽ ڪپي ٿي.

$$\text{ثابت ڪرڻ : } \frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

جوڙجڪ : ٽڪر PC ۽ ٽڪر BQ ڪڍو.

ثابتي : $\triangle APQ$ ۽ $\triangle PQB$ اهي ساڳئي اوچائيءَ وارا ٽڪنڊا آهن.

$$(I) \dots\dots\dots \therefore \frac{A(\triangle APQ)}{A(\triangle PQB)} = \frac{AP}{PB}$$

$$(II) \dots\dots\dots \frac{A(\triangle APQ)}{A(\triangle PQC)} = \frac{AQ}{QC}$$

$\triangle PQC$ ۽ $\triangle PQB$ ٽڪر PQ عام پايو آهي ۽ ٽڪر $BC \parallel PQ$ مطلب $\triangle PQC \cong \triangle PQB$ انهن جي اوچائي برابر آهي.

$$\therefore A(\triangle PQB) = A(\triangle PQC) \dots\dots\dots (III)$$

$$[(III) \text{ ۽ } (II), (I)] \dots\dots\dots \therefore \frac{A(\triangle APQ)}{A(\triangle PQB)} = \frac{A(\triangle APQ)}{A(\triangle PQC)}$$

$$[(II) \text{ ۽ } (I)] \dots\dots\dots \therefore \frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

بنيادي تناسبيت سڌيان جو اُٻتڙ (converse of B.P.T.)


سڌيان : جيڪڏهن ڪا ليڪ ٽڪنڊي جي ڪن به ٻن پاسن کي ساڳئي ريشي ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ليڪ ٽئين پاسي جي پورچوٽ هوندي آهي.

شکل 1.18 ۾ ليڪ l اها $\triangle ABC$ جي پاسن AB ۽ AC کي

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

نمبر وار P ۽ Q ٿيڪن تي ڪپي ٿي ۽


ته ليڪ $l \parallel BC$ ٽڪر



شکل 1.18

ان سڌيان جي ثابتي اڻ سڌي طريقي
ڏجي ٿي.

مشغولي :



شکل 1.19

- $\triangle ABC$ ڪهڙو به ٽڪنڊو ڪڍو.
- ٽڪنڊي جي $\angle B$ جو اڌڪ ڪڍو AC تي جتي ڪپي، ان کي D نالو ڏيو.
- پاسا ماپي لکو
- $AB = \square$ س.م $BC = \square$ س.م
- $AD = \square$ س.م $DC = \square$ س.م

• $\frac{AB}{BC} \neq \frac{AD}{DC}$ اهي ريشا لھو.


- اهي ٻئي ريشا لڳيڻ ساڳيا آهن. اهو آزمودو وٺو.
- ان ٽڪنڊي جي ٻين ڪنڊن جا اڌڪ ڪڍي، مٿئين نموني ريشا لھو اهي ريشا برابر آهن اهو آزمودو وٺو.

چاڻي وٺون



ٽڪنڊي جي ڪنڊ - اڌڪ جو سڌيان (Theorem of an angle bisector of a triangle)

سڌيان : ٽڪنڊي ۾ ڪنڊ جو اڌڪ، ان ڪنڊ جي مخالف پاسي کي ٻين پاسن جي برابر ريشو ۾ ورهائي ٿو.



شکل 1.20

ڏنل : $\triangle ABC$ ۾ $\angle C$ جو اڌڪ ٽڪر AB کي E وٽ ڪپي ٿو.

ثابت ڪرڻ : $\frac{AE}{EB} = \frac{CA}{CB}$

جوڙجڪ : ٽپڪي B وٽان ڪرڻي CE جي پوروچوٽ ليڪ ڪڍو جيڪا وڌايل AC کي ٽپڪي B وٽ ڪپي ٿي.

ثابتي : ڪرڻو $CE \parallel BD$ ۽ ليڪ AD ڇيڊڻي آهي.

..... (نسبتي ڪنڊون). (I)

$$\therefore \angle ACE \cong \angle CDB$$

هاڻي BC ڇيڊڻي ڪڍي

..... (متبادل ڪنڊون). (II)

$$\angle ECB \cong \angle CBD$$

..... (ڏنل). (III)

$$\angle ACE \cong \angle ECB \text{ پر}$$

..... [(III), (II), (I)]

$$\therefore \angle CBD \cong \angle CDB$$

..... (نهڪندڙ ڪنڊن جي مخالف پاسا)

$\triangle CBD$ ۾، ٽڪر $CB \cong CD$ پاسو

..... (IV)

$$\therefore CB = CD$$

هاڻي، $\triangle ABD$ ۾، ٽڪر $EC \parallel BD$ پاسو


$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{AC}{CD} \text{ بنيادي تناسبيت سڏيان} \quad (V)$$

..... [(IV) ۽ (V) مان]

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{AC}{CB}$$


مٿئين سڏيان جي ثابتي توهان ٻئي طريقي لکو.

اُن لاءِ شڪل 1.21 موجب $DM \perp AB$ ۽ $DN \perp AC$ ڪڍو.



شڪل 1.21

(1) برابر اوچائي وارن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو.



شڪل 1.22

(2) انهن جي نسبتي پايڻ جو ريشو برابر ٿيندو آهي.


اِهو ڪم آڻيو.

ٽڪنڊي جي اڌڪ جي سڌيان جو اُبتڙ (Converse of angle bisector of triangle)

$\triangle ABC$ جي پاسي BC مٿان ٽڪو D اهڙي نموني آهي جو $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ ، ته ڪرڻو AD اهو $\angle BAC$ جو اڌڪ آهي.

ٽن پوروچوٽ ليڪن وسيلي ٺهيل اُنترچيدن جي خاصيت
(Property of three parallel lines and their intercepts)

مشغولي :



شڪل 1.23

• ٽي پوروچوٽ ليڪون ڪڍو.

• انهن کي l, m, n نالا ڏيو.


• t_1 ۽ t_2 ٻه چيدڻيون ڪڍو.

• t_1 چيدڻي ۾ AB ۽ BC اُنتر چيد آهن.

• t_2 چيدڻي ۾ PQ ۽ QR اُنتر چيد آهن.

• $\frac{PQ}{QR} = \frac{AB}{BC}$ اهي ريشا ڪڍو اهي لڳڻ سڳيا آهن اهو آزمودو وٺو.

خاصيت : ٽن پوروچوٽ ليڪن سبب هڪ چيدڻيءَ تي ٺهيل اُنترچيدن جو ريشو ساڳين ٽن پوروچوٽ ليڪن سبب ٻي چيدڻيءَ تي ٺهيل اُنترچيدن جي برابر ٿئي ٿو.



شڪل 1.24

ڏنل : ليڪ $l \parallel m \parallel n$

t_1 ۽ t_2 ٻه چيدڻيون آهن.

t_1 انهن ليڪن کي نمبروار A, B, C

وت ڪڍي ٿي. t_2 چيدڻي انهن ليڪن

کي نمبروار P, Q, R وت ڪڍي ٿي.

ثابت ڪرڻ : $\frac{AB}{BC} = \frac{PQ}{QR}$

ثابتي : ٽڪر PC ڪڍو اهو ليڪ m ٽڪي D وت ڪڍي ٿو.

$\triangle ACP$ ۾ $BD \parallel AP$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PD}{DC} \dots \dots (I) \quad (\text{بنيادي تناسبيت سڌيان})$$

$\triangle CPR$ ۾ $DQ \parallel CR$

$$\therefore \frac{PD}{DC} = \frac{PQ}{QR} \dots \dots (II) \quad (\text{بنيادي تناسبيت سڌيان})$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PQ}{QR} \quad \therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PD}{DC} = \frac{PQ}{QR} \dots \dots (I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان}$$

تکر PQ || تکر AC

$$\frac{BP}{PA} = \frac{BQ}{QC} \quad \text{ii}$$


$$\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR} \quad \text{3.}$$

QR. تکر || ST تکر

آهي C-D-A،


$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} \text{ ق}$$



(3)

ۛ m ۛ ۛ چیدٹيون آھن تہ

$$\frac{AB}{BC} = \frac{XY}{YZ} \quad \text{ت}$$

شڪل 1.29

مثال (1) $DE \parallel BC$ ۾ $\triangle ABC$ (شڪل 1.29)

جيڪڏهن $AD = 1.8$ ۽ $DB = 5.4$ س ۾

$EC = 7.2$ س ۾ AE ته لھو.

حل : $DE \parallel BC$ ۾ $\triangle ABC$

$$\therefore \frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DB} \dots\dots (بنيادي تناسبيت سڏيان)$$

$$\therefore \frac{AE}{7.2} = \frac{1.8}{5.4}$$

$$\therefore 1.8 \times 7.2 = 5.4 \times AE$$

$$\therefore AE = \frac{1.8 \times 7.2}{5.4} = 2.4$$

$$AE = 2.4 \text{ س ۾}$$

مثال (2) $\triangle PQR$ ۾ RS اهو $\angle R$ جو آڌڪ آهي جيڪڏهن (شڪل 1.30)

$$PS = 12, RQ = 20, PR = 15$$

ته SQ لھو. ٽڪنڊي..


حل : $\triangle PRQ$ ۾ ٽڪر RS اهو $\angle R$ جو آڌڪ آهي

$$\dots\dots\dots (ٽڪنڊي جو ڪنڊ آڌڪ سڏيان) \frac{PR}{RQ} = \frac{PS}{SQ}$$

$$\frac{15}{20} = \frac{12}{SQ}$$

$$SQ = \frac{12 \times 20}{15} = 16$$

$$\therefore SQ = 16$$



شڪل 1.30


ڏنل شڪل ۾ 1.31 ۾ $AB \parallel CD \parallel EF$ جيڪڏهن

$AC = 5.4, CE = 9, BD = 7.5$ ته DF لھو

حل : $AB \parallel CD \parallel EF$

$$\frac{AC}{\square} = \frac{\square}{DF} \dots\dots\dots (\square)$$

$$\frac{5.4}{9} = \frac{\square}{DF} \therefore DF = \square$$



شڪل 1.31


مشغولي :

مشغولي:

$\triangle ABC$ ۾ ڪرڻو BD اهو $\angle ABC$ جو اڌ آهي.

$A-E-B, BC \parallel DE$ ۽ $A-D-C$ ٺڪر

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{EB} \text{ ثابت ڪريو،}$$



شڪل 1.32

ثابتي: $\triangle ABC$ ۾ ڪرڻو BD اهو $\angle B$ جو اڌ آهي.

$$(I) \dots\dots\dots \therefore \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$$

$\triangle ABC$ ۾ $DE \parallel BC$


$$(II) \dots\dots\dots \frac{AE}{EB} = \frac{AD}{DC}$$

(I) ۽ (II) مان


$$\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{EB}$$

آپيلاس 1.2


1. هيٺ ڪجهه ٺڪندا ڏنل آهن ۽ ٽڪرن جي ڊيگهه ڏنل آهي ٻڌايو ته ڪهڙي شڪل ۾ ڪرڻو PM اهو $\angle QPR$ جو اڌ آهي.




شڪل 1.35



شڪل 1.34




شڪل 1.33



شڪل 1.36

2. $\triangle PQR$ ۾ $PQ = 25$, $PM = 15$

$NR = 8$, $PR = 20$ ته ٺڪر NM اهو پاسي RQ جي پورو ڇوٽ آهي ڇا؟ سبب لکو.




شکل 1.37

3. $\angle N$ ۾ $\triangle MNP$ جو NQ اڌڪ آهي.
جيڪڏهن $MN = 5$, $PN = 7$, $MQ = 2.5$ ته QP لھو.

4. شڪل ۾ ڪجهه ڪنڊن جون ماپون مليل


$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

آھن ثابت ڪري ڏيکاريو ته




شکل 1.38

5. $\square ABCD$ هڪ پورعمودي چوڪنڊو آهي ان ۾
 $DC \parallel PQ \parallel AB$ جيڪڏهن $AP = 15$,
 $QC = 14$, $PD = 12$ ته BQ لھو




شکل 1.39

6. شڪل 1.40 ۾ ڏنل ڄاڻ موجب QP لھو.



شکل 1.40


7. پرواري شڪل 1.41 ۾ $AB \parallel CD \parallel FE$
ته x جو ملھ لھو ۽ AE لھو.




شکل 1.41

8. $\triangle LMN$ ۾ ڪرڻو MT ۽ $\angle LMN$ جو اڌڪ آهي.

جيڪڏهن $LM = 6$ ، $MN = 10$ ، $TN = 8$ ته LT ڇا آهي.




شکل 1.42



شکل 1.43

9. $\triangle ABC$ ۾ ٽڪر BD ۽ $\angle ABC$ جو اڌڪ آهي. جيڪڏهن $AB = x$ ، $BC = x + 5$ ، $AD = x - 2$ ، $DC = x + 2$ ته x جو ملهه ڇا آهي.

10. پرواري شکل 1.44 ۾ ٽڪنڊي جي اندر ٽپڪو X آهي. اهو ٽپڪو X نوڪي ٽپڪن سان جوڙيل آهي. $PQ \parallel DE$ ، $QR \parallel EF$ ۽ $PR \parallel DF$ ته ثابت ڪرڻ لاءِ چوڪنڊا پورا ڪريو.



شکل 1.44

.....
(I) (بنيادي تناسبيت سڌيان جي اُبتڙ)

.....
(II).....

..... (I) ۽ (II) مان

..... (بنيادي تناسبيت سڌيان جي اُبتڙ)

ثابتي : $\triangle XDE$ ۾ $PQ \parallel DE$

$$\therefore \frac{XP}{QE} = \frac{XD}{DE}$$

$\triangle XEF$ ۾ $QR \parallel EF$

$$\therefore \frac{XF}{FE} = \frac{XR}{ER}$$

$$\therefore \frac{XF}{FE} = \frac{XD}{DE}$$

$\therefore PR \parallel DF$ ٽڪر

11* $\triangle ABC$ ۾ $\angle B$ ۽ $\angle C$ جا اڌڪ پاسن AC ۽ AB تي نمبر وار D ۽ E ٽپڪن وٽ ڪپڻ ٿا ثابت ڪريو. $ED \parallel BC$




هڪ جهڙا ٿڪندا (Similar triangles)

$\triangle DEF \cong \triangle ABC$ جيڪڏهن $\angle D \cong \angle A$,

$\angle C \cong \angle F$ ۽ $\angle B \cong \angle E$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} \text{ ۽}$$

ته $\triangle DEF \cong \triangle ABC$ هڪ جهڙا ٿڪندا آهن.



شڪل 1.45

$\triangle DEF \cong \triangle ABC$ هڪ جهڙا آهن $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ائين لکبو آهي.

جاڻي وٺون.




ٿڪندڙ جي هڪ جهڙائيءَ لاءِ آزمائشون (Tests for similarity of triangles)

ٻن ٿڪندڙ جو هڪ جهڙا ٿڪندا ٿيڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته انهن جا ٽيئي نسبتي پاسا ساڳئي ريت هجن ۽ ٽيئي نسبتي ڪندڙ ٺهڪندڙ هجن پر انهن ڇهن شرطن مان جيڪڏهن ٽي خاص شرطون پوريون ٿين ته باقي بچيل ٽي شرطون خود به خود پوريون ٿينديون. اهي ٽيئي شرطون ڇاڇڻ کان پوءِ خبر پوندي ته ٻئي ٿڪندا هڪ جهڙا آهن يا نه. انهن شرطن کي ٿڪندڙ جي هڪ جهڙائيءَ لاءِ آزمائشون چئبو آهي.

ٿڪندڙ جي هڪ جهڙائيءَ لاءِ ڪند-ڪند-ڪند آزمائش

(AAA test for similarity of triangles)

ٻن ٿڪندڙ جي نوڪي ٽپڪن وچ ۾ هڪ هڪ لاڳاپو موجب جيڪڏهن نسبتي ڪندڙ ٺهڪندڙ هونديون ته ٿڪندا هڪ جهڙا هوندا.



شڪل 1.46

$$ABC \leftrightarrow PQR \text{ ۽ } \triangle PQR \cong \triangle ABC$$

جيڪڏهن $\angle B \cong \angle Q$, $\angle A \cong \angle P$,



ته $\angle C \cong \angle R$ ۽ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$.



وڌيڪ ڄاڻ لاءِ :

ڪنڊ - ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش لاءِ ثابتي

ڏنل : $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ،
 $\angle B \cong \angle Q$, $\angle A \cong \angle P$
 $\angle C \cong \angle R$



شڪل 1.47

ثابتي ΔABC ، ΔPQR جي پيٽ ۾ وڌو آهي. پاسي AB مٿان ٽپڪو M پاسي AC مٿان :
 ٽپڪو N اهڙي نموني کڻو جيئن $AM = PQ$ ۽ $AN = PR$ هجي پوءِ
 $\Delta AMN \cong \Delta PQR$ ڏيکاريو. هاڻي $MN \parallel BC$ ثابت ڪبي.

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \text{ ، بنيادي تناسبيت سڌيان موجب ،}$$

$$\frac{MB}{AM} = \frac{NC}{AN} \text{ ، مطلب ،} \dots\dots\dots \text{ (انورٽينڊو)}$$

$$\frac{MB + AM}{AM} = \frac{NC + AN}{AN} \dots\dots\dots \text{ (ڪامپونينڊو)}$$

$$\frac{AC}{AN} = \frac{AB}{AM} \therefore$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} \text{ مطلب } \frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ} \therefore$$

$$\Delta ABC \sim \Delta PQR \therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} \therefore$$

ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائي لاءِ ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش (AA test for similarity of triangles)

ٽڪنڊن ۾ نوڪي ٽپڪن وچ ۾ هڪ - هڪ لاڳاپو موجب جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ، ٻئي ٽڪنڊي جي نسبتتي ٻن ڪنڊن سان ٺهڪندڙ آهن ته پهرين ٽڪنڊن جي بچيل ڪنڊ ، ٻئي ٽڪنڊي جي بچيل ڪنڊ سان ٺهڪندڙ ٿيندي اها اسان کي ڄاڻ آهي. مطلب هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ٻئي ٽڪنڊن جي نسبتتي ٻن ڪنڊن سان ٺهڪندڙ آهن ته ان شرط موجب ٻئي ٽڪنڊا هڪ جهڙا ٿي سگهندا ، مطلب هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ، ٻئي ٽڪنڊي جي نسبتتي ٻن ڪنڊن سان ٺهڪندڙ آهن ته اهي ٻئي ٽڪنڊا هڪ جهڙا هوندا .

ان خاصيت کي هڪ جهڙائي لاءِ ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش چئبو آهي.


ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائيءَ لاءِ پاسو - پاسو آزمائش (SAS test for similarity of triangles) جيڪڏهن ٻن ٽڪنڊن ۾ نوڪي ٽپڪن وچ ۾ هڪ لڳاپو موجب انهن جي نسبتي ٻن پاسن جو جوڙيون ڀرپور ۾ آهن ۽ انهن پاسن وچ ۾ سمايل ڪنڊون نهڪندڙ آهن ته اهي به ٽڪنڊا هڪ جهڙا هوندا.

مثال، $\triangle RST \approx \triangle KLM$ ۾ جيڪڏهن

$$\angle KLM \cong \angle RST$$

$$\frac{KL}{RS} = \frac{LM}{ST}$$

مطلب $\triangle KLM \sim \triangle RST$




شڪل 1.48

ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائيءَ لاءِ پاسو - پاسو - پاسو آزمائش (SSS test for similarity of triangles) ٻن ٽڪنڊن ۾ نوڪي ٽپڪن وچ ۾ هڪ لڳاپو موجب، جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جا ٽيئي پاسا ٻئي ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن سان ڀرپور ۾ هجن ته اهي ٽڪنڊا هڪ جهڙا هوندا. ان آزمائش کي پاسو - پاسو آزمائش چئبو آهي.

مثال، $\triangle XYZ \approx \triangle PQR$ ۾ جيڪڏهن

$$\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ} = \frac{PR}{XZ}$$

مطلب $\triangle PQR \sim \triangle XYZ$



شڪل 1.49

هڪ جهڙن ٽڪنڊن جون خاصيتون

(1) $\triangle ABC \sim \triangle ABC$ - (Reflexivity)

(2) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ته $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ - (Symmetry)

(3) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ۽ $\triangle DEF \sim \triangle GHI$ ته $\triangle ABC \sim \triangle GHI$ - (Transitivity)

حل ڪيل مثال


مثال. (1) $\triangle XYZ$ ۾ $\angle Y = 100^\circ$

$$\angle Z = 30^\circ$$

$\triangle LMN$ ۾ $\angle M = 100^\circ$

$\angle N = 30^\circ$ ته ڇا $\triangle LMN \approx \triangle XYZ$

هڪ جهڙا آهن؟



شڪل 1.50

جي آهن ته ڪهڙي آزمائش موجب؟

حل : $\Delta LMN \cong \Delta XYZ$ ۽

$$\angle Y = 100^\circ, \angle M = 100^\circ \therefore \angle Y \cong \angle M$$


$$\angle Z = 30^\circ, \angle N = 30^\circ \therefore \angle Z \cong \angle N$$

$\therefore \Delta XYZ \sim \Delta LMN$ (ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش موجب)

مثال (2) شڪل 1.51 ۾ ڏنل ڄاڻ موجب ٿڪندڙا هڪ جهڙا

آهن ڇا؟ جي آهن ته ڪهڙيءَ آزمائش

موجب؟



شڪل 1.51

حل : $\Delta U VW \cong \Delta PMN$ ۽

$$\frac{PM}{UV} = \frac{6}{3} = \frac{2}{1}, \frac{MN}{VW} = \frac{10}{5} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore \frac{PM}{UV} = \frac{MN}{VW}$$


۽ $\angle M \cong \angle V$ (ڏنل)

$\therefore \Delta PMN \sim \Delta UVW$ پاسو ڪنڊ - پاسو آزمائش

مثال (3) شڪل 1.52 ۾ ڏنل ڄاڻ موجب ڇا ٿڪندڙا

هڪ جهڙا آهن؟ جي آهن ته

ڪهڙيءَ آزمائش موجب؟



شڪل 1.52

حل : $\Delta MNP \cong \Delta XYZ$ ۽

$$\frac{XY}{MN} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3},$$

$$\frac{YZ}{NP} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{XY}{MN} = \frac{YZ}{NP}$$

پر $\angle Z \cong \angle P$ ڏنل آهي ۽ اهي ڪنڊون پروپورشن ۾ هونديون پاسن جو سمائل ڪنڊون نه آهن.

انڪري $\Delta MNP \cong \Delta XYZ$ اهي هڪ جهڙا ٿڪندڙا نه آهن.

مثال (4)

پرواري شکل ۾ $A-P-C$ ، $CQ \perp AB$ ، $BP \perp AC$ ۽ $A-Q-B$ ثابت ڪريو ته $\triangle AQC$ ۽ $\triangle APB$ هڪ جهڙا آهن.

حل : $\triangle AQC$ ۽ $\triangle APB$


$$(I) \quad \square^\circ = \angle APB$$

$$(II) \quad \square^\circ = \angle AQC$$

$\therefore \angle APB \cong \angle AQC$ (I) ۽ (II) مان

$$(\dots\dots\dots) \quad \angle PAB \cong \angle QAC$$


$\therefore \triangle APB \sim \triangle AQC$ (کنڊ - کنڊ آزمائش)



شکل 1.53

مثال (5) $\square ABCD$ ۾ اُڀر ٿيڻ تي Q وٽ پاڻ ۾ ڪپين ٿا $2QA = QC$ ۽ $2QB = QD$.

ته ثابت ڪريو $DC = 2AB$



شکل 1.54

$$2QA = QC \quad : \quad \text{ڏنل}$$

$$2QB = QD$$

$$CD = 2AB \quad : \quad \text{ثابتي}$$

$$(I) \quad \dots\dots\dots \quad 2QA = QC \quad \therefore \frac{QA}{QC} = \frac{1}{2} \quad : \quad \text{ثابتي}$$

$$(II) \quad \dots\dots\dots \quad 2QB = QD \quad \therefore \frac{QB}{QD} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{QA}{QC} = \frac{QB}{QD} \quad (I) \quad \text{۽} \quad (II) \quad \text{مان}$$

$$\triangle CQD \quad \text{۽} \quad \triangle AQB$$

$$\frac{QA}{QC} = \frac{QB}{QD}$$


$$\angle AQB \cong \angle DQC$$

$$\therefore \triangle AQB \sim \triangle CQD$$

$$\therefore \frac{AQ}{CQ} = \frac{QB}{QD} = \frac{AB}{CD}$$

$$\therefore \frac{AQ}{CQ} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2}$$


$$\therefore 2AB = CD$$




شکل 1.55

1. شکل 1.55 ۾ $\angle ABC = 75^\circ$ ۽ $\angle EDC = 75^\circ$ ڪهڙا ٿڪندا، ڪهڙيءَ آزمائش موجب هڪ جهڙا آهن؟
اُنهن جي هڪ جهڙائي هڪ - هڪ نسبت موجب لکو.

2. شکل 1.56 ۾ ٿڪندا هڪ جهڙا آهن ڇا؟
جي آهن ته ڪهڙيءَ آزمائش موجب؟



شکل 1.56



شکل 1.57

3. شکل 1.57 ۾ 8 ميٽر ۽ 4 ميٽر اوچائيءَ وارا ٻه ٽنڀا سڌا زمين تي بيٺل آهن. سج جي روشنيءَ ننڍي ٽنڀي جو پاڇو 6 ميٽر پوي ٿو. اُن وقت ئي وڏي ٽنڀي جي پاڇي جي ڊيگهه ڪيتري؟


4. $\triangle ABC$ ۾ $BQ \perp AC$ ۽ $AP \perp BC$

$B-P-C$ ۽ $A-Q-C$ ثابت ڪريو ته


$\triangle CPA \sim \triangle CQB$ جيڪڏهن

$AP = 7$, $BQ = 8$, $BC = 12$

ته AC لھو.



1.58



شکل 1.59


5. شکل ۾ پور عمودي چوکنڊو PQRS ۾ پاسو ۽
 $PQ \parallel SR$ ۾ پاسو $AR = 5AP$ ۽ $AS = 5AQ$ ثابت ڪريو.
 $SR = 5PQ$

6. پور عمودي چوکنڊو ABCD ۾ پاسو (شکل 1.60)

پاسو $AB \parallel DC$ ۽ اُڀر AC ۽ اُڀر BD

هڪ ٻئي کي ٽڪي O وٽ ڪپين ٿا.


$AB = 20$ ، $DC = 6$ ، $OB = 15$ ته OD لھو.



شکل 1.60

7. $\square ABCD$ هڪ پوروچوت پاسو چوکنڊو آهي
 پاسي BC مٿان هڪ ٽڪو E آهي ليڪ DE اها
 ڪرڻي AB کي ٽڪي T وٽ ڪپي ٿي ثابت ڪريو.

$$DE \times BE = CE \times TE$$




شکل 1.61

8. شکل ۾ ٽڪر AC ۽ BD ٽڪر P هڪ ٻئي


$$\frac{AP}{CP} = \frac{BP}{DP}$$

ثابت ڪريو $\triangle ABP \sim \triangle CDP$



شکل 1.62

شکل 1.63



9. شکل ۾ $\triangle ABC$ ۾ پاسي BC مٿان ٽڪو D


اهڙي نموني آهي جو $\angle BAC = \angle ADC$
 ته ثابت ڪريو.

$$CA^2 = CB \times CD$$



هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو سڌيان (Theorem of areas of similar triangles)

سڌيان : جيڪڏهن ٻه ٽڪنڊا هڪ جهڙا آهن ته انهن جي ايراضيون جو ريشو، سندن نسبتي پاسن جي ٻي سگهه جي ريشو جي برابر ٿئي ٿو.



شڪل 1.64

ڏنل : $ABC \sim \Delta PQR$, $AD \perp BC$, $PS \perp QR$

ثابت ڪرڻ : $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AC^2}{PR^2}$

(I) ثابت ٿئي ٿو : $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AD}{QR \times PS} = \frac{BC}{QR} \times \frac{AD}{PS}$

$\Delta PQS \cong \Delta ABD$

(ڏنل) $\angle B = \angle Q$

$\angle ADB = \angle PSQ = 90^\circ$

ڪنڊ-ڪنڊ آزمائش آئوسار : $\Delta ABD \sim \Delta PQS$

(II) $\therefore \frac{AD}{PS} = \frac{AB}{PQ}$

پر $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

(III) $\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$

(II) ۽ (III) مان

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC}{QR} \times \frac{AD}{PS} = \frac{BC}{QR} \times \frac{AB}{PQ} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{AC^2}{PR^2}$$

مثال (1) : $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ، $A(\Delta ABC) = 16$ ، $A(\Delta PQR) = 25$ ته $\frac{AB}{PQ}$ اهو ريشو لھو.

حل : $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2}$$

..... هڪ جھڙن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو.

$$\therefore \frac{16}{25} = \frac{AB^2}{PQ^2} \quad \therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{4}{5}$$

..... (ٻيو مول لھندي)

مثال (2) ٻن هڪ جھڙن ٽڪنڊن جي نسبت جي پاسن جو ريشو 2:5 آھي. ننڍي ٽڪنڊي جي ايراضي 64 چ.س.م آھي ته وڏي ٽڪنڊي جي ايراضي ڪيتري؟

حل : سمجھو ته $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ΔABC ننڍو ۽ ΔPQR وڏو ٽڪنڊو آھي.

$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{(2)^2}{(5)^2} = \frac{4}{25}$$

..... (هڪ جھڙن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو)

$$\therefore \frac{64}{A(\Delta PQR)} = \frac{4}{25}$$

$$4 \times A(\Delta PQR) = 64 \times 25$$

$$A(\Delta PQR) = \frac{64 \times 25}{4} = 400 \text{ چ.س.م}$$

$\therefore$ وڏي ٽڪنڊي جي ايراضي = 400 چ.س.م

مثال (3) هڪ پور عمودي چوڪنڊي ABCD ۾ پاسو CD || پاسو AB ، اُڀر AC ۽ اُڀر BD هڪ ٻئي کي

$$\frac{A(\Delta ABP)}{A(\Delta CPD)} = \frac{AB^2}{CD^2}$$


حل : پور عمودي چوڪنڊي ۾ پاسو AB || پاسو CD

ΔCPD ۽ ΔAPB

$\angle PAB \cong \angle PCD$ (متبادل ڪنڊون)

$\angle APB \cong \angle CPD$ (مخالفي ڪنڊون)

$\therefore \Delta APB \sim \Delta CPD$ ڪنڊ آزمائش



شڪل 1.65

$$\therefore \frac{A(\Delta APB)}{A(\Delta CPD)} = \frac{AB^2}{CD^2}$$

..... (هڪ جھڙن ٽڪنڊن جي ايراضيون جو ريشو)

آپياس 1.4

1. ٻن هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي نسبتي پاسن جو ريشو 3:5 آهي ته انهن جي ايراضي جو ريشو ٿيو.

2. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ته $AB : PQ = 2:3$ هيٺ ڏنل چوڪنڊا پورا ڪريو

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{2^2}{3^2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

3. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, $A(\Delta ABC) = 80$, $A(\Delta PQR) = 125$ ته هيٺ چوڪنڊا پورا ڪريو.

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta \dots)} = \frac{80}{125} \quad \therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

4. $\Delta LMN \sim \Delta PQR$, $9 \times A(\Delta PQR) = 16 \times A(\Delta LMN)$ ته $QR = 20$ ته MN ٿيو.


5. ٻن هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي ايراضيون 225 چ س م ۽ 81 چ س م آهن. جيڪڏهن ننڍي ٽڪنڊي جو هڪ پاسو 12 س م آهي ته وڏي ٽڪنڊي جو نسبتي پاسو ٿيو.

6. ΔABC ۽ ΔDEF اهي ٽپور پاسو ٽڪنڊا آهن. $A(\Delta ABC) : A(\Delta DEF) = 4 : 7$ ته $AB = 4$ ته DE جي ڊيگهه ٿيو.

7. شڪل 1.66 ۾ ٽڪر $PQ \parallel DE$, $A(\Delta PQF) = 20$ چ. ايڪا، $PF = 2 DP$ ته $A(\square DPQE)$ ٿيو.

$$A(\Delta PQF) = 20 \text{ چ ايڪا، } PF = 2 DP \text{ سمجھو } DP = x \text{ ته } PF = 2x$$

$$DF = DP + \boxed{} = \boxed{} + \boxed{} = 3x$$



شڪل 1.66

$$\Delta FPQ \sim \Delta FDE$$

$$\angle FDE \cong \angle FPQ \text{ نسبتي ڪنڊون}$$

$$\angle FED \cong \angle FEQ \text{ نسبتي ڪنڊون}$$


$$\therefore \Delta FDE \sim \Delta FPQ \text{ ڪنڊ ڪنڊ آزمائش}$$

$$\therefore \frac{A(\Delta FDE)}{A(\Delta FPQ)} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{(3x)^2}{(2x)^2} = \frac{9}{4}$$

$$\therefore \text{.....} A(\Delta FDE) = \frac{9}{4} A(\Delta FPQ) = \frac{9}{4} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{.....} A(\square DPQE) &= A(\Delta FDE) - A(\Delta FPQ) \\ &= \boxed{} - \boxed{} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

1. هيٺ ڏنل آپ سوالن جا متبادل جواب ڏنل آهن. صحيح متبادل چونڊيو.



شڪل 1.67

(1) $\triangle PQR$ ۽ $\triangle ABC$ جي هڪ هڪ نسبت ۾

$$\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$$


هيٺ وڌائين مان صحيح ڪهڙو؟

(A) $\triangle PQR \sim \triangle ABC$

(B) $\triangle PQR \sim \triangle CAB$

(C) $\triangle CBA \sim \triangle PQR$

(D) $\triangle BCA \sim \triangle PQR$



شڪل 1.68


(2) جيڪڏهن $\triangle PQR$ ۽ $\triangle DEF$

$$\angle D \cong \angle Q, \angle R \cong \angle E$$

هيٺ وڌائين مان غلط ڪهڙو؟

(A) $\frac{EF}{PR} = \frac{DF}{PQ}$ (B) $\frac{DE}{PQ} = \frac{EF}{RP}$

(C) $\frac{DE}{QR} = \frac{DF}{PQ}$ (D) $\frac{EF}{RP} = \frac{DE}{QR}$



شڪل 1.69

(3) $\angle B = \angle E$, $\triangle DEF$ ۽ $\triangle ABC$

$$\angle F = \angle C \text{ ۽ } AB = 3 DE$$

ته انهن ٻن ٽڪڻن لاءِ صحيح بيان ڪهڙو؟

(A) اهي نه ٺهڪندڙ آهن نه هڪ جهڙا

(B) اهي هڪ جهڙا آهن پر نهڪندڙ نه آهن.


(C) اهي نهڪندڙ آهن ۽ هڪ جهڙا آهن.

(D) مٿين بيانن مان ڪوبه صحيح نه آهي.

(4) $\triangle DEF$ ۽ $\triangle ABC$ اهي ٽپور پاسو ٽڪندا آهن.

$$A(\triangle ABC) : A(\triangle DEF) = 1 : 2$$


AB=4 ته DE جي ڊيگهه ڪيتري؟



شڪل 1.70

(A) $2\sqrt{2}$ (B) 4 (C) 8 (D) $4\sqrt{2}$

(5) شکل 1.71 ۾ ٽڪر $BC \parallel XY$ ته هيٺ ڏنل جوابن مان ڪهڙو صحيح جواب آهي؟




شکل 1.71

$$(i) \frac{AB}{AC} = \frac{AX}{AY} \quad (ii) \frac{AX}{XB} = \frac{AY}{AC}$$

$$(iii) \frac{AX}{YC} = \frac{AY}{XB} \quad (iv) \frac{AB}{YC} = \frac{AC}{XB}$$

2. $\triangle ABC$ ۾ $B-D-C$ ۽ $BD=7$, $BC=20$ ته هيٺ ڏنل ريشا لھو؟



شکل 1.72

$$\frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ADC)} \quad (1)$$

$$\frac{A(\triangle ABD)}{A(\triangle ABC)} \quad (2)$$


$$\frac{A(\triangle ADC)}{A(\triangle ABC)} \quad (3)$$

3. برابر اوچاين وارن ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي جو ريشو 2:3 آهي. ننڍي ٽڪنڊي جو پايو 6 س م آهي ته وڏي ٽڪنڊي جو نسبتي پايو ڪيترو ٿيندو؟


شکل 1.73 ۾ $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$

$$AB = 6, DC = 8$$

$$\text{تم ڪيتري؟} = \frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DCB)}$$



شکل 1.73



شکل 1.74


5. شکل ۾ 10 س م $PM =$

$$A(\triangle PQS) = 100 \text{ چ س م}$$

$$A(\triangle QRS) = 110 \text{ چ س م ته NR لھو.}$$

6. $\triangle MNT \sim \triangle QRS$ ٽپڪي 'T' وٽان نڪتل عمود جي ڊيگهه 5 آهي ۽ ٽپڪي 'S' وٽان نڪتل

$$\text{عمود جي ڊيگهه 9 آهي ته } \frac{A(\triangle MNT)}{A(\triangle QRS)}$$



شکل 1.75

7. شکل 1:75 ۾ $A-D-C$ ۽ $B-E-C$

پاسو $AB \parallel DE$ ٽڪر

$AD = 5$, $DC = 3$, $BC = 6.4$


تہ BE لھو.

8. شکل ۾ 1.76 ٽڪر PA , QB , RC ۽ ٽڪر


SD اھي ليڪ AD تي عمود آھن. $AB = 60$,

$BC = 70$, $CD = 80$, $PS = 280$ تہ PQ ,

RS , QR لھو.



شکل 1.76



شکل 1.77

9. $\triangle PQR$ ۾ ٽڪر PM مڌيان آھي ۽ PMQ

PMR جا اٽڪ پاسن PQ ۽ PR وٽ نمبروار X ۽

Y تي ڪپڻ ٿا تہ ثابت ڪريو تہ $XY \parallel QR$

ثابتي لاءِ هيٺ ڏنل چوڪنڊا پورا ڪريو

$\triangle PMQ$ ۾ ڪرڻو $\angle PMQ$, $\angle MX$ جو اٽڪ آھي.

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots \text{(I) اٽڪ سڌيان}$$


$\triangle PMR$ ۾ ڪرڻو $\angle PMR$, $\angle MY$ جو اٽڪ آھي.

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots \text{(II) ڪنڊ - اٽڪ سڌيان}$$

$$\text{پر } \frac{MP}{MQ} = \frac{MP}{MR} \dots\dots\dots \text{M هي QR جو وچ ٽڪو آھي. } MQ=MR$$

$$\therefore \frac{PX}{XQ} = \frac{PY}{YR}$$

بنیادي تناسبیت سڌيان جي اُبتڙ $XY \parallel QR$




شکل 1.78

- 10*. شکل 1.78 ۾ $\angle B$ ۽ $\angle C$ جا اڌڪ هڪ ٻئي کي X وٽ ڪپين ٿا ليڪ AX، پاسي BC کي ٽپڪي Y وٽ ڪپي ٿي. $AB = 4$ ، $AC = 5$ ، $BC = 6$ ، ته $\frac{AX}{XY}$ جو ملهه لھو.

11. ABCD ۾ $AD \parallel BC$ اُڀر AC ۽ اُڀر BD

هڪ ٻئي کي ٽپڪي P وٽ ڪپين ٿا ثابت ڪري ڏيکاريو.

$$\frac{AP}{PD} = \frac{BP}{PC}$$




شکل 1.79

12. شکل 1.80 ۾ $XY \parallel AC$ جيڪڏهن

$$2AX = 3BX \text{ ۽ } XY = 9$$

AC جو ملهه لھڻ لاءِ مشغولي پوري ڪريو .

$$2AX = 3BX \therefore \frac{AX}{BX} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ مشغولي:}$$



شکل 1.80


$$\frac{AX + BY}{BX} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{\boxed{}} \text{ ڪامپوٽيندو}$$

$$\frac{AB}{BX} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ (I)}$$

آزمائش $\Delta BCA \sim \Delta BYX$

$$\therefore \frac{BA}{BX} = \frac{AC}{XY} \text{}$$

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{AC}{9} \therefore AC = \boxed{} \text{ (I)}$$



شکل 1.81

- 13*. ΔABC ۾ $\square DEFG$ ، $\angle A = 90^\circ$ هڪ چورس آهي.

ٽپڪا D ۽ E اهي پاسو BC مٿان آهن. ٽپڪو F، پاسو

AC مٿان ۽ ٽپڪو G، پاسو AB مٿان آهي. ثابت


ڪريو $DE = BD = EC$

(اهي ΔGBD ۽ ΔCFE اهي هڪ جهڙا ڏيکاريو

$GD = FE = DE$ جو استعمال ڪريو.)



اچو ته سڳي ونون



- گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هڪ جهڙائي
- ريڪا گئٽ سراسر
- پائتاگورس جو سڌيان
- پائتاگورس جا ٽپڊا
- پائتاگورس سڌيان جا اُپيوگه
- اُپولو نيس سڌيان

ذرا ياد ڪريو.




پائتاگورس جو سڌيان :

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٽپائينيوڙ جي ٻي سڱهه باقي بن پاسن جي ٻي سڱهه جي جوڙ برابر هوندي آهي.

$$\angle PQR = 90^\circ \quad \text{۾} \quad \Delta PQR$$

$$l(PR)^2 = l(PQ)^2 + l(QR)^2$$

$$PR^2 = PQ^2 + QR^2$$



شڪل 2.1

ΔPQR ۾ PQ , QR ۽ PR پاسن جي ڊيگهه نمبر وار p , q ۽ r اکرن وسيلي ڏيکاربي آهي.

شڪل 2.1 ۾ پائتاگورس سڌيان موجب $q^2 = p^2 + r^2$ پائتاگورس جا ٽپڊا :

قدرتي عددن جي ٽپڊي ۾ جيڪڏهن وڏي عدد جي ٻي سڱهه، باقي بن عددن جي ٻي سڱهه برابر آهي ته ان کي پائتاگورس جو ٽپڊو چئبو آهي. مثال (11, 60, 61) ان ٽپڊي ۾

$$11^2 = 121, \quad 60^2 = 3600, \quad 61^2 = 3721 \quad \text{۽} \quad 121 + 3600 = 3721$$

هتي وڏي عدد جي ٻي سڱهه ٻين عددن جي ٻي سڱهه جي جوڙ برابر آهي.

11, 60, 61 هڪ پائتاگورس جو ٽپڊو آهي اهڙي نموني (5, 12, 13), (8, 15, 17), (24, 25, 7), (3, 4, 5), اهي پائتاگورس جا ٽپڊا آهن ڇا؟ ڇا ڪريو پائتاگورس ٽپڊي ۾ عدد ڪهڙي به سلسلي ۾ لکي سگهجن ٿا.

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ :

پائٽاگورس جا ٽپڊا حاصل ڪرڻ جي فارمولا جيڪڏهن a, b اهي قدرتي عدد آهن.

۽ $a > b$ ته $(a^2 - b^2), (a^2 + b^2), 2ab$ اهو پائٽاگورس جو ٽپڊو آهي.

$$\therefore (a^2 + b^2)^2 = a^4 + 2a^2b^2 + b^4 \quad \dots\dots\dots (I)$$

$$(a^2 - b^2)^2 = a^4 - 2a^2b^2 + b^4 \quad \dots\dots\dots (II)$$

$$(2ab)^2 = 4a^2b^2 \quad \dots\dots\dots (III)$$

$\therefore$ (I), (II), ۽ (III) مان ، $(a^2 + b^2)^2 = (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2$

$[(a^2 + b^2), (a^2 - b^2), (2ab)]$ انڪري اهو پائٽاگورس جو ٽپڊو آهي

مثال $a=5, b=3$ هاڻي

$$a^2 + b^2 = 34, a^2 - b^2 = 16, 2ab = 30$$

$(34, 16, 30)$ اهو پائٽاگورس جو ٽپڊو آهي اهو توهان ڄاڻ ڪريو اهڙي نموني a

۽ b جا جدا جدا ملهه کڻي 5 پائٽاگورس جا ٽپڊا تيار ڪريو.

گذريل درجي ۾ توهان $30^\circ=60^\circ=90^\circ$ ۽ $45^\circ=45^\circ=90^\circ$ ڪنڊن وارن گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جون خاصيتون ڪيون آهن.

(I). $30^\circ=60^\circ=90^\circ$ ٽڪنڊي جي خاصيت

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ سوڙهيون ڪنڊون 30° ۽ 60° هجن ته 30° ماپ واري ڪنڊ جي مخالف پاسو

هٽپاٿينيوڙ جو آڌ ۽ 60° ماپ واري ڪنڊ جو مخالف پاسو هٽپاٿينيوڙ جو $\frac{\sqrt{3}}{2}$ هوندو آهي.

شڪل 2.2 ۾ $\triangle LMN$ ۾ $\angle L = 30^\circ, \angle N = 60^\circ, \angle M = 90^\circ$

$$\therefore 30^\circ \text{ جي سامهون وارو پاسو } MN = \frac{1}{2} \times LN$$


$$60^\circ \text{ جي سامهون وارو پاسو } LM = \frac{\sqrt{3}}{2} \times LN$$

جيڪڏهن $LN = 6$ س م ته MN ۽ LM لھو.

$$MN = \frac{1}{2} \times LN \quad LM = \frac{\sqrt{3}}{2} \times LN$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \quad = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6$$

$$= 3 \text{ س م} \quad = 3\sqrt{3} \text{ س م}$$



شڪل 2.2

(II) $45^\circ = 45^\circ = 90^\circ$ ٽڪنڊي جي خاصيت

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ سوڙهيون ڪنڊيون 45° ۽ 45° ماپن واريون هجن ته گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ هر هڪ پاسو هٽپاٽينيوڙ جو $\frac{1}{\sqrt{2}}$ هوندو.

شڪل 2.3 ڏسو: $\triangle XYZ$ ۾


$$XY = \frac{1}{\sqrt{2}} \times ZY$$

$$XZ = \frac{1}{\sqrt{2}} \times ZY$$

جيڪڏهن س ۾ $ZY = 3\sqrt{2}$ س ۾ ته XY ۽ XZ لھو.

$$XY = XZ = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 3\sqrt{2}$$

$$\therefore XY = XZ = 3 \text{ م}$$



شڪل 2.3


ستين درجي ۾ پاڻٿاگورس سڌيان ايراضين جي مدد سان سمجھو آھي اُن ۾ چار گوني ڪنڊ ٽڪنڊا ۽ هڪ چورس استعمال ڪيو. هاڻي ان سڌيان جي ثابتي هڪ الڳ طريقي سان ڪندا سين.

مشغولي:

ڏيکاريل شڪل موجب ٻه ٺهڪندڙ گوني ڪنڊ ٽڪنڊا کڻو انهن جي هٽپاٽينيوڙن جي ڊيگهه جهڙا هڪ ٻيڀور پاسو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو کڻو. اهي ٽيئي گوني ڪنڊ جوڙي هڪ پور عمودي چوڪنڊو تيار ڪريو.

اوچائي X (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) $X = \frac{1}{2}$ پور عمودي چوڪنڊي جي ايراضي

ان سوتر جو اُپيوگه ڪري اُن جي ايراضي ٽنهي ٽڪنڊن جي ايراضين جي جوڙ برابر آهي اهو جاچي پاڻٿاگورس جو سڌيان ثابت ڪريو.




شڪل 2.4



هاڻي اسان پائتاگورس جو سڌيان هڪ جهڙن ٽڪنڊن جي آڌار تي ثابت ڪنداسين. ان ثابتيءَ لاءِ گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائي خاصيت اڀياس ڪنداسين.

هڪ جهڙائي ۽ گوني ڪنڊ ٽڪنڊا (Similarity and right angled triangle)

سڌيان : گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي هٽپاڻينيوڙ تي نڪتل عمود سبب جيڪي ٽڪنڊا تيار ٿين ٿا اهي اصلوڪي ٽڪنڊي ۽ هڪ ٻئي جي هڪ جهڙا هوندا آهن.



شڪل 2.5

ڏنل : $\angle ABC = 90^\circ$ ۾ $\triangle ABC$ ۾ $BD \perp AC$ ٽڪر

ثابت ڪرڻ : $\triangle ADB \sim \triangle ABC$

$\triangle BDC \sim \triangle ABC$

$\triangle ADB \sim \triangle BDC$

۾ $\triangle ABC \approx \triangle BDC$

$\angle BCD \cong \angle ACB$... (عام ڪنڊ)

$\angle BDC \cong \angle ABC$... (90° ڪنڊ)

(II) $\triangle BDC \sim \triangle ABC$... ڪنڊ - آزمائش

ثابتي : $\triangle ABC \approx \triangle ADB$ ۾

$\angle DAB \cong \angle BAC$... (عام ڪنڊ)

$\angle ADB \cong \angle ABC$... (90° ڪنڊ)


(I) $\triangle ADB \sim \triangle ABC$... ڪنڊ - آزمائش

$\therefore \triangle ADB \sim \triangle BDC$ مان (I) ۽ (II) ... (III)

$\therefore \triangle ADB \sim \triangle BDC \sim \triangle ABC$ مان (I), (II), (III)

ريڪا گئٽ سراسر سڌيان (Theorem of geometric mean)

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٽپاڻينيوڙ تي نڪتل عمود، ريڪا گئٽ سراسر آهي. انهن ٻن ٽڪرن جو، جن ۾ هٽپاڻينيوڙ ورهايو وڃي ٿو.



شڪل 2.6

ثابتي : $\triangle PQR$ ۾، هٽپاڻينيوڙ PR ٽڪر $\perp$ ٽڪر QS

$\triangle QSR \sim \triangle PSQ$ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي هڪ جهڙائي

$$\therefore \frac{QS}{PS} = \frac{SR}{SQ} = \frac{QR}{PQ}$$


$$\therefore \frac{QS}{PS} = \frac{SR}{QS}$$

$$QS^2 = PS \times SR$$

عمود QS اهو ٽڪر PS ۽ ٽڪر SR جو ”ريڪا گئٽ سراسر“ آهي.

پائتاگورس جو سڌيان (Theorem of Pythagoras)

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينوز جي ٻي سگهه، باقي ٻين پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر هوندي آهي.



شڪل 2.7

ڏنل : $\angle ABC = 90^\circ$ $\triangle ABC$

ثابت ڪرڻ : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

جوڙجڪ : ٽپڪي B وٽان پاسو AC تي

عمود BD ڪڍو A-D-C

ثابتي : $\triangle ABC$ ۾ هٿپاڻينوز $\perp AC$ ٽڪر BD (جوڙجڪ)

..... $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADB \sim \triangle BDC$

(گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي هڪ جهڙائي)

$\triangle ABC \sim \triangle BDC$

$\therefore \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{BC}$ - نسبتي پاسا

$\therefore \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{BC}$

$BC^2 = DC \times AC$ (II)

$\triangle ABC \sim \triangle ADB$

$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DB} = \frac{AC}{AB}$ - نسبتي پاسا

$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AB}$

$AB^2 = AD \times AC$ (I)

(I) ۽ (II) جي جوڙ ڪري

$AB^2 + BC^2 = AD \times AC + DC \times AC$

$= AC (AD + DC)$

$= AC \times AC$ (A-D-C)

$\therefore AB^2 + BC^2 = AC^2$

$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$


پائتاگورس سڌيان جو اُبتڙ (Converse of Pythagoras' theorem)

جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي ۾ هڪ پاسي ٻي سگهه، باقي ٻين پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر آهي


ته اُهي گوني ڪنڊي ٽڪنڊو آهي.

ڏنل : $AC^2 = AB^2 + BC^2$ ، $\triangle ABC$

ثابت ڪرڻ : $\angle ABC = 90^\circ$



شڪل 2.8



شڪل 2.9

جوڙجڪ : $\triangle PQR$ ڪڍو جيئن ، $AB = PQ$ ، $BC = QR$ ، $\angle PQR = 90^\circ$.

ثابتي : $\triangle PQR$ ۾ ، $\angle Q = 90^\circ$

$$PR^2 = PQ^2 + QR^2 \quad \text{پائٿاگورس جو سڌيان}$$

$$= AB^2 + BC^2 \quad \text{جوڙجڪ}$$

$$= AC^2 \quad \text{ڏنل}$$

$$\therefore PR^2 = AC^2,$$

$$\therefore PR = AC$$


$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle PQR \quad \text{پاسو - پاسو - پاسو آزمائش}$$

$$\therefore \angle ABC = \angle PQR = 90^\circ$$

اهو ڌيان ۾ رکو .



(1) (a) گوني ڪند ٿڪندڻ ۾ هڪ جهڙائي



شڪل 2.10

$\triangle PQR$ ۾ $\angle Q = 90^\circ$ ، ٽڪر $QS \perp PR$ ٽڪر

هتي $\triangle PQR \sim \triangle PSQ \sim \triangle QSR$

اهڙي شڪل ۾ تيار ٿيل ٿڪندڻا

(گوني ڪند ٿڪندڻا) هڪ ٻئي

سان هڪ جهڙا آهن.

(b) ريڪا گئٽ سراسر سڌيان مٿي ڏنل شڪل ۾

$$\triangle PSQ \sim \triangle QSR$$

$$\therefore QS^2 = PS \times SR$$

$\therefore$ ٽڪر QS اهو ٽڪر PS ۽ ٽڪر SR جي ريڪا گئٽ سراسر آهي.

(2) پائٿاگورس جو سڌيان :

گوني ڪند ٿڪندڻي ۾ هٿپاڻينيو جي ٻي سگهه ، ٻين پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر

هوندي آهي.

(3) پائٿاگورس سڌيان جي اُبتڙ :

جيڪڏهن ڪنهن ٿڪندڻي ۾ هڪ پاسي جي ڊيگهه ، باقي ٻن پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر

آهي ته اهو ٿڪندڻو گوني ڪند ٿڪندڻو آهي ان کان سواءِ ٻي به هڪ خاصيت ڪمائڻي آهي ، اها به


ڌيان ۾ رکو .

(4) گوني ڪند ٿڪندڻي ۾ هڪ پاسو هٿپاڻينيو جي آڌ هجي ته اها خاصيت $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$

سڌيان جي اُبتڙ آهي.




مثال (1) شڪل 2.11 ڏسو $\triangle ABC$ ۾ $B=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, $\angle C=60^\circ$, $AC=14$ ته AB ۽ BC ڇا آهن.
 حل :



شڪل 2.11

$$\begin{aligned} \angle B &= 90^\circ, \angle A = 30^\circ, \therefore \angle C = 60^\circ \\ &30^\circ - 60^\circ - 90^\circ \text{ سڌيان موجب ۽} \\ BC &= \frac{1}{2} \times AC & AB &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times AC \\ BC &= \frac{1}{2} \times 14 & AB &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 14 \\ BC &= 7 & AB &= 7\sqrt{3} \end{aligned}$$


مثال (2) شڪل 2.12 ڏسو $\triangle ABC$ ۾ $AD \perp BC$ ٽڪر AD , $\angle C=45^\circ$, $BD=5$ ۽ $AC=8\sqrt{2}$ ته AD ۽ BC ڇا آهن.
 حل :



شڪل 2.12

$$\begin{aligned} \angle ADC &= 90^\circ, \angle C = 45^\circ, \therefore \angle DAC = 45^\circ \\ (45^\circ - 45^\circ - 90^\circ \text{ سڌيان}) \dots AD &= DC = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 8\sqrt{2} \\ \therefore DC &= 8 \quad \therefore AD = 8 \\ BC &= BD + DC \\ &= 5 + 8 \\ &= 13 \end{aligned}$$


مثال (3) شڪل 2.13 ڏسو $\angle PQR = 90^\circ$ ۽ $PN \perp QR$ ٽڪر PN , $PN=9$, $NR=16$ ته QN ڇا آهي.
 حل :



شڪل 2.13

$$\begin{aligned} \therefore QN^2 &= PN \times NR \dots (ريڪا گئٽ سراسر سڌيان) \\ \therefore QN &= \sqrt{PN \times NR} \\ &= \sqrt{9 \times 16} \\ &= 3 \times 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$

مثال (4) شکل 2.14 ڏسو $\triangle PQR$ ۾ $\angle Q = 90^\circ$ ، ٽڪر $PR \perp QS$ ته x, y, z جا ملهه لھو



شکل 2.14

حل : $\triangle PQR$ ۾ $\angle PQR = 90^\circ$ ، ٽڪر $QS \perp PR$

ريڪا گئٽ سراسر $QS = \sqrt{PS \times SR}$

$$= \sqrt{10 \times 8}$$

$$= \sqrt{5 \times 2 \times 8}$$

$$= \sqrt{5 \times 16}$$

$$= 4\sqrt{5}$$

$$\therefore x = 4\sqrt{5}$$

$\angle QSP = 90^\circ$ ، $\triangle PSQ$

$$\therefore PQ^2 = QS^2 + PS^2$$

$$= (4\sqrt{5})^2 + 10^2$$

$$= 16 \times 5 + 100$$

$$= 80 + 100$$

$$= 180$$

$$= 36 \times 5$$

$$\therefore PQ = 6\sqrt{5}$$

$\angle QSR = 90^\circ$ ، $\triangle QSR$

$$\therefore QR^2 = QS^2 + SR^2$$

$$= (4\sqrt{5})^2 + 8^2$$

$$= 16 \times 5 + 64$$

$$= 80 + 64$$

$$= 144$$

$$\therefore QR = 12$$

$$\text{جواب : } x = 4\sqrt{5}, y = 12, z = 6\sqrt{5}$$

مثال (5) هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسا 9 س ۾ ۽ 12 س ۾ آهن ته ٽڪنڊي جو هٿپاڻينيو ڇا لھو.

حل : $\triangle PQR$ ۾ $\angle Q = 90^\circ$

$$PR^2 = PQ^2 + QR^2 \text{ (پائٿاگورس سڌيان)}$$


$$= 9^2 + 12^2$$

$$= 81 + 144$$

$$\therefore PR^2 = 225$$

$$\therefore PR = 15$$

هٿپاڻينيو = 15 س ۾



شکل 2.15

مثال (6) $\triangle LMN$ ۾ $l=5$, $m=13$, $n=12$ ته $\triangle LMN$ ڳوٺي ڪنڊ ٿڪنڊو آهي يا نه؟ اُهو ٻڌايو

حل : $l = 5, m = 13, n = 12$

$$l^2 = 25, m^2 = 169, n^2 = 144$$

$$\therefore m^2 = l^2 + n^2$$

$\therefore$ پائتاگورس سڌيان اُبتز موجب $\triangle LMN$ ڳوٺي ڪنڊ ٿڪنڊو آهي.

مثال (7) شڪل 2.16 ۾ $\triangle ABC$ ۾ ٽڪر $AD \perp BC$ ته ثابت ڪريو .

$$AB^2 + CD^2 = BD^2 + AC^2$$

حل : $\triangle ADC$ ۾ پائتاگورس سڌيان

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$\therefore AD^2 = AC^2 - CD^2 \dots (I)$$


$\triangle ADB$ ۾ ,

$$AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$\therefore AD^2 = AB^2 - BD^2 \dots (II)$$

$$\therefore AB^2 - BD^2 = AC^2 - CD^2 \dots [(I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان }]$$

$$\therefore AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2$$




شڪل 2.16

اُپاس 2.1

1. هيٺ ڏنل ٽپڊن مان پائتاگورس جا ٽپڊا سڃاڻو سبب سان ٻڌايو

- (1) (3, 5, 4) (2) (4, 9, 12) (3) (5, 12, 13)
(4) (24, 70, 74) (5) (10, 24, 27) (6) (11, 60, 61)




شڪل 2.17

2. شڪل 2.17 ۾ $\angle MNP = 90^\circ$,

ٽڪر $NQ \perp MP$, $MQ = 9$,

$QP = 4$ ۽ NQ لھو.



شڪل 2.18

3. شڪل 2.18 ۾ $\angle QPR = 90^\circ$,

ٽڪر $PM \perp QR$ ۽ $Q-M-R$,

$PM = 10$, $QM = 8$ تہ QR لھو.



پائتاگورس سڌيان جو اُپيوت

پائتاگورس سڌيان ۾ گوني ڪند ٿڪندي جي هٿپائينيو ۽ گوني ڪند ٺاهيندڙ پاسن وچ ۾ لاڳاپو ٻڌايل آهي. ٿڪندي ۾ سوڙهي ڪند جي سامهون وارن ٻن پاسن ۽ ويڪري ڪند جي سامهون وارن ٻن پاسن جو لاڳاپو پائتاگورس سڌيان موجب مقرر ڪري سگهجي ٿو. اهو لاڳاپو هيٺ مثالن ۾ سمجھي وٺو.

مثال (1) $\triangle ABC$ ۾ $\angle C$ هڪ سوڙهي ڪند آهي. ٿڪر $AD \perp BC$ ٿڪر

تہ ثابت ڪريو $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \times DC$

ڏنل شڪل ۾ سمجھو، $AB = c$ ، $AC = b$ ، $AD = p$ ، $BC = a$ ، $DC = x$

$$\therefore BD = a - x$$

$\triangle ADB$ ۾ پائتاگورس سڌيان موجب


$$c^2 = (a-x)^2 + \square$$

$$c^2 = a^2 - 2ax + x^2 + \square \dots\dots\dots (I)$$

$\triangle ADC$ ۾ پائتاگورس سڌيان موجب

$$b^2 = p^2 + \square$$

$$p^2 = b^2 - \square \dots\dots\dots (II)$$



شڪل 2.23

(II) جو ملهه، (I) ۾ وجهو،

$$c^2 = a^2 - 2ax + x^2 + b^2 - x^2$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 - 2ax$$

$$\therefore AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \times DC$$

مثال (2) $\triangle ABC$ ۾ $\angle ACB$ هڪ ويڪري ڪند آهي.

ثابت ڪريو $AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2BC \times CD$

سمجھو $AD = p$ ، $AC = b$ ، $AB = c$ ،


$$BC = a$$
، $DC = x$

$$DB = a + x$$

$\triangle ADB$ ۾ پائتاگورس سڌيان موجب،

$$c^2 = (a+x)^2 + p^2$$

$$c^2 = a^2 + 2ax + x^2 + p^2 \dots\dots\dots (I)$$



شڪل 2.24

ساڳئي نموني $\triangle ADC$ ۾ ،

$$b^2 = x^2 + p^2$$

$$p^2 = b^2 - x^2 \quad \dots\dots\dots (II)$$

$\therefore$ (I) جو مله (II) ۾

$$\begin{aligned} \therefore c^2 &= a^2 + 2ax + x^2 + b^2 - x^2 \\ &= a^2 + 2ax + b^2 \end{aligned}$$

$$\therefore AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2BC \times CD$$


اپولونيس سڌيان (Appollonius' Theorem)

$\triangle ABC$ ۾ ٽڪو M اهو پاسو BC جو مڌيه ٿيڻو آهي ته ثابت ڪريو $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$

ڏنل : $\triangle ABC$ ۾ M اهو پاسو BC جو مڌيه ٿيڻو آهي .

ثابت ڪرڻ : $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$

جوڙجڪ : ٽڪر $AD \perp BC$ ٽڪر ڪڍو .



شڪل 2.25

ثابتي : ٽڪر AM ، ٽڪر BC مٿان عمود نه آهي تنهن ڪري $\angle AMB$ ويڪري
ڪنڊ $\angle AMC$ سوڙهي ڪنڊ آهي مٿي ڏنل مثال (1) ۽ (2) مان

$$AB^2 = AM^2 + MB^2 + 2BM \times MD \quad \dots\dots (I)$$

$$\text{۽ } AC^2 = AM^2 + MC^2 - 2MC \times MD$$

$$\therefore AC^2 = AM^2 + MB^2 - 2BM \times MD \quad (\because BM = MC) \quad \dots\dots\dots (II)$$

$\therefore$ (I) ۽ (II) جوڙ ڪرڻ ،

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$$

جيڪڏهن ٽڪر $AM \perp BC$ مٿان عمود هجي ته سڌيان جي ثابتي توهان لکو .

هن مثال ذريعي ٽڪندي جي پاسن ۽ وچ جو لاڳاپو سمجهه ۾ اچي ٿو . انکي اپولونيس سڌيان چئجي ٿو .

حل ڪيل مثال

مثال (1) $\triangle PQR$ ۾ ، ٽڪر PM اهو مڌيان آهي $PM=9$ ۽ $PQ^2 + PR^2 = 290$ ته QR لھو .

حل : $\triangle PQR$ ۾ ، ٽڪر PM مڌيان آهي . M اهو ٽڪر QR مٿان مڌيه - ٿيڻو آهي .

$$QM = MR = \frac{1}{2} QR$$

$$PQ^2 + PR^2 = 2PM^2 + 2QM^2 \quad (\text{آپولونيوس سڌيان موجب})$$

$$290 = 2 \times 9^2 + 2QM^2$$

$$290 = 2 \times 81 + 2QM^2$$

$$290 = 162 + 2QM^2$$

$$2QM^2 = 290 - 162$$

$$2QM^2 = 128$$


$$QM^2 = 64$$

$$QM = 8$$

$$\therefore QR = 2 \times QM$$

$$= 2 \times 8$$

$$= 16$$




شڪل 2.26

مثال (2) پور پاسي چوڪنڊي (رامبس) جي اُرين جي ٻي سگه جو جوڙ، اُنجي پاسن جي ٻي سگه جي جوڙ برابر هوندو آهي. اهو ثابت ڪريو.

ڏنل : PQRS هڪ پور پاسو چوڪنڊو آهي. اُريب PR ۽ اُريب SQ هڪ ٻئي کي T وٽ ڪپين ٿا.

ثابت ڪرڻ : $PS^2 + SR^2 + QR^2 + PQ^2 = PR^2 + QS^2$



شڪل 2.27

ثابتي : پور پاسي چوڪنڊي جا اُريب هڪ ٻئي کي پورن اڌن ۾ ڪپيندا آهن آپولونيوس سڌيان موجب

$$PQ^2 + PS^2 = 2PT^2 + 2QT^2 \dots\dots\dots (I)$$

$$QR^2 + SR^2 = 2RT^2 + 2QT^2 \dots\dots\dots (II)$$

$\therefore$ (I) ۽ (II) جوڙ ڪرڻ،

$$PQ^2 + PS^2 + QR^2 + SR^2 = 2(PT^2 + RT^2) + 4QT^2$$

$$\therefore PS^2 + SR^2 + QR^2 + PQ^2 = 2(PT^2 + PT^2) + 4QT^2 \dots\dots\dots (RT = PT)$$

$$= 4PT^2 + 4QT^2$$


$$= (2PT)^2 + (2QT)^2$$

$$= PR^2 + QS^2$$

اهو مثال پائٿاگورس جي سڌيان موجب به حل ڪري سگهجي ٿو.

1. $\triangle PQR$ ۾ ٽپڪو S اهو پاسو QR جو مڌيه ٽپڪو آهي. $PQ=11$, $PR=17$, $PS=13$ ته QR جي ڊيگهه لھو.

2. $\triangle ABC$ ۾ $AB=10$, $AC=7$, $BC=9$ ته ٽپڪي C وٽان نڪتل مڌيان جي ڊيگهه ڪيتري؟




شکل 2.28

4. شکل 2.29 ۾، $\triangle ABC$ ۾ پاسي BC جو

ٽپڪو M، اهو مڌيه ٽپڪو آهي.

$$AB^2 + AC^2 = 290$$

س ۾ $AM = 8$ ته BC لھو.




شکل 2.29

5. 2.30 ۾ ٽپڪو T هڪ مستطيل PQRS ۾ ڏنل آهي ته ثابت ڪريو

$$TS^2 + TQ^2 = TP^2 + TR^2$$

(شکل ۾ ڏيکاريل A-T-B ليڪ ڪڍو $AB \parallel SR$ هجي)



شکل 2.30

گڏيل آپياس 2

1. هيٺ ڏنل ٻه - متبادل سوالن جي جوابن مان مناسب متبادل چونڊيو.

(1) هيٺ ڏنل ٽپڊن مان ڪهڙا پاڻتائگورس جا ٽپڊا آهن؟

(A) (1, 5, 10) (B) (3, 4, 5) (C) (2, 2, 2) (D) (5, 5, 2)

(2) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسن جي ٻي سگهه جو چوڙ 169 آهي ته هٽاٽيوز

جي ڊيگهه ڪيتري؟

(A) 15 (B) 13 (C) 5 (D) 12

(3) هيٺ ڏنل تاريخن مان ڪهڙا عدد پاڻٿاگورس ٿيندي سان واسطو رکڻ ٿا؟

(A) 15/08/17 (B) 16/08/16 (C) 3/5/17 (D) 4/9/15

(4) پاس جي ڊيگهه a, b, c واري ٽڪنڊي ۾ $a^2 + b^2 = c^2$ آهي ته اهو ٽڪنڊو ڪهڙي قسم جو آهي؟

ٽپور پاسو ٽڪنڊو (D) گوني ڪنڊ ٽڪنڊو (C) سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو (B) ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو (A)

(5) هڪ چورس جو اُريب $10\sqrt{2}$ س ۾ آهي ته سندس گرد ماپ آهي .

40 س ۾ (D) 20 س ۾ (C) $40\sqrt{2}$ س ۾ (B) 10 س ۾ (A)

(6) هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيو مٿان نڪتل عمود، هٿپاڻينيو ڪي 4 س ۾ ۽ 9 س ۾ ۾ ورهائي ٿو ته عمود جي ڊيگهه ڪيتري؟

$2\sqrt{6}$ س ۾ (D) 6 س ۾ (C) 4 س ۾ (B) 9 س ۾ (A)

(7) گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسن جي ڊيگهه 24 س ۾ ۽ 18 س ۾ آهي ته هٿپاڻينيو جي ڊيگهه ٿيندي.

18 س ۾ (D) 15 س ۾ (C) 30 س ۾ (B) 24 س ۾ (A)

(8) ΔABC ۾، $AB = 6\sqrt{3}$ س ۾، $AC = 12$ س ۾ ۽ $BC = 6$ س ۾ ته $\angle A$ جي ماپ ڪيتري؟

45° (D) 90° (C) 60° (B) 30° (A)

2. هيٺيان مثال حل ڪريو

(i) هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي جو پاسو $2a$ آهي ته اُنجي اوچائي لھو؟

(ii) 7 س ۾، 24 س ۾، 25 س ۾ پاسن وارو ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي ڇا؟

(iii) هڪ مستطيل جا پاسا 11 س ۾ ۽ 60 س ۾ آهي ته اُنجي اُريب جي ڊيگهه لھو؟

(iv) هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا 9 س ۾ ۽ 12 س ۾ آهن ته هٿپاڻينيو جي ڊيگهه لھو.

(v) هڪ ٻپور پاسي گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جو پاسو 'x' آهي ته هٿپاڻينيو جي ڊيگهه لھو .

(vi) ΔPQR ۾ $PQ = \sqrt{8}$ ، $QR = \sqrt{5}$ ۽ $PR = \sqrt{3}$ ڇا اهو ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي ڇا؟ ان ۾ گوني ڪنڊ ڪهڙي آهي؟

3. ΔRST ۾، $\angle S = 90^\circ$ ، $\angle T = 30^\circ$ ، $RT = 12$ س ۾، RS ۽ ST س ۾ لھو.


4. هڪ مستطيل جي ايراضي 192 چ. س ۾ آهي. ان جي ڊيگهه 16 س ۾ آهي ته مستطيل جي اُريب جي ڊيگهه لھو.

5* هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي جي اوچائي $\sqrt{3}$ س ۾ آهي ته اُنجي پاسن جي ڊيگهه ۽ گرد ماپ لھو.

6. ΔABC ۾ ٽڪر AP مڌيان آهي جيڪڏهن $AB^2 + AC^2 = 260$ ، $BC = 18$ ، ته AP لھو.



- 7* $\triangle ABC$ هڪ ٽپور پاسو ٽڪندو آهي پاڻو BC تي ٽپڪو P اهڙي نموني آهي جو $AB = 6 PC = \frac{1}{3} BC$ س م AP ته لھو.




شکل 2.31

8. شکل 2:31 ۾ ڏنل جاڻ موجب ثابت ڪريو

$$PM = PN = \sqrt{3} \times a$$

9. ثابت ڪريو ته پوروچوٽ پاسي چوڪنڊي جي اُرين جي ٻي سگه جو جوڙ اُنجي پاسن جي ٻي سگه جي جوڙ برابر آهي.

10. وٺيٽا ۽ وڃي هڪ جڳهه کان اوڀر ۽ اُتر طرف ساڳي رفتار سان رونا ٿيا. ٻن ڪلاڪن کان پوءِ اُنهن وچ ۾ مفاصلو $15\sqrt{2}$ ڪم هو ٻڌايو ته اُنهن جي ڪلاڪ ۾ رفتار ڪيتري؟




شکل 2.32

- 11* $\triangle ABC$ ۾ $\angle BAC = 90^\circ$ ٽڪر BL ۽ ٽڪر CM اهي $\triangle ABC$ جا مڌيان آهن ثابت ڪريو:

$$4(BL^2 + CM^2) = 5 BC^2$$

12. هڪ پوروچوٽ پاسي چوڪنڊي جي لائيتي پاسن جي ٻي سگه جو جوڙ 130 ۽ 3 م آهي اُنهن جي هڪ اُريب جي ڊيگهه 14 س م آهي ته ٻئي اُريب جي ڊيگهه لھو.




شکل 2.33

13. $\triangle ABC$ ۾ ٽڪر $AD \perp BC$ ٽڪر $DB = 3 CD$ ته ثابت ڪريو

$$2AB^2 = 2AC^2 + BC^2$$

- 14* هڪ ٻپور پاسي ٽڪنڊي نهڪندڙ پاسن جي ڊيگهه 13 س م آهي ۽ پاڻو 10 س م آهي ته اُن ٽڪنڊي جي مڌياتن جي عام ٽپڪي کان پايي سامهون نڪتل عمود جي ڊيگهه لھو.





شکل 2.34

15. پور عمودي چوکنڊي ABCD ۾


تڪر $DC \parallel AB$

تڪر $AD \perp BD$

تڪر $BC \perp AC$

تہ $AD = 15$ ، $BC = 15$ ، $AB = 25$

$\Delta(ABCD)$ تہ ڪيتري؟



شکل 2.35

16* ΔPQR هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي ٽپڪو S

اِهو تڪر QR مٿان آهڙي نموني آهي جو

$$QS = \frac{1}{3} QR \quad \text{ثابت ڪريو؛ } 9 PS^2 = 7 PQ^2$$

17* تڪر PM اِهو ΔPQR جي مڌيان آهي. $PQ=40$ ، $PR=42$ ، $PM=29$ تہ QR لھو.

18. تڪر AM اِهو ΔABC جي مڌيان آهي $AB=22$ ، $AC=34$ ، $BC=24$ تہ AM جي ڊيگھ لھو.

ICT Tools or Links



ونڊوز انٽرنيٽ ايڪسپلور ۾ 'Story on the life of Pythagoras' ۽ ٻيون آنلنر - ڪريائن جا ويڊيو ڏسو.

Slide Show تيار ڪريو. آڳيٽي واري لنڪ ڏسو <http://en.wikipedia.org/wiki/>



ڄاڻي وٺون.







- هڪ ٻه ٽي ٽپڪن مان لنگهندڙ گول
- ڇهندڙ گول
- ڀڃڪڙ (محدود) چوڪنڊو
- ڀڃڪڙي - قاطع سڏيان
- ڇڪڙي ۽ ڇڪڙي
- گول جو ڪمان
- ڀڃڪڙي (محدود) چوڪنڊو
- انٽر ڪپيندڙ زه سڏيان

ذرا ياد ڪريو.



توهان کي گول جي ڀاڱن مرکز، نيم قطر، قطر، زه، آندريون حصو، ٻاهريون حصو انهن بابت توهان جي سٺي سڃاڻپ ٿي آهي نهڪندڙ گول، هر - مرڪزي گول ۽ ڪپيندڙ گول اهي اسر ياد ڪريو.




نهڪندڙ گول

هر مرڪزي گول

ڪپيندڙ گول

درجي نائين ۾ سڪيل زهن جي خاصيتن کي هيٺ ڏنل مشغوليءَ جي مدد سان ياد ڪريو.



مشغولي I: پرواري شڪل ۾ گول جو مرڪز C آهي. زه

DE آهي زه $DE \perp CF$. قطر $CF = 20$ س

م، $16 = 1(CF) = 1(DE) =$

شڪل 3.1

ان سوال کي حل ڪرڻ لاءِ مناسب سڏيان ۽ خاصيتون ڪم آڻي لکو.

- (1) گول جي مرڪز کان زه تي نڪتل عمود
- (2)
- (3)


مشغولي II : پرواري شکل ۾ ڳول جو مرڪز

O آهي. ٽڪر QR هڪ زهه آهي. P

اهو زهه QR جو مڌيه ٿيڪو آهي.

جيڪڏهن $QR=24$ ، $OP=10$ ته

ڳول جو نيم قطر لھو.




شکل 3.2

اهو سوال حل ڪرڻ لاءِ گهربل سڌيان لکو.

(1)

(2)

اهي سڌيان ڪم آڻي مثال حل ڪريو :



شکل 3.3

مشغولي III : ڳول جو مرڪز M شکل

۾ ڏنل آهي. ٽڪر AB اهو قطر

آهي. زهه AD ٽڪر $MS \perp$

زهه $MT \perp AC$

$\angle DAB \cong \angle CAB$.

ته ثابت ڪريو : $AD \cong$ زهه AC.

اهو سوال حل ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل سڌيان مان ڪهڙو سڌيان واپرائبو؟

(1) ڳول ۾ جيڪڏهن ٻه زهه مرڪز کان هر مفاصلي آهن ته اهي زهه ٺهڪندڙ هوندا آهن.

(2) ڳول ۾ ٺهڪندڙ زهه مرڪز کان هر - مفاصلي هوندا آهن. ان کان سواءِ ٽڪنڊن جي

ڪهڙي آزمائش ڪم آڻي؟

(1) پاسو-ڪنڊ-پاسو ، (2) ڪنڊ-پاسو - ڪنڊ ، (3) ڪنڊ-ڪنڊ-ڪنڊ ،


(4) ڪنڊ-ڪنڊ-پاسو ، (5) هٿپائينيو پاسو

مناسب ڪسوٽي ۽ سڌيان ڪم آڻي ثابت ڪريو.

ڄاڻي وٺون.



هڪ، ٻي، ٽي ٽيڪن مان لنگهندڙ ڳول



شکل 3.4

پرواري شکل ۾ هڪ سطح ۾ ٿيڪو A ڏيکاريل آهي.

R, Q, P مرڪزن وارا ڳول ٿيڪي A مان لنگهندڙ

آهن. ٿيڪي A مان اڃان ڪيترا ڳول لنگهي سگهيا.

توهان کي ڇا ٿو لڳي؟ توهان جو جواب 'ڪيترا به' يا

'ٻي آنت' اهو آهي ته توهان برابر آهيو.

هڪ ٿيڪي مان لنگهندڙ ڳول 'ٻي آنت' هوندا آهن.

پڙ واري شڪل ۾ A ۽ B انهن جدا جدا ٽپڪن مان
لنگهندڙ ڪيترا گول ٿيندا؟ A, B, C انهن ٽنهي
ٽپڪن مان لنگهندڙ گول ڪيترا ٿيندا؟


C

B

A

شڪل 3.5

مشغولي I : ٽپڪي A ۽ ٽپڪي B کي ڳنڍيندڙ
ٽڪر AB ڪڍو. ان ٽڪر جو عمودي آڌڪ
ليڪ l ڪڍو ليڪ l تي P ٽپڪو مرڪز
ڪٿي ۽ نيسر قطر PA ڪٿي گول ڪڍو. اهو
گول B مان به لنگهي ٿو. ان جو ڪارڻ
ڳولهي لهو. (عمودي ليڪ جي خاصيت
ياد ڪريو)




شڪل 3.6

ليڪ l تي هڪ ٻيو ٽپڪو Q ڪٽو. ٽپڪو Q مرڪز ۽ نيسر قطر QA ڪٿي گول ڪڍو. ڇا اهو گول B مان
لنگهندو؟ ويچار ڪريو.
ٽپڪي A ۽ ٽپڪي B مان لنگهندڙ آيا وڌيڪ ڪيترا گول نڪري سگهن ٿا؟ انهن جا مرڪز ڪٿي
آهن.

مشغولي II : غير هر ليڪ ٽپڪا A, B, C لاءِ ڪڍو.

انهن ٽنهي مان لنگهندڙ گول ڪيڏ لاءِ ڇا
ڪبو؟ انهن ٽنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ
گول ڪڍو. انهن ٽنهي ٽپڪن مان آيا هڪ
گول ڪڍي سگهيو ڇا؟ ويچار ڪريو.



شڪل 3.7

مشغولي III : هر ليڪ ٽپڪا D, E, F ڪٽو انهن ٽنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ گول ڪيڏ جي ڪوشش ڪريو. اهڙو گول
نه ڪڍي سگهيو. ڇو نه ڪڍي سگهيو، ان بابت ويچار ڪريو.


اهو ڏيان ڀر ڪو.



- (1) هڪ ٽپڪي مان لنگهندڙ گول بيشمار هوندا آهن.
- (2) ٻن جدا جدا ٽپڪن مان لنگهندڙ گول بيشمار هوندا آهن.
- (3) ٽي غير هر ليڪ ٽپڪن مان هڪ ۽ فقط گول ڪڍي سگهيو.
- (4) ٽي هر ليڪ ٽپڪن مان هڪ ڀر گول نه ڪڍي سگهيو.



قاطع ۽ ڇهڻي (Secant and tangent)




شڪل 3.8

شڪل ۾ ليڪ l ۽ گول ۾ ڪوبه عام ٽپڪو ڪانهي ليڪ m ۽ گول ۾ فقط هڪ ٽپڪو عام آهي.

ليڪ m کي ڇهڻي ۽ ٽپڪي n کي چيٽڙ - ٽپڪو چئبو آهي. ليڪ n اها گول کي ٻن ٽپڪن Q ۽ R ۾ ڪپي ٿي ليڪ n کي قاطع چئبو آهي.

QR گول ۾ اندر آهي اهو گول جو زهه آهي گول جي ڇهڻيءَ جي هڪ اهميت واري خاصيت هڪ مشغوليءَ ذريعي سمجهندا سين.

مشغولي :



3.9

مرڪز O کڻي هڪ وڏو گول ڪڍو. ان ۾ هڪ نيم قطر OP کڻو. ان نيم قطر جي عمود هڪ ليڪ ڪڍو ان ليڪ ۽ گول ڪپيندڙ ٽپڪن کي A ۽ B نالو ڏيو. ويچار ڪريو. ليڪ AB اها O کان P طرف آهستي آهستي سرڪندي وڃي جيئن اها نئين حالت ۽ شروعاتي حالت، اهي پورو چوٽ هجن مطلب ليڪ AB ۽ نيم قطر وچ ۾ هميشه گوني ڪند هجي

ائين ڪندي A ۽ B هڪ ٻئي جي ويجهو ايندا وڃن ٿا. آخر ۾ اهي ٽپڪي P وٽ اچي ملن ٿا ان حالت ۾ ليڪ AB اها گول جي ڇهڻي بڻجي پوي ٿي.

پر نيم قطر OP ۽ ليڪ AB وچ ۾ ڪند گوني ٿي رهي ٿي.

ان مان سمجهه ۾ اچي ٿو ته گول جي ڪنهن به ٽپڪي وٽ ڇهڻي، نيم قطر جي چيٽڙ ٽپڪي سان گوني ڪند ناهي ٿي ان کي ڇهڻي سڏيان چئبو آهي.

سڏيان : گول تي ڪنهن به ٽپڪي وٽ چھڻي، نير قطر تي ملائي ٽپڪي وٽ عمود ٿئي ٿي.

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ :

ڏنل : 'O' مرڪز واري گول ۾ ليڪ l وٽ چھڻي ٿي ٽڪر OA نير قطر آھي.
 ثابت ڪرڻ : نير قطر OA $\perp$ ليڪ l

ثابتي : سمجھو ته ليڪ l ٽڪر OA تي عمود نه آھي.

ٽپڪي O وٽان ليڪ l تي عمود ڪڍو.

ٽپڪو B اُن جو پاڻو آھي.

اھو مڃيندي ته ٽپڪو A اھو ٽپڪي B کان

جڏا آھي ليڪ l تي ٽپڪو C اھڙي نموني

ڪٽو جيئن $BA = BC$ ۽ A-B-C.

ھاڻي، $\triangle OBA$ ۽ $\triangle OBC$ ۾،

ٽڪر $BA \cong BC$ ٽڪر.....

..... $\angle OBC \cong \angle OBA$

ٽڪر $OB \cong OB$

$\therefore \triangle OBC \cong \triangle OBA$

$\therefore OC = OA$

پر ٽڪر OA ته نير قطر آھي

ان ڪري ٽڪر OC پڻ نير قطر آھي.

مطلب ٽپڪو C اھو گول مٿان آھي

مطلب ليڪ l اھا گول کي A ۽ C انھيءَ ٻن ٽپڪن وٽ

چھڻي ٿي


اھو چھڻيءَ جي وصف ۾ اُبتَر آھي.

اسان جو مڃڻ غلط آھي.


ان ڪري ليڪ l اھا نير قطر OA جو عمود نه آھي،

اھو غلط آھي.


$\therefore$ نير قطر OA $\perp$ ليڪ l



شکل 3.10



شکل 3.11



شکل 3.12

ذرا یاد کریو.



گوني ڪُنڊ ٿڪنڊي ۾ هٽيا ٿينبيوز وڌي ۾ وڏو پاسو هوندو آهي اهو ڪهڙن ڪهڙن سڌيان جي آڌار ۾ ثابت ڪري سگهجي ٿو؟

چاڻي وٺون.



چھڻي نيئر قطر سڌيان جو اُبتڙ (Converse of Tangent theorem)

سڌيان : گول جي نيئر قطر تي سندس ٻاهرين پچڙ وٽ ڏنل عمودي ليڪ اُن گول جي چھڻي ٿئي ٿي.

ڏنل : ٽپڪو M گول جو مرڪز آهي. ٽڪر MN


نيئر قطر N ٽپڪي وٽ ليڪ l عمود

آهي.

ثابت ڪرڻ : ليڪ l اها گول جي چھڻي آهي.

ثابتي : ليڪ l ٽي ٽپڪي N کي ڇڏي ٻيو

ٽپڪو P کڻو. ٽڪر MP ڪڍو.



شکل 3.13

هاڻي $\triangle MNP$ ۾ $\angle N$ گوني ڪُنڊ آهي.

ٽڪر MP هٽيا ٿينبيوز آهي.

MN ٽڪر $>$ ٽڪر MP

مطلب ٽپڪو P گول ٽي نه آهي.


ليڪ l تي ٽپڪي N کان سواءِ ٻيو ڪو به ٽپڪو

گول تي نه آهي.

ليڪ l اها گول جي هڪ ٽپڪي وٽ چھي ٿي.

مطلب ليڪ l گول جي چھڻي آهي.

اچو ته ويچار ڪريون.



شکل 3.14

مرڪز A هوندڙ گول تي ٽپڪو B ڏنل آهي. ان ٽپڪي مان

لنگهندڙ چھڻي ڪڍي آهي.

ٽپڪي B مان بيشمار ليڪون لنگهي سگهجن ٿيون؟ انهن مان

چھڻي ڪهڙي ليڪ آهي؟ اها ڪيئن ڪڍبي، ڇا ٽپڪي B

مان هڪ کان وڌيڪ چھڻيون نڪري سگهجن ٿيون؟

گول جي اندرين پاڻي ۾ 'C' ان ٽپڪي مان ، اُن گول ڏانهن ڇهڻي ڪڍي سگهي ڇا؟

گول جي ٻاهرين پاسي ٽپڪي D مان گول

ڏانهن ڇهڻي ڪڍي سگهجي ڇا؟

اهڙيون گهڻيون ڇهڻيون ٿينديون شڪل مان

ظاهر آهي ته گول ٻاهرين پاڻي جي ٽپڪي مان


ٻه ڇهڻيون ڪڍي سگهجن ٿيون.

پر واري شڪل ۾ ليڪ DP ۽ ليڪ DQ اهي A

مرڪز واري گول تي ٽپڪي P ۽ ٽپڪي Q وٽ

ڇهن ٿيون. انهن ٽڪرن DP ۽ DQ کي ڇهڻي

ٽڪر چئجي ٿو.




شڪل 3.15

ڇهڻي ٽڪرن جو سڌيان (Tangent Segment Theorem)

سڌيان : گول ۾ ٻاهر ورتل ٽپڪي مان گول طرف ڪيل ڇهڻي ٽڪر ٺهڪندڙ هوندا آهن.

پر واري شڪل لاءِ 'ڏنل' ۽ 'ثابتي' مقرر ڪريو



شڪل 3.16

ثابتي : $\triangle PAD$ ۽ $\triangle QAD$ ۾

پاسو $PA \cong QA$ (هڪ گول جا ٻيهر قطر)


پاسو $AD \cong AD$

$\angle APD \cong \angle AQD = 90^\circ$ (ڇهڻي سڌيان)

$\therefore \triangle PAD \cong \triangle QAD$

$\therefore$ پاسو $DP \cong DQ$

حل ٿيل مثال



مثال (1) D مرڪز واري گول ۾ $\angle ACB = 52^\circ$

۽ CA ۽ CB اهي ڇهڻيون آهن ته

$\angle ADB$ لھو.

حل : چوڪنڊي جي چئني ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ 360°

شڪل 3.17


$$\therefore \angle ACB + \angle CAD + \angle CBD + \angle ADB = 360^\circ$$

$$\therefore 52^\circ + 90^\circ + 90^\circ + \angle ADB = 360^\circ \dots\dots\dots (\text{ڇهڻي سڌيان})$$

$$\therefore \angle ADB + 232^\circ = 360^\circ$$

$$\therefore \angle ADB = 360^\circ - 232^\circ = 128^\circ$$

مثال (2) ليڪ a ۽ ليڪ b اهي O مرڪز واري گول تي سلسليوار P ۽ Q وٽ ڇهندڙ پوروڇوٽ ڇهڻيون آهن ثابت ڪريو ته PQ اهو گول جو قطر آهي.



شڪل 3.18

ثابتي : ٽپڪي O وٽان هڪ ليڪ C ڪڍو جيڪا ليڪ a

جي پوروڇوٽ هجي نيمر قطر OP ۽ OQ ڪڍو.

$\angle OPT = 90^\circ$ (ڇهڻي سڌيان)

$\angle SOP = 90^\circ$ (اندريون ڪنڊون) (I)

ليڪ a || ليڪ c (رڇنا)

ليڪ a || ليڪ b (ڏنل)

ليڪ b || ليڪ c

$\angle OQR = 90^\circ$

$\angle SOQ = 90^\circ$ اندريون ڪنڊون (II)


$\therefore$ (I) ۽ (II) مان ،

$\angle SOP + \angle SOQ = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$

$\therefore$ ڪرڻو OP ۽ ڪرڻو OQ اهي مخالف ڪرڻا آهن.

$\therefore$ P, O, Q اهي هڪ ليڪ ٽپڪا آهن.

$\therefore$ ٽڪر PQ اهو قطر آهي.



برسات ۾ هلندڙ واهڻ ۾ ٽائر مان اڏامندڙ پاڻيءَ جو نظارو توهان ڏٺو آهي اهو گول ۽ ڇهڻيءَ وانگر توهان کي لڳي ٿو اها وهڪ ڪيئن آهي اهو وڳيان جي اُستاد کان ڄاڻ حاصل ڪريو.

اهو ڌيان ڀرڻو




(1) ڇهڻي سڌيان گول ڏانهن نڪتل ڇهڻي نيمر قطر جي پڇڙ وٽ عمود هوندي آهي.

(2) ڇهڻي سڌيان اُبتڙ گول جي نيمر قطر جي ٻاهرين ملاقي ٽپڪي وٽ نڪتل عمود، اها ليڪ گول

جي ڇهڻي هوندي آهي.

(3) گول جي ٻاهران ٽپڪي مان نڪتل ڇهڻي ٽڪر نهڪندڙ هوندا آهن.

1. ڀرواري شڪل ۾ گول جو مرڪز C آهي. گول جو نيم قطر 6 س م آهي. ليڪ AB اهو گول تي ٽپڪي A وٽ ڇهي ٿو ان جاڻ موجب، سوالن جا جواب ڏيو.



شڪل 3.19

(1) $\angle CAB$ جي ماپ ڪيتري؟

(2) ٽپڪو C اهو ليڪ AB کان ڪيترو پري آهي؟

(3) $d(A, B) = 6$ س م ته $d(B, C)$ لھو.

(4) $\angle ABC$ جي ماپ ڪيتري؟


2. ڀرواري شڪل ۾ ٽپڪي O مرڪز واري

گول ڏانهن نڪتل ڇهڻي ٽڪر RM ۽ RN

اهي نمبر وار M ۽ N وٽ ڇهن ٿا

جيڪڏهن $QR = 10$ س م ۽ گول جو نيم

قطر 5 س م آهي ته




شڪل 3.20

(1) هر هڪ ڇهڻي - ٽڪر جي ڊيگهه ڪيتري؟

(2) $\angle MRO$ جي ماپ ڪيتري؟

(3) $\angle MRN$ جي ماپ ڪيتري؟



شڪل 3.21

3. ٽڪر RM ۽ ٽڪر RN اهي O مرڪز واري

گول جا ڇهڻي ٽڪر آهن ته ثابت ڪريو ته

ٽڪر OR اهو $\angle MRN$ ۽ $\angle MON$ جو اڌڪ

آهي.

4. نيم قطر 4.5 س م واري گول ۾ ٻه ڇهڻيون هڪ ٻئي جي پورچوٽ آهن ته انهن ڇهڻين جي وچ ۾ مفاصلو لھو.

ICT Tools or Links




ڪمپيوٽر تي جيئو جبرا ان Software مدد سان گول ۽ گول ٻاهران ٽپڪي مان ڇهڻيون ڪڍو. ڇا ڇهڻي ٽڪر نه ڪندڙ آهي؟ ان جي ڇاڇ ڪريو.



چهندڙ گول (Touching Circles)


مشغولي I :



شکل 3.22

X-Y-Z اهي هر ليڪ جو ٽپڪا آهن
مرڪز X ۽ نيپر قطر XY ڪٽي هڪ گول
ڪڍو. مرڪز Z ۽ نيپر قطر YZ ڪڍي،
هڪ ٻيو گول ڪڍو. اهي ٻئي گول هڪ
ٻئي کي Y ٽپڪي وٽ چهن ٿا. ٽپڪي
Y وٽان هڪ ليڪ ڪڍو اها YZ هجي. اها
ليڪ ٻنهي گولن جي عام چھڻي آهي
اهو ڏيان ڀر ڪو.

مشغولي II :




شکل 3.23

شکل 3.23 ۾ X-Y-Z اهي هر ليڪ
ٽپڪا آهن مرڪز Z ۽ نيپر قطر YZ
کي ڪٽي هڪ گول ڪڍو
اهي ٻئي گول ٽپڪي Y وٽ هڪ ٻئي
کي چهن ٿا اهو آزمودو وٺو. ٽپڪي
Y مان لنگهندڙ هڪ ليڪ ڪڍو جا
ٽڪر YZ تي عمود هجي.


اها ليڪ ٻنهي گولن جي عام چھڻي آهي. اهو ڏيان ڀر ڪو.

مٿي ڏنل مشغوليون مان ظاهر آهي ته ٻنهي شڪلين ۾ به ٽي گول هڪ سطح ۾ آهن
۽ هڪ ٻئي کي ساڳئي ٽپڪي وٽ چهن ٿا. انهن کي چهندڙ گول چئبو آهي.

هڪ ئي سطح ۾ ٻه گول جنهن ٽپڪي تي ملن ٿا ان مان لنگهندڙ ليڪ ٻنهي گولن جي عام چھڻي
آهي ۽ ان عام ٽپڪي کي چھڻي ٽپڪو چئبو آهي.



شکل 3.25



شکل 3.24

شکل 3.24 ۾ مرکز S ۽ R وارن گولن کي ل لیک کي هڪ ئي ٽپکي T وٽ ڪپي ٿي. مطلب اها ل لیک ٻنهي گولن جي عام ڇهڻي آهي انهن کي ٻاهران ڇهندڙ گول چئبو آهي. شکل 3.25 ۾ لیک P ٻنهي گولن جي عام ڇهڻي آهي اهي اندريان ڇهندڙ گول آهن.

اچو ته ويچار ڪريون



(1) شکل 3.24 ۾ گولن کي ٻاهران ڇهندڙ گول چئبو آهي؟

(2) شکل 3.25 ۾ گولن کي اندران ڇهندڙ گول چئبو آهي؟


(3) 3.26 ۾ مرکز A ۽ B وارن جا نيئر قطر نمبر وار 3 س ۽ 4 س ۾ هوندا ته

(i) شکل 3.26(a) ۾ $d(A, B) = \text{ڪيترو؟}$


(ii) شکل 3.26(b) ۾ $d(A, B) = \text{ڪيترو؟}$

ڇهندڙ گول سڏيان (Theorem of touching circles)

سڏيان : جيڪڏهن ٻه گول ڇهندڙ گول آهن ته پوءِ ڇهڻ ٽپڪو ٻنهي گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ لیک تي هوندو آهي.



(b)



(a)

شکل 3.26

ڏنل : مرکز A ۽ مرکز B وارن گولن ۾ ڇھڻ ٿيڻ ۾ C آهي .

ثابت ڪرڻ : ته ٽپڪو C اهو ليڪ AB تي آهي.

ثابتي : سمجھو ليڪ $1/a$ مان لنگهندڙ پنهي ٽولن جي عام ڇهڻي آهي.

ٲڪر BC ⊥ ليڪ ٲڪر AC ⊥ ليڪ ٲڪر AC ۽ ٲڪر BC اِهي ليڪ تي عمود آهن. ∴

ٽپڪي C وٽان ليڪ ڏانهن فقط هڪ ئي عمود ڪڍي سگهيو. ان ڪري ٽپڪا B, A, C اهي هر ليڪ ٽپڪا آهن.



اهو ڌيان ۾ رکو

(1) هڪ ٻئي کي ڇهندڙ گولن جو ڇهڻ ٽپڪو انهن گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ تي هوندو آهي.

(2) باهران ڇهندڙ ٽولن ۾ مرڪزن جو مفاصلو انهن جي نيم قطر جي زور برابر هوندو آهي.

(3) اندريان ڇهندڙ ڳولن ۾ مرڪزن جو مفاصلو اُنهن جي نيم قطر جي ڪٽ برابر هوندو آهي.


3.2 اپیاس

1. هڪ ٻئي کي اندريان ڇهندڙ گولن جا نيسر قطر نمبر وار 3.5 س م ۽ 4.8 س م آهن. انهن جي مرڪزن جو مفاصلو ڪيترو؟

2. ٻاهريان ڇهندڙ گولن جا نيسر قطر نمبر وار 5.5 ۽ 4.2 س م آهن ته انهن جي مرڪزن جو مفاصلو ڪيترو؟

3. نیم قطر نمبر وار 4 س م ۽ 2.8 س م کٽي ٻاهران ڇهندڙ گول ۽ اندريان ڇهندڙ گول ڪڍو.

4. شکل 3.27 ۾ مرکز P ۽ مرکز Q وارا گول هڪ ٻئي کي R تي ڇهن ٿا ٽپڪي R مان لنگهندڙ ليڪ انهن گولن کي نمبروار A ۽ B وٽ ڪپي ٿي ته



شكل 3.27

(1) ثابت کریو تکر BQ || تکر AP

(2) $\Delta APR \sim \Delta RQB$ ثابت کریو


(3) جيڪڏهن $\angle PAR = 35^\circ$ ته $\angle RQB$ جي

ماپ لھو۔

5. شکل 3.28 مرکز A و مرکز B وارا

گول هڪ ٻئي کي ٽپڪي E وٽ چهن ٿا. ليڪ I اها عام ڇهڙي اُنهن کي نمبر وار C ۽ D وٽ ڇهي ٿي. جيڪڏهن گولن جا نيئر قطر نمبر وار 4 س م ۽ 6 س م آهن ته ٽڪر CD

جی دیگر کیتري ٿيندي؟




شکل 3.28



گول جي ڪمان (Arc of a circle)

قاطح ڪري گول ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿو ان مان ڪوبه هڪ حصو ۽ قاطح جي عام ٽيڪن سان گڏ ٺهيل شڪل کي ڪمان چئبو آهي. جن ٽيڪن تي قاطح گول کي ڪپي ٿي. انهن کي چيڙ ٽيڪا چئبو آهي.



شڪل 3.29

شڪل 3.29 ۾ قاطح C, K مرڪز واري گول کي ڪپي ٻه ڪمانون AYB ۽ AXB تيار ڪري ٿي.


جنهن ڪمان پاسي مرڪز هجي ان کي وڏي ڪمان چئبو آهي ۽ ان جي مخالفت ڪمان کي ننڍي ڪمان چئبو آهي.

شڪل 3.29 ۾ AYB اها وڏي ڪمان آهي ۽ AXB اها ننڍي ڪمان آهي. عام طور ڪمان کي ٽن اکرن سان لکبو آهي جيئن مونجهه نه ٿئي پر ننڍي ڪمان ٻه اکر چيڙ ٽيڪا ڪم آڻي سگهون ٿا مثال ڪمان AXB کي ڪمان AB لکي سگهجي ٿو اسان ڪمان لکڻ لاءِ اهو طريقو ڪم آڻيندا آهيون.

مرڪزي ڪنڊ (Central angle)

جنهن ڪنڊ جو نوڪي ٽيڪو گول جي مرڪز تي هوندو آهي ان کي مرڪزي ڪنڊ چئبو آهي.

شڪل 3.30 گول ۾ جو مرڪز O آهي. $\angle AOB$ هڪ مرڪزي ڪنڊ آهي قاطح وانگر ئي مرڪزي ڪنڊ ڪري گول ٻن ڪمانن ۾ ورهائجي ٿو.



شڪل 3.30

ڪمان جي ماپ (Measure of an arc)

ڪيترائي دفعا ٻن ڪمانن جي پيٽ ڪرڻي پوندي آهي. ان ڪمانن جي ماپ اڳتي سمجهايل آهي.

(1) ننڍي ڪمان جي ماپ اُن جي نسبتي مرڪزي ڪنڊ جي برابر هوندي آهي.

شڪل 3.30 ۾ مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ اُن جي ماپ θ آهي ته ننڍي ڪمان APB جي ماپ θ آهي.

(2) وڏي ڪمان جي ماپن = نسبتي ڪنڊ جي ماپ - 360°

(3) اڌ گول ڪمان مطلب اڌ گول جي ماپ 180° آهي.

(4) سڄي گول جي ماپ 360° هوندي آهي.

ڄاڻي وٺون.



ڪمانن جو ٺهڪڻ (Congruence of arcs)


جڏهن ٻه سطحي شڪلون هڪ ٻئي سان پوري طرح سان ٺهڪي اچن ته اُن کي ٺهڪندڙ شڪليون چئبو آهي. اها ويچار ڌارا ڪم آڻي سائڻي ماپ وارين ڪنڊن کي ٺهڪندڙ ڪنڊون چئبو آهي. سائڻي نموني جيڪڏهن ٻن ڪمانن جون ماپون برابر آهن ته اُهي ڪمان ٺهڪندڙ هونديون ڇا؟
ان سوال جو جواب اڳي ڏنل مشغولي ڪري ڳولهيو.

مشغولي :

شڪل 3.31 ۾ هڪ 'C' مرڪز وارا ٻه گول ڪڍو. $\angle DCE$ ۽ $\angle FCG$ اهي سائڻي ماپ واريون ڪنڊون

ڪڍو. انهن ڪنڊن جي ماپن ۾ ڀيٽ ۾ جدا ماپ واري $\angle ICJ$ ڪڍو. $\angle DCE$ جي پاسن ۾ سمايل ڪمان کي AB نالو ڏيو.

ڪمانن جي ماپن جي وسف موجب ڪمان AB ۽ ڪمان DE جون ماپون ساڳيون آهن. اهو ڌيان ۾ آيو ڇا؟
اهي ٻئي ڪمانون هڪ ٻئي سان ٺهڪي اچن ٿيون ڇا؟




شڪل 3.31

پڪ سان ٺهڪي نه ٿيون اچن. هاڻي C-DE, C-GF, C-IJ ۽ C-II اهي ٽڪرا ڪڍيو. هڪ ٻئي سان ٺهڪندڙ DE, GF ۽ II ڪمانن مان ڪهڙيون ڪمانون هڪ ٻئي سان پوري طرح سان ملن ٿيون. ان مشغولي موجب ٻه ڪمانون ٺهڪندڙ هجن اُن جي لاءِ ضروري نه آهي ته اُهي هڪ ٻئي سان پوري طرح ٺهڪي اچن.

ٻن ڪمانن جي ٺهڪڻ لاءِ ٻي ڪهڙي شرط هئڻ گهرجي؟ مٿي ڏنل مشغولي مان ڌيان ۾ اچي ٿو.
ٻن ڪمانن جا نيم قطر ۽ اُن جون ماپون برابر آهن ته اُهي ڪمانون ٺهڪندڙ هونديون آهن ڪمان DE ۽ ڪمان GF اهي ٺهڪندڙ آهن اهو نشانين ۾ لکيو آهي. ڪمان $GF \cong DE$

شڪل 3.32 ۾ ٽپڪا D, C, B, A گول تي ڏنل آهن. انهن ٽپڪن مان ڪيتريون ئي ڪمانون تيار ٿين ٿيون. انهن مان ڪمان ABC ۽ ڪمان CDE ۾ ٽپڪو C عام ٽپڪو آهي. مطلب ڪمان ABC ۽ ڪمان CDE جي ماپن جو جوڙ ڪمان ACE جي ماپ برابر ٿيندو.



شڪل 3.32

$$m(\text{arc } ABC) + m(\text{arc } CDE) = m(\text{arc } ACE)$$

پر ڪمان ABC ۽ ڪمان BCE ۾ هڪ کان وڌيڪ عام ٽپڪا آهن. ان ڪري ڪمان ABC ۽ ڪمان BCE انهن جي ماپن جو جوڙ ڪمان ABE جي ماپ برابر نه ٿيندو.

سڏيان: هڪ ئي گول (يا ٺهڪندڙ گولن ۾) ٺهڪندڙ ڪمانن جا نسبتي زهه ٺهڪندڙ هوندا آهن.

ڏنل: گول جو مرڪز B آهي. ڪمان $APC \cong$ ڪمان DQE

ثابت ڪرڻ تہ: زهه $AC \cong$ زهه DE

ثابتي: خال پري ثابتي پوري ڪريو

$$\triangle DBE \cong \triangle ABC$$


$$\text{پاسو } AB \cong \text{پاسو } DB \dots (\dots)$$

$$\text{پاسو } \dots \cong \text{پاسو } \dots (\dots)$$

$$\angle DBE \cong \angle ABC \dots (\dots)$$

$$\therefore \triangle DBE \cong \triangle ABC \dots (\dots)$$

$$\therefore \text{زهه } DE \cong \text{زهه } AC \dots (\dots)$$



شڪل 3.33

سڏيان: هڪ ئي گول (يا ساڳين گولن ۾) ٺهڪندڙ زهن جو نسبتي ڪمانون ٺهڪندڙ هونديون آهن.

ڏنل: گول جو مرڪز O آهي.

$$\text{زهه } PQ \cong \text{زهه } RS$$

ثابت ڪرڻ تہ: ڪمان RNS ڪمان PMQ


آڻي وڇار ڪري ثابتي لکو ٻن ڪمانن

جي ٺهڪڻ لاءِ انهن جا نيم قطر ۽ ماپون

برابر هئڻ گهرجن ڪمان PMQ ۽ ڪمان

RNS اهي ساڳئي گول جون ماپون آهن ان

ڪري انهن جا نيم قطر ساڳيا آهن.



شڪل 3.34


انهن ڪمانن جون ماپون انهن جي نسبتي مرڪزي ڪنڊن جي برابر هونديون آهن انڪري نيم
 قطر OP, OQ, OR ۽ OS ڪڍو.
 ۽ $\triangle OPQ$ ۽ $\triangle ORS$ ٺهڪندڙ آهن ڇا؟ مٿيان ٻئي سڌيان توهان ٺهڪندڙ گول کڻي ثابت ڪريو.

ويچار ڪريو



- مٿين سڌيان مان پهرين ۾ ڪمان APC ۽ ڪمان DQE اهي ننڍيون ڪمانون ٺهڪندڙ ثابت ڪيون آهن انهن جون نسبتي وڏيون ڪمانون ٺهڪندڙ ثابت ڪري سگهجن ٿيون ڇا؟
- ٻئين سڌيان ۾ ٺهڪندڙ زهن جون نسبتي وڏيون ڪمانون ٺهڪندڙ هونديون ڇا؟ جيڪڏهن زهه PQ ۽ زهه RS اهي قطر هوندا ته سڌيان صحيح آهن ڇا؟

حل ڪيل مثال



شڪل 3.35

مثال (1) O مرڪز واري گول تي A, B, C ٽپڪا آهن.

(i) انهن ٽن ٽپڪن وسيلي تيار ٿيندڙ سڀ ڪمانن جا نالا لکو

(ii) ڪمان BC ۽ ڪمان AB جون نمبروار ماپون 110° ۽ 125° آهن ته بچيل ڪمانن جون ماپون لکو.

حل : (i) ڪمان AB, ڪمان BC, ڪمان AC, ڪمان ABC, ڪمان ACB, ڪمان BAC

$$(ii) m(\text{arc } ABC) = m(\text{arc } AB) + m(\text{arc } BC)$$

$$= 125^\circ + 110^\circ = 235^\circ$$


$$m(\text{arc } A C) = 360^\circ - m(\text{arc } ABC)$$

$$= 360^\circ - 235^\circ = 125^\circ$$

$$m(\text{arc } ACB) = 360^\circ - 125^\circ = 235^\circ$$

$$m(\text{arc } BAC) = 360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$$

(2) شڪل 3.36 ۾ گول جو مرڪز T آهي. مستطيل PQRS گول ۾ اُرديل آهي. ثابت ڪريو



شڪل 3.36

(i) $\text{ڪمان } PQ \cong \text{ڪمان } SR$

(ii) $\text{ڪمان } SPQ \cong \text{ڪمان } PQR$

حل : $\square PQRS$ مستطيل آهي.

$\therefore$ $\text{زھ } PQ \cong \text{زھ } SR$ (مستطيل جا مخالف پاسا)

$\therefore$ $\text{ڪمان } PQ \cong \text{ڪمان } SR$ (نھڪندڙ زھن جو نسبتي ڪمانون)

$\text{زھ } PS \cong \text{زھ } QR$ (مستطيل جا مخالف پاسا)

$\therefore$ $\text{ڪمان } SP \cong \text{ڪمان } QR$ (نھڪندڙ زھن جون نسبتي ڪمانون)

$\therefore$ $\text{ڪمان } SP \text{ ۽ ڪمان } QR$ جون ماپون ساڳيون آهن.

$$m(\text{arc } SP) + m(\text{arc } PQ) = m(\text{arc } PQ) + m(\text{arc } QR)$$

$$\therefore m(\text{arc } SPQ) = m(\text{arc } PQR)$$

$$\therefore \text{arc } SPQ \cong \text{arc } PQR$$

ڌيان ۾ رکو



(1) جن ڪنڊن جا نوڪي ٽپڪا گول جي مرڪز تي هوندا آهن انهن کي مرڪزي ڪنڊون چئبو آهي.

(2) ڪمان - ماپ وصف (i) ننڍي ڪمان جي ماپ = نسبتي مرڪزي ڪنڊ ماپ

(ii) وڏي ڪمان ماپ = نسبتي ڪنڊ ماپ - 360° (iii) اڌ گول ماپ = 180°

(3) ٻن گول جي ڪمانن جا نيم قطر ۽ ماپون برابر ته اهي ڪمانون نهڪندڙ آهن.


(4) جيڪڏهن ڪمان ABC ۽ ڪمان CDE ۾ فقط C ٽپڪو ئي عام آهي ته

$$m(\text{arc } ABC) + m(\text{arc } CDE) = m(\text{arc } ACE)$$

(5) هڪ گول (يا نهڪندڙ گولن ۾) نهڪندڙ ڪمانن جا نسبتي زھ نهڪندڙ هوندا آهن.

(6) هڪ گول (يا نهڪندڙ گولن ۾) نهڪندڙ زھن جون نسبتي ڪمانون نهڪندڙ هونديون آهن.

آپياس 3.3



شڪل 3.37

1. شڪل 3.37 ۾ گول جو مرڪز C آهي. گول تي


F, E, D, G ٽپڪا آهن. $\angle ECF$ جي ماپ 70° ۽ ڪمان

DGF جي ماپ 200° آهي ته ڪمان DE ۽ ڪمان DEF


انهن جون ماپون لھو.

2*. شڪل 3.38 ۾ هڪ گول ۾ ٽيڀور پاسو ٽڪنڊو $\triangle QRS$ اُرديل آهي.
تم ثابت ڪريو:

- (i) ڪمان $QR \cong$ ڪمان QS ڪمان RS
(ii) ڪمان QRS جي ماپ 240° آهي.



شڪل 3.38



شڪل 3.39

3. شڪل 3.39 ۾،

زهره $AB \cong$ زهره CD

تم ثابت ڪريو:

ڪمان $AC \cong$ ڪمان BD

ڄاڻي وٺون.




گول ۽ ٽيڪو، گول ۽ ليڪ (ڇهڙي) انهن وچ ۾ لاڳاپي بابت آسان ڪجهه خاصيتون ڏنيون آهن. هاڻي گول ۽ ڪنڊ وچ ۾ ڪجهه خاصيتون جو آڀياس ڪندا سين. مشغوليون رستي اهي خاصيتون سمجهندا سين.

مشغولي I:

مرڪز C کڻي هڪ وڏو گول ڪڍو. شڪل 3.40 موجب زهره AB ڪڍو

مرڪزي ڪنڊ ACB ڪڍو زهره AB واري وڏي ڪمان مٿان
ٽيڪو D ۽ ننڍي ڪمان مٿان ٽيڪو E کڻو



شڪل 3.40


(1) $\angle ACB$ ۽ $\angle ADB$ ماپيو انهن جون ماپون
پيئيو.

(2) $\angle AEB$ ۽ $\angle ADB$ ماپيو انهن ماپن جو جوڙ
ڪري ڏسو.

- (3) کمان ADB مٿان H, G, F اِهي ٽپڪا ڪٽو. $\angle AFB, \angle AGB, \angle AHB$ ڪنڊن جون ماپون لھو. انھن ماپن جي $\angle ADB$ ماپ سان پيٽ ڪريو.
- (4) کمان $\angle AEB$ مٿان هڪ ٽپڪو I ڪٽو $\angle ACB$ ماپي اُن جي $\angle AEB$ سان پيٽ ڪريو اِن مشغوليءَ مان هيٺيان نتيجا نڪرندا.

- (1) $\angle ACB$ جي ماپ $\angle ADB$ کان ٻيڙي آهي.
- (2) ADB ۽ AEB انھن جي ماپن جو جوڙ 180° آهي.
- (3) $\angle AHB, \angle ADB, \angle AFB, \angle AGB$ انھن سڀني جون ماپون ساڳيون آهن.
- (4) AIB ۽ AEB انھن جي ماپ ساڳئي آهي.


مشغولي II :



شکل 3.41

‘C’ مرکز کڻي هڪ وڏو گول ڪڍو. ٽڪر PQ قطر ڪيو. اِن قطر ڪري تيار ٿيل اڌ گولن مان ٽپڪا T, S, R ڪٽو. $\angle PRQ, \angle PSQ, \angle PTQ$ ماپيو. انھن مان هر هڪ گوني ڪنڊ آهي ڇا؟ مٿي ڏنل مشغولين مان حاصل ٿيل خاصيتن جو مطلب گول ۽ ڪنڊ لاڳاپي بابت سڌيان آهي. اِن سڌيان کي آسان ڏسون پوءِ وڌيڪ اسر سڃاڻي سگھندا سين

اِرديل ڪنڊ (Inscribed angle)




شکل 3.42

شکل 3.42 ۾ گول جو مرکز C آهي. PDQ جو نوڪي ٽپڪو D گول مٿان آهي. ڪنڊ جا پاسا DP ۽ DQ گول کي نمبروار A ۽ B وٽ ڪپين ٿا. اِن ڪنڊ کي گول ۾ اِرديل ڪنڊ چئبو آهي.

شکل 3.42 ۾ $\angle ADB$ اِها کمان ADB ۾ اِرديل آهي.


هيٺ ڏنل شڪل 3.43 واريون (i) کان (vi) سڀ شڪليون ڄاچ ڪريو



شڪل 3.43

هر هڪ شڪل ۾ $\angle ABC$ جي اندرين حصي ۾ گول جو ڪمان سمايل آهي. ان ڪمان کي آنٽرچيڊيل ڪمان چئبو آهي. آنٽرچيڊيل ڪمان جا چيٽر ٽپڪا اهي گول ۽ ڪنڊ جا چيڊ ٽپڪا هوندا آهن. ڪنڊ جي هر هڪ پاسي مٿان ڪمان جو هڪ چيٽر ٽپڪو هئڻ لازمي آهي. شڪل 3.43 جي (i) (ii) (iii) ۾ ڪنڊن فقط هڪ ئي ڪمان کي آنٽرچيڊيو آهي پر (iv) (v) ۽ (vi) ۾ هر هڪ ڪنڊ ٻه ڪمانون آنٽرچيڊيون آهن. شڪل v ۾ ڪنڊ جي هڪ پاسو ۽ vi ۾ ڪنڊ جا ٻه پاسا گول کي چهن ٿا.

شڪل 3.44



شڪل 3.44 ۾ ڪمان آنٽرچيڊيل نه آهي. ڇو ته ڪنڊ جي پاسي BC تي ڪمان جو هڪ به چيٽر ٽپڪو موجود نه آهي.


اُرديل ڪنڊ سڌيان (Inscribed angle theorem)

سڌيان : گول ۾ اُرديل ڪنڊ جي ماپ، اُن جي انٽرچيڊيل ڪمان جي ماپ جي اڌ هوندي آهي.

ڏنل : گول جو مرڪز O آهي $\angle BAC$ اها ڪمان $\angle BAC$ ۾ اُرديل آهي. $\angle BDC$ کي آنٽرچيڊيو آهي.

ثابت ڪرڻ : $\angle BAC = \frac{1}{2} m(\text{arc BDC})$

رچنا : ڪرڻو AO ڪڍو. اهو گول تي ٽپڪي E وٽ ڪپي ٿو. نيم قطر OC ڪڍو.



شڪل 3.45

ثابتي : $\triangle AOC$

پاسو $OA \cong OC$ پاسو (هڪ ئي گول جا نيم قطر)

$\therefore \angle OAC = \angle OCA$ (ٻي پاسو ٽڪنڊو سڏيان)

$\angle OAC = \angle OCA = x$ (I) (سمجھ)

$\therefore \angle EOC = \angle OAC + \angle OCA$ (پرين اندرين ڪنڊن جو سڏيان)

$$= x^\circ + x^\circ = 2x^\circ$$

پر $\angle EAC$ اها مرڪزي ڪنڊ آهي.

$\therefore m(\text{arc EC}) = 2x^\circ$ (II) (ڪمان ڪنڊ وصف)

(I) ۽ (II) مان

$$\angle OAC = \angle EAC = \frac{1}{2} m(\text{arc EC}) \text{ (III)}$$

اهڙي نموني نيم قطر OB ڪڍي. $\angle EAB = \frac{1}{2} m(\text{arc BE})$ (IV)


مان (III) ۽ (IV) $\therefore \angle EAC + \angle EAB = \frac{1}{2} m(\text{arc EC}) + \frac{1}{2} m(\text{arc BE})$ (V)

$$\therefore \angle BAC = \frac{1}{2} [m(\text{arc EC}) + m(\text{arc BE})]$$

$$= \frac{1}{2} [m(\text{arc BEC})] = \frac{1}{2} [m(\text{arc BDC})] \text{ (VI)}$$

ڏيان ڏيو

اُرديل ڪنڊ ۽ مرڪز لاءِ ٿي لاڳاپا ممڪن آهن گول جو مرڪز ڪنڊ جي پاسي تي، يا اندرين حصي يا ڪنڊ کان ٻاهر ٿي سگهي ٿو. انهن مان ٻه آسان III ۽ IV ۾ ثابت ڪيا. هاڻي ٽئين باري ويچار ڪريون.



شڪل 3.46

$$\angle BAC = \angle BAE - \angle CAE$$

$$= \frac{1}{2} m(\text{arc BCE}) - \frac{1}{2} m(\text{arc CE})$$

مان (III)

$$= \frac{1}{2} [m(\text{arc BCE}) - m(\text{arc CE})]$$

$$= \frac{1}{2} [m(\text{arc BC})] \text{ (VI)}$$

گول جي ڪمان طرفان ڪنهن به ٽپڪي وٽ ٺهيل ڪنڊ جي ماپ (Subtended) اُن ڪمان جي نسبتي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ جي آڌ هوندي آهي.

هن سڌيان جا بيان اُپ سڌيان لکيا وڃن ٿا .




(Corollaries of inscribed angle theorem) اُردیل ڪنڊ سڌيان جا اُپ سڌيان

1. هڪ ئي ڪمان ۾ اُردیل سڀ ڪنڊون نهڪندڙ هونديون آهن.

1. شڪل 3.47 جي آڌار تي ڏنل ۽ ثابت ڪرڻ لکو. سوالن جي آڌار تي ثابتي لکو.


- (1) $\angle PQR$ جي اُنترچيدیل ڪمان ڪهڙي؟
- (2) $\angle PSR$ جي اُنترچيدیل ڪمان ڪهڙي؟
- (3) اُردیل ڪنڊي اُنترچيدیل ڪمان، اُنهن جي ماپن ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟



شڪل 3.47

2. اُت گول ۾ اُردیل ڪنڊ گوني ڪنڊ هوندي آهي.

پڻ واري شڪل 3.48 جي آڌار تي ڏنل، ثابت ڪرڻ ۽ ثابتي لکو.



شڪل 3.48


چڪرڪ (محدود) چوڪنڊو (Cyclic quadrilateral)

چوڪنڊي جا چار ئي ٽپڪا جيڪڏهن ساڳئي گول تي هجن ته اُن چوڪنڊي کي چڪرڪ چوڪنڊو چئبو آهي.

چڪرڪ چوڪنڊو سڌيان (Theorem of cyclic quadrilateral)

چڪرڪ چوڪنڊي جون مخالف ڪنڊون تتمم هونديون آهن. خال پري ثابت ڪريو.

ڏنل : $\square$ هڪ چڪرڪ چوڪنڊو آهي
 ثابت ڪرڻ : $m\angle B + m\angle D =$
 $m\angle C = 180^\circ +$



شڪل 3.49

ثابتي : $\angle ADC$ اُردیل ڪنڊ ڪمان ABC کي اُنتر چيدي ٿي.

$$\therefore \angle ADC = \frac{1}{2} \text{ } \dots\dots\dots (I)$$

اهڙي نموني اُردیل ڪنڊ ڪمان ADC کي اُنتر چيدي ٿي.

$$\therefore \boxed{} = \frac{1}{2} m(\text{arc ADC}) \dots\dots (II)$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle ADC + \boxed{} &= \frac{1}{2} \boxed{} + \frac{1}{2} m(\text{arc ADC}) \dots\dots [(I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان}] \\ &= \frac{1}{2} [\boxed{} + m(\text{arc ADC})] \\ &= \frac{1}{2} \times 360^\circ \dots\dots\dots (\text{ڪمان ABC ۽ ڪمان ADC گول ٺاهڻ ٿا}) \end{aligned}$$

$$= \boxed{}$$

$$m\angle A + m\angle C = \boxed{} \text{ ساڳئي نموني}$$

چڪرڪ چوڪنڊي سڌيان جو اُپ سڌيان (Corollary of cyclic quadrilateral theorem)

چڪرڪ چوڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ، سندس ڀر واري ڪنڊ جي مخالف ڪنڊ سان ٺهڪندڙ هوندي آهي. ان اُپ سڌيان جي ثابتي پاڻ لکو.

ويچار ڪريو



مٿي ڏنل سڌيان ۾ $m\angle B + m\angle D = 180^\circ$ اهو ثابت ڪرڻ بعد بچيل مخالف ڪنڊن جو جوڙ 180° بڻي ڪنهن طريقي ثابت ڪري سگهجي ٿو ڇا؟


چڪرڪ چوڪنڊو سڌيان جو اُبتڙ (Converse of cyclic quadrilateral theorem)

سڌيان : ڪنهن چوڪنڊي جون مخالف ڪنڊون تنهنهه آهي ته اُهو چڪرڪ چوڪنڊو هوندو آهي. مٿئين سڌيان مان اسان ائين ويچار ڪريون ته جيڪڏهن چوڪنڊي جون مخالف ڪنڊون تنهنهه آهن ته ان چوڪنڊي جي گرد گول هوندو. هر هڪ ٽڪنڊي جو هڪ گرد گول ٿئي ٿو. اها اسان کي ڄاڻ آهي. پر هر هڪ چوڪنڊي جو گرد گول هوندو، ائين نه آهي ڪهڙي شرط سان چوڪنڊي جو گرد گول هوندو مطلب چوڪنڊي جا نوڪي ٽپڪا گول تي هجن، اهو مٿئين سڌيان مان سمجهڻ ايندو. اڃا هڪ اڻپڙ حالت ۾ چار غير هم ليڪ ٽپڪا گول تي هوندا اهو اڳتي سڌيان ۾ ٻڌايل آهي.

سڌيان : جيڪڏهن ڪنهن ليڪ جا ٻه ٽپڪا ساڳئي پاسي ٻن ٽپڪن وٽ ٺهڪندڙ ڪنڊون ٺاهن ٿا ته اهي چار ئي ٽپڪا هڪ گول مٿان هوندا آهن.

ڏنل : ليڪ AD جي ساڳئي پاسي ٽپڪا B ۽ C آهن. $\angle ABD \cong \angle ACD$

ثابت ڪرڻ : ٽپڪا A, B, C, D اهي هڪ ئي گول تي آهن (يعني) ABCD هڪ چڪر ۾ چوڪنڊو آهي ان لاءِ اڻ سڌي ثابتي ڏجي ٿي.




شڪل 3.50

ويچار ڪريو



مٿيون سڌيان ڪهڙي سڌيان جي اُبتڙ آهي؟

حل ڪيل مثال



شڪل 3.51

مثال (1) شڪل 3.51 ۾، $LM \cong LN$ ، ته $\angle L = 35^\circ$

(i) $m(\text{arc } MN) = ?$

(ii) $m(\text{arc } LN) = ?$

(i) $\angle L = \frac{1}{2} m(\text{arc } MN)$ (اڍريل ڪنڊ سڌيان)

حل :

$$\therefore 35 = \frac{1}{2} m(\text{arc } MN)$$

$$\therefore 2 \times 35 = m(\text{arc } MN) = 70^\circ$$

(ii) $m(\text{arc } MLN) = 360^\circ - m(\text{arc } MN)$ (ڪمان ڪنڊوصف)
 $= 360^\circ - 70^\circ = 290^\circ$

زهره $LM \cong LN$ هاڻي

$$\therefore \text{LN arc} \cong \text{LM arc}$$

پر $m(\text{arc } MLN) = 290^\circ = m(\text{arc } LN) + m(\text{arc } LM)$ (ڪمان جوڙ خاصيت)

$$m(\text{arc } LM) = m(\text{arc } LN) = \frac{290^\circ}{2} = 145^\circ$$

يا، (ii) زهره $LM \cong LN$

$$\therefore \angle M = \angle N$$
 (پور پاسو ٿڪندڙ سڌيان)

$$\therefore 2 \angle M = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

$$\therefore \angle M = \frac{145^\circ}{2}$$

$$\begin{aligned}\therefore m(\text{arc LN}) &= 2 \times \angle M \\ &= 2 \times \frac{145^\circ}{2} \\ &= 145^\circ\end{aligned}$$

مثال (2) شکل 3.52 ۾ زهه PQ ۽ RS زهه آر ايس هڪ ٻئي کي ٽپي T وٽ ڪپين ٿا.

(i) جيڪڏهن $\angle PSR = 24^\circ$, $\angle STQ = 58^\circ$,


تہ $m(\text{arc SQ})$ لھو

$$\angle STQ = \frac{1}{2} [m(\text{arc PR}) + m(\text{arc SQ})] \quad (\text{ii})$$

اھا ڇڪاس ڪريو

(iii) زهه PQ ۽ RS وچ ۾ ڪنڊ جي ماپ ڪهڙي

بھ هجي تہ ثابت ڪريو



شکل 3.52

$$m\angle STQ = \frac{1}{2} [m(\text{arc PR}) + m(\text{arc SQ})]$$

(iv) ان ثابت ٿيل مثال جي خاصيت لفظن ۾ لکو

حل : (i) $\angle SPQ = \angle SPT = 58^\circ - 24^\circ = 34^\circ$ ٻاهرين ڪنڊ سڏيان

$$m(\text{arc QS}) = 2m\angle SPQ = 2 \times 34^\circ = 68^\circ$$

$$m(\text{arc PR}) = 2m\angle PSR = 2 \times 24^\circ = 48^\circ \quad (\text{ii})$$

$$\frac{1}{2} [m(\text{arc PR}) + m(\text{arc SQ})] = \frac{1}{2} [48 + 68]$$

$$= \frac{1}{2} \times 116 = 58^\circ$$

$$= m\angle STQ$$

(iii) ان خاصيت کي ثابت ڪرڻ لاءِ خال ڀريو

$$\text{.....} + m\angle STQ = m\angle SPQ \quad (\text{پرين ڪنڊن جو سڏيان})$$

$$\text{.....} = \frac{1}{2} m(\text{arc SQ}) + \text{.....}$$

$$= \frac{1}{2} [\text{.....} + \text{.....}]$$

(iv) گول ۾ جيڪڏهن ٻه زهه هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ آهن تہ انهن زهن ۾ ٺهيل ڪنڊ


جي ماپ، ان ڪنڊ جي آنتر ڇيڊيل ڪمان ۽ ان جي مخالف ڪنڊ جي

آنتر ڇيڊيل ڪمان جي جوڙ جو آڌ هوندي آهي.

مثال (3) گول جي ٻاهر، جيڪڏهن اُن جا زهه هڪ ٻئي کي ڪپين ٿا ته اُنهن کي سمائيندڙ ليڪن جي وچواري ڪنڊ جي ماپ، اُن طرفان انٽر چيڊيل ڪمانن جي فرق جو آڌ هوندي آهي.

ڏنل : گول جا زهه AB ۽ CD اهي گول کان ٻاهر ٽپڪي ۽ وٽ هڪ ٻئي کي ڪپين ٿا.

ثابت ڪرڻ : $m\angle AEC = \frac{1}{2} [m(\text{arc AC}) - m(\text{arc BD})]$




شکل 3.53

جوڙجڪ : ٽڪر AD ڪڍو ان خاصيت جي ثابتي مثال (2) وانگر ڏجي ٿي اُن لاءِ $\triangle AED$ ڄاڻ ڪندون، اُن جي پرين ڪنڊن جو سڌيان خيال ڀرڻ کي ثابتي لکو.

اهو ڏيان ڀر ڪو.



- (1) گول ۾ اڻڍيل ڪنڊ جي ماپ، اُن جي انٽر چيڊيل ڪمان جي ماپ جي آڌ هوندي آهي.
- (2) گول ۾ هڪ ڪمان ۾ اڻڍيل ڪنڊون ٺهڪندڙ هونديون آهن.
- (3) آڌ گول ۾ اڻڍيل ڪنڊ گوني هوندي آهي.
- (4) چوڪنڊي جا چارئي نوڪي ٽپڪا گول تي هوندا ته اُن چوڪنڊي کي چڪرڪ چوڪنڊو چئبو آهي.
- (5) چڪرڪ چوڪنڊي جو مخالف ڪنڊون تتهم هونديون آهن.
- (6) چڪرڪ چوڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ، اُن جي پرواري ڪنڊ جي مخالف ڪنڊ جي ٺهڪندڙ هوندي آهي.
- (7) چوڪنڊي جون مخالف ڪنڊون تتهم هونديون ته اهو چوڪنڊو چڪرڪ آهي.
- (8) ليڪ جا ٻه ٽپڪا، ساڳئي پاسي ٻن ٽپڪن تي ٺهڪندڙ ڪنڊون ٺاهين ٿا ته اهي چارئي ٽپڪا هڪ ئي گول تي هوندا آهن.




شکل 3.54

(9) ڀر واري شکل 3.54 ۾

(i) $m\angle AEC = \frac{1}{2} [m(\text{arc AC}) + m(\text{arc DB})]$

(ii) $m\angle CEB = \frac{1}{2} [m(\text{arc AD}) + m(\text{arc CB})]$




شکل 3.55

(10) پرواري شکل 3.55 ۾

$$m\angle BED = \frac{1}{2} [m(\text{arc } BD) - m(\text{arc } AC)]$$

اڀياس 3.4



شکل 3.56

1. شکل 3.56 ۾ گول جو مرکز O آهي زهه

AB جي ڏيکڻه نيسر قطر برابر آهي ته

(1) $\angle AOB$ (2) $\angle ACB$ (3) arc AB

(4) کمان ACB جون ماپون لھو.

2. شکل 3.57 ۾ PQRS ھڪ چڪرڪ


چوڪنڊو آھي. پاسو $PQ \cong RQ$ پاسو $m\angle PSR = 110^\circ$

تہ (1) $\angle PQR = ?$

(2) $m(\text{arc } PQR) = ?$

(3) $m(\text{arc } QR) = ?$

(4) $\angle PRQ = ?$




شکل 3.57

3. چڪرڪ چوڪنڊي MRPN ۾ $\angle R = (5x - 13)^\circ$ ۽ $\angle N = (4x + 4)^\circ$ تہ $\angle R$ ۽ $\angle N$ جون ماپون

لھو.

• T



شکل 3.58


4. شکل 3.58 ۾ O مرکز آهي ٽڪر RS گول

جو قطر آهي ٽڪو T گول کان ٻاهر آهي

ثابت ڪريو $\angle RTS$ سوڙهي ڪنڊ آهي.


5. هر هڪ مستطيل چڪرڪ چوڪنڊو هوندو آهي. اهو ثابت ڪريو.

6. شڪل 3.59 ۾ ٽڪر YZ ۽ ٽڪر XT اهي عمود $\triangle WXY$ اندر ٽپڪي P وٽ ڪپين ٿا. ته ثابت ڪريو
- (1) $\square WZPT$ هڪ چڪرڪ چوڪنڊو آهي.
- (2) ٽپڪا Y, T, Z, X اهي ساڳئي گول تي آهن.




شڪل 3.59

7. شڪل 3.60 ۾ $m(\text{arc } NS) = 125^\circ$ ۽ $\angle NMS$ جي ماپ لھو. $m(\text{arc } EF) = 37^\circ$



شڪل 3.60

8. شڪل 3.61 ۾ زھ AC ۽ زھ DE اهي ٽپڪي B وٽ ڪپين ٿا. جيڪڏهن $\angle ABE = 108^\circ$ ته $m(\text{arc } DC) = 95^\circ$ لھو.




شڪل 3.61

ڄاڻي وٺون




هڪ وڏو گول ڪڍو شڪل 3.62 انوسار هڪ ٽڪر AC هڪ زھ ڪڍو گول تي B ٽپڪو کڻو $\angle ABC$ اها اڀريل ڪنڊو ڪڍو $\angle ABC$ جي ماپ ماپي درج ڪريو هاڻي شڪل 3.63 موجب ٽپڪي C وٽ ليڪ CD ڇڻهي ڪڍو ACD جي ماپ لھو.

مشغولي :




شڪل 3.62



شڪل 3.63

ACD جي ماپ، اها $\angle ABC$ جي ماپ برابر آهي انگريزي $m\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{arc AC})$ اها ڄاڻ آهي ان مان $\angle ACD$ جي ماپ جي آڌ آهي پڻ ڪمان AC جي ماپ گول جي ڇهڙي جي هڪ اهميت واري خاصيت آهي. اهو اسان ثابت ڪنداسين.

ڇهڙي - قاطع ڪند سڌيان (Theorem of angle between tangent and secant)



شڪل 3.64

ڏنل: $\angle ABC$ جو نوڪي ٽپڪو M مرڪز واري گول مٿان آهي. ان جو پاسو BC گول کي ڇهڙي ٿو. پاسو BA گول کي ٽپڪي A وٽ ڪپي ٿو. $\angle ABC$ جو آئترچيدل ڪمان $\angle ADB$ آهي.

$$\text{ثابت ڪرڻ: } m\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{arc ADB})$$

ثابتي: ان سڌيان لاءِ ٽي ثابتيون ممڪن آهن.

(1) شڪل 3.64 ۾ گول جو مرڪز M $\angle ABC$ مٿان آهي.

$$(I) \dots \angle ABC = \angle MBC = 90^\circ \dots (\text{ڇهڙي سڌيان}) \dots$$

ڪمان ADB اهو آڌ گول آهي.

$$\therefore m(\text{arc ADB}) = 180^\circ$$


(I) ۽ (II) مان

$$\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{arc ADB})$$

(2) 3.64 موجب مرڪز M $\angle ABC$ جي ٻاهر آهي نيم قطر MA ۽ نيم قطر MB ڪڍو.

$$\dots \angle MBA = \angle MAB \dots (\text{ٻي پاسو ٽڪندو سڌيان})$$

$$\dots \angle MBC = 90^\circ \dots (\text{ڇهڙي سڌيان}) \dots (I)$$




شڪل 3.64(i)



چھڙي - قاطع ڪنڊن جي سڌيان جو اُبتنڙ

گول جي زهه جي ڇيڙي وٽان نڪتل ليڪ آهڙي نموني آهي جو انهن وچ ۾ ٺهيل ڪنڊ اُتار ڇيڊيل ڪمان ماپ جي آڌر آهي ته اها ليڪ گول جي چھڙي آهي.

شڪل 3.66 ۾



شڪل 3.66

جيڪڏهن $\angle PQR = \frac{1}{2} m(\text{arc PSQ})$ ته اها چھڙي آهي.

$$[\angle PQT = \frac{1}{2} m(\text{arc PUQ})] \text{ يا}$$

۽ ليڪ TR اها چھڙي آهي.

ليڪ TR اها گول جي چھڙي آهي ان اُبتنڙ سڌيان جو پريوڱ گول جي چھڙي جوڙجڪ ۾ ٿيندو آهي. ان سڌيان کي اڻ سڌي نموني به ثابت ڪري سگهجي ٿو.


زهن جي اندرين ورڇ سڌيان (Theorem of internal division of chords)

هڪ گول ۾ جيڪڏهن ٻه زهه گول اندر ڪنهن ٽپڪي وٽ ڪپين ٿا ته هڪ زهه جي ٻن حصن جي ڊيگهه جي ضرب اُپت، ٻئي زهه جي ٻن حصن جي ڊيگهه جي ضرب اُپت برابر آهي.

ڏنل: گول جو مرڪز P آهي.

زهه AB ۽ زهه CD اهي گول اندر

ٽپڪي E وٽ ملن ٿا.



شڪل 3.67

$$\angle AEC \cong \angle DEB$$

(مخالفي ڪنڊون)

$$\angle CAE \cong \angle BDE$$

ساڳئي ڪمان جون ڪنڊون

$$\therefore \triangle CAE \sim \triangle BDE$$

ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش

$$\therefore \frac{AE}{DE} = \frac{CE}{BE}$$

.....

$$\therefore AE \times EB = CE \times ED$$

ثابت ڪرڻ: $AE \times EB = CE \times ED$

رچنا: ٽڪر AC ٽڪر DB ڪڍو.

ثابتي: $\triangle BDE \sim \triangle CAE$ ۾

ويچار ڪريون




شڪل 3.67 ۾ اسان ٽڪر AD ۽ ٽڪر BC ڪڍي اهو سڌيان ثابت ڪري سگهون ٿا ڇا.

شڪل 3.67 ۾ زهه AB جا ٽپڪي E ڪري ٻه حصا AE ۽ EB ٿيا آهن. ٽڪر AE ۽ ٽڪر EB اهڙا لاڳيتا پاسا ڪٽي مستطيل ٺاهيو ته $AExEB = CExED$ اهو ان مستطيل جي ايراضي ٿيندي. ساڳئي نموني $CExED$ اهو زهه CD جي ٻن حصن مان ٺهيل مستطيل جي ايراضي ٿيندي آسان ثابت ڪيو. $AExEB = CExED$ مطلب ته اهو سڌيان آڻڻ نموني به بيان ڪري سگهجي ٿو. هڪ گول ۾ جيڪڏهن ٻه زهه، گول جي اندر ڪنهن ٽپڪي وٽ ڪپين ٿا ته هڪ زهه جي ٻن حصن سبب ٺهيل مستطيل جي ايراضي اها ٻئي زهه جي ٻن حصن ٺهيل مستطيل جي ايراضي برابر هوندي آهي.

زهن جي ٻاهرين ورڇ جو سڌيان (Theorem of external division of chords)

هڪ گول ۾ زهه AB ۽ زهه CD کي سمائيندڙ ليڪون گول جي ٻاهران ٽپڪي E وٽ ڪپين ٿيون ته

$$AE \times EB = CE \times ED.$$


شڪل 3.68

ثابتي: $\triangle ADE \sim \triangle CBE$ ۾

$\angle AED \cong$ (عام ڪنڊ)


$\angle DAE \cong \angle BCE$ ()

$\therefore \triangle ADE \sim$ ()

$$\therefore \frac{(AE)}{\text{}} = \frac{\text{}}{\text{}} \dots\dots\dots$$

$$\therefore \text{} = CE \times ED$$

مثال (1) شڪل 3.73 ۾ ٽڪر PS اهو ڇهڻي ٽڪر آهي. ليڪ PR اها قاطع آهي
 $PQ = 3.6$
 $QR = 6.4$ ته PS لھو.



شڪل 3.73

حل : $PS^2 = PQ \times PR$ (ڇهڻي قاطع سڏيان)
 $= PQ \times (PQ + QR)$
 $= 3.6 \times [3.6 + 6.4]$
 $= 3.6 \times 10$
 $= 36$
 $\therefore PS = 6$

شڪل 3.74 ۾ ٻه MN ۽ RS آھن
 گول اندر ٽپڪي P وٽ ملن ٿا.

$$PR = 6, PS = 4, MN = 11$$

ته PN لھو.

حل : ذهن جي آندرين ورڇ سڏيان موجب

$$PN \times PM = PR \times PS \dots (I)$$

$$PN = x \therefore PM = 11 - x$$

$$x(11 - x) = 6 \times 4$$

$$\therefore 11x - x^2 - 24 = 0$$

$$\therefore x^2 - 11x + 24 = 0$$


$$\therefore (x - 3)(x - 8) = 0$$

$$\therefore x - 3 = 0 \text{ يا } x - 8 = 0$$


$$\therefore x = 3 \text{ يا } x = 8$$

$$\therefore PN = 3 \text{ يا } PN = 8$$

مثال (2)



شڪل 3.74



شکل 3.75

مثال (3) شکل 3.75 ۾ ٻہ گول هڪ ٻئي کي ٽپڪن X ۽ Y تي ڪپين ٿا. ليڪ XY تي ٽپڪو M آهي M وٽان گولن ڏانهن P ۽ Q وٽ ڇهڻيون نڪتل آهن.

ثابت ڪريو $\triangle PMQ \cong \triangle QMP$.

ثابتي : خالي جڳههون ڀري ثابتي لکو.

ليڪ MX اها ٻنهي گولن جو عام آهي.

$$PM^2 = MY \times MX \dots (I)$$

ساڳئي نموني = × , ڇهڻي - قاطع ٽڪرن سڏيان (II)

$$QM^2 = \dots (II) \text{ ۽ } (I) \therefore$$

$$PM = QM \therefore$$

$$\triangle RSQ \cong \triangle RPT$$

مثال (4)

مثال (4) شکل 3.76 ۾ ٽڪر PQ اهو

‘O’ مرڪز واري گول جو قطر آهي.


گول تي ٽپڪو R ڏنل آهي.

ٽڪر $RS \perp PQ$

ته ثابت ڪريو.

SR اهو PS ۽ SQ جو ريڪا گڻت مڌيه آهي.

$$[SR^2 = PS \times SQ]$$



شکل 3.76

حل : هيٺ ڏنل ڏاڪا سمجھي ثابتي لکو

(1) ڪرڻو RS ڪڍو اهو گول کي T وٽ ڪپي ٿو.

(2) RS=RT ثابت ڪريو.

(3) ذهن جي آندرين ورڇ سڏيان واپرائو.

(4) RS=RT استعمال ڪري ثابتي لکو.


ويچار ڪريو



(1) مٿي ڏنل شکل 3.76 ۾ ٽڪر PR ۽ ٽڪر RQ ڪڍڻ سان $\triangle PRQ$ ڪهڙي قسم جو ٿڪندو آهي؟

(2) مٿي ڏنل مثال 4 ۾ ثابت ڪيل خاصيت ان کان اڳهه ٻئي نموني ثابت ڪئي ويئي آهي ڇا؟

شڪل 3.77



1. شڪل 3.77 ۾ ٽپڪو Q چيڙ ٽپڪو آهي.
 $PQ = 12$, $PR = 8$
 $RS =$ لھو ؟

شڪل 3.78 ۾ رڙھ MN ۽ رڙھ RS

اِهي D وٽ ملن ٿا


(1) جيڪڏھن $RD = 15$, $DS = 4$

تہ $MD = 8$ ۽ $DN =$ لھو ؟

(2) جيڪڏھن $MD = 9$, $RS = 18$

تہ $DN = DS =$ لھو ؟

شڪل 3.78




3. شڪل 3.79 ۾ ٽپڪو B چيڙ ٽپڪو آهي.
 گول جو O مرڪز آهي.
 $OE \perp AD$ ٽڪر

$$AB = 12,$$

$AC = 8$ تہ (1) AD (2) DC

(3) DE لھو .

شڪل 3.79




شڪل 3.80 ۾ جيڪڏھن $PQ = 6$


$$QR = 10, PS = 8$$

تہ $TS =$ لھو ؟

شڪل 3.80



شڪل 3.81




5. شڪل 3.81 ۾ ٽڪر EF قطر آهي. ٽڪر
 DF اِهو ڇھڻي ٽڪر آهي. ٽڪر r
 آهي تہ ثابت ڪريو
 $DE \times GE = 4r^2$

1. هر هڪ اُپ سوال جا چار متبادل جواب ڏنل آهن. مناسب جواب چونڊيو.
 - (1) 5.5 س م ۽ 3.3 س م نيم قطر وارا گول هڪ ٻئي کي ڇهن ٿا انهن جي مرڪزن وچ ۾ مفاصلو ڪيترا س م آهي؟
 (A) 2.2 يا 8.8 (B) 8.8 (C) 2.2 (D) 4.4
 - (2) ٻه گول هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ آهن هڪ گول هر هڪ گول ٻئي گول جي مرڪز مان لنگهي ٿو. جي انهن جي مرڪزن وچ ۾ مفاصلو 12 س م آهي ته هر هڪ گول جو نيم قطر ڪيترا س م ٿيندو؟
 (A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) نه ٿو سگهجي
 - (3) هڪ گول پورو چوٽ پاسي چوڪنڊي جي سڀني پاسن کي ڇهي ٿو ته اهو چوڪنڊو هئڻ گهرجي.
 پور پاسو چوڪنڊو (D) چورس (C) پورو چوٽ پاسو (B) مستطيل (A)
 - (4) هڪ گول جي مرڪز کان 12.5 س م مفاصلي تي هڪ ٽپڪي کان اُن گول ڏانهن ڇهڻي 12 س م آهي ته گول جو قطر ڪيترا س م آهي؟
 (A) 14 (B) 7 (C) 24 (D) 25
 - (5) ٻاهريان ڇهندڙ ٻن گولن ۾ وڌ ۾ وڌ عام ڇهڻيون گهڻيون ٿي سگهن ٿيون؟
 هڪ (A) ٻه (B) ٽي (C) چار (D)
 - (6) مرڪز O واري گول ۾ $\angle ACB$ ڪمان ۾ $\angle ACB$ اڀريل آهي $m\angle ACB = 65^\circ$ ته $m(\text{arc } ACB) =$ لھو.؟
 (A) 65° (B) 130° (C) 295° (D) 230°
 - (7) هڪ گول ۾ رڙهه AB ۽ CD اندر ۽ وٽ ملن ٿا.
 (ED) ته 8 = (CE) = 10, (EB) = 5.6, (AE) = لھو.؟
 (A) 7 (B) 8 (C) 11.2 (D) 9
 - (8) $\square ABCD$ چڪرڪ چوڪنڊو آهي $\angle A$ جي ماپ جي ٻيئي $\angle C$ جي ماپ جي ٽيئي آهي ته $\angle C$ جي ماپ ڪيتري؟
 (A) 36 (B) 72 (C) 90 (D) 108
 - (9)* هڪ گول مٿان ٽپڪا A, B, C ته $(\text{arc } AB) = m(\text{arc } BC) = 120^\circ$ انهن ٻنهي ڪمانن ۾ عام ٽپڪو ڪوبه نه آهي $\triangle ABC$ جو ڪهڙو قسمر آهي؟
 (A) اُڀور پاسو (B) ٽپور پاسو
 (C) ٻه پور پاسو (D) گوني ڪنڊ

(10) ٽڪر XZ گول جو قطر آهي گول اندر Y ٽپڪو آهي ته هيٺين بيانن مان ڪهڙو صحيح آهي؟

- (i) $\angle XYZ$ سوڙهي ڪنڊ نه آهي
(ii) $\angle XYZ$ گوني ڪنڊ ٿي نٿي سگهي
(iii) $\angle XYZ$ ويڪري ڪنڊ آهي.
(iv) $\angle XYZ$ لاءِ ڪجهه چئي نه ٿو سگهجي.

(A) فقط ٽي (B) فقط ٻه (C) فقط هڪ (D) سڀ



شڪل 3.82

2. گول جو مرڪز O آهي l ليڪ

ٽپڪي P وٽ ڇهڻي آهي. نيٺ

قطر 9 س م آهي ته

$$(1) \quad d(O, P) = ?$$

$$(2) \quad d(O, Q) = 8 \text{ س م ته } Q \text{ ٽپڪو ڪٿي}$$

آهي؟

$$(3) \quad d(O, R) = 15 \text{ ته } R \text{ ٽپڪا ليڪ } l$$

تي ڪيترا آهن؟ انهن جو P کان ڪيترو مفاصلو؟


3. ڀر واري شڪل ۾ مرڪز M ۽ ٽڪر KL

ڇهڻي ٽڪر آهي.

$$\text{ته } MK = 12, KL = 6\sqrt{3}$$

(1) گول جو نيٺ قطر لھو.

(2) $\angle M$ ۽ $\angle K$ جون ماپون لھو.




شڪل 3.83

4. شڪل 3.84 ۾ مرڪز O آهي ٽڪر AB ۽ ٽڪر

AC ۾ ڇهڻي ٽڪر آهن گول جو نيٺ قطر

r آهي ۽ $(AB) = l$ ثابت ڪريو. $\square ABOC$


هڪ چورس آهي.




شڪل 3.84



5. شڪل 3.85 ۾ $\square ABCD$ هڪ پورو چوٽ پاسو چوڪنڊو T مرڪز واري گول جي گرد آهي (مطلب پاسا گول کي ڇهندڙ آهن) $H \in G, F, E$ اهي ڇيڙا-ٽپڪا آهن. $AE=4.5$ ۽ $EB=5.5$ ته AD لھو



شڪل 3.85



شڪل 3.86


نيمر قطر

7. پرواري شڪل ۾ X ۽ Y مرڪزن وارا گول ٽپڪي Z وٽ ڇهن ٿا. Z مان لنگهندڙ قاطع انهن کي نمبروار A ۽ B وٽ ڪپي ٿي ته ثابت ڪريو. نيمر قطر XA $\parallel$ نيمر قطر YB. ثابتي لاءِ هيٺيان خال ڀريو

6. شڪل 3.86 ۾ N مرڪز وارو گول M مرڪز واري گول کي T وٽ ڇهي ٿو. وڏي گول جو نيمر قطر ننڍي گول کي S وٽ ڇهي ٿو. جيڪڏهن وڏي گول ۽ ننڍي گول جا نيمر قطر نمبروار 9 س م ۽ 2.5 س م ته MS:SR ريشو لھو.

(1) $MT =$ لھو ؟ (2) $MN =$ لھو ؟

(3) $m\angle NSM =$ ڪيتري ؟



شڪل 3.87

جوڙجڪ ٽڪر XZ ۽ ٽڪر ڪڍو.

$\therefore \angle XZA \cong \dots\dots\dots$ مخالف ڪنڊون

(I) $\angle XZA = \angle BZY = a$

ٽڪر XA $\cong$ هاڻي XZ (.....)

(II) $\therefore \angle XAZ = \dots\dots\dots = a$ ٻي پاسو سڌيان


ٽڪر YB $\cong$ (.....)

(III) $\therefore \angle BZY = \dots\dots\dots = a$

∴ (I), (II) ۽ (III) مان ۽

$$m\angle XAZ = \dots\dots\dots$$


∴ XA قطر $\parallel$ YB قطر YB (.....)




شکل 3.88

8. شکل 3.88 ۾ X ۽ Y مرکز وارا گول هڪ ٻئي کي
اندريان ٽپڪي Z وٽ چهن ٿا. ٽڪر BZ وڏي گول جو
زهر ننڍي گول کي A وٽ ڪپي ٿو. ثابت ڪريو ٽڪر
 $AX \parallel BY$ ٽڪر

9. پرواري شکل ۾ ليڪ l اها O مرکز واري
گول کي P وٽ چهي ٿي. ٽپڪو Q اهو نيم
قطر OP جو مڌيه - ٽپڪو آهي. ٽپڪو Q کي
سمائيندڙ زهر $RS \parallel$ ليڪ l جيڪڏهن $RS =$
12 س م ته گول جو نيم قطر لھو؟



شکل 3.89




شکل 3.90

10*. شکل 3.90 ۾ گول جو مرکز C آهي.
ٽڪر AB قطر آهي ڇهڻي PQ اها گول
کي T وٽ چهي ٿي ليڪ $PQ \perp$ ٽڪر AP ۽
ليڪ $PQ \perp$ ٽڪر BQ ته ثابت ڪريو
ٽڪر $CP \cong CQ$

11*. هر هڪ 3 س م نيم قطر وارا A, B, C مرکز سان ٿي گول آهڙي نموني ڪڍو جيئن هر هڪ
گول ٻين ٻن گولن کي چهي.

12*. گول جا ڪهڙا به ٿي ٽپڪا هم - ليڪ ٽپڪا نه هوندا آهن. اهو ثابت ڪريو.

13. شڪل 3.11 ۾ ليڪ PR گول کي Q وٽ ڇهڻ تي. ان شڪل جي آڌار تي سوالن جا جواب لکڻ




شڪل 3.91

- (1) $\angle TAQ$ ۽ $\angle TSQ$ ماپن جو جوڙو ڪيترو؟
- (2) $\angle AQP$ سان ٺهڪندڙ ڪنڊ ڪهڙي؟
- (3) $\angle QTS$ سان ٺهڪندڙ ڪنڊ ڪهڙي؟

(4) جيڪڏهن $\angle TAS = 65^\circ$ ته $\angle TQS$ ۽ $m(\text{arc TS})$ ٻڌايو.

(5) جيڪڏهن $\angle AQP = 42^\circ$ ۽ $\angle SQR = 58^\circ$ ته $\angle ATS$ لھو.



شڪل 3.92

14. ڀرواري شڪل ۾ گول جو مرڪز O آھي.

ٽڪر PQ ۽ ٽڪر RS اھي ٺھڪندڙ زھم آھن

$\angle POR = 70^\circ$ ۽ ؟

ته $m(\text{arc RS}) = 80^\circ$

(1) $m(\text{arc PR})$ ڪيترو؟

(2) $m(\text{arc QS})$ ڪيترو؟

(3) $m(\text{arc QSR})$ ڪيترو؟

15. شڪل 3.93 ۾، $m(\text{arc WY}) = 44^\circ$

ته $m(\text{arc ZX}) = 68^\circ$


(1) $\angle ZTX$ ۽ ڪمان جي ماپ لھو

(2) $WT = 4.8$, $TX = 8.0$

$TZ = 6.4$ ڪيترو؟


(3) $WX = 25$, $YT = 8$

$WT = 26$ ڪيترو؟



شڪل 3.93


16. شڪل 3.94 ۾



شڪل 3.94

- (1) $m(\text{arc CE}) = 54^\circ$,
 $m(\text{arc BD}) = 23^\circ$, ته $\angle \text{CAE}$ = ڪيتري؟
 (2) $AB = 4.2$, $BC = 5.4$,
 $AE = 12.0$ ته AD = ڪيترو؟
 (2) $AB = 3.6$, $AC = 9.0$,
 $AD = 5.4$ ته AE = ڪيترو؟

17. ڀرواري شڪل ۾ زهه GH || زهه EF ته ثابت ڪريو زهه FH || زهه EG




شڪل 3.95

- $\angle \text{EFG} = \angle \text{FGH}$ (I)
 $\angle \text{EFG} = \dots\dots\dots$ (اردیل کنڊ سڌيان) (II)
 $\angle \text{FGH} = \dots\dots\dots$ (اردیل کنڊ سڌيان) (III)
 $\therefore m(\text{arc EG}) = \dots\dots\dots [(I), (II), (III) \text{ مان }]$
 زهه $EG \cong$ زهه FH (.....)

18. ڀرواري شڪل ۾ ٽپڪو P اهو ڇيڙو ٽپڪو آهي


- (1) $m(\text{arc PR}) = 140$
 ته $\angle \text{POR} = 36^\circ$
 $m(\text{arc PQ})$ = ڪيترو؟
 (2) $OQ = 3.2$, $OP = 7.2$
 $OR =$ ڪيترو؟ $QR =$ ڪيترو؟
 (3) $OR = 16.2$, $OP = 7.2$
 $QR =$ ڪيترو؟




شڪل 3.96

19. ڀرواري شڪل ۾ C مرڪز وارو ڳول D مرڪز

- واري ڳول کي اندريان E وٽ ڇهي ٿو.
 ٽپڪو D اندرين ڳول مٿان آهي. ٻاهرين
 ڳول جو زهه EB اهو اندرين ڳول کي ٽپڪي
 A وٽ ڪپي ٿو ته ثابت ڪريو
 $EA \cong AB$ ٽڪر




شڪل 3.97



شکل 3.98

20. شکل 3.98 ۾ ٽڪر AB اِهو O مرڪز واري
گول جو قطر آهي. اِرديل ACB جو اَڌڪ
گول تي ٽپڪي D وٽ ڪپي ٿو ته ثابت
ڪريو: ٽڪر $BD \cong AD$
ثابتي خال ڀري پوري ڪريو
ثابتي ٽڪر OD ڪڍو

(اَڌ ۾ اِرديل ڪنڊ) = $\angle ACB$
(ٽڪر CD اَڌڪ آهي) = $\angle DCB$
(اِرديل ڪنڊ سڏيان) = $m(\text{arc } DB)$
(I) (ڪمان-ماپ وصف) = $\angle DOB$
ٽڪر $OB \cong OA$ (II)
∴ ليڪ OD اِها ٽڪر AB جي ليڪ آهي. (I) ۽ (II) مان
∴ ليڪ $AD \cong BD$ ليڪ




شکل 3.99

21. ڀرواري شکل 3.99 ۾ O مرڪز واري گول جو
زهره MN آهي. زهره MN مٿان L ٽپڪو آهي.
 $MN = 25$, زهره MN ٽپڪو آهي L
 $d(O, L) = 5$ ۽ $ML = 9$
ته گول جو نيم قطر ڪيترو؟

22* . شکل 3.100 ۾ ٻه گول هڪ ٻئي کي S ۽
R وٽ هڪ ٻئي کي ڪپين ٿا. اُنهن
۾ ليڪ PQ اِها عام ڇهڻي آهي ته
ثابت ڪريو.

$$\angle PRQ + \angle PSQ = 180^\circ$$



شکل 3.100


23*. شکل 3.101 ۾ ٻه گول هڪ ٻئي کي N ۽ M

وت ڪپين ٿا. ٽپڪي M ۽ ٽپڪي N مان

نڪتل قاطع ٽپڪن R ۽ S ۽ P ۽ Q تي

ڪپي ٿي ثابت ڪريو $PR \parallel QS$

چڪرڪ چوڪندو آهي.




شکل 3.101

24* ٻه گول هڪ ٻئي کي A ۽ E وت ڪپين ٿا

ٽپڪي C وٽان نڪتل ڇهڻيون B ۽ D وت

چهن ٿيون ثابت ڪريو $\square ABCD$ چڪرڪ

چوڪندو آهي.



شکل 3.102

25*. $\triangle ABC$ ۾ پاسو $BC \perp AD$ ٽڪر


پاسو $AC \perp BE$ ٽڪر

پاسو $AB \perp CF$ ٽڪر

ٽپڪو O اهو آرٿو مرڪز آهي ثابت ڪريو

ٽپڪو O اهو ٽڪنڊي $\triangle DEF$ جي اندرين

حصي ۾ آهي.



شکل 3.103

ICT Tools or Links



جيئو جبرا مدد سان جدا جدا گول ڪڍو. انهن ۾ رزه

۽ ڇهڻيون ڪڍي خاصيتون چڪاس ڪريو.



RIQ2J4

اچو ته سڳي وٺون.



- هڪ جهڙن ٽڪنڊن جو جوڙجڪ
- * ٻن هڪ جهڙن ٽڪنڊن مان هڪ ٽڪنڊي جا پاسا ۽ ٻنهي ٽڪنڊن جي نسبتِي پاسن جو ريشو مليا ته ٻيو ٽڪنڊو ڪڍڻ.
- (i) هڪ به نوڪي ٽپڪو عام نه هئڻ
- (ii) هڪ نوڪي ٽپڪو ۽ هڪ ڪنڊ عام هئڻ
- گول جي ڇهڙي ڪڍڻ
- * گول تي مليل ٽپڪي تي ڇهڙي ڪڍڻ
- (i) گول جو مرڪز استعمال ڪري
- (ii) گول جو مرڪز استعمال نه ڪري
- * گول جي ٻاهران مليل ٽپڪي مان گول ڏانهن ڇهڙي ڪڍڻ.

ذرا ياد ڪريو .



هيٺ ڏنل جوڙجڪ آسان اُڀه وارن درجن ۾ سڳيا آهيون انهن جوڙجڪن جو دؤر ڪريو

- ڏنل ليڪ جي ٻاهر ٽپڪي مان، اُن ليڪ جي پورو چوٽ ليڪ ڪڍڻ.
- ڏنل ليڪ - ٽڪر جو عمودي اڌ ڪڍڻ
- ٽڪنڊي جا پاسا ملڻ سان ٽڪنڊو ڪڍڻ
- ڏنل ليڪ - ٽڪر جو ڏنل عدد موجب حصا ڪرڻ
- ڏنل ليڪ ٽڪر کي مليل ريشي ۾ ورهائڻ.
- ڏنل ڪنڊ جي ٺهڪندڙ ڪنڊ ڪڍڻ

درجي نائين ۾ توهان اسڪول جي پسگردائيءَ جو نقشو تيار ڪرڻ جو عملي ڪم ڪيو آهي ڪنهن عمارت ٺاهڻ کان اڳ، اُن جو ڪچو نقشو تيار ڪيو آهي، اسڪول جي پسگردائي ۽ اُن جو نقشو، عمارت ۽ اُنجو ڪچو نقشو اهي هڪ ٻئي ۾ هڪ جهڙائي خاصيت ڏيکارين ٿا. جاگرافي، واسنو شاستر، انجنيئرنگ وغيره ۾ شڪليون ڪيڏيون پونديون آهن. ٽڪنڊو هڪ سادي - بند شڪل جو مثال آهي ڏنل ٽڪنڊي جو هڪ جهڙو ٽڪنڊو ڪيئن ڪڍو اچو ته سڳو.




هڪ جهڙا ٿڪندا : جوڙجڪ

هڪ ٿڪندي جا پاسا مليل آهن ان مان هڪ جهڙو ۽ ريشو شرط پوري ڪندي ٿڪندو ڪڍڻ :

ٻن هڪ جهڙن ٿڪندڙن جا نسبتي پاسا پروپورشن ۾ هوندا آهن ۽ نسبتي ڪندڙن ٺهڪندڙ هونديون آهن ان جو استعمال ڪري هڪ جهڙا ٿڪندا ڪڍبا آهن.

مثال (1) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ۽ $AB = 5.4$ س م، $BC = 4.2$ س م، $AC = 6.0$ س م. $AB: PQ = 3:2$ ته ΔABC ۽ ΔPQR ڪڍو



شڪل 4.1
ڪڇي شڪل



پهريائين ΔABC ماپن موجب ڪڍو.
 ΔABC ۽ ΔPQR هڪ جهڙا آهن
∴ نسبتي پاسا پروپورشن ۾ آهن.

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots (I)$$

AB, BC, AC جون ماپون مليل آهن ان ڪري PQ, QR, PR جو ماپون لهي سگهجن ٿيون.

$$\frac{5.4}{PQ} = \frac{4.2}{QR} = \frac{6.0}{PR} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore PQ = 3.6 \text{ س م}, QR = 2.8 \text{ س م}, PR = 4.0 \text{ س م}$$




$\triangle PQR$ جا سڀني پاسن جي ڊيگهه ملڻ سان اهو ٽڪنڊو ڪڍبو.

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ

ڪيترائي دفعا ڏنل ٽڪنڊي جو هڪ جهڙو ٽڪنڊو ڪڍڻو هوندو آهي انهن جا پاسا ماپي نه سگهيا آهن. اهڙي وقت ڏنل ليڪ - ٽڪر جا عدد موجب حصن ۾ ورهائي ٽڪنڊي جا پاسا ڪڍبا مثال پاسي AB جي ڊيگهه $\frac{11.6}{3}$ س م ته 11.6 س م ٽڪر جا 3 برابر حصا ڪري AB پاسو ڪڍبو.

$\triangle PQR$ جا سڀ پاسا ملڻ سان، انجو جوڙجڪ ڪڍيو. مٿي ڏنل مثال ۾ ٻنهي ٽڪنڊن ۾ ڪوبه نوڪي ٽپڪو عام نه هو. هڪ نوڪي ٽپڪو عام هجي، ته ٽڪنڊا ڪڍڻ وڌيڪ سولاً ٿيندا.



شڪل 4.3
ڪچي شڪل

مثال (2) $\triangle ABC$ ڪوبه ٽڪنڊو ڪڍو $\triangle ABC$ جو هڪ جهڙو ٽڪنڊو $A'B'C'$ ڪڍو جئن
 $AB : A'B = 5:3$

چيد : A, A', B, C, C' اهي هر ليڪ ٽپڪا ڪڙو.

$$\triangle ABC \sim \triangle A'BC' \therefore \angle ABC = \angle A'BC'$$

$$\frac{AB}{A'B} = \frac{BC}{BC'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{5}{3}$$

$\triangle ABC$ جا پاسا $\triangle A'B'C'$ جي پيٽ ۾ وڌا هوندا

$\therefore$ ٽڪر BC جا 5 برابر حصا ڪبا انهن مان 3 حصا ٽڪر BC' جا هوندا $\triangle ABC$ ۾ ٽڪر BC جي

B ٽپڪي کان 3 حصا ڪڍي انکي C نالو ڏبو. ٽپڪي C مان ٽڪر AC جي پوروچوٽ ليڪ BA کي A وٽ ڪپيندي.

$$\frac{BA}{BA'} = \frac{BC}{BC'} = \frac{5}{3}, \text{ مطلب } \frac{BA'}{BA} = \frac{BC'}{BC} = \frac{3}{5}$$

جوڙجڪ جا ڏاڪا

(1) $\triangle ABC$ ڪڍو

(2) BC ٽڪر جا پنڃ حصا ڪريو

(3) B کان 3 حصا ڪٽي اُن ٽپڪي کي C نالو ڏيو.


$$\therefore BC' = \frac{3}{5} BC$$

(4) مطلب هاڻي C' ٽپڪي مان CA جي


پوروچوٽ ليڪ ڪڍو اها AB کي جتي ڪپي

اُتي A' نالو ڏيو.

(5) $\triangle ABC$ جو هڪ جهڙو ٽڪندو $\triangle A'B'C$ ملندو.



شڪل 4.4



شڪل 4.5

ٽپ : BC جا پنڃ حصا ڪرڻ لاءِ جنهن

پاسي A آهي، اُن جي مخالف پاسي B

وٽان هڪ ڪرڻو ڪڍي، اُنجا حصا ڪرڻ


سهوليت ڀريو آهي. اُن ڪرڻي تي

$$BT_1 = T_1T_2 = T_2T_3 = T_3T_4 = T_4T_5$$

حصا ڪٽو T_5C جوڙيو T_1, T_2, T_3, T_4, T_5

مان T_5C جي پوروچوٽ ليڪ ڪڍو.

ويچار ڪريو



شڪل 4.6

هڪ جهڙا ٽڪندا ڪڍڻ وقت ڪچي شڪل

موجب $\triangle A'B'C$ ڪڍي سگهجي ٿو. اِن لاءِ

$\triangle A'B'C$ ڪڍڻ وقت جوڙجڪ جي ڏاڪن

پر ڪهڙي تبديل ڪرڻي پوندي.

مثال (3) $\triangle ABC$ جو هڪ جهڙو ٿڪندو $\triangle A'B'C'$ ڪڍو جئن $AB : A'B = 5:7$


چيد : B, C, C', B, A, A' هر ليڪ ٽپڪا آهن.

$$AB : A'B = 5:7 \text{ ۽ } \triangle ABC \sim \triangle A'BC'$$

$\therefore \triangle ABC$ جا پاسا $\triangle A'B'C'$ جي ڀيٽ ۾ ننڍا آهن.
ان جو ويچار ڪندي ڪڇي شڪل ڪڍي.

$$\angle ABC \cong \angle A'BC'$$

$$\frac{BC}{BC'} = \frac{5}{7}$$



شڪل 4.7
ڪڇي شڪل

$\therefore$ ٽڪر BC جا 5 برابر حصا ڪرڻ سان انهن ۾ هڪ حصي جي سٽوڻ BC' ٽڪر ٿيندو.
 $\therefore \triangle ABC$ ڪڍي ٽڪر BC جا 5 برابر حصا ڪري، B کان ست حصا ڏيگهه ڪڍي BC تي C' ملندو. پروپورشن جي بنيادي سڌيان موجب C' وٽان AC جي پروپورشن ليڪ ڪرڻي BA کي A' وٽ ڪپيندي. $\triangle A'B'C'$ اهو گهربل ٿڪندو آهي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا


(1) $\triangle ABC$ ڪڍو

(2) BC جا 5 برابر حصا ڪريو ڪرڻي BC تي C' ڪٽو جئن BC' جي ڏيگهه BC جي هڪ

حصي ۾ سٽوڻ ٿئي.

(3) C' مان AC جي پروپورشن ليڪ ڪڍو جيڪا ڪرڻي BA کي A' وٽ ڪپي.

(4) $\triangle A'B'C'$ هاڻي $\triangle ABC$ جو هڪ جهڙو ٿڪندو ملندو.



شڪل 4.8



آپياس 4.1

1. $\triangle ABC$ ۾ $AB = 5.5$ س.م.، $BC = 6$ س.م.، $CA = 4.5$ س.م. $\triangle ABC \sim \triangle LMN$ ۾ $\frac{BC}{MN} = \frac{5}{4}$ ته $\triangle LMN$ ۾ ڪڍو
2. $\triangle PQR$ ۾ $PQ = 4.2$ س.م.، $QR = 5.4$ س.م.، $PR = 4.8$ س.م. $\triangle PQR \sim \triangle LTR$ ۾ $\frac{PQ}{LT} = \frac{3}{4}$ ته $\triangle LTR$ ۾ ڪڍو
3. $\triangle RST$ ۾ $RS = 4.5$ س.م.، $\angle RST = 40^\circ$ ، $ST = 5.8$ س.م. $\triangle RST \sim \triangle XYZ$ ۾ $\frac{RS}{XY} = \frac{3}{5}$ ته $\triangle XYZ$ ۾ ڪڍو.
4. $\triangle AMT$ ۾ $AM = 6.3$ س.م.، $\angle TAM = 50^\circ$ ، $AT = 5.6$ س.م. $\triangle AMT \sim \triangle AHE$ ۾ $\frac{AM}{AH} = \frac{7}{5}$ ته $\triangle AHE$ ۾ ڪڍو.


جاڳي وٺون.



گول تي ڏنل ٽپڪي مان گول ڏانهن ڇهڻي ڪڍڻ

(i) گول جو مرڪز استعمال ڪري.
چيڊ :

سمجھو ته 6 مرڪز واري گول تي P ٽپڪي وٽ ليڪ l ڇهڻي ڪڍڻي آهي. آسان ڪي خبر آهي ته نيم قطر جي ٻاهرين ڇيڙ ٽپڪي تي نڪتل عمود اها ڇهڻي آهي. ان خاصيت جو استعمال ڪبو. CP نيم قطر تي ليڪ CP عمود ڪڍبو ته اها ليڪ ڇهڻي ٿيندي



شڪل 4.9

ان ڪري CP ليڪ l جو جوڙجڪ

ڪند اسين جيئن ليڪ $CP \perp l$

جوڙجڪ جا ڏاڪا :

(1) گول جو مرڪز C ڪٺو. گول تي هڪ


ٽپڪو P ڪٺو.

(2) ڪرڻو C ڪڍو

(3) ٽپڪي P وٽ، ڪرڻي CX تي هڪ

عمود ليڪ ڪڍو. اها ليڪ P ٽپڪي


تي گول ڏانهن ڇهڻي آهي.



شڪل 4.10

(ii) گول تي ڏنل ٽپڪي مان گول ڏانهن ڇهڻي ڪڍڻ (بنا گول جي مرڪز استعمال جي)

مثال : ڪهڙي به نيم قطر وارو گول ڪڍو. اُن تي 'C' ٽپڪو کڻو بنا مرڪز استعمال جي، C تي گول ڏانهن عمود ڪڍو.



شڪل 4.11


شڪل موجب ليڪ l اِها C وٽ گول ڏانهن ڇهڻي آهي. ٽڪر CB اِهو قطر ۽ CAB سڌيان موجب $\angle CAB \cong \angle BCD$. انڪري اِن سڌيان جو اُبتڙ موجب جيڪڏهن $\angle CAB \cong \angle BCD$, ته ليڪ l ڇهڻي اِن ڪري ٽڪر CB اِهو زهه ڪڍي، $\angle CAB$ ڪنڊ ڪڍي، $\angle BCD$ ڪنڊ

ڪڍي، BCD ڪنڊ اِهڙي نموني ڪڍبي، جئن $\angle BCD$

$$\angle BCD \cong \angle BAC.$$

ليڪ CD اِها گهربل ڇهڻي نڪرندي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا



شڪل 4.12

(1) هڪ گول ڪڍو. گول تي ٽپڪو C کڻو.

(2) زهه CB ۽ اِرديل ڪنڊ $\angle CAB$ ڪڍو.

(3) ڪمپاس تي سهوليت ۽ وارو نيم قطر کڻي ۽

مرڪز A کڻي $\angle BAC$ جي پاسن تي M ۽ N وٽ

ڪپي ڪمان ڪڍو.

(4) اُهو نيم قطر ۽ C مرڪز کڻي زهه CB تي R وٽ ڪپيندڙ ڪمان ڪڍو.

(5) ڪمپاس وسيلي MN ماپ وارو نيم قطر ۽ مرڪز R کڻي اُڀر واري ڪڍيل ڪمان تي D وٽ

ڪپيندڙ ٻي ڪمان ڪڍو.


ليڪ CD ملايو. اِها ليڪ CD گهربل ڇهڻي آهي.

(مٿي ڏنل شڪل ۾ $\angle MAN \cong \angle BCD$ اِن جا ڪارڻ سوچيو ٽڪر MN ۽ ٽڪر RD

جوڙڻ سان پاسو - پاسو - پاسو آزمائش $\Delta MAN \cong \Delta RCD$. $\therefore \angle MAN \cong \angle BCD$)

چيد :


O گول جو مرڪز آهي P گول جي ٻاهران ٽپڪو آهي P وٽان نڪتل ڇهڻيون A ۽ B وٽ گول تي ڪپين ٿيون. جيڪڏهن گول تي A ۽ B جايون برابر ملن ته PA ۽ PB ڇهڻيون ٿينديون. نيسر، قطر OA ۽ OB ڪڍبا ليڪ PB نيسر قطر OB ليڪ PA نيسر قطر $\triangle OBP$ ۽ $\triangle OAP$ آهي گوني ڪنڊ ٿڪنڊا آهن. OP آهي ٻنهي ٿڪنڊن جو هٿپائينيوڙ آهي.



شڪل 4.13

قطر OP کڻي گول ڪڍبو ته O مرڪز واري گول تي A ۽ B وٽ ڪپيندو آڌ گول اڍريل ڪنڊ گوني ڪنڊ هوندي آهي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا :



شڪل 4.14

- (1) O مرڪز وارو هڪ گول ڪڍو.
- (2) گول جي ٻاهران P هڪ ٽپڪو کڻو.
- (3) ٽڪر OP ڪڍو ۽ اُنجو عمودي آڌڪ ڪڍي 'M' حاصل ڪيو.
- (4) مرڪز M ۽ نيسر قطر OM کڻي گول ڪڍو.
- (5) اِهو گول ڏنل گول تي A ۽ B وٽ ڪپيندو.
- (6) ليڪ PA ۽ ليڪ PB ڪيو. اِهي گهربل ڇهڻيون آهن.

آپياس 4.2

- (1) مرڪز P ۽ نيسر قطر 3.2 س م وارو گول ڪڍو. گول تي ٽپڪو M کڻي، اُن تي گول ڏانهن ڇهڻي ڪڍو.
- (2) 2.7 س م نيسر قطر وارو گول ڪڍو. اُن تي ڪوبه ٽپڪو کڻي ڇهڻي ڪڍو.
- (3) 3.6 س م نيسر قطر وارو گول ڪڍو. بنا مرڪز استعمال جي، گول جي ڪنهن به ٽپڪي تي ڇهڻي ڪڍو.
- (4) 3.3 س م نيسر قطر وارو گول ڪڍو. 6.6 س م ڊيگهه وارو زهه PQ ڪڍو. P ۽ Q وٽ ڇهڻيون ڪڍو. ڇهڻين بابت چڪاس ڪريو.

5. 3.4 س م نيمر قطر وارو گول ڪڍو 5.7 س م ڊيگهه وارو زهم MN ڪڍو. M ۽ N تي گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍو.
6. مرڪز P ۽ C نيمر قطر 3.4 ڪٽي هڪ گول ڪڍو. گول مرڪز کان 5.5 س م مفاصلي تي ٽپڪو O ڪٽو. O وٽان گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍو.
7. 4.1 س م نيمر قطر وارو گول ڪڍو. مرڪز کان 7.3 س م مفاصلي تي ٽپڪي کان ڇهڻيون ڪڍو.

گڏيل اڀياس 4

1. مناسب متبادل چونڊيو

1. گول تي ڏنل ٽپڪي مان گول ڏانهن ڇهڻين جو عدد ... هوندو آهي.

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

(2) گول کان ٻاهر ڏنل ٽپڪي مان گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍي سگهيون.

(A) 2 (B) 1 (C) فقط هڪ (D) 0

(3) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, $\frac{AB}{PQ} = \frac{5}{7}$ ته
 (A) ΔABC وڏو (B) ΔPQR وڏو
 (C) ڇٽي نه ٿو سگهجي (D) ٻئي برابر

2. O مرڪز ۽ 3.5 س م نيمر قطر وارو گول ڪڍو. مرڪز کان 5.7 س م مفاصلي تي P ڪٽي اُن کان گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍو.

3. ڪوبه گول ڪڍو اُن تي هڪ ٽپڪو A ڪٽي بنا مرڪز استعمال جي اُن ٽپڪي تي ڇهڻي ڪڍو.

4. 6.4 قطر وارو گول ڪڍو مرڪز کان قطر جيتري مفاصلي تي ٽپڪو R ڪٽي، اُن مان گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍو.

5. P مرڪز ڪٽي گول ڪڍو. 100° ماپ وارو ڪمان AB ڪڍو ۽ B وٽ گول ڏانهن ڇهڻيون ڪڍو.

6. E مرڪز ۽ 3.4 س م نيمر قطر ڪٽي گول ڪڍو گول تي F ٽپڪو ڪٽو. ٽپڪو A اهڙي نموني ڪٽو جئن $FA = 4.1$ ۽ $E-F-A$ ٽپڪي A وٽان گول ڏانهن ڇهڻي ڪڍو.

7. ΔABC , $\Delta ABC \sim \Delta LBN$, $AB = 5.1$ س م , $\angle B = 40^\circ$, $BC = 4.8$ س م ,

ته $\frac{AC}{LN} = \frac{4}{7}$ ۽ ΔLBN ڪڍو

8. ΔXYZ , $PQ = 5.8$ س م , $YQ = 7.2$ س م , $PY = 6.3$ س م ڪڍو ΔPYQ

ڪڍو جيڪو ΔPYQ سان هڪ جهڙائي رکي ٿو. $\frac{YZ}{YQ} = \frac{6}{5}$



اچو ته سڳي ونئون



• ليڪ جو لاه


• وچ سوتر

• مفاصلو سوتر

ذرا ياد ڪريو.



عدد - ليڪ تي ٻن ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو ڪيئن لھيو آھي. اھا آسان ڪي ڄاڻ آھي Q, P ۽ R جا مساوا نمبر وار 1, -5, -4 جا آھن ته ٽڪر PQ ۽ ٽڪر QR جي ڊيگھ لھو.



شڪل 5.1 انوسار R, Q, P جا مساوا آھن 1, -5, -4

ٽپڪي A ۽ B جا مساوا x_1 ۽ x_2 جا مساوا، $x_2 > x_1$ آھن
 $d(A, B) = x_2 - x_1$

ٽڪر Q, P جي ڊيگھ شڪل 5.1 انوسار R, Q, P جا مساوا آھن 1, -5, -4
 $\therefore d(P, Q) = (-1) - (-5) = -1 + 5 = 4$
 $d(Q, R) = 4 - (-5) = 4 + 5 = 9$

اھا ويچار ڌارا ڪر آڻي XY گراف تي هڪ ئي محور تي ٻن ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو لھي سگھجي ٿو.

ڄاڻي ونئون




(1) هڪ ئي محور تي ٻن ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو لھڻ

هڪ محور تي ٻه ٽپڪا X- مطلب هڪ ئي عدد - ليڪ تي ٻه ٽپڪا X- محور تي ٽپڪن جا مساوا
 $(0, 1), (0, \frac{17}{2}), (0, -3), (2, 0), (\frac{-5}{2}, 0), (8, 0)$ هوندا
 اهو ڌيان ڀر ڪو.

X- محور جا ڪاٿو مساوا ڏيکاريندڙ پاڻو OX' ۽ Y- محور تي ڪاٿو مساوا ڏيکاريندڙ پاڻو OY آھي.

(i) $-X$ محور تي ٻن ٽپڪن وچپر مفاصلو



شڪل 5.2


مٿي ڏنل شڪل موجب

محور تي $A(x_1, 0)$ $B(x_2, 0)$

$$x_2 > x_1, -X$$

$$\therefore d(A, B) = x_2 - x_1$$

(ii) $-Y$ محور تي ٻن ٽپڪن وچپر مفاصلو



شڪل 5.3


مٿي ڏنل شڪل موجب

محور تي $Q(0, y_2)$ $P(0, y_1)$

$$Y-, y_2 > y_1$$

$$\therefore d(P, Q) = y_2 - y_1$$

(2) XY محور تي ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ ٽڪر ڪنهن محور جي پوروچوٽ هجي ته انهن ٻن ٽپڪن وچپر مفاصلو لھڻ.



شڪل 5.5


(ii) شڪل ۾ ٽڪر PQ ۽ RS جو $-Y$ محور جي پوروچوٽ

آهي. مطلب P ۽ Q جو X مساو ساڳيو آهي
 $-Y$ محور تي PR ۽ QS عمود ڪيو.
 $\therefore$ مستطيل $PSQR$ آهي.

$$\therefore PQ = RS$$

$$\text{پر } RS = y_2 - y_1$$

$$\therefore d(P, Q) = y_2 - y_1$$



شڪل 5.4

(i) شڪل موجب ٽڪر AB ۽ LM جو $-X$ محور جي پوروچوٽ

آهي. مطلب A ۽ B جو $-Y$ مساو ساڳيو آهي. $-X$
 محور تي ٽڪر AL ۽ ٽڪر BM عمود ڪيو.


مستطيل $ABML$ آهي

$$\therefore AB = LM$$

$$\text{پر } LM = x_2 - x_1$$

$$\therefore d(A, B) = x_2 - x_1$$

مشغولي :



شڪل ۾ Y-محور || ٽڪر AB

X-محور || ٽڪر CB

A ۽ C جا مساوا ڏنل آهن.

$\triangle ABC$ ٽڪري ڪنڊ ٽڪنڊو آهي

پاڻڻا گورس سڌيان موجب

$$(AB)^2 + (BC)^2 = \square$$

AB ۽ BC ٻولھڻ لاءِ ٽپڪي B جا مساوا لھون

= مساوت y جو B . $\therefore$ محور-X || CB

= مساوت x جو B . $\therefore$ محور-Y || BA

شڪل 5.6

$$AB = \square - \square = \square$$

$$BC = \square - \square = \square 4$$

$$\therefore AC^2 = \square + \square = \square$$


$$\therefore AC = \sqrt{17}$$

ڇاڻي ونون



مفاصلو سوتر (Distance formula)

شڪل 5.7 ۾ $A(x_1, y_1)$ ۽ $B(x_2, y_2)$ گراف تي ٻه ٽپڪا آهن. ٽپڪي B وٽان X-محور طرف BP عمود ڪڍو. ٽپڪي A وٽان Y-محور طرف DA عمود ڪڍو. ٽڪر BP ۽ ٽڪر AD ٻه ٽپڪا آهن. $\therefore$ ٽپڪي D جو X مساو X آهي. ٽڪر AD، X-محور جي پوروچوٽ آهي. $\therefore$ ٽپڪي D جو Y مساو Y آهي. $\therefore AD = d(A, D) = x_2 - x_1$, $BD = d(B, D) = y_2 - y_1$



شڪل 5.7


$\triangle ABD$ ٽڪري ڪنڊ ٽڪنڊو آهي ، $AB^2 = AD^2 + BD^2$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\therefore AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ان سوتر کي مفاصلو سوتر چئبو آهي.

اِهو ڏيان ۾ رکو ، $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ،
اڳه واري صفحي تي AB ، AC جي ڊيگه ڪڍڻ لاءِ پائٿاگورس جو سڌيان استعمال ڪيو.
هاڻي مڃايل سوتر ڪم آڻي انهن ٽڪرن جي ڊيگه لهند اسين.



شڪل 5.8

$$A(2, 3) \quad C(-2, 2)$$

$$A(x_1, y_1) \quad C(x_2, y_2)$$

$$x_1 = 2, y_1 = 3, x_2 = -2, y_2 = 2$$

$$AC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (2 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 1}$$

$$= \sqrt{17}$$

ٽڪر - || YAB محاور - || XBC محاور

B جو مساو (2,2) آهي.

$$\therefore AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(2 - 2)^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{0 + 1} = 1$$

$$BC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 0} = 4$$

اِهو ڏيان ۾ رکو.



• منڊ ٽپڪو O جا مساو (O, O) آهن. ان ڪري جي P جا مساو (y, x) آهن ته

$$d(O, P) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

• $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \text{ سمجھو}$$

مثال (1) $P(-1, 1)$, $Q(5, -7)$ تہ انهن وچر مفاصلو لھو.

حل : $P(x_1, y_1)$ $Q(x_2, y_2)$ سمجھو
 $x_1 = -1$, $y_1 = 1$, $x_2 = 5$, $y_2 = -7$

$$\begin{aligned} d(P, Q) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{مفاصلو سوتر موجب} \\ &= \sqrt{[5 - (-1)]^2 + [(-7) - 1]^2} \\ &= \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} \end{aligned}$$

$$d(P, Q) = \sqrt{100} = 10$$

تہڪي P ۽ Q وچر مفاصلو 10 .

مثال (2) ثابت ڪريو تہ $A(-3, 2)$, $B(1, -2)$, $C(9, -10)$ اهي هر ليڪ تہڪا آهن

حل : جيڪڏهن $d(A, B)$; $d(B, C)$; $d(A, C)$ انهن مان ٻن جي مفاصلن جو جوڙ

تئين مفاصلي جي برابر هوندو تہ A, B, C هر ليڪ تہڪا هوندا

$$\therefore d(A, B), d(B, C), d(A, C)$$

	تہڪو A مساو	تہڪو B مساو	مفاصلو سوتر
$(-3, 2)$	$(1, -2)$	$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	
(x_1, y_1)	(x_2, y_2)		

$$\therefore d(A, B) = \sqrt{[1 - (-3)]^2 + [(-2) - 2]^2} \dots\dots\dots$$

$$= \sqrt{(1+3)^2 + (-4)^2}$$

$$= \sqrt{16+16}$$

$$= \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \dots\dots\dots(I)$$

$$d(B, C) = \sqrt{(9-1)^2 + (-10+2)^2}$$

$$= \sqrt{64+64} = 8\sqrt{2} \dots\dots\dots(II)$$

$$d(A, C) = \sqrt{(9+3)^2 + (-10-2)^2}$$

$$= \sqrt{144+144} = 12\sqrt{2} \dots\dots\dots(III)$$

$$4\sqrt{2} + 8\sqrt{2} = 12\sqrt{2} \dots\dots\dots (I), (II) \text{ ۽ } (III) \text{ مان}$$

$$\therefore d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$$

$\therefore A, B, C$ اهي هر ليڪ تہڪا آهن.

مثال (3) $R(3, 3)$ $P(6, -6)$, $Q(3, -7)$ ڇا اهي ٽيڪا هڪ ليڪ آهن؟

حل :

$$PQ = \sqrt{(6-3)^2 + (-6+7)^2} \dots\dots\dots$$

$$= \sqrt{(3)^2 + (1)^2} = \sqrt{10} \dots\dots\dots (I)$$

$$QR = \sqrt{(3-3)^2 + (-7-3)^2}$$

$$= \sqrt{(0)^2 + (-10)^2} = \sqrt{100} \dots\dots\dots (II)$$

$$PR = \sqrt{(3-6)^2 + (3+6)^2}$$

$$= \sqrt{(3)^2 + (9)^2} = \sqrt{90} \dots\dots\dots (III)$$

(I), (II) ۽ (III) مان $\sqrt{10}$, $\sqrt{90}$, $\sqrt{100}$ ۾ سڀ کان وڏو مان آهي

$$(\sqrt{10} + \sqrt{90}) \text{ ۽ } (\sqrt{100})$$

$$(\sqrt{100})^2 \text{ ۽ } (\sqrt{10} + \sqrt{90})^2$$

انهن جي ڀيٽ ڪريو $PQ + PR \neq QR$ $\therefore (\sqrt{10} + \sqrt{90}) > (\sqrt{100})$

$R(3, 3)$ ۽ $P(6, -6)$, $Q(3, -7)$ $\therefore$


اهي هڪ ليڪ ٽيڪا نه آهن

مثال (4) $(-4, 4)$ ۽ $(1, 7)$, $(4, 2)$, $(-1, -1)$

چورس جا نوڪي ٽيڪا آهن. ثابت ڪريو.

حل : چوڪنڊي جا جيڪڏهن چارئي پاسا ۽ اُڀرڻ ساڳي ڊيگهه وارا آهن ته اهو چوڪنڊو چورس آهي.

$D(-4, 4)$ ۽ $A(1, 7)$, $B(4, 2)$, $C(-1, -1)$ $\therefore$



شڪل 5.9

$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{(4+1)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$CD = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$DA = \sqrt{(1+4)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$AC = \sqrt{(1+1)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{4+64} = \sqrt{68}$$

$$BD = \sqrt{(4+4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$$

$\therefore AB = BC = CD = DA$ ۽ $AC = BD$

ان مان ظاهر آهي ته چوڪنڊي جا چار ٽي پاسا برابر آهن ۽ اُريب C ۽ AD ساڳئي ڊيگهه جا آهن.

$$\therefore (-4, 4), (-1, -1), (4, 2), (1, 7)$$

اهي چورس جا نوڪي ٿيڪا آهن.

مثال (5) -Y محور تي اهڙي نموني ٿيڪي جا مساوا ٻولهيو جيئن
M (-5, -2) ۽ N(3, 2) کان اهو ٿيڪو هر مفاصلي هجي.

حل : سمجهه -Y محور تي 'P' ٿيڪي جا مساوا آهن (O, Y)

$$\therefore PM = PN \quad \therefore PM^2 = PN^2$$

$$\therefore [0 - (-5)]^2 + [y - (-2)]^2 = (0 - 3)^2 + (y - 2)^2$$

$$\therefore 25 + (y + 2)^2 = 9 + y^2 - 4y + 4$$

$$\therefore 25 + y^2 + 4y + 4 = 13 + y^2 - 4y$$

$$\therefore 8y = -16 \quad \therefore y = -2$$

$\therefore$ 'P' ٿيڪي جا مساوا آهن (O, -2)

ٿيڪو M(-5, -2) ۽ N(3, 2) کان هر مفاصلي آهي.

مثال (6) ΔABC آهي A(-3, -4), B(-5, 0), C(3, 0)

اهي ΔABC جا نوڪي ٿيڪا آهن ته ٽڪنڊي جي گرد مرڪز جا مساوا لھو.

حل : سمجهو P(a, b) آهي ΔABC جو گرد مرڪز آهي اهو کان هر مفاصلي آهي.

$$\therefore PA^2 = PB^2 = PC^2 \dots\dots\dots (I) \quad \therefore PA^2 = PB^2$$

$$(a + 3)^2 + (b + 4)^2 = (a + 5)^2 + (b - 0)^2$$

$$\therefore -4a + 8b = 0$$

$$\therefore a - 2b = 0 \dots\dots\dots (II)$$

$$PA^2 = PC^2 \dots\dots\dots (I)$$

$$\therefore (a + 3)^2 + (b + 4)^2 = (a - 3)^2 + (b - 0)^2$$


$$\therefore a^2 + 6a + 9 + b^2 + 8b + 16 = a^2 - 6a + 9 + b^2$$

$$\therefore 12a + 8b = -16$$

$$\therefore 3a + 2b = -4 \dots\dots\dots (III)$$

$$(II) \text{ ۽ } (III) \text{ مساوتون حل ڪري } a = -1, b = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ گرد مرڪز جا مساوا } (-1, -\frac{1}{2})$$



شڪل 5.10

مثال (7) (X, Y) اهو ٽپڪو ۽ $(7, 1)$ ۽ $(3, 5)$ کان هر مفاصلي آهي ته ثابت ڪريو $Y = X - 2$ حل :

$$\therefore AP = BP$$

$$\therefore AP^2 = BP^2$$

$$\therefore (x - 7)^2 + (y - 1)^2 = (x - 3)^2 + (y - 5)^2$$

$$\therefore x^2 - 14x + 49 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25$$

$$\therefore -8x + 8y = -16$$

$$\therefore x - y = 2$$

$$\therefore y = x - 2$$

مثال (8) ٽپڪو $A(2, -2)$ ۽ ٽپڪو $B(-1, y)$ وچير مفاصلو 5 آهي ته Y جو ملهه لھو.

$$\therefore AB^2 = [(-1) - 2]^2 + [y - (-2)]^2 \dots\dots\dots$$

حل

$$\therefore 5^2 = (-3)^2 + (y + 2)^2$$

$$\therefore 25 = 9 + (y + 2)^2$$

$$\therefore (y + 2)^2 = 16$$

$$\therefore y + 2 = \pm\sqrt{16}$$

$$\therefore y + 2 = \pm 4$$

$$\therefore y = 4 - 2 \text{ يا } y = -4 - 2$$

$$\therefore y = 2 \text{ يا } y = -6$$

$\therefore Y$ جي قيمت 2 يا -6 آهي.

آپياس 5.1

1. ڏنل ٽپڪن وچير مفاصلو لھو

(1) $A(2, 3), B(4, 1)$ (2) $P(-5, 7), Q(-1, 3)$ (3) $R(0, -3), S(0, \frac{5}{2})$

(4) $L(5, -8), M(-7, -3)$ (5) $T(-3, 6), R(9, -10)$ (6) $W(\frac{-7}{2}, 4), X(11, 4)$

2. هيٺ ڏنل ٽپڪا هر ليڪ آهن يا نه

(1) $A(1, -3), B(2, -5), C(-4, 7)$ (3) $L(-2, 3), M(1, -3), N(5, 4)$

(2) $R(0, 3), D(2, 1), S(3, -1)$ (4) $P(-2, 3), Q(1, 2), R(4, 1)$

3. $-X$ محور تي آهڙو ٽپڪو ڳولھيو جيڪو $A(-3, 4)$ ۽ $B(1, -4)$ ٽپڪن کان هر مفاصلي هجي.

4. $R(2, 7)$ ۽ $P(-2, 2), Q(2, 2)$ ڇا اهي ٽي ٽپڪا آهن؟ ڇا ڪريو.

5. $S(6, -6)$ ۽ $P(2, -2), Q(7, 3), R(11, -1)$

ثابت ڪريو ته انهن نوڪي ٽپڪن وارو چوڪنڊو پوروچوٽ پاسو چوڪنڊو آهي.

6. $\square ABCD, D(5, -4), A(-4, -7), B(-1, 2), C(8, 5)$

ثابت ڪريو ته پورو پاسو چوڪنڊو آهي.

7. جيڪڏهن $L(x, 7)$ ۽ $M(1, 15)$ وچ ۾ مفاصلو 10 آهي ته X جو ملهه لھو.

8. $A(1, 2), B(1, 6), C(1 + 2\sqrt{3}, 4)$

ثابت ڪريو ته اهي ٽيڪا ٽپور پاسي ٽڪنڊي جا نوڪي ٽيڪا آهن.

ذرا ياد ڪريو .




ٽن پوروچوٽ ليڪن جي انٽر چيڊ خاصيت :

ليڪ $l \parallel m \parallel n$ ليڪ n ,

ليڪون p ۽ q چيڊڻيون آهن.

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$



شکل 5.11

جاڻي ونون



ليڪ - ٽڪر جي ورڇ (Division of a line segment)

شکل ۾، $AP = 6$ ۽ $PB = 10$

$$\therefore \frac{AP}{PB} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$



شکل 5.12

جدا لفظن ۾: ٽپڪو P اهو ٽڪر AB کي $3:5$ ۾ ورهائي ٿو. ائين چئبو آهي ٽپڪو جڏهن ڪنهن ٽڪر کي ٽنل ريشي ۾ ورهائي ٿو ته اُنجا مساوا ڪيئن لھبا، اهو ڏسندا سين.



ورچ سوتر (Section formula)

شڪل 5.13 ۾ XY گراف ۾ ٽڪر AB تي ٽيڪو P، ٽڪر AB کي m:n ۾ ورهائي ٿو

سمجهو $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $P(x, y)$


ٽڪر AC، ٽڪر PQ، ٽڪر BD
X- اهي محور تي عمودي ٽڪر آهن.

$$\therefore C(x_1, 0); Q(x, 0)$$

$$D(x_2, 0).$$

$$\therefore \left. \begin{array}{l} CQ = x - x_1 \\ QD = x_2 - x \end{array} \right\} \dots\dots\dots (I)$$

BD ٽڪر || PQ ٽڪر || AC ٽڪر.



شڪل 5.13

$$\therefore \quad \left(\text{ٽن پوروڇوٽ ليڪون خاصيت} \right) \quad \frac{AP}{PB} = \frac{CQ}{QD} = \frac{m}{n}$$

$$CQ = x - x_1 \quad QD = x_2 - x \dots\dots\dots (I)$$

$$\therefore \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{m}{n}$$

$$\therefore n(x - x_1) = m(x_2 - x)$$

$$\therefore nx - nx_1 = mx_2 - mx$$

$$\therefore mx + nx = mx_2 + nx_1$$

$$\therefore x(m + n) = mx_2 + nx_1$$

$$\therefore x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

اهڙي نموني A, P, B وٽان Y-محور تي عمود ڪڍڻ سان آسان ڪي ملندو.


$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$$

$\therefore A(x_1, y_1)$ ۽ $B(x_2, y_2)$ انهن ٽيڪن کي جوڙڻ واري ٽڪر AB کي m:n ۾ ورهائڻ

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right) \text{ واري ٽيڪي جا مساوا ٿيندا.}$$

مذیہ - تپکو سوتر (Mid-point formula)

$A(x_1, y_1)$ ۽ $B(x_2, y_2)$ انهن ٻنهي ٽپڪن جي ٽڪر AB جو مڌي ٽپڪو $P(X, Y)$ آهي ته $m=n$ هاڻي وچ سوتر موجب x ۽ y جا ملهه لھون.



شکل 5.14

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

$$= \frac{my_2 + my_1}{m + m} \quad \because m = n$$

$$= \frac{m(y_1 + y_2)}{2m}$$

$$= \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

$$= \frac{mx_2 + mx_1}{m + m} \quad \because m = n$$

$$= \frac{m(x_1 + x_2)}{2m}$$

$$= \frac{x_1 + x_2}{2}$$

∴ P اِن مڌيه ٽڪي جا مساوا آهن $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ اِن کي مڌيه ٽپڪو سوتر چئبو آهي.

آسان اٿئين درجي ۾ ٻن منتق عددن a ۽ b عدد ليڪ تي ڏيکاري اُنجو مڌيه ٿيڪو

$$\frac{a+b}{2} \text{ سمجھایو . اِھو نتیجہ اَلْبَہ آھي .}$$

حل کلیل مثال

مثال (1) $A(3,5)$, $B(7,9)$ ٽپڪو Q اهو ٽڪر AB کي $2:3$ ۾ ورهائي ٿو ته Q جا مساوا لھو.

$(x_1, y_1) = (3, 5)$: ڈنل مثال موجب

$$(x_2, y_2) = (7, 9)$$

$$m : n = 2:3$$

ورچ سوئر موجب

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n} = \frac{2 \times 7 + 3 \times 3}{2+3} = \frac{23}{5}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n} = \frac{2 \times 9 + 3 \times 5}{2+3} = \frac{33}{5}$$

$\therefore Q$ جا مساوا آھن $\left(\frac{23}{5}, \frac{33}{5}\right)$

مثال (2) $A(-4,2)$ $B(6,2)$ جو مڌيه ٽپڪو آهي ته P جا مساوا لھو
حل :

$$A(-4,2) \quad P(x,y) \quad B(6,2)$$

شڪل 5.15

$$P(x,y) \text{ سمجھو } (-4,2) = (x_1, y_1) ; (6,2) = (x_2, y_2)$$

∴ مڌيه - ٽپڪو سوتر موجب ،

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4 + 6}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

∴ سمجھو P جا مساوا آهي $(1,2)$

ذرا ياد ڪريو



آسان ڪي جاڻ آهي ته ٽڪنڊي جا مڌيان هر ڇيڊي هوندا آهن مرڪز (مڌيان ڇيڊي ٽپڪو) (centroid) $2:1$ آهي مڌيان ڪي ورهائيندو آهي.


ڄاڻي وٺون



مرڪز ڪ سوتر (Centroid formula)

ٽڪنڊي جي ٽنهي نوڪي ٽپڪن جا مساوا مليل هجن ته مفاصلو سوتر موجب موڪز ڪ جا مساوا ڪٽب لھبا، آھو سڪندا سين.

سمجھو $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$



شڪل 5.16

آهي $\triangle ABC$ جا نوڪي ٽپڪا آهن.

ٽڪر AD مڌيان آهي

$G(X, Y)$ آھو موڪز آھي.

ٽپڪو D آھو BC جو مڌيه ٽپڪو آھي.

$x = \frac{x_2 + x_3}{2}, y = \frac{y_2 + y_3}{2}$ ٽپڪي D جا مساوا $\therefore$

G اهو مرکز آهي. $\therefore AG : GD = 2 : 1$

∴ ورچ سوئر موجب،

$$x = \frac{2\left(\frac{x_2 + x_3}{2}\right) + 1 \times x_1}{2 + 1} = \frac{x_2 + x_3 + x_1}{3} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y = \frac{2\left(\frac{y_2 + y_3}{2}\right) + 1 \times y_1}{2 + 1} = \frac{y_2 + y_3 + y_1}{3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

مطلب $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ان ٽڪنڊي جي مرڪز جا مساوا ٿيندا

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

ان کی مرکزک سوتر چئبو آهي.



اهو ڌيان ۾ رکو

● **ورج سونر**

$(x_2, y_2) \neq (x_1, y_1)$ انهن ٻن ٽپڪي کي جوڙڻ واري ٽڪر کي $m:n$ ۾ ورهائڻ واري

تپکي جا مساوا ٿيندا.

● مذہبِ تہک و سوتر

$(x_2, y_2) \neq (x_1, y_1)$ انهن کي ملائيندڙ ٽڪر جي مڌيه ٽپڪي جا مساوا ٿيندا

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

● مرکز کے سوتلر


$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ انهن نوڪي ٽپڪن واري ٽڪنڊي جي مرڪز ۾ جا مساوا ٿيندا

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

مثال (1) $B(-6, -5)$ ۽ $A(-7, 4)$

انھن ۾ ٽپڪو T اھو ٽڪر AB کي 7:2 ۾ ورھائي ٿو. تہ T جا مساوا لھو.

حل : سمجھو تہ T جا مساوا (X,Y) آھن
 ∴ ورچ سوٽر آئوسار ۽



شکل 5.17

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n} = \frac{7 \times (-6) + 2 \times (-7)}{7+2}$$

$$= \frac{-42-14}{9} = \frac{-56}{9}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n} = \frac{7 \times (-5) + 2 \times (4)}{7+2}$$

$$= \frac{-35+8}{9} = \frac{-27}{9} = -3$$

∴ T جا مساوا آھن. $\left(\frac{-56}{9}, -3\right)$

مثال (2) ٽپڪو $T B(r, s)$ $A(-6, 10)$ $P(-4, 6)$ اھو ٽڪر AB کي 2:1 ۾ ورھائي ٿو.

تہ B جا مساوا لھو. سمجھو تہ T جا مساوا (X,Y) آھن

حل : ورچ سوٽر آئوسار

$$6 = \frac{2 \times s + 1 \times 10}{2 + 1}$$

$$\therefore 6 = \frac{2s + 10}{3}$$

$$\therefore 18 = 2s + 10$$

$$\therefore 2s = 8$$

$$\therefore s = 4$$

$$-4 = \frac{2 \times r + 1 \times (-6)}{2 + 1}$$

$$\therefore -4 = \frac{2r - 6}{3}$$

$$\therefore -12 = 2r - 6$$

$$\therefore 2r = -6$$

$$\therefore r = -3$$

∴ B جا مساوا آھن $(-3, 4)$

(3) $A(15, 5)$ ۽ $B(9, 20)$ ۾ $A-P-B$ ۾ $P(11, 15)$ آھي تہ P اھو AB کي ڪھڙي ريشي

۾ ورھائي ٿو؟

حل : سمجھم $P(11, 15)$ کي AB کي m:n ۾ ورھائي ٿو.

ورچ سوٽر آئوسار

ساڳئي نموني Y- مساوو ڪڍي ريشو
لهو نتيجو لکو.

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

$$\therefore 11 = \frac{9m+15n}{m+n}$$

$$\therefore 11m + 11n = 9m + 15n$$

$$\therefore 2m = 4n$$

$$\therefore \frac{m}{n} = \frac{4}{2} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore m:n = 2 = 1$$


مثال (4) $A(2, -2)$ ۽ $B(-7, 4)$ انهن ٽپڪن کي ملائيندڙ ٽڪر کي ٿڌڪ ڪندڙ ٽپڪن جا مساوا لھو.
(ٽڪر کي ٽن حصن ۾ ورهائڻ واري ٽپڪي کي ٿڌڪ چئبو آھي)

حل : سمجھو ته ٽپڪا P ۽ Q اهي AB ٽڪر کي ٽن حصن ۾ ورهائيندڙ آهن.

$$AP = PQ = QB \dots\dots\dots (I)$$

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AP}{PQ+QB} = \frac{AP}{AP+AP} = \frac{AP}{2AP} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots (I)$$

ٽپڪو P ٽڪر AB کي 1:2 ورهائي ٿو



شکل 5.18

$$P \text{ جو } X \text{ مساوو} = \frac{1 \times (-7) + 2 \times 2}{1+2} = \frac{-7+4}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$P \text{ جو } Y \text{ مساوو} = \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2} = \frac{4-4}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$$\frac{AQ}{QD} = \frac{2}{1} \text{ ساڳئي نموني Q اهو AB کي 2:1 ۾ ورهائي ٿو.}$$

$$Q \text{ جو } X \text{ مساوو} = \frac{2 \times (-7) + 1 \times 2}{2+1} = \frac{-14+2}{3} = \frac{-12}{3} = -4$$

$$Q \text{ جو } Y \text{ مساوو} = \frac{2 \times 4 + 1 \times (-2)}{2+1} = \frac{8-2}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$\therefore P$ ۽ Q مساوا آهن $(-1, 0)$ ۽ $(-4, 2)$


وڌيڪ ڄاڻ لاءِ :

A ۽ B ٽپڪن کي جوڙيندڙ ٽڪر AB جي ٻاهرين ورڇ ڪيئن ٿيندي آهي.

$$A(-4, 6), B(5, 10)$$

ان ٽڪر AB کي 3:2 ۾ ٻاهريان ورڇ ڪندڙ ٽپڪي جا مساوا ڪيئن لهما.

$$AB \text{ ۾ ٻاهريان ورڇ ڪندڙ ٽپڪي جا مساوا } \frac{AP}{PB} = \frac{3}{2}$$



شکل 5.19

$$AP = 3k, BP = k, AB = 2k \quad \frac{AP}{PB} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{AB}{BP} = \frac{3}{2}$$

هاڻي ٽپڪو B ٽڪر AP کي 3:2 ۾ ورهائي ٿو A ۽ B جا مساوا خبر آهن ته P جو مساو لهي سگهنداسين

آپياس 5.2

1. جيڪڏهن P هو A(-1, 7) ۽ B(4, -3) جي ٽڪر AB کي 2:3 ۾ ورهائي ٿو ته P جا مساوا لھو.

2. هيٺ مثالن ۾ ٽڪر PQ کي A ٽپڪو a:b ۾ ورهائي ٿو ته A جا مساوا لھو.

$$(1) P(-3, 7), Q(1, -4), a : b = 2 : 1$$

$$(2) P(-2, -5), Q(4, 3), a : b = 3 : 4$$

$$(3) P(2, 6), Q(-4, 1), a : b = 1 : 2$$

3. P-T-Q ۾ T(1, 6) هو ٽپڪو (-3, 10) ۽ Q(6, -8) کي ملائيندڙ ٽڪر کي ڪهڙي ريشي ۾ ورهائي ٿو؟

4. ٽڪر AB گول جو قطر آهي ٽپڪو P مرڪز آهي A(2, -3) ۽ B(-2, 0) ته B جا مساوا لھو.

5. A(2, -3) ۽ B(1, 2) جي ٽڪر AB کي ڪهڙي ريشي ۾ ورهائي ٿو؟ K جو ملهه لھو.

6. (22, 20) ۽ (0, 16) ٽپڪن کي ملائيندڙ ٽڪر جي مڌيہ - ٽپڪي جا مساوا لھو.

7. هيٺ ڏنل ٽڪنڊن ۾ مرڪز ڪا مساوا لھو

$$(1) (-7, 6), (2, -2), (8, 5)$$

$$(2) (3, -5), (4, 3), (11, -4)$$

$$(3) (4, 7), (8, 4), (7, 11)$$

8. $\triangle ABC$ ۾ مرڪزڪ $G(-4, 7)$ آهي، $A(-14, -19)$ ، $B(3, 5)$ آهي ته C جا مساوا لھو.

9. مرڪزڪ $(1, 5)$ هوندڙ ٽڪنڊي ۾ $(2, 3)$ ، $(h, -6)$ ۽ $(-6, K)$ نوڪي ٽپڪا آهن ته h ۽ k جا ملھ لھو.

10. $A(2, 7)$ ، $B(-4, -8)$ ان ٽڪر AB جي ٿڌڪ جا مساوا لھو.


11. $A(-14, -10)$ ان ٽڪر $B(6, -2)$ ان ٽڪر AB کي چئن برابر حصن ۾ ورهائڻ وارن ٽپڪن جا مساوا لھو.

12. $A(-20, 10)$ ، $B(0, -20)$ ان ٽڪر AB کي پنجن برابر حصن ۾ ورهائڻ وارن ٽپڪن جا مساوا لھو.

چاڻي ونون



ليڪ جو لاه (Slope of a line)



شما اسڪول سائيڪل تي پيئي وڃي سڌو رستو ختم ٿيڻ تي جڏهن چڙهائي شروع ٿي ته هوءَ هيٺ لهي پيئي. فاطما ڪارڻ پڇيو تڏهن شما جواب ڏنو ته هاڻي سڌو رستو پورو ٿيو آهي. چڙهائي شروع ٿي آهي. چڙهائيءَ واري رستي پيڊل هلائڻ ۾ ڏاڍي محنت ڪرڻي پوندي آهي. چڙهائي ۾ رستي تي هلڻ ۾ آسان ڌرتيءَ جي ڪشش زور مخالف هليون ٿا. اهو سائنس ۾ پڙهيو آهي. مساوي جاميٽري ۾ ليڪ جو لاه هڪ اهميت رکندڙ آهي ان بابت آسان سمجهندا سڀين.

مشغولي I :


پرواري شڪل ۾ $A(-2, -5)$ ،

$B(0, -2)$ ، $C(2, 1)$ ، $D(4, 4)$ ، $E(6, 7)$

اهي ٽپڪا ليڪ l مٿان آهن. انهن

مساون کي واپرائي هيٺ ٿيل

جاچيو.



شڪل 5.20

نمبر	پهريون ٽپڪو	ٻيون ٽپڪو	پهريون ٽپڪي جا مساوا (x_1, y_1)	ٻئي ٽپڪي وارا جا مساوا (x_2, y_2)	$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
1	C	E	(2, 1)	(6, 7)	$\frac{7-1}{6-2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$
2	A	D	(-2, -5)	(4, 4)	$\frac{4-(-5)}{4-(-2)} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$
3	D	A	(4, 4)	(-2, -5)	$\frac{-5-4}{-2-4} = \frac{-9}{-6} = \frac{3}{2}$
4	B	C	--	--	--
5	C	A	--	--	--
6	A	C	--	--	--

ٽيبل ۾ بچيل ڇوڪندا پري ٽيبل مڪمل ڪريو. ان مان ليڪ l مٿان ٻين ٽپڪن جون جوڙيون کڻو
۽ هر هڪ جوڙي ۾ $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ جا چيو

ان مشغوليءَ مان ظاهر آهي ته ليڪ l ۾ (x_1, y_1) ۽ (x_2, y_2)

انهن ڪهڙن به ٻن ٽپڪن جي موجودگيءَ ۾ $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ريشو مقرر آهي


ليڪ l ۾ (x_1, y_1) ۽ (x_2, y_2) ٻه ٽپڪا هوندا $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ کي ليڪ جو لاهه چئبو آهي. اهو m اکر
وسيئي ڏيکاربو آهي.

$$\therefore m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

اچو ته چرچا ڪريون

مشغولي II :

ليڪ l ليڪ t ۽ ليڪ n تي ڪجهه ٽپڪا
ڏنل آهن انهن ٽپڪن وسيلي ليڪن جا
لاھ لھو توهان کي ڏيان پر رڪڻو آھي.



شکل 5.21

(1) ليڪ l ۽ ليڪ t جو لاھ واڌو آھي.

(2) ليڪ n جو لاھ ڪاٽو آھي.


(3) ليڪ t جو لاھ ليڪ l کان وڌيڪ آھي.

(4) $-X$ محور جي واڌو طرف سوڙھي ڪنڊ ٺاھڻ

واريون ليڪن l ۽ t جا لاھ واڌو آھن.

(5) $-X$ محور جي واڌو طرف ويڪري ڪنڊ ٺاھيندڙ ليڪ n جو لاھ ڪاٽو آھي

$-X$ محور، $-Y$ محور ۽ محورن جي پوروچوٽ ليڪن جو لاھ



شکل 5.22

شکل 5.22 ۾ ، $(x_1, 0)$ ۽ $(x_2, 0)$

اھي $-X$ محور جا ٻہ ٽپڪا آھن.

$$\frac{0 - 0}{x_2 - x_1} = 0 = \text{X-محور جو لاھ}$$

ساڳئي نموني، $(0, y_1)$ ۽ $(0, y_2)$ اھي $-Y$ محور جا ٻہ ٽپڪا آھن.

$$-Y = \frac{y_2 - y_1}{0 - 0} = \frac{y_2 - y_1}{0} =$$

پر O سان ونڊ نہ ٿي ڪري سگھجي انڪري $-Y$ محور جو

لاھ مقرر ڪري نہ ٿو سگھجي اھڙي نموني f ليڪ l وانگر

X محور جي پوروچوٽ ليڪن جو لاھ ڪڍو. ليڪ m وانگر

Y محور جي پوروچوٽ ليڪن جو لاھ لھي نٿو سگھجي.

ليڪ جو لاھ :

ٽڪنڊن جي ھڪ جھڙائي ريشو واپرائي : پري واري شکل ۾ $P(x_1, y_1)$ ۽ $Q(x_2, y_2)$

اھي ليڪ l مٿان آھن ليڪ l اھا X محور کي ٽپڪي T وٽ ڪپي ٿي $-X$ محور $\perp$

ٽڪر QS ٽڪر PR $\perp$ ٽڪر QS

$\therefore$ ٽڪر $PR \parallel$ ٽڪر TS

$$\therefore QR = y_2 - y_1 \quad \text{۽} \quad PR = x_2 - x_1$$

$$\therefore \frac{QR}{PR} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \dots\dots\dots (I)$$

ليڪ TQ اها -X محور تي θ ڪنڊ ٺاهي ٿي


$$\therefore \frac{QR}{PR} = \tan\theta \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore (I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان } , \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan\theta$$

$$\therefore m = \tan\theta$$

$\therefore \angle QPR = \angle QTS \dots\dots\dots$ نسبتي ڪنڊون

ان مان ليڪ جيڪا واڌو طرف -X محور جي ڪنڊ ٺاهي ٿي ان جو ٽٽڻ ريشو ان ليڪ جو لاه آهي اها لاه جي وصف آهي ٻه ليڪون جن جو لاه ساڳيو هجي اهي -X محور جي واڌو طرف برابر ڪنڊون ٺاهين ٿيون اهي ليڪون پورو چوٽ هونديون آهن.



شڪل 5.23

پورو چوٽ ليڪن جو لاه (Slope of parallel lines)

مشغولي: شڪل 5.24 ۾ ليڪ l ليڪ t اهي ٻيئي ليڪون -X محور جي واڌو طرف θ ڪنڊ ٺاهين ٿيون.


$\therefore$ ليڪ t || ليڪ l (نسبتي ڪنڊون)

ليڪ l مٿان ٽپڪو B(0,3) ۽ A(-3,0)

آهي سوچيو ليڪ AB جو لاه ڪڍو.

$$\text{ليڪ AB جو لاه} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{\boxed{} - \boxed{}}{\boxed{} - \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$



شڪل 5.24

اهڙي نموني ليڪ l مٿان سولو ٽپڪو ڪٿي ان جو لاه لھو. اهڙي نموني پورو چوٽ ليڪن جو لاه ساڳيو هوندو آهي توهان چڪاس ڪري سگهندا.

هاڻي هتي $\theta = 45^\circ$

لاھ: $m = \tan \theta$ استعمال ڪري ٻنهي پوروڇوٽ ليڪن جو لاھ ساڳيو آھي. اھو ڇاچي ڏسو آھڙي نموني
 $\theta = 30^\circ$ ۽ $\theta = 60^\circ$ کڻي پوروڇوٽ ليڪن جا لاھ ساڳيا هوندا آهن. ان جي چڪاس ڪريو.

اھو ڏيان ڀر ڪو



-X محور يا -X محور جي پوروڇوٽ ليڪ جو لاھ ٻڙي هوندو آھي.
 -Y محور يا -Y محور جي پوروڇوٽ ليڪ جو لاھ اڻ وصفيل آھي.

حل ٿيل مثال

مثال (1) $A(-3, 5)$ ۽ $B(4, -1)$ انهن ٽپڪن مان لنگهندڙ ليڪ جو لاھ لھو.

حل : سمجھو $x_1 = -3, x_2 = 4, y_1 = 5, y_2 = -1$

$$\therefore \text{ليڪ AB جو لاھ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 5}{4 - (-3)} = \frac{-6}{7}$$

مثال (2) $P(-2, 3), Q(1, 2), R(4, 1)$ هر ليڪ آھن ثابت ڪريو.

حل : $R(4, 1), Q(1, 2), P(-2, 3)$

$$\text{ليڪ PQ جو لاھ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 3}{1 - (-2)} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{ليڪ QR جو لاھ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 2}{4 - 1} = -\frac{1}{3}$$

ليڪ PQ ۽ ليڪ QR جا لاھ ساڳيا آهن . پر

ٽپڪو Q ٻنهي ليڪن تي آھي ٻئي ليڪون هڪ

ئي آهن P, Q, R هر ليڪ آهن .

مثال (3) جيڪڏهن $P(k, 0)$ ۽ $Q(-3, -2)$ ٻنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ ليڪ جو لاھ $\frac{2}{7}$ جو لاھ k جو ملھ

حل : $P(k, 0)$ ۽ $Q(-3, -2)$

$$\text{ليڪ PQ جو لاھ} = \frac{-2 - 0}{-3 - k} = \frac{-2}{-3 - k}$$

$$\therefore \frac{-2}{-3 - k} = \frac{2}{7} \quad \therefore k = 4$$

مثال (4) $A(6, 1), B(8, 2), C(9, 4), D(7, 3)$ اهي ABCD جا نوڪي ٿيڪا $\square$ اهن ثابت ڪريو ABCD $\square$ پوروچوٽ پاسو چوڪنڊو آهي.

حل

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \text{توهان کي ڄاڻ آهي ليڪ جو لاهه}$$

$$\text{ليڪ BC جو لاهه} = \frac{2-1}{8-6} = \frac{1}{2} \quad \text{(I) ليڪ AB جو لاهه}$$

$$\text{ليڪ CD جو لاهه} = \frac{4-2}{9-8} = 2 \quad \text{(II) ليڪ BC جو لاهه}$$

$$\text{ليڪ DA جو لاهه} = \frac{3-4}{7-9} = \frac{1}{2} \quad \text{(III) ليڪ CD جو لاهه}$$

$$\text{ليڪ AB جو لاهه} = \frac{3-1}{7-6} = 2 \quad \text{(VI) ليڪ DA جو لاهه}$$

$$\text{AB جو لاهه} = \text{ليڪ CD جو لاهه} \quad \text{(I) ۽ (III) مان}$$

$$\therefore \text{ليڪ AB} \parallel \text{ليڪ CD}$$

$$\text{ليڪ BC جو لاهه} = \text{ليڪ DA جو لاهه} \quad \text{(II) ۽ (VI) مان}$$

$$\therefore \text{ليڪ BC} \parallel \text{ليڪ DA}$$

$\therefore$ ABCD $\square$ هڪ پوروچوٽ پاسو چوڪنڊو

آپياس 5.3

1. X-محور جي واڌو طرف ليڪن جي ٺهيل ڪنڊ ڏنل آهي. انهن ليڪن جو لاهه لھو

$$(1) 45^\circ \quad (2) 60^\circ \quad (3) 90^\circ$$

2. هيٺ ڏنل ٽيڪن مان لنگهندڙ ليڪ جو لاهه لھو.

$$(1) A(2, 3) \text{ ۽ } B(4, 7) \quad (2) P(-3, 1) \text{ ۽ } Q(5, -2)$$

$$(3) C(5, -2) \text{ ۽ } D(7, 3) \quad (4) L(-2, -3) \text{ ۽ } M(-6, -8)$$

$$(5) E(-4, -2) \text{ ۽ } F(6, 3) \quad (6) T(0, -3) \text{ ۽ } S(0, 4)$$

3. هيٺ ڏنل ٽيڪا هر ليڪ آهن يا نه لاهه ڪڍي چڪاس ڪريو.

$$(1) A(-1, -1), B(0, 1), C(1, 3) \quad (2) D(-2, -3), E(1, 0), F(2, 1)$$

$$(3) L(2, 5), M(3, 3), N(5, 1) \quad (4) P(2, -5), Q(1, -3), R(-2, 3)$$

$$(5) R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4) \quad (6) A(-4, 4), K(-2, \frac{5}{2}), N(4, -2)$$

4. ٽڪنڊي جا ٽي ٽيڪا $A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3)$ آهن ته هر هڪ پاسي جو لاهه لھو.

5. D(5, -4), A(-4, -7), B(-1, 2), C(8, 5) ثابت ڪريو اهي ABCD

پوروچوٽ پاسي چوڪنڊي جا نوڪي ٿيڪا آهن.

6. $R(1, -1)$ ۽ $S(-2, k)$ جي لڪ RS جو لاهه 2- آهي ته k جو ملهه لھو.
7. $B(k, -5)$ ۽ $C(1, 2)$ ان لڪ جو لاهه 7 آهي ته k جو ملهه لھو.
8. لڪ PQ || لڪ RS $P(2, 4), Q(3, 6), R(3, 1)$ ۽ $S(5, k)$ آهي ته k جو ملهه لھو.

گڏيل اڀياس 5

1. مناسب متبدل چونڊي خال ڀريو
- ليڪ AB، Y محور جي پوروچوٽ آهي $A(1, 3)$ آهي ته B جا مساوا ٿيندا.
- (A) $(3, 1)$ (B) $(5, 3)$ (C) $(3, 0)$ (D) $(1, -3)$
- (2) هيٺين مان ٽپڪو X-محور جي واڌو طرف آهي.
- (A) $(-2, 0)$ (B) $(0, 2)$ (C) $(2, 3)$ (D) $(2, 0)$
- (3) $(-3, 4)$ ٽپڪي جو منڊ ٽپڪي کان مفاصلو آهي
- (A) 7 (B) 1 (C) 5 (D) -5
- (4) هڪ لڪ X- جي واڌو طرف 30° ڪنڊ ٺاهي ٿي ان لڪ جو لاهه ٿيندو.
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\sqrt{3}$
2. هيٺ ڏنل ٽپڪا هر لڪ آهن يا نه
- (1) $A(0, 2), B(1, -0.5), C(2, -3)$
- (2) $P(1, 2), Q(2, \frac{8}{5}), R(3, \frac{6}{5})$
- (3) $L(1, 2), M(5, 3), N(8, 6)$
3. $(0, 6)$ ۽ $(12, 20)$ کي جوڙيندڙ ٽڪر جي مڌيه ٽپڪي جا مساوا لھو.
4. $A(3, 8)$ ۽ $B(-9, 3)$ جوڙيندڙ ٽڪر کي Y محور تي ڪهڙي ريشي ۾ ورهائي ٿو؟
5. X-محور تي هڪ ٽپڪو ڳولھيو جيئن اهو $P(2, 3)$ ۽ $Q(-2, 9)$ کان هر مفاصلي هجي.
6. هيٺ ڏنل ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو لھو.
- (1) $A(a, 0), B(0, a)$ (2) $P(-6, -3), Q(-1, 9)$ (3) $R(-3a, a), S(a, -2a)$
7. هڪ ٽڪنڊي جا نوڪي ٽپڪا $(1, 3), (0, -2), (-3, 1)$ آهن ته ٽڪنڊي جو مرڪز ڪا مساوا لھو.

8. هيٺ ڏنل ٽپڪن کي جوڙيندڙ ٽڪرن مان ٽڪنڊو تيار ٿي سگهي ٿو ڇا؟ ٽڪنڊو تيار ٿيڻ تي پاسن جي آڌار تي اُن جو قسم لکو.

(1) $L(6,4)$, $M(-5,-3)$, $N(-6,8)$

(2) $P(-2,-6)$, $Q(-4,-2)$, $R(-5,0)$

(3) $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $C(-\sqrt{6}, \sqrt{6})$

9. جيڪڏهن $(-12,-3)$ ۽ $(4,k)$ اِن ليڪ جو لاه $\frac{1}{2}$ ته k جو ملهه لھو.

10. $A(4, 8)$, $B(5, 5)$ انهن ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ $C(2,4)$, $D(1,7)$

انهن ٽپڪن کي ملائيندڙ جي پوروچوٽ آهي اهو ثابت ڪريو.

11. ثابت ڪريو ته $P(1,-2)$, $Q(5,2)$, $R(3,-1)$, $S(-1,-5)$ پوروچوٽ پاسي چوڪنڊي جا نوڪي ٽپڪا آهن.

12. $P(2,1)$, $Q(-1,3)$, $R(-5,-3)$ ۽ $S(-2,-5)$ آهي $\square PQRS$ ثابت ڪريو مستطيل آهي.

13. $A(-1, 1)$, $B(5, -3)$ ۽ $C(3, 5)$ نوڪي ٽپڪن واري ٽڪنڊي جا مڌيان، انهن جا مساوا لھو.

14* $D(-7, 6)$, $E(8, 5)$ ۽ $F(2, -2)$ اهي ٽڪنڊي جي پاسن جا مڌيه ٽپڪا آهن

ته اُن ٽڪنڊي جي مرڪز جا مساوا لھو.

15. $D(5, -3)$ ۽ $A(4, -1)$, $B(6, 0)$, $C(7, -2)$ ثابت ڪريو $\square ABCD$ چورس آهي.

16. $A(7, 1)$, $B(3, 5)$ ۽ $C(2, 0)$ ٽپڪن واري ٽڪنڊي جي گود مرڪز جا مساوا لھو.

17. $A(4,-3)$ ۽ $B(8,5)$ ٽڪر AB کي 3:1 ۾ ورهائيندڙ ٽپڪي جا مساوا لھو.

18* $D(2, 3)$ ۽ $A(-4, -2)$, $B(-3, -7)$, $C(3, -2)$ انهن ٽپڪن کي نمبروار جوڙڻ

سان تيار ٿيل $ABCD$ چوڪنڊي جو قسم لکو.

19* ٽڪر AB ٽپڪا S ۽ P, Q, R کي پنجن برابر حصن ۾ ورهائين ٿا

$A-P-Q-R-S-B$ ۽ $Q(12, 14)$, $S(4, 18)$ آهي ته A, P, R ۽ B جا مساوا لھو.

20. $R(3,3)$ ۽ $P(6,-6)$, $Q(3,-7)$ مان لنگهندڙ گول جي مرڪز جا مساوا ڪڍو.

21* پوروچوٽ پاسي چوڪنڊي جا ٽي نوڪي ٽپڪا $A(5,6)$, $B(1,-2)$ ۽ $C(3,-2)$

آهن ته چوٿين ٽپڪي جا ممڪن مساوان جون جوڙيون لکو.

22. $D(-3,3)$ ۽ $A(1,7)$, $B(6,3)$, $C(0,-3)$ ۾ هر هڪ اُريب جا مساوا لھو.



اچو ته سکون



- بلندي ۽ تراڻي ڪنڊ
- اوچائي ۽ مفاصلو - مثال

- علم مثلث ريشا
- علم مثلث سمانتا


ذرا ياد ڪريو



1. پرواري شڪل ڇاچي خال ڀريو

$$\sin \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}, \cos \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\tan \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$



2. لاڳاپا پورا ڪريو

(i) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \boxed{}$

(ii) $\sin \theta = \cos (90 - \boxed{})$

(iii) $\cos \theta = \sin (90 - \boxed{})$

(iv) $\tan \theta \cdot \tan (90 - \theta) = \boxed{}$

3. مساوت پوري ڪريو

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \boxed{}$

4. مثلثاتي ريشين جا ملهه لکو

(i) $\sin 30^\circ = \frac{1}{\boxed{}}$

(ii) $\cos 30^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

(iii) $\tan 30^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

(iv) $\sin 60^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

(v) $\cos 45^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

(vi) $\tan 45^\circ = \boxed{}$

نائين درجي ۾ آسان گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ سوڙهي ڪنڊن جا مثلثاتي ريشا سکيا آهن. هن سال آسان انهن ۾ آڃا به وڌيڪ ريشا سکندا سين.



ڪوسِيڪ، سِيڪ ۽ ڪاٽ ريشا (cosec, sec and cot ratios)

سائين ڪنڊي جي ضرب اُبتڙ ريشو کي ڪو سِيڪنٽ (cosecant) چئبو آهي اُن کي ٿوري ۾

$$\therefore \text{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \text{ cosec لکبو آهي.}$$

ساڳئي نموني ڪو سائين ۽ ٽنڊنٽ جي ضرب اُبتڙن کي نمبروار سِيڪنٽ (secant) ۽ ڪو ٽنڊنٽ (cotangent) ريشا چئبو آهي ٿوري ۾ انهن کي نمبروار sec ۽ cot لکبو آهي.

$$\therefore \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \text{ ۽ } \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

شڪل 6.2 ۾

$$\sin \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore \text{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{AB}{AC}} = \frac{AC}{AB}$$

هٽپاڻينيو


مطلب ، cosec θ = مخالف پاسو

$$\tan \theta = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{AB}{BC}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\frac{\text{پروارو پاسو}}{\text{مخالف پاسو}} = \cot \theta = \frac{BC}{AB}$$



شڪل 6.2

$$\cos \theta = \frac{BC}{AC}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{BC}{AC}}$$

$$= \frac{AC}{BC}$$

هٽپاڻينيو

مطلب sec θ = پروارو پاسو

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$$

$$= \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$


$$\therefore \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$



مثلائي ريشا جو پاڻ ۾ لاڳاپو

- $\frac{1}{\sin \theta} = \operatorname{cosec} \theta \quad \therefore \sin \theta \times \operatorname{cosec} \theta = 1$
- $\frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta \quad \therefore \cos \theta \times \sec \theta = 1$
- $\frac{1}{\tan \theta} = \cot \theta \quad \therefore \tan \theta \times \cot \theta = 1$

وڌيڪ ڄاڻ لاءِ



مشهور ڀارت جي رياضدان آريه پٽ جو جنم 476ع ۾ ڪسمپور ۾ ٿيو. اهو استان بهار ۾ پائنا شهر ويجهو هو. هن عددي شاستر، الجبرا، جاميٽري انهن علم رياض جي شاخائن جو خوب آڀياس ڪيو. ”آريه پٽيس“ گرنٽ ۾ ڪيترائي حسابن جا نتيجا ۽ فارمولائون لکيل آهن. مثال

(1) ارت ميٽڪ ۾ سلسلي ۾ ’n‘ پڌ لکڻ ۽ پهرين n پڌن جو جوڙ

(2) $\sqrt{2}$ جو ملهه لهڻ

(3) 3.1416π جو ملهه برابر لهڻ وغيره کڻول شاستر ۾ عام مثلث جو استعمال ڪيو. Sine Ratio

جي ڪلپنا هن پهرين استعمال ڪئي. جڳت ۾ حسابن جو گيان ڦهلجي، اُن جي گرنٽ جو پڇار سڄي ڀارت ۽ عربستان ذريعي يورپ ۾ ٿيو.

سڄ ڌرتيءَ جي چوگرد نه پر ڌرتي سڄ جي چوگرد ڦري ٿي. اهو ويچار ڪوپرنڪس پهريون ٻڌايو ائين مڃيو ويندو آهي پر اُن کان 1000 سال اڳه اِن هت بابت گرنٽ ۾ ڪيل آهي.

19 اپريل 1975 ۾ ڀارت پهريون اڻگرهه پولار ۾ ڇڏيو. اُن جو نالو ”آريه پٽ“

ڏئي ڀارت سرڪار برڪه رياضدان جو قدر ڪيو.


(θ) ڪنڊن جي ماپ					مثلثي ريشو
90°	60°	45°	30°	0°	
1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$\sin \theta$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\cos \theta$
اڻ وصفيل	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\tan \theta$
1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	اڻ وصفيل	$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$
اڻ وصفيل	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1	$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$
0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	اڻ وصفيل	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$

ڄاڻي وٺون



مثلثي برابريون (Trigonometrical identities)

پرواري شڪل 6.3 ۾ ΔABC ۾ $\angle B = 90^\circ$



شڪل 6.3

$$(i) \sin \theta = \frac{BC}{AC}$$

$$(ii) \cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$(iii) \tan \theta = \frac{BC}{AB}$$

$$(iv) \operatorname{cosec} \theta = \frac{AC}{BC}$$

$$(v) \sec \theta = \frac{AC}{AB}$$

$$(vi) \cot \theta = \frac{AB}{BC}$$

پايتاگورس سڌيان موجب

$$BC^2 + AB^2 = AC^2 \dots\dots (I)$$

(I) کي AC^2 سان ونڊ ڪرڻ

$$\frac{BC^2 + AB^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2}$$

$$\therefore \frac{BC^2}{AC^2} + \frac{AB^2}{AC^2} = 1$$

$$\therefore \left(\frac{BC}{AC}\right)^2 + \left(\frac{AB}{AC}\right)^2 = 1$$

$$\therefore (\sin\theta)^2 + (\cos\theta)^2 = 1 \dots$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \dots\dots\dots (II)$$

$(\sin\theta)^2$ اهو $\sin^2\theta$ ڪري لکيو آهي.

$(\cos\theta)^2$ اهو $\cos^2\theta$ ڪري لکيو آهي.

$$\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{\sin^2\theta}$$

$$1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta \dots\dots\dots (III)$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{\cos^2\theta}$$

$$\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$$

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta \dots\dots\dots (IV)$$

(IV), (III), ۽ (II) اهي مثلاتي ريشا برابريون آهن

حل ڪيل مثال

مثال (1) جيڪڏهن $\sin\theta = \frac{20}{29}$ ته $\cos\theta$ لھو


ٻيو طريقو

$$\sin\theta = \frac{20}{29}$$

$$\sin\theta = \frac{AB}{AC} \text{ شڪل ۾}$$

$$\therefore AB = 20k \text{ ۽ } AC = 29k$$

$$BC = x \text{ (سمجھو)}$$



شڪل 6.4

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$(20k)^2 + x^2 = (29k)^2$$

$$400k^2 + x^2 = 841k^2$$

$$x^2 = 841k^2 - 400k^2$$

$$= 441k^2$$

$$\therefore x = 21k$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{BC}{AC} = \frac{21k}{29k} = \frac{21}{29}$$

حل : پھريون طريقو

اسان کي ڄاڻ آهي

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$


$$\left(\frac{20}{29}\right)^2 + \cos^2\theta = 1$$

$$\frac{400}{841} + \cos^2\theta = 1$$

$$\cos^2\theta = 1 - \frac{400}{841}$$

$$= \frac{441}{841}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{21}{29} \text{ (ٻيو مول ڪڍندي)}$$



شکل 6.5

$$\begin{aligned} \therefore (7k)^2 + QR^2 &= (25k)^2 \\ \therefore QR^2 &= 625k^2 - 49k^2 = 576k^2 \\ \therefore QR &= 24k \\ \tan \theta &= \frac{QR}{PQ} = \frac{24k}{7k} = \frac{24}{7} \text{، هاڻي} \end{aligned}$$

مثال (2) جيڪڏهن $\sec \theta = \frac{25}{7}$ ته $\tan \theta$ لھو

طريقو II

شکل موجب

$$\sec \theta = \frac{PR}{PQ}$$

$$\therefore PQ = 7k, PR = 25k$$

پايتاگورس سڌيان موجب

$$PQ^2 + QR^2 = PR^2$$

حل : طريقو I

اسان کي ڄاڻ آهي

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\therefore 1 + \tan^2 \theta = \left(\frac{25}{7}\right)^2$$

$$\therefore \tan^2 \theta = \frac{625}{49} - 1$$

$$= \frac{625 - 49}{49}$$

$$= \frac{576}{49}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{24}{7}$$

مثال (3) جيڪڏهن $5\sin \theta - 12\cos \theta = 0$ ته $\sec \theta$ ۽ $\operatorname{cosec} \theta$ جو ملھ لھو.

حل : $5\sin \theta - 12\cos \theta = 0$

$$\therefore 5\sin \theta = 12\cos \theta$$

$$\therefore \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{12}{5}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{12}{5}$$

اسان کي ڄاڻ آهي

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\therefore 1 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \sec^2 \theta$$

$$\therefore 1 + \frac{144}{25} = \sec^2 \theta$$

$$\therefore \frac{25 + 144}{25} = \sec^2 \theta$$

$$\therefore \sec^2 \theta = \frac{169}{25}$$

$$\therefore \sec \theta = \frac{13}{5}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{5}{13}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{، هاڻي}$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{25}{169}$$

$$= \frac{144}{169}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{12}{13}$$

$$\therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{12}$$

مثال (4) $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ جو ملھ لھو، $\frac{1 - \sec \theta}{1 + \operatorname{cosec} \theta}$

طریقو II

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \therefore \theta &= 30^\circ \\ \therefore \sec \theta &= \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \operatorname{cosec} \theta &= \operatorname{cosec} 30^\circ = 2 \\ \therefore \frac{1 - \sec \theta}{1 + \operatorname{cosec} \theta} &= \frac{1 - \frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + 2} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 2}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 2}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

حل : طریقو I

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ \therefore \sin^2 \theta + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 &= 1 \\ \therefore \sin^2 \theta &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \\ \therefore \sin \theta &= \frac{1}{2} \quad \therefore \operatorname{cosec} \theta = 2 \\ \therefore \frac{1 - \sec \theta}{1 + \operatorname{cosec} \theta} &= \frac{1 - \frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + 2} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 2}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 2}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

مثال (5) ثابت کریو، $\sec X + \tan X = \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$

حل : $\sec X + \tan X = \frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1 + \sin x}{\cos x} \\ &= \sqrt{\frac{(1 + \sin x)^2}{\cos^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{(1 + \sin x)(1 + \sin x)}{1 - \sin^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{(1 + \sin x)(1 + \sin x)}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}} \\ &= \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}\end{aligned}$$

مثال (6) ہیپت مساوتن پر θ ہتایو

$$x = a \cot \theta - b \operatorname{cosec} \theta$$

$$y = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta$$

$$x = a \cot \theta - b \operatorname{cosec} \theta \quad \dots\dots\dots (I) \quad \text{حل}$$

$$y = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta \quad \dots\dots\dots (II)$$

(I) ۽ (II) جوڑ کرڻ

$$x + y = 2a \cot \theta$$

$$(III) \quad \therefore \cot \theta = \frac{x+y}{2a} \quad \dots\dots\dots$$

(I) ۽ (II) ڪٽ کرڻ

$$y - x = 2b \operatorname{cosec} \theta$$

$$(IV) \quad \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{y-x}{2b} \quad \dots\dots\dots$$

$$\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1 \quad \text{هاڻي}$$

$$\therefore \left(\frac{y-x}{2b} \right)^2 - \left(\frac{y+x}{2a} \right)^2 = 1$$

$$\therefore \frac{(y-x)^2}{4b^2} - \frac{(y+x)^2}{4a^2} = 1$$

$$\left(\frac{y-x}{b} \right)^2 - \left(\frac{y+x}{a} \right)^2 = 4$$

آپياس 6.1

1. جيڪڏهن $\sin \theta = \frac{7}{25}$ ته $\cos \theta$ ۽ $\tan \theta$ ملهه لھو.

2. جيڪڏهن $\tan \theta = \frac{3}{4}$ ته $\sec \theta$ ۽ $\cos \theta$ ملهه لھو.

3. جيڪڏهن $\cot \theta = \frac{40}{9}$ ته $\operatorname{cosec} \theta$ ۽ $\sin \theta$ جا ملهه لھو.

4. جيڪڏهن $5 \sec \theta - 12 \operatorname{cosec} \theta = 0$ ته $\sec \theta$ ، $\cos \theta$ ۽ $\sin \theta$ جا ملهه لھو.

5. جيڪڏهن $\tan \theta = 1$ ته $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta}$ ملهه لھو.

6. ثابت ڪريو

$$(1) \quad \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$$

$$(2) \quad \cos^2 \theta (1 + \tan^2 \theta) = 1$$

$$(3) \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = \sec\theta - \tan\theta$$

$$(4) (\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta) = \tan\theta \cdot \sec\theta$$

$$(5) \cot\theta + \tan\theta = \operatorname{cosec}\theta \cdot \sec\theta$$

$$(6) \frac{1}{\sec\theta - \tan\theta} = \sec\theta + \tan\theta$$

$$(7) \sec^4\theta - \cos^4\theta = 1 - 2\cos^2\theta$$

$$(8) \sec\theta + \tan\theta = \frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$$

$$(9) \tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} = 2 \quad \text{تم ثابت ڪريو} \quad \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2 \quad \text{جيڪڏهن}$$

$$(10) \frac{\tan A}{(1+\tan^2 A)^2} + \frac{\cot A}{(1+\cot^2 A)^2} = \sin A \cos A$$


$$(11) \sec^4 A (1 - \sin^4 A) - 2\tan^2 A = 1$$

$$(12) \frac{\tan\theta}{\sec\theta - 1} = \frac{\tan\theta + \sec\theta + 1}{\tan\theta + \sec\theta - 1}$$

ڄاڻي وٺون



علم مثلث جو اُپيُوَ (Application of trigonometry)



شڪل 6.6

گهڻي دفعا آسان منارا، عمارتون، وڻن وغيره جي اوچائي يا جهاز جي روشني گهر کان مفاصلو يا ندي جي ويڪر وغيره جي ڄاڻ ڪپندي آهي. اهي مفاصلا آسان ماپي نه ٿا سگهون پر مثلاًتون ريشا ڪم آڻي اوچائي ۽ مفاصلا لهي سگهون ٿا. اوچائي يا مفاصلا ڏنل ڄاڻ موجب ڪچي شڪل ٺاهي ٽڪريون، منارا، آهڙيون جڳهيون زمين تي عمود ۾ آهن


اهو ڏيکارڻ لاءِ شڪل ۾ ليڪ ٽڪرن جو استعمال ڪنداسين ڏسندڙ جي نظر برابر شڪل ڪڍي آسان اوچائي ۽ مفاصلا لهي سگهون ٿا.

پهريان آسان ڪجهه ڀڌ سمجهندا سين

(i) درشتي ليڪ (Line of vision):


درشتي ليڪ ٽپڪي A وٽ بينل ڇاپيندڙ ٽپڪو B ڏسي ٿو ته ليڪ AB اها درشتي ليڪ آهي.

(ii) بلنديءَ واري ڪنڊ: (Angle of elevation)



جيڪڏهن A ۽ B ٽپڪا اهڙي نموني آهن جو B جي اوچائي A کان وڌيڪ آهي ۽ $\angle MAB$ مٿان ڪڍيل سڌي ليڪ آهي ته $\angle MAB$ کي بلنديءَ واري ڪنڊ چئجي ٿو.

(iii) تراڻيءَ واري ڪنڊ (Angle of depression):



A ۽ B ٽپڪا اهڙي نموني آهن جو AC کان وڌيڪ آهي. ۽ $\angle MAC$ سڌي ليڪ $\angle MAC$ کي تراڻيءَ واري ڪنڊ چئبو آهي.

جڏهن آسان نظر مٿي ڪري نھاريون ٿا ته بلنديءَ واري ڪنڊي ٺھي ٿي.
جڏهن آسان نظر هيٺ ڪري نھاريون ٿا ته تراڻيءَ واري ڪنڊ ٺھي ٿي.

حل ڪيل مثال

مثال (1) هڪ وٺ کان 10 م مفاصلي تي بينل ڇاپيندڙ جي وٺ جي چوٽيءَ تي نھارڻ سان 60° ماپ واري بلنديءَ واري ڪنڊ ٺھي ٿي ته وٺ جي اوچائي لھو ($\sqrt{3} = 1.73$)

حل : شڪل 6.9 ۾ 'C' ڇاپيندڙ ۽ AB وٺ آھي

BC = 10 م بلنديءَ واري ڪنڊ

$$\angle BCA = 60^\circ$$

$$\tan \theta = \frac{AB}{BC} \dots\dots\dots (I)$$


$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \sqrt{3} \dots\dots\dots (I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان}$$

$$\therefore AB = BC \sqrt{3} = 10 \sqrt{3}$$

$$\therefore AB = 10 \times 1.73 = 17.3 \text{ م}$$

وٺ جي اوچائي 17.3 م.



شڪل 6.9


مثال (2) 40 م اوچائي عمارت جي ڇت کان، ڪجهه ميٽر مفاصلي هڪ بيٺل اسڪوٽر کي ڏسڻ سان 30° ماپ واري ترائيءَ واري ڪنڊ ٺهي ٿي ته اهو اسڪوٽر عمارت کان ڪيترو پري آهي ($\sqrt{3} = 1.73$)

حل : شڪل ۾ A جاچيندڙ آهي.

AM لپٽيل ليڪ آهي

$\angle MAC$ اها ترائيءَ واري ڪنڊي

$\angle MAC$ ۽ $\angle ACB$ متبادل ڪنڊون



شڪل 6.10

$$\tan 30^\circ = \frac{AB}{BC} \quad \text{سمجھو}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{40}{x}$$

$$\therefore x = 40\sqrt{3}$$

$$= 40 \times 1.73$$

$$= 69.20 \text{ م}$$

اسڪوٽر عمارت کان 69.20 م پري آهي.

مثال (3) نديءَ جي ويڪر ڄاڻڻ لاءِ هڪ ماڻهو نديءَ جي ٻئي پاسي وٺ جي چوٽيءَ تي نهارڻ سان 61° ماپ واري بلندي واري ڪنڊ ٺاهي ٿو. اڃان وڌيڪ 50 م پري وڃڻ سان اها ڪنڊ 35° بلنديءَ واري ڪنڊ ٺهي ٿي ته نديءَ جي ويڪر ۽ وٺ جي اوچائي لھو.

$$(\tan 61^\circ \approx 1.8, \tan 35^\circ \approx 0.7)$$


حل : A وٺ جي چوٽي آهي

BC نديءَ جي ويڪر آهي

وٺ جي اوچائي = h

نديءَ جي ويڪر = x

$$\tan 61^\circ = \frac{h}{x}$$



شڪل 6.11

$$\therefore 1.8 = \frac{h}{x}$$

$$h = 1.8 \times x$$

$$10h = 18x \dots\dots\dots (I) \dots\dots (10 \text{ سان ضرب ڪرڻ})$$

$$\tan 35 = \frac{h}{x + 50}$$

$$0.7 = \frac{h}{x + 50}$$

$$\therefore h = 0.7 (x + 50)$$

$$\therefore 10h = 7 (x + 50) \dots\dots\dots (II)$$

[(I) ۽ (II) مان]


$$18x = 7(x + 50)$$

$$\therefore 18x = 7x + 350$$

$$\therefore 11x = 350$$

$$\therefore x = \frac{350}{11} = 31.82$$

$$\therefore h = 1.8x = 1.8 \times 31.82 = 57.28$$



شڪل 6.12

نديءَ جي ويڪر 31.82 م ۽ وٺ جي اوچائي 57.28 م

مثال (4) روشني گهر جي دروازي تي بيٺي هئي. گهر کان ٿورو پري هڪ وٺ جي چوٽيءَ تي کيس هڪ پڪي نظر آيو. اُن جي نظر سان 61° بلنديءَ واري ڪنڊ هئي پڪيءَ کي چڱيءَ طرح ڏسڻ لاءِ هو گهر کان مٿي 4 ميٽر دريءَ تان پڪي ڏسڻ وقت بلنديءَ واري ڪنڊ 52° ٿي. ٻڌايو ته پڪي زمين کان مٿي ڪيتري اوچائي تي (جواب سچن انگن ۾ لھو)

$$(\tan 61^\circ = 1.80, \tan 52^\circ = 1.28, \tan 29^\circ = 0.55, \tan 38^\circ = 0.78)$$

مثال : سمجھو شڪل 6.12 ۾ PQ گهر ۽ SR وٺ

آهي ٽڪر $\perp RS$ ٽڪر QT ڪڍو

$\therefore \square TSPQ$ مستطيل آهي.

سمجھو $TR = y, SP = x$

$$\angle PRS = 90^\circ - 61^\circ = 29^\circ, \text{ ۾ } \triangle RSP$$

$$\angle QRT = 90^\circ - 52^\circ = 38^\circ, \text{ ۾ } \triangle RTQ$$

$$\therefore \tan \angle PRS = \tan 29^\circ = \frac{SP}{RS}$$

$$\therefore 0.55 = \frac{x}{y+4}$$

$$\therefore x = 0.55(y + 4) \dots\dots\dots (I)$$

$$\tan \angle QRT = \frac{TQ}{RT}$$

$$\therefore \tan 38^\circ = \frac{x}{y} \dots\dots\dots [\because SP = TQ = x]$$

$$\therefore 0.78 = \frac{x}{y}$$

$$\therefore x = 0.78y \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore 0.78y = 0.55(y + 4) \dots\dots\dots (I) \text{ ۽ } (II) \text{ مان}$$

$$\therefore 78y = 55(y + 4)$$

$$\therefore 78y = 55y + 220$$

$$\therefore 23y = 220$$

$$\therefore y = 9.565 = 10 \text{ سڄن انگن ۾}$$

$$\therefore RS = y + 4 = 10 + 4 = 14$$


$\therefore$ پکي زمين کان 14 ميٽر اوچائي تي آهي.

مثال (5) طوفان سبب هڪ وٺ جي ڪرڻ سان اُن جو مٿيون حصو زمين تي ڪري، اُن سان 30 ڪنڊ

ٺاهي ٿو وٺ جي پڙل چوٽي ۽ ٿڌ ۾ مفاصلو 10 م آهي ته سڄي وٺ جي اوچائي لھو.

حل : شڪل 6.13 ۾ AB وٺ جي A چوٽي آهي. طوفان سبب 'C' ٽپڪي تان ڪري اِهو هيٺ D

ٽپڪي تي پھتو.



$$\angle CDB = 30^\circ, BD = 10 \text{ م}, BC = x \text{ م}$$

$$CA = CD = y$$

$$\Delta CDB \text{ ۾,}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{BC}{BD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{10}$$

$$x = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

$$y = \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$x + y = \frac{10}{\sqrt{3}} + \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{30}{\sqrt{3}}$$

$$x + y = 10\sqrt{3}$$

وٽ جي اوچائي $10\sqrt{3}$ ميٽر آهي

آپياس 6.2

- هڪ ماڻهو هڪ چرچ کان 80 م مفاصلي تي آهي هن جي چرچ جي ڇت نهارڻ سان، بلنديءَ واري ڪنڊ 45° ٺهي ٿي ته چرچ جي اوچائي لھو.
- هڪ روشني گھر کان جھاز نھارڻ سان 60° ٽرائيءَ واري ڪنڊ ٺھي ٿي روشني گھر جي اوچائي 90 م آھي تہ اھو جھاز روشني گھر کان ڪيترو پري آھي ($\sqrt{3} = 1.73$)
- 12 ميٽر ويڪر رستي جي ٻنهي پاسي آمھون سامھون ٻہ عمارتون آھن 10 م اوچائيءَ واري هڪ عمارت کان ٻئي عمارت جي ڇت نھارڻ سان 60° بلنديءَ واري ڪنڊ ٺھي ٿي تہ ٻي عمارت جي اوچائي ڪيتري؟
- 18 م 7 م ٻہ ٽنڀا زمين تي اُڀا آھن. انھن جي چوٽين کي ملائيندڙ تار جي ڊيگھ 22 م آھي تہ تار جي ليتيل ليڪ سان ٺھندڙ ڪنڊ لھو.
- طوفان سبب هڪ وٽ جي ڪرڻ سان ٽٽل حصو زمين تي ڪري، زمين سان 60° ڪنڊ ٺاھي ٿو. اُھو ٿڌ کان 20 م مفاصلي تي آھي تہ اصلي وٽ جي اوچائي لھو.
- هڪ لغڙ زمين کان 60° م مفاصلي تي اڏامي رھيو آھي لغڙ جي ڌاڳي جو هڪ ڇيڙو زمين تي ٿوري وقت لاءِ پڪو ٻڌو ويو ان ڌاڳي جي زمين سان ٺھيل ڪنڊ 60° آھي تہ ڌاڳي جي ڊيگھ لھو ($\sqrt{3} = 1.73$)

1. مناسب متبدل جواب چونڊيو

$$\dots\dots = \sin\theta \cdot \operatorname{cosec}\theta \quad (1)$$

$$(A) 1 \quad (B) 0 \quad (C) \frac{1}{2} \quad (D) \sqrt{2}$$

(2) $\operatorname{cosec}45^\circ$ جو ملهه ڪيترو؟

$$(A) \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (B) \sqrt{2} \quad (C) \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (D) \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\dots\dots = \theta^{\operatorname{cosec}} + 1 \quad (3)$$

$$(A) \cot^2\theta \quad (B) \operatorname{cosec}^2\theta \quad (C) \sec^2\theta \quad (D) \tan^2\theta$$

(4) ليتيل ليڪ کان مٿي نهارڻ سان ڪندڙ نه ٿي.

(A) بلنديءَ واري (B) ترائيءَ واري (C) ٻڙي (D) سڌي

2. جيڪڏهن $\sin\theta = \frac{11}{61}$ ته (مثلا تي برابريون ڪر آڻي $\cos\theta$ لھو).

3. جيڪڏهن $\tan\theta = 2$, ته سڀ ريشا لھو

4. جيڪڏهن $\sec\theta = \frac{13}{12}$ ته سڀ ريشا لھو

5. ثابت ڪريو

$$(1) \sec\theta (1 - \sin\theta) (\sec\theta + \tan\theta) = 1$$

$$(2) (\sec\theta + \tan\theta) (1 - \sin\theta) = \cos\theta$$

$$(3) \sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = \sec^2\theta \times \operatorname{cosec}^2\theta$$

$$(4) \cot^2\theta - \tan^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - \sec^2\theta$$

$$(5) \tan^4\theta + \tan^2\theta = \sec^4\theta - \sec^2\theta$$

$$(6) \frac{1}{1 - \sin\theta} + \frac{1}{1 + \sin\theta} = 2 \sec^2\theta$$

$$(7) \sec^6x - \tan^6x = 1 + 3\sec^2x \times \tan^2x$$

$$(8) \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} + \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta}$$

$$(9) \frac{\tan^3 \theta - 1}{\tan \theta - 1} = \sec^2 \theta + \tan \theta$$

$$(10) \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}$$

6. هڪ چوڪرو هڪ عمارت کان 48 م پري بيٺو آهي عمارت جي چوٽي نهارڻ سان چوڪرو 30 ماپ واري بلندي واري ڪنڊ ٺاهي ٿو ته عمارت جي اوچائي لھو.

7. هڪ روشني گھر کان جهاز نهارڻ سان 30° جي ترائيءَ واري ڪنڊ ٺهي ٿي جيڪڏهن روشني گھر جي اوچائي 100 م آهي ته اهو جهاز روشني گھر کان ڪيترو پري آهي؟

8. 15 م ويڪر رستي جي ٻنهي طرف آمهون سامهون ٻه عمارتون آهن 12 م اوچائيءَ واري عمارت جي ڇت تان ٻي عمارت جي ڇت ڏسڻ سان بلنديءَ واري ڪنڊ 30° ٺهي ٿي. ته ٻي عمارت جي اوچائي لھو.

9. باهم وسائڻ واري گاڏي ڏاکڻ وٽ ۾ وٽ 70° مٿي وڃي سگهي ٿي اُن وقت اُنجي وٽ ۾ وٽ ڊيگھ 20 م آهي آهي. ڏاکڻ گاڏيءَ مٿان زمين کان 2 م اوچائي تي آهي ٻڌايو ته ڏاکڻ جو ٻيو ڇيڙو وٽ ۾ وٽ ڪيتري اوچائي تائين پهچندو. ($\sin 70^\circ \approx 0.94$)

10. آسمان ۾ اڏامندڙ جهاز ۾ پائليٽ ايئر پورٽ تي لهڻ وقت ترائيءَ واري ڪنڊ 20° ڪئي. اُن وقت جهاز جي سراسري رفتار 200 ڪ م في ڪلاڪ هئي اهو جهاز 54 سيڪنڊن ۾ ايئرپورٽ تي لٿو لهڻ وقت اُها هوائي جهاز زمين کان مٿي ڪيتري اوچائي تي هو. ($\sin 20^\circ \approx 0.342$)







ڄاڻي وٺون





- جدا جدا شڪلين ڪعب جي
- گول ڪمان - ڊيگهه
- مٿاڇرو ايراضي ۽ مقدار بابت
- گول - ٽڪر ايراضي
- گڏيل مثال

ذرا ياد ڪريو




نمبر	ت - ماڻي شڪل	سوتر
1 .	مستطيل بلاڪ 	اُڀن مٿاڇرن جي ايراضي $2h(l + b) =$ ڪل مٿاڇرو ايراضي $2(lb + bh + hl) =$ مقدار $lbh =$
2 .	ڪعب 	اُڀن مٿاڇرن جي ايراضي $4l^2 =$ ڪل مٿاڇرو ايراضي $6l^2 =$ مقدار $l^3 =$
3 .	سليندر 	اُڀن مٿاڇرن جي ايراضي $2\pi rh =$ ڪل مٿاڇرو ايراضي $2\pi r(r + h) =$ مقدار $\pi r^2 h =$
4 .	ڪون (مخروط) 	اُڀن مٿاڇرن جي ايراضي $(l) = \sqrt{h^2 + r^2}$ $\pi rl =$ $\pi r(r + l) =$ $\frac{1}{3} \times \pi r^2 h =$

نمبر	ت - ماڀي شڪل	سوتر
5.	گولو 	مٿاڇڙو ايراضي $4\pi r^2 =$ مقدار $\frac{4}{3}\pi r^3 =$
6.	اڌ گولو 	وريئل مٿاڇڙو ايراضي $2\pi r^2 =$ ڪل مٿاڇڙو ايراضي $3\pi r^2 =$ مقدار $\frac{2}{3}\pi r^3 =$

هيٺيان مثال حل ڪريو


مثال (1)



شڪل 7.1

پرواري شڪل ۾ 30 س م اوچائي، 20 س م ڊيگھ ۽ 20 س م ويڪر هڪ تيل جو دٻو آهي ان ۾ ڪيترا ليٽر تيل ماپندو؟ (1 لٽر = 1000 س³ م)

مثال (2)



شڪل 7.2

پرواري شڪل ۾ هڪ مسخري جي ٽوپي ڏيکاريل آهن ان ٽوپيءَ کي تيار ڪرڻ ۾ ڪيترو ڪپڙو لڳندو.

ويچار ڪريو



پرواري شڪل ۾ هڪ سلينڊر آندو هڪ بال رکيل آهي اهو بال سلينڊر جي تري ۽ پاسن کان ڇهي ٿو سلينڊر جو ٽيئر قطر r آهي ته




شڪل 7.3


(1) بال جو ٽيئر قطر ڪيترو؟

(2) سلينڊر ۽ بال جي وريئل مٿاڇڙن جي ايراضي جو ريشو ڪيترو؟


(3) سلينڊر ۽ بال جي مقدارن جو ريشو ڪيترو؟



شکل 7.6



شکل 7.5



شکل 7.4

مٽي ڏنل شڪلين موجب هڪ بال ۽ بال جي نيسر قطر برابر (r) هڪ بيڪر کڻو بيڪر جي قطر جي ڊيگهه ($2r$) واري هڪ ڪاغذ جي پٽي کڻو ان ڊيگهه جا 3 برابر حصا ڪندڙ ۾ ليڪون پٽيءَ تي ڪڍو. اها پٽي بيڪر ۾ تري کان اُڀي چڪايو. بيڪر ۾ هيٺ پٽيءَ جي پهرين پاڻي تائين پاڻي ڀريو پوءِ اهستي اهستي بيڪر ۾ بال تريءَ تائين رکو. هاڻي بيڪر ۾ پاڻيءَ جي سنوت وڌندي اهو ڇاپيو پاڻيءَ جي سنوت ڪاغذ جي ٽئين پاڻي تائين پهچي ٿي.

ان مان اسان بال جي مقدار بابت سوتر سکنداسين بيڪر سلينڊر شڪل جو آهي. سمجهو بيڪر جو مقدار V آهي.

$$V = \pi \times r^2 \times 2r = 2\pi r^3 \quad (\text{پاڻيءَ اوچائي})$$

$$\frac{1}{3} \times 2\pi r^3$$

$$\therefore \text{اڳوڻو وارو پاڻيءَ جو مقدار} = 2\pi r^3 - \frac{1}{3} \times 2\pi r^3$$

$$= 2\pi r^3 - \frac{2}{3} \pi r^3 \quad \text{بال جو مقدار}$$

$$= \frac{6\pi r^3 - 2\pi r^3}{3} = \frac{4\pi r^3}{3} \quad \text{بال جو مقدار}$$

$$\therefore V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad \text{اهڙي نموني گولي جو مقدار}$$

ان سوتر جو استعمال ڪري شڪل 7.3 سوال نمبر 3 جو جواب توهان لهي سگهو ٿا.

مثال (1) هڪ سلينڊر آڪار پاڻيءَ جي ٽانڪيءَ جو نيم قطر 2.8 م ۽ اوچائي 3.5 م آهي اُن ٽانڪيءَ ۾ ڪيترا ليٽر پاڻي ماپندو؟ هڪ ماڻهوءَ کي روز سراسري 70 ليٽر پاڻي گهرجي ته سڄي پريل ٽانڪي ڪيترن ماڻهن لاءِ پوري ٿيندي. ($\pi = \frac{22}{7}$)

حل : نيم قطر $r = 2.8$ م، اوچائي $h = 3.5$ م $\pi = \frac{22}{7}$

سلينڊر ٽانڪيءَ جو مقدار = پاڻيءَ جي ٽانڪيءَ جي گنجائيس

$$= \pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times 2.8 \times 2.8 \times 3.5$$

$$= 86.24 \text{ م}^3$$

(ليٽر $1 \text{ م}^3 = 1000$) $\therefore$ ليٽر 86.24×1000

$$= 86240.00 \text{ ليٽر}$$

$\therefore$ ٽانڪيءَ ۾ 86240 ليٽر پاڻي آهي هڪ ماڻهوءَ لاءِ 70 ليٽر

$$\frac{86240}{70} = 1232$$

$\therefore$ ڪپٽ 1232 ماڻهن لاءِ

مثال (2) 30 س م نيم قطر واري نهري پريل گولي کي ٻياري 6 س م اوچائي ۽ 10 س م نيم قطر وارا نهرا پريل سلينڊر تيار ڪيا ويا. ٻڌايو ته ڪل ڪيترا سلينڊر تيار ڪيا ويا.

حل : 30 س م $r =$ گولي جو نيم قطر
 10 س م $R =$ سلينڊر جو نيم قطر
 30 س م $h =$ سلينڊر جي اوچائي
 سمجھ 'h' سلينڊر تيار ٿين ٿا.
 ڪل 60 سلينڊر تيار ٿيندا.


$$\frac{\text{گولي جو مقدار}}{\text{هڪ سلينڊر جو مقدار}} = \pi$$

$$= \frac{\frac{4}{3} \pi (r)^3}{\pi (R)^2 H}$$

$$= \frac{\frac{4}{3} \times (30)^3}{10^2 \times 6} = \frac{\frac{4}{3} \times 30 \times 30 \times 30}{10 \times 10 \times 6} = 60$$

$\therefore$ ڪل 60 سلينڊر تيار ٿيندا.

مثال (3) سرڪس جي ٽنبو جو هيٺيون حصو سلينڊر ۽ مٿيون حصو ڪون (مخروط) شڪل جو آهي
 تري جو قطر 48 م ۽ سلينڊر حصي جي اوچائي 15 م آهي ٽنبوءَ جي ڪل اوچائي 33
 ميٽر آهي ته ٽنبو ٺاهڻ لاءِ گهربل ڪپڙي جي ايراضي ۽ ٽنبوءَ اندر هوا جو مقدار لھو.
 حل : ٽنبوءَ جي ڪل اوچائي 33 م



شڪل 7.7

سلينڊر جي اوچائي $H = 15$

$\therefore$ ڪون حصي جي اوچائي $h = (33 - 15) = 18$

ڪون جي آڏائي اوچائي $(l) = \sqrt{r^2 + h^2}$

$$= \sqrt{24^2 + 18^2}$$

$$= \sqrt{576 + 324}$$

$$= \sqrt{900}$$

$$l = 30 \text{ م}$$

ڪون جي حصي وريل مٿاڇرو ايراضي + سلينڊر حصي جي وريل ايراضي = سرڪس جي ٽنبوءَ ۾ لڳندڙ ڪپڙو

$$= 2\pi rH + \pi rl$$

$$= \pi r (2H + l)$$

$$= \frac{22}{7} \times 24 (2 \times 15 + 30)$$

$$= \frac{22}{7} \times 24 \times 60$$

$$= 4525.71 \text{ چورس ميٽر}$$

ڪون حصي جو مقدار + سلينڊر حصي جو مقدار = ٽنبوءَ اندر هوا جو مقدار

$$= \pi r^2 H + \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \pi r^2 \left(H + \frac{1}{3} h \right)$$

$$= \frac{22}{7} \times 24^2 \left(15 + \frac{1}{3} \times 18 \right)$$


$$= \frac{22}{7} \times 576 \times 21$$

$$= 38,016 \text{ ڪعب م}$$


چورس ميٽر 4525.71 = ٽنبوءَ ۾ لڳندڙ ڪپڙو

ڪعب م 38016 = هوا جو مقدار.

1. هڪ ڪون جي تري جو نيم قطر 1.5 س م آهي ۽ اُن جي عمودي اوچائي 5 س م ته اُن ڪون جو مقدار لھو.
2. 6 س م قطر واري گولي جو مقدار لھو.
3. هڪ سلينڊر جو نيم قطر 5 س م ۽ اوچائي 40 س م ته اُن جي ڪل مٿاڇڙو ايراضي لھو.
4. هڪ گولي جو نيم قطر 7 س م آهي ته اُن گولي جي وريل مٿاڇڙو ايراضي لھو.
5. هڪ مستطيل بلاڪ شڪل ڏاتوءَ جي ڊيگهه، ويڪر اوچائي نمبر وار 44 س م 21 س م ۽ 12 س م آهي اُن مان 24 س م اوچائيءَ وارو ڪون (مخروط) تيار ڪيو ته ڪون جو نيم قطر لھو.




شڪل 7.8 ڪون شڪل
پاڻيءَ جي جڳهه




شڪل 7.8 سلينڊر
شڪل پاڻيءَ جي جڳهه

6. شڪل 7.8 ۽ 7.9 ۾ برتنن جون ماپون ڏسي ٻڌايو ته سلينڊر شڪل برتن مان ڪيتريون جڳون پاڻيءَ جون ڀري سگهندا؟




شڪل 7.10

7. سلينڊر ۽ ڪون جا پايا ساڳيا آهن سلينڊر حصي جي اوچائي 3 س م ۽ 400 ا پايي جي ايراضي 100 چ م آهي سڄي ڪعب شڪل جو مقدار 500 ڪعب س م ته سڄي شڪل جي اوچائي لھو.



شڪل 7.11

8. ڀر واري شڪل ۾ ڏنل رانديڪي ۾ اڌ گولو، سلينڊر ۽ ڪون پاڻيا آهن ان رانديڪي جي ڪل مٿاڇڙو ايراضي لھو.



شڪل 7.13

10. شڪل 7.13 ۾ هڪ اڌ گول ۽ ڪون جي مدد سان ٺهيل رانديڪو آهي ڏنل ماپن موجب رانديڪي جو مقدار ۽ مٿاڇڙو ايراضي لھو.


$$(\pi = 3.14)$$

9. شڪل 7.12 ۾ هڪ سلينڊر شڪل 10 س م ڊيگهه جو ڪئپسول آهي هڪ گوريءَ جو نيم قطر 7mm ۽ اوچائي 5mm آهي ته اُن ۾ ڪيتريون گوريون ماپينديون؟




شڪل 7.12

11 شکل 7.14 ۾ ڏيکاريل بال جو مٿاڇرو ايراضي ۽ مقدار لھو.



شکل 7.14

12. شکل ۾ ڏيکاريل هڪ سلينڊر آڪار واري گلاس ۾ پاڻي آهي ان ۾ 2 س م نير قطر واري گولو ٻڌل آهي ته پاڻي جو مقدار لھو.




شکل 7.15

ڄاڻي ونئون




ڪون - ٽڪر (frustum of the cone)


آسان پاڻي پيئڻ لاءِ گلاس استعمال ڪندا آهيون ان گلاس جو آڪار ڪون - ٽڪر آهي.




شکل 7.16




شکل 7.17



شکل 7.18




شکل 7.19



شکل 7.20

شکل ۾ هڪ ڪون اُٺو رکيل آهي ان ڪون جي پايي جي پورو چوٽ ڪپڻ سان اُنجا ٻه حصا تيار ٿيا هڪ حصو ڪون آڪار آهي ٻئي رهيل حصي کي ڪون - ٽڪر چئبو آهي. اِهو لفظ لئٽن ٻولي جي (frustum) مان نڪتل آهي. مطلب ”ڪپيل حصو“ ڪون وانگر ئي ڪون - ٽڪر جي مٿاڇرو ايراضي ۽ مقدار ڪڍڻي پوندي آهي. اُن لاءِ اڳتي سوترن جو استعمال ڪرڻ وارا آهيون.



شڪل 7.21

h = ڪون ٽڪر جي اوچائي l = ڪون ٽڪر جي آڌي اوچائي

r_1 ۽ r_2 = گولاڪار مٿاڇري جا نيم قطر ($r_1 > r_2$)

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2} = \text{آڌي اوچائي}$$

$$\pi l (r_1 + r_2) = \text{وريل مٿاڇرو ايراضي}$$

$$\pi l (r_1 + r_2) + \pi r_1^2 + \pi r_2^2 = \text{ڪل مٿاڇرو اوچائي}$$


$$\frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 \times r_2) = \text{مقدار}$$

حل ڪيل مثال

مثال (1) 1 هڪ ڪون - ٽڪر جي بالٽيءَ جي اوچائي 28 س م آهي. بالٽيءَ جي ٻنهي گولاڪار پاسن جا نيم قطر 12 س م ۽ 15 س م ته بالٽيءَ ۾ ڪيترا ليٽر پاڻي ماپندو؟ ($\pi = \frac{22}{7}$)

$$h = 28 \quad r_2 = 12 \quad r_1 = 15 \quad \text{حل}$$

ڪون ٽڪر جو مقدار بالٽيءَ جي گنجائش



شڪل 7.22

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 \times r_2) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 28 (15^2 + 12^2 + 15 \times 12) \\ &= \frac{22 \times 4}{3} \times (225 + 144 + 180) \\ &= \frac{22 \times 4}{3} \times 549 \\ &= 88 \times 183 \\ &= 16104 \text{ س م}^3 = 16.104 \text{ ليٽر} \end{aligned}$$

بالٽيءَ ۾ 16.104 ليٽر پاڻي ماپندو

مثال (2) ڪون ٽڪر جي گولاڪار حصن جا نيم قطر 14 س م ۽ 8 س م آهي جي ان جي اوچائي

8 س م آهي ته هيٺ ڏنل ملهه لھو ($\pi = 3.14$)

(i) وريل مٿاڇرو ايراضي (ii) ڪل مٿاڇرو ايراضي (iii) مقدار

$$r_1 = 14, r_2 = 8, h = 8 \quad \text{حل}$$

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}$$

$$l = \sqrt{8^2 + (14 - 8)^2}$$

$$l = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ س م}$$

ڪون ٽڪر جي وريل مٿاڇڙو ايراضي $l = \pi(r_1 + r_2)$

$$= 3.14 \times (14 + 8) \times 10$$

ڪون ٽڪر جي چورس ميٽر = 690.8

ڪل مٿاڇڙو ايراضي $\pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi(r_1 + r_2)l$

$$= 3.14 \times 10 (14 + 8) + 3.14 \times 14^2 + 3.14 \times 8^2$$

$$= 690.8 + 615.44 + 200.96$$

$$= 690.8 + 816.4$$

چورس ميٽر = 1507.2

$$= \frac{1}{3} \pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 \times r_2) \text{ مقدار}$$

$$= \frac{1}{3} \times 3.14 \times 8 (14^2 + 8^2 + 14 \times 8)$$

$$= 3114.88 \text{ چورس ميٽر}$$

آپيٽاس 7.2

1. 30 س م اوچائي واري ڪون ٽڪر آڪار واري بالٽيءَ جا گولاڪار پاسن جا نيٺ قطر 14 س م ۽ 7 س م آهن ته ان بالٽيءَ ۾ ڪيترا ليٽر پاڻي ماپندو؟

(1 ليٽر = 1000 ڪعب س م)

2. ڪون ٽڪر جي گولاڪار حصن جا نيٺ قطر 14 س م ۽ 6 س م آهن ان جي اوچائي 6 س م آهي ته هيٺ ڏنل ملهه لھو. ($\pi = 3.14$)

(i) ڪون ٽڪر جي وريل مٿاڇڙو ايراضي (ii) ڪل مٿاڇڙو ايراضي (iii) مقدار

3. شڪل 7.23 ۾ هڪ ڪون ٽڪر جي گولاڪار پائين جا گھير 132 س م ۽ 88 س م آهن سندس اوچائي

24 س م آهي ته ان جڻي وريل مٿاڇڙو ايراضي لھڻ لاءِ هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو ($\pi = \frac{22}{7}$)

$$2\pi r_1 = 132$$

$$r_1 = \frac{132}{2\pi} = \boxed{} \text{ س م}$$

$$2\pi r_2 = 88$$


$$r_2 = \frac{88}{2\pi} = \boxed{} \text{ س م}$$

$l =$ وريل مٿاڇڙو ايراضي

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}$$

$$l = \sqrt{\boxed{}^2 + \boxed{}^2}$$

$$l = \boxed{} \text{ س م}$$



شڪل 7.23

$$= \pi(r_1 + r_2)l$$

$$= \pi \times \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} \text{ چورس ميٽر}$$


ذرا ياد ڪريو



پير واري شڪل موجب خاڪو پورو ڪريو

ڪمان جي ماپ	ڪمان جو نالو	ڪمان جو قسم
.....	ڪمان AXB	ننڍي ڪمان
.....	ڪمان AYB	

شڪل 7.24




ڄاڻي وٺو



گول جو قطاع دائره (Sector of a circle)

شڪل ۾ مرڪزي ڪنڊ سبب گول جي ايراضيءَ جا ٻه ڀاڱا تيار ٿين ٿا هر هڪ کي گول جو قطاع دائره چئبو آهي. گول جي ٻن نيم قطرن ۽ انهن جي ڇيڙن ملائيندڙ ڪمان جي محدود ايراضيءَ کي قطاع دائره چئبو آهي. شڪل ۾ O-PMQ ۽ O-PBQ اهي ٻه قطاع دائره آهن.



شڪل 7.25


ننڍو قطاع دائره : ٻن نيم قطرن ۽ انهن جي نسبتي وڏي ڪمان جي محدود ايراضي وڏو قطاع دائره آهي شڪل ۾ O-PMQ آهي.

وڏو قطاع دائره : ٻن نيم قطرن ۽ انهن جي نسبتي وڏي ڪمان جي محدود ايراضي وڏو قطاع دائره آهي شڪل ۾ O-PBQ آهي.

قطاع دائره جي ايراضي (Area of a sector)

هيٺ ڏنل شڪلين ۾ برابر نيم قطر وارن گولن ۾ ڏنڌليل حصن کي ڇاپيو ۽ خاڪو پورو ڪريو.





شڪل 7.26

گول جي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ 360° پوري ڪنڊ

گول جي مرڪزي ڪنڊ = 360° , گول جي ايراضي = πr^2			
قطاع دائرہ ايراضي A	$\frac{\theta}{360}$	نسبتي ڪمان ماپ	قطاع دائرہ
$1 \times \pi r^2$	$\frac{360}{360} = 1$	360°	A_1
$\frac{1}{2} \times \pi r^2$	$\frac{1}{2}$	180°	A_2
$\frac{1}{4} \times \pi r^2$	$\frac{1}{4}$	90°	A_3
.....		60°	A_4
$\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$	$\frac{\theta}{360}$	θ	A

خاڪي مان ظاهر آهي ته گول جي ايراضي کي $\frac{\theta}{360}$ سان ضرب ڪرڻ سان ڪمان جي ماپ θ هوندي، قطاع دائرہ جي ايراضي ملي ٿي.





$$(A) = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \quad \text{قطاع دائرہ جي ايراضي}$$

ان سوتر موجب

$$\frac{\theta}{360} = \frac{\text{قطاع دائرہ ايراضي}}{\text{گول جي ايراضي ڪ}} \quad ; \quad \frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{360}$$

ڪمان جي ڊيگهه (Length of an arc)

هيٺ ڏيکاريل برابر نيمر قطرن وارن گولن جي گهاٽي ڪيل ڪمانن جي ڊيگهه چڪاس ڪريو ۽ هيٺ ڏنل خاڪو پورو ڪريو

$\theta = 360^\circ$  $l_1 = 2\pi r$	$\theta = 180^\circ$  $l_2 = \frac{1}{2} \times 2\pi r$	$\theta = 90^\circ$  $l_3 = \frac{1}{4} \times 2\pi r$	$\theta = 60^\circ$  $l_4 = \frac{1}{6} \times 2\pi r$
---	--	--	---

شڪل 7.27

ڪمان جي ڊيگهه (l)	$\frac{\theta}{360}$	ڪمان جي ماپ (θ)	ڪمان جي ڊيگهه
$1 \times 2\pi r$	$\frac{360}{360} = 1$	360°	l_1
$\frac{1}{2} \times 2\pi r$	$\frac{180}{360} = \frac{1}{2}$	180°	l_2
$\frac{1}{4} \times 2\pi r$	$\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$	90°	l_3
.....		60°	l_4
$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$	$\frac{\theta}{360}$	θ	l

مٿي ڏنل ڄاڻ مان ڏيان ۾ اچي ٿو گول جي گهيري کي $\frac{\theta}{360}$ سان ضرب ڪرڻ سان، ڪمان جي ماپ θ هوندي آسان کي ڪمان جي ڊيگهه ملي ٿي.

$$(l) = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r \quad \text{ڪمان جي ڊيگهه}$$

ان سوتر موجب

$$\therefore \frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{360}$$

$$\frac{\theta}{360} = \frac{\text{ڪمان جي ڊيگهه}}{\text{گهيري}}$$

ڪمان جي ڊيگهه ۽ قطاع دائرہ ايراضي وچ ۾ لاڳاپو

$$A = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \dots\dots\dots \text{I} \quad \text{قطاع دائرہ ايراضي}$$

$$(l) = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r \quad \text{ڪمان جي ڊيگهه}$$

$$\therefore \frac{\theta}{360} = \frac{l}{2\pi r} \dots\dots\dots \text{II}$$


$$A = \frac{l}{2\pi r} \times \pi r^2 \dots\dots\dots \text{I ۽ II مان}$$

$$A = \frac{1}{2} l r = \frac{l r}{2}$$

$$\text{نيمر قطر ڪمان جي ڊيگهه} = \frac{\text{قطاع دائرہ جي ايراضي}}{2} \therefore$$

$$\text{ساڳئي نموني} \quad \frac{A}{\pi r^2} = \frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{360}$$

حل ڪيل مثال



شکل 7.28

مثال (1) 21 س م نيمر قطر واري گول ۾ قطاع دائرہ جي ڪنڊ 150° آهي ان جي ايراضي ۽ نسبتي ڪمان جي ڊيگهه لھو

$$\text{حل} : \quad r = 21, \theta = 150, \pi = \frac{22}{7}$$

$$(A) = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \quad \text{قطاع دائرہ جي ايراضي}$$

$$= \frac{150}{360} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21$$


$$= \frac{1155}{2} \text{ س م}^2$$

$$= 577.5 \text{ س م}^2$$

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r \quad \text{ڪمان جي ڊيگهه}$$

$$= \frac{150}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21$$

$$= 55 \text{ س م}$$



شڪل 7.29

مثال (2) شڪل ۾ گول جو مرڪز P ۽ نيئر قطر 6 س
 ۾ آهي ٽڪر QR اها گول جي ڇهڻي
 آهي.
 $PR = 12\text{cm}$ ته ڏنڌيل حصي جي
 ($\sqrt{3} = 1.73$) ايراضي لھو

حل : ڇهڻي سڌيان موجب

س ۾ $PQ = 6$ س, $PR = 12$ س, $\angle PQR = 90^\circ$, ۾ ΔPQR

$$\therefore PQ = \frac{PR}{2}$$

گونِي ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هڪ پاسو هٽيا ٿيوز جي آڌ هوندو ته اُنجي سامهون
 واري ڪنڊ 30° هوندي آهي

$$\therefore \angle R = 30^\circ \quad \angle P = 60^\circ$$

$$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ \text{ موجب سڌيان موجب } QR = \frac{\sqrt{3}}{2} \times PR = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12 = 6\sqrt{3}$$

$$QR = 6\sqrt{3} \text{ س ۾}$$

$$\therefore A(\Delta PQR) = \frac{1}{2} QR \times PQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6$$

$$= 18\sqrt{3} = 18 \times 1.73$$

$$= 31.14 \text{ س}^2 \text{ ۾}$$

چ س ۾ ΔPQR ۾

$$PQ = \frac{1}{2} (PR)$$

$$\therefore \angle PRQ = 30^\circ$$

$$\therefore \angle QPR = 60^\circ$$

$$\text{قطاع دائره جي ايراضي} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$\therefore A(P-QAB) = \frac{60}{360} \times 3.14 \times 6^2$$

$$\text{ڏنڌيل حصي جي ايراضي} = \frac{1}{6} \times 3.14 \times 6 \times 6 = 3.14 \times 6$$

$$= 18.84 \text{ س}^2 \text{ ۾}$$


$$= A(\Delta PQR) - A(P-QAB)$$

$$= 31.14 - 18.84$$

$$= 12.30 \text{ س}^2 \text{ ۾}$$

ڏنڌيل حصي جي ايراضي = 12.30 چ س ۾

مشغولي : شڪل ۾ ABCD چورس جو هر هڪ پاسو 7 س م آهي مرڪز D ۽ نيپر قطر DA کڻي نڪتل قطاع دائرہ D-AXC آهي ڏنڌيل حصي جي ايراضي لھڻ خال ڀري مثال حل ڪريو




شڪل 7.30

چورس جي ايراضي
حل : چورس جي ايراضي = سوتر
=
49 = چورس س م
قطاع دائرہ ايراضي (D-AXC) = سوتر
= $\times \frac{22}{7} \times$
= 38.5 چورس س م
ڏنڌيل حصي جي ايراضي = -
= -
=

آپياس 7.3

1. گول جو نيپر قطر 10 س م ۽ ڪمان جي ماپ 54° آهي ته اُن ڪمان جي مڪدود ڪيل قطاع دائري جي ايراضي لھو ($\pi = 3.14$)
2. هڪ گول ۾ ڪمان جي ماپ 80 ۽ نيپر قطر 18 س م آهي ته اُن ڪمان جي ڊيگهه لھو. ($\pi = 3.14$)
3. گول جو نيپر قطر 3.5 س م ۽ ڪمان جي ڊيگهه 2.2 س م ته اُن قطاع دائرہ جي ايراضي لھو.
4. گول جو نيپر قطر 10 س م آهي اُن جي قطاع دائرہ جي ايراضي 100 چ س م ته اُن جي نسبتي وڌي قطاع دائرہ ايراضي لھو. ($\pi = 3.14$)
5. 15 س م نيپر قطر واري گول ۾ هڪ قطاع دائري جي ايراضي 30 چ س م آهي ته اُن جي نسبتي ڪمان جي ڊيگهه لھو.




شڪل 7.31

6. ڀرواري شڪل ۾ گول جو نيپر قطر
7 س م ۽ $m(\text{arc MBN}) = 60^\circ$ ته
(1) گول جي ايراضي لھو
(2) $A(O - MBN)$ لھو.
(3) $A(O - MCN)$ لھو.

7. 3.4 س م نيمر قطر واري گول جي قطاع دائرہ جو گھيرو 12.8 س م آهي ته ان قطاع دائرہ ايراضي لھو.


شکل 7.32



8. شکل 7.33 ۾ O مرکز آهي

$\angle ROQ = \angle MON = 60^\circ$, $OR = 7$
 $OM = 21$ س م ۾ کمان RXQ ۽ کمان MYN
 جي ڊيگھ لھو ($\pi = \frac{22}{7}$)

شکل 7.33




9. شکل ۾ $A(P-ABC) = 154$

آهي نيمر قطر 14 س م آهي ته

(1) $\angle APC$ جي ماپ لھو

(2) کمان ABC جي ڊيگھ لھو

شکل 7.34




10. گول جو نيمر قطر 7 س م آهي کمانن جي ماپون هيٺ ڏنل آهن هرھڪ ۾ قطاع دائرہ ايراضي لھو

3 گوني ڪنڊون (3) 210° (2) 30° (1)

11. ننڍي قطاع دائرہ جي ايراضي 3.85 چ س م ۽ نسبتي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ 36° آهي ته ان گول جو نيمر قطر لھو.

12. $\square PQRS$ هڪ مستطيل آهي 14 س م، $PQ = 21$ س م، $QR =$

ته شکل ۾ x, y, z مان هرھڪ حصي جي ايراضي لھو.



شکل 7.35

13. $\triangle LMN$ هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي

14 س م $LM =$ هرھڪ نوڪي ٽپڪو مرڪز ۽ نيمر قطر 7 س م ڪٿي


تي قطاع دائرہ ڪڍيا ويا آهن ته

(1) $A(\triangle LMN) = ?$

(2) هرھڪ قطاع دائرہ ايراضي لھو

(3) ٽنهي قطاع دائرہ جي ايراضي لھو


(4) ڏنڌيل حصي جي ايراضي لھو.



شکل 7.36



گول ٽڪر (segment of a circle)



شڪل 7.37

گول - ٽڪر مطلب لھم ۽ ڪمان جي محدود ڪيل ايراضي

ننڍو - گول ٽڪر : زھه ۽ ننڍي ڪمان پاران محدود ڪيل ايراضي کي ننڍو

گول - ٽڪر چئبو آھي.

شڪل ۾ AXB اھو ننڍو گول ٽڪر آھي.

وڏو گول ٽڪر : زھه ۽ وڏي ڪمان پاران محدود ڪيل حصي کي وڏو گول -


ٽڪر چئبو آھي شڪل ۾ AYB اھو وڏو گول ٽڪر آھي.

BT گول : قطر پاران تيار ٿيل ٽڪر کي اڌ گول چئبو آھي.

گول ٽڪر جي ايراضي (Area of a Segment)

شڪل ۾ (O-PXQ) اھو ننڍو گول - ٽڪر آھي

۽ (O-PYQ) اھو وڏو گول - ٽڪر آھي.



شڪل 7.38

ننڍي گول - ٽڪر جي ايراضي ڪيئن لھبي؟

گول جو مرڪز O کان OP ۽ OQ ٻہ نيم قطر ڪڍو.


توھان کي قطاع دائرھ جي ايراضي O-PXQ ڪڍڻ

خبر آھي. ساڻئي وقت $\triangle OPQ$ جي ايراضي بہ لھي

سڱھجي ٿي. قطاع دائرھ جي ايراضي مان ٽڪنڊي

جي ايراضي ڪڍو ڪرڻ سان گول - ٽڪر جي ايراضي

ملندي.



شڪل 7.39

$$(O - PXQ) - \triangle OPQ$$

$$(I) \text{ گول - ٽڪر } PXQ \text{ جي ايراضي } \triangle OPQ - \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

شڪل ۾ $\triangle OPQ$ ۾ ٽڪر PT اھو پاسو OQ تي عمود ڪڍو.

$$\sin \theta = \frac{PT}{OP} \quad \text{گونہ ڪنڊ ٽڪنڊي } \triangle OTP \text{ ۾}$$

$$\therefore PT = OP \times \sin \theta$$

$$PT = r \sin \theta \quad (\because OP = r)$$


$$\begin{aligned} \Delta OPQ &= \frac{1}{2} \times \text{اوپائي} \times \text{پايو} \\ &= \frac{1}{2} \times OQ \times PT \\ &= \frac{1}{2} \times r \times r \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \times r^2 \sin \theta \text{ ----- (ii)} \end{aligned}$$

, مان (II) ۽ (I)

$$\begin{aligned} \text{گول ٽڪر جي ايراضي} \quad PXQ &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta \\ &= r^2 \left[\frac{\pi \theta}{360} - \frac{\sin \theta}{2} \right] \end{aligned}$$

اسان سوڙهي ڪنڊ جو سائين ريشو سڳيا آهيون θ اها 90° يا اُن کان گهٽ ماپ لاءِ اهو سوتر ڪم آڻبو آهي اهو ڏيان ڀر ڀرو

حل ڪيل حساب



شڪل 7.40

مثال (1) شڪل ۾ $OA = 12$, $\angle AOB = 30^\circ$ س ۾

گول - ٽڪر جي ايراضي لھو

($\pi = 3.14$)

طريقو I :

$$\begin{aligned} A(\Delta OAB) &= \frac{1}{2} r^2 \times \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \times 12^2 \times \sin 30 \\ &= \frac{1}{2} \times 144 \times \frac{1}{2} \\ &\dots (\because \sin 30 = \frac{1}{2}) \\ &= 36 \text{ چورس س ۾} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &= 12, \theta = 30^\circ, \pi = 3.14 \\ O-AXB \\ &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\ &= \frac{30}{360} \times 3.14 \times 12^2 \\ &= 3.14 \times 12 \\ &= 37.68 \text{ چورس س ۾} \end{aligned}$$

$$AXB \text{ ۾ } (O - AXB) - A(\Delta OAB)$$

$$37.68 - 36 =$$

$$1.68 \text{ ۾ } \text{چ س م}$$

طریقو II :

$$= r^2 \left[\frac{\pi\theta}{360} - \frac{\sin\theta}{2} \right] \quad \text{گول ٽڪر AXB جي ايراضي}$$

$$= 12^2 \left[\frac{3.14 \times 30}{360} - \frac{\sin 30}{2} \right]$$

$$= 144 \left[\frac{3.14}{12} - \frac{1}{2 \times 2} \right]$$

$$= \frac{144}{4} \left[\frac{3.14}{3} - 1 \right]$$

$$= 36 \left[\frac{3.14 - 3}{3} \right]$$

$$= \frac{36}{3} \times 0.14 = 12 \times 0.14$$

$$= 1.68 \text{ ۾ } \text{چ س م}$$

مثال (2) P مرڪز واري گول جو نيم قطر 10 س م آهي زهه AB طرفان ٺهيل ننڍو گول ٽڪر ۽ وڏو گول ٽڪر جي ايراضي لھو. ($\pi = 3.14$)

حل : $r = 10, \theta = 90, \pi = 3.14$

$$= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \quad \text{قطاع دائري ايراضي}$$

$$= \frac{90}{360} \times 3.14 \times 10^2$$

$$= \frac{1}{4} \times 314$$

$$= 78.5 \text{ ۾ } \text{چ س م}$$

$$A(\Delta APB) = \frac{1}{2} \times \text{پايو} \times \text{اوچائي}$$


$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10$$

$$= 50 \text{ ۾ } \text{چ س م}$$

گول - ٽڪر جي ايراضي لھو

$$78.5 - 50 =$$

$$28.5 \text{ ۾ } \text{چ س م}$$



شڪل 7.41

ننڊو گول ٽڪر ايراضي - گول جي ايراضي = وڏي گول ٽڪر جي ايراضي

$$= 3.14 \times 10^2 - 28.5$$


$$= 314 - 28.5$$

$$= 285.5 \text{ چورس س م}$$

مثال (3) 14 س م نيم قطر گول ۾ هڪ پور ڇهڪنڊو ۽ اڍيل آهي ان ڇهڪنڊي کان ٻاهر ۽ گول جي

اندرين حصي جي ايراضي لھو ($\pi = \frac{22}{7}$, $\sqrt{3} = 1.732$)

ڇهڪنڊي جي گرد گول جو نيم قطر = ڇهڪنڊي پاسي ۾ ڏيکھ



شڪل 7.42

∴ پور ڇهڪنڊي جي ايراضي = 14 س م

$$= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{پاسو})^2$$

$$= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 14^2$$

$$= 509.208 \text{ س م}$$

$$\text{گول جي ايراضي} = \pi r^2$$

$$= \frac{22}{7} \times 14 \times 14$$

$$= 616 \text{ چورس س م}$$

پورچوٽ ڪنڊي جي ايراضي - گول جي ايراضي = پور ڇهڪنڊي ايراضي

$$616 - 509.208 =$$

$$= 106.792 \text{ چورس س م}$$

اڀياس 7.4


1. شڪل ۾ A مرڪز واري گول ۾

$$\angle ABC = 45^\circ, AC = 7\sqrt{2}$$

تہ ننڊو - ٽڪر BXC جي ايراضي لھو.

$$(\pi = 3.14, \sqrt{2} = 1.41)$$

شڪل 7.43




شڪل 7.44 ۾ گول جو مرڪز O آهي


$$OP = 10 \text{ cm}, m(\text{arc PQR}) = 60$$

تہ ڏنڌيل حصي جي ايراضي لھو

$$(\pi = 3.14, \sqrt{3} = 1.73)$$




شڪل 7.44



3. مرکز A واري ٿول ۾ $\angle PAR = 30^\circ$ ته ٿڪر جي ايراضي لھو.
 $AP = 7.5$
 $(\pi = 3.14)$

شڪل 7.45

- O مرکز واري ٿول ۾ PQ هڪ زھ آھي.
 $\angle POQ = 90^\circ$ ڏنڌيل حصي جي
 ايراضي 114 چ س م آھي ٿول جو نيم
 قطر لھو. $(\pi = 3.14)$



شڪل 7.46

4. 1.5 س م نيم قطر واري ٿول ۾ PQ جي مرڪزي ڪنڊ 60° آھي. ان زھ طرف سان ٺھيل وڏو
 ٿول ٿڪر ۽ ننڍو ٿول - ٿڪر جي ايراضي لھو. $(\pi = 3.14, \sqrt{3} = 1.73)$

گڏيل آپياس 7

1. مناسب متبدل چونڊيو

- (1) جيڪڏهن ٿول جو گھيرو ۽ ٿول جي ايراضي جو ريشو 2:7 ته ٿول جو گھيرو ڪيترو؟

(A) 14π (B) $\frac{7}{\pi}$ (C) 7π (D) $\frac{14}{\pi}$

- (2) 44 س م ڊيگھ واري ڪمان جي ماپ 160 ته ٿول جو گھيرو ڪيترو؟

(A) 66 س م (B) 44 س م (C) 160 س م (D) 99 س م

- (3) ڪمان جي ماپ 90 ۽ نيم قطر 7 س م ته قطاع دائرھ جي گرد ماپ لھو.

(A) 44 س م (B) 25 س م (C) 36 س م (D) 56 س م

- (4) پايي جو نيم قطر 7 س م ۽ اوچائي ڪون جي وريل مٿاڇرو ايراضي ڪيتري؟

(A) 440π (B) 550π (C) 330π (D) 110π

- (5) 5 س م نيم قطر سلينڊر جي وريل مٿاڇرو ايراضي 440π س م ان سلينڊر جي اوچائي ڪيتري؟

(A) $\frac{44}{\pi}$ (B) 22π (C) 14 (D) $\frac{22}{\pi}$

- (6) هڪ ڪون کي ٻاري انجي نيم قطر برابر سلينڊر تيار ڪيل آھي جيڪڏهن سلينڊر

جي اوچائي 5 س م ته ڪون جي اوچائي ڪيتري؟

(A) 15 س م (B) 10 س م (C) 18 س م (D) 5 س م

(7) 0.01 س م پاسي واري ڪعب جو مقدار ڪيترو؟

- (A) 1 (B) 0.001 (C) 0.0001 (D) 0.000001

(8) هڪ ڪعب ميٽر مقدار واري ڪعب جي پاسي جي ڊيگهه ڪيتري؟

- (A) 1 س م (B) 10 س م (C) 100 س م (D) 1000 س م

2. هڪ ڪون - ٽڪر آڪار ڪپڙي ڌوئڻ جي ٿب جي اوچائي 21 س م ٿب جي ٻنهي گولاڪار پاسن

جا نيم قطر 20 س م ۽ 15 س م آهي ته ان ٿب ۾ ڪيترا ليٽر پاڻي ماپندو ($\pi = \frac{22}{7}$)

3. * پلاسٽڪ جا اسر نيم قطر وارا گولا ٻاري هڪ سلينڊر آڪار جو دٻو تيار ڪيو ڏيئي جي ٿولھ 2 س م

۽ اوچائي 90 س م ۽ ٻاهريون نيم قطر 30 س م آهي ته ان ڏيئي ٺاهڻ لاءِ ڪيترا گولا ٻاريا ويا؟

4. 16 س م ڊيگهه، ويڪر 11 س م ۽ اوچائي 10 س م واري هڪ مستطيل بلاڪ ڌاتوءَ مان 2 س م

ٿولھ ۽ قطر 2 س م وارا سڪا تيار ڪيا ويا. ٻڌايو ته ڪيترا سڪا تيار ٿيندا؟

5. هڪ رولر جو قطر 120 س م ۽ ڊيگهه 84 س م آهي هڪ ميدان کي سڌو ڪرڻ ۾ رولر 200 چڪر

پورا ڪري ٿو. ٻڌايو ته 10 رفي چورس ميٽر حساب سان ميدان سڌو ڪرڻ ۾ ڪيترو خرچ ايندو؟

6. قطر 12 س م ۽ ٿولھ 0.01 م وارو هڪ گولو آهي ته ان گولي جي ٻاهرين مٿاڇڙو ايراضي لھو.

جيڪڏهن ڌاتوءَ جي گهاٽائي 8.88 گرام في ڪعب س م آهي ته گولي جو مادو (وزن) لھو.

7. هڪ گوني گولائون سلينڊر آڪار بالٽيءَ جي پايي جو قطر 28 س م ۽ اوچائي 20 س م آهي اها

بالٽي ريتيءَ سان ڀريل آهي اها ريتي زمين مٿان اهڙي نموني اوتي ويئي جو ريتيءَ جو ڪون

تيار ٿيو. ريتيءَ جي ڪون جي اوچائي 14 س م ته ريتي جي ڪون جي پايي جي ايراضي لھو.

8. هڪ ڌاتوءَ جو گولو 9 س م نيم قطر وارو آهي ته گولو ٻاري 4 س م قطر ڌاتوءَ جي تار ٺاهي ويئي

آهي ته تار جي ڊيگهه ڪيتري؟

9. 6 س م نيم قطر گول ۾ هڪ قطاع دائرھ جي ايراضي 15π آهي ته ان قطاع دائرھ جي ڪمان

جي ماپ ۽ ڪمان جي ڊيگهه لھو.


10. شڪل ۾ P گول جو مرڪز آهي ٽڪر AB

اهو زھ آهي 8 س م PA =


زھ AB اهو مرڪز کان 4 س م مفاصلي تي

آهي ته ڌنڌليل حصي جي ايراضي لھو.

($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)



شڪل 7.47



شکل 7.48

11. قطاع دائرہ A-PCQ اندر $\square ABCD$ چورس آهي
 قطاع C-BXD دائرہ جو نيم قطر 20 س ۾ آهي ته
 ڏنڊيل حصي جي ايراضي لھو. اھا ايراضي لھڻ
 لاءِ مشغولي پوري ڪريو

حل : $\square ABCD$ جو پاسو = قطاع دائرہ جو نيم قطر C - BXD =

چورس جي ايراضي = $\text{پاسو}^2 = \text{}^2 = \text{}$ (I)

چورس اندر اُرديل حصي جي ايراضي

$$= (\square ABCD) - A(C-BXD)$$

$$= \text{} - \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$= \text{} - \frac{90}{360} \times \frac{3.14}{1} \times \frac{400}{1}$$

$$= \text{} - 314$$

$$= \text{}$$

$\square ABCD$ جو اُرب = وڏي قطاع دائرہ نيم قطر

$$= 20\sqrt{2}$$

$$= A(A - PCQ) - A(\square ABCD)$$

$$= \left(\frac{\theta}{360} \times \pi \times r^2 \right) - \text{}^2$$


$$= \frac{90}{360} \times 3.14 (20\sqrt{2})^2 - (20)^2$$

$$= \text{} - \text{}$$

$$= \text{}$$

∴ ڪل ڏنڊيل حصي جي ايراضي = $314 + 86 = 228$

مرکز O ۽ P وارا گول هڪ ٻئي کي
A وٽ آندريان ڇهن ٿا. ته گولن جا نيم قطر
لهڻ لاءِ هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو.
 $BQ = 9, DE = 5$



شڪل 7.49

حل : سمجهو ته وڏي گول جو قطر R ۽ ننڍي

گول جو قطر r آهي

$\therefore OA = OB = OC = OD = R$ وڏي گول جا نيم قطر r

$$PQ = PA = r$$

$$OQ = OB - BQ = \boxed{}$$

$$OE = OD - DE = \boxed{} \dots\dots\dots (\because OE = OF)$$

مرکز P واري گول ۾ اندروني ورڇ سڏيان موجب

$$OQ \times OA = OE \times OF$$

$$\boxed{} \times R = \boxed{} \times \boxed{} (\because OE = OF)$$

$$R^2 - 9R = R^2 - 10R + 25$$

$$R = \boxed{}$$

$$AQ = 2r = AB - BQ$$

$$2r = 50 - 9 = 41$$

$$r = \boxed{} = \boxed{}$$

□□□



جواب باب 1 هڪ جهڙائي

1.1 آڀياس

1. $\frac{3}{4}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. 3 4. 1:1 5. (1) $\frac{BQ}{BC}$, (2) $\frac{PQ}{AD}$, (3) $\frac{BC}{DC}$, (4) $\frac{DC \times AD}{QC \times PQ}$

1.2 آڀياس

1. (1) آڌڪ آهي (2) آڌڪ نه آهي (3) آڌڪ آهي
2. $\frac{PN}{NR} = \frac{PM}{MQ} = \frac{3}{2}$, انڪري $NM \parallel RQ$ پاسو 3. $QP = 3.5$ 5. $BQ = 17.5$
6. $QP = 22.4$ 7. $x = 6$; $AE = 18$ 8. $LT = 4.8$ 9. $x = 10$

10. ڏنل، XQ , PD , ڏنل، $\frac{XR}{RF} = \frac{XQ}{QE}$, بنياد تناسبيت سڌيان، $\frac{XP}{PD} = \frac{XR}{RF}$

1.3 آڀياس

1. $\Delta ABC \sim \Delta EDC$ ڪنڊ - ڪنڊ آزمائش 2. $\Delta PQR \sim \Delta LMN$; پاسو - پاسو آزمائش
3. 12 ميٽر 4. $AC = 10.5$ 6. $OD = 4.5$

1.4 آڀياس

1. $9 : 25$ ايراضي جو ريشو 2. PQ^2 , $\frac{4}{9}$ 3. $A(\Delta PQR)$, $\frac{16}{25}$, $\frac{4}{5}$
4. $MN = 15$ 5. 20 س م 6. $4\sqrt{2}$
7. PF ; x ; $2x$; $\angle FPQ$; $\angle FQP$; $\frac{DF^2}{PF^2}$; 20 ; 45 ; $45 - 20$; 25 چورس ايڪا

گڏيل آڀياس 1

1. (1) (B), (2) (B), (3) (B), (4) (D), (5) (A)
2. $\frac{7}{13}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{13}{20}$ 3. 9 س م 4. $\frac{3}{4}$ 5. 11 س م 6. $\frac{25}{81}$ 7. 4
8. $PQ = 80$, $QR = \frac{280}{3}$, $RS = \frac{320}{3}$ 9. $\frac{PM}{MQ} = \frac{PX}{XQ}$, $\frac{PM}{MR} = \frac{PY}{YR}$,
10. $\frac{AX}{XY} = \frac{3}{2}$ 12. $\frac{3}{2}$, $\frac{3+2}{2}$, $\frac{5}{3}$, ڪنڊ - ڪنڊ, $\frac{5}{3}$, 15

باب 2 پائٽاگورس جو سڌيان

2.1 آڀياس

1. پائٽاگورس جا ٽپڊا: (1), (3), (4), (6) 2. $NQ = 6$ 3. $QR = 20.5$

4. $RP = 12, PS = 6\sqrt{3}$ 5. $\boxed{\text{ڏنل}}$ $\boxed{45^\circ}$, $\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$, $\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$, $\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$, $\boxed{2}$

6. 37 س م 7. (1) 18 (2) $4\sqrt{13}$ (3) $6\sqrt{13}$ 8. $5\sqrt{2}$ س م $20\sqrt{2}$ = گرد ماپ، س م $5\sqrt{2}$ = پاسو
10. 8.2 م

2.2 آڀياس

1. 12 2. $2\sqrt{10}$ 4. 18 س م

گڏيل آڀياس 2

1. (1) (B), (2) (B), (3) (A), (4) (C), (5) (D), (6) (C), (7) (B), (8) (A).
2. (1) $a\sqrt{3}$, (2) گوني ڪنڊ ٽڪنڊو (3) 61 س م (4) 15 س م (5) $x\sqrt{2}$, (6) $\angle PRQ$.
3. $RS = 6$ س م, $ST = 6\sqrt{3}$ س م 4. 20 س م 5. 2 س م = گرد ماپ, 2 س م = پاسو
6. 7 7. $AP = 2\sqrt{7}$ س م 10. 7.5 ڪلاڪ / م 12. 8 س م 14. 8 س م
15. 192 چورس ايڪا 17. 58 18. 26

باب 3 گول

3.1 آڀياس

1. (1) 90° , (2) ڇهڙي نير قطر سڌيان, (3) عمودي مفاصلو; س م 6 (4) 45°
2. (1) $5\sqrt{3}$ س م (2) 30° (3) 60° 4. 9 س م

3.2 گڏيل آڀياس

1. 1.3 س م 2. 9.7 س م 4. 110° (3) 5. $4\sqrt{6}$ س م

3.3 آڀياس

1. $m(\text{arc DE}) = 90^\circ$, $m(\text{arc DEF}) = 160^\circ$

3.4 آڀياس

1. (1) 60° (2) 30° (3) 60° (4) 300° 2. (1) 70° (2) 220° (3) 110° (4) 55°
3. $\angle R = 92^\circ$; $\angle N = 88^\circ$ 7. 44° 8. 121°

3.5 آڀياس

1. $PS = 18$; $RS = 10$, 2. (1) 7.5 (2) 12 يا 6
3. (1) 18 (2) 10 (3) 5 4. 4

گڏيل آڀياس 3

1. (1) D (2) B (3) B (4) C (5) B (6) D (7) A (8) B (9) A (10) C.
2. (1) 9 س م (2) گول جي اندر (3) 12 س م, 2 ٽپڪا
3. (1) 6 (2) $\angle K = 30^\circ$; $\angle M = 60^\circ$ 5. 10 6. 6.5 س م (2) 9 س م (1)

- (3) 90° ; MS : SR = 2 : 1 9. $4\sqrt{3}$ س م
 13. (1) 180° (2) $\angle AQP \cong \angle ASQ \cong \angle ATQ$
 (3) $\angle QTS \cong \angle SQR \cong \angle SAQ$ (4) $65^\circ, 130^\circ$ (5) 100° 14. (1) 70°
 (2) 130° (3) 210° 15. (1) 56° (2) 6 (3) 16 يا 9 16. (1) 15.5°
 (2) 3.36 (3) 6 18. (1) 68° (2) OR = 16.2, QR = 13 (3) 13 21. 13

باب 4 جاميٽريءَ جا جوڙجڪ

گڏيل آپيلاس 4

1. (1) C (2) A (3) A

باب 5 مساوي جاميٽري

آپيلاس 5.1

1. (1) $2\sqrt{2}$ (2) $4\sqrt{2}$ (3) $\frac{11}{2}$ (4) 13 (5) 20 (6) $\frac{29}{2}$
 2. هر ليڪي آهن (4) هر ليڪي آهن (3) هر ليڪي نه آهن (2) هر ليڪي آهن (1)
 3. (-1, 0) 7. 7 يا -5

آپيلاس 5.2

1. (1, 3) 2. (1) $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ (2) $\left(\frac{4}{7}, -\frac{11}{7}\right)$ (3) $\left(0, \frac{13}{3}\right)$ 3. 2:7 4. (-6, 3)
 5. 2:5, $k = 6$ 6. (11, 18) 7. (1) (1, 3) (2) (6, -2) (3) $\left(\frac{19}{3}, \frac{22}{3}\right)$
 8. (-1, -7) 9. $h = 7, k = 18$ 10. (0, 2) ; (-2, -3)
 11. (-9, -8), (-4, -6), (1, -4) 12. (16, 12), (12, 14), (8, 16), (4, 18)

آپيلاس 5.3

1. (1) 1 (2) $\sqrt{3}$ (3) لاه آڻ وڌيل
 2. (1) 2 (2) $-\frac{3}{8}$ (3) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{5}{4}$ (5) $\frac{1}{2}$ (6) لاه آڻ وڌيل
 3. هر ليڪي آهن (4) هر ليڪي نه آهن (3) هر ليڪي آهن (2) هر ليڪي آهن (1)
 هر ليڪي آهن (6) هر ليڪي آهن (5)
 4. -5; $\frac{1}{5}$; $-\frac{2}{3}$ 6. $k = 5$ 7. $k = 0$ 8. $k = 5$

گڏيل آپيلاس 5

1. (1) D (2) D (3) C (4) C
 2. هر ليڪي آهن (1) هر ليڪي آهن (2) هر ليڪي نه آهن (3) هر ليڪي نه آهن (4) 3:1

5. $(-7, 0)$ 6. (1) $a\sqrt{2}$ (2) 13 (3) $5a$ 7. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
 8. (1) ها، آڻپور پاسو ٽڪنڊو (2) نه (3) ٽپور پاسو ٽڪنڊو 9. $k = 5$
 13. $5, 2\sqrt{13}, \sqrt{37}$ 14. $(1, 3)$ 16. $\left(\frac{25}{6}, \frac{13}{6}\right)$ نير قطر = $\frac{13\sqrt{2}}{6}$ 17. $(7, 3)$
 18. پاسو چوڪنڊو. 19. $A(20, 10), P(16, 12), R(8, 16), B(0, 20)$. 20. $(3, -2)$
 21. $(7, 6)$ $(3, 6)$ 22. $10 \neq 0$

باب 6 علم مثلث

آپياس 6.1

1. $\cos\theta = \frac{24}{25}$; $\tan\theta = \frac{7}{24}$ 2. $\sec\theta = \frac{5}{4}$; $\cos\theta = \frac{4}{5}$
 3. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{41}{9}$; $\sin\theta = \frac{9}{41}$ 4. $\sec\theta = \frac{13}{5}$; $\cos\theta = \frac{5}{13}$; $\sin\theta = \frac{12}{13}$
 5. $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta} = \frac{1}{2}$

آپياس 6 2

1. چرچ جي اوچائي 80 ميٽر
 2. جهاز جو روشن گهر کان مفاصلو 51.60 ميٽر
 3. بي عمارت جي اوچائي $(10 + 12\sqrt{3})$ ميٽر
 4. تار جي ليتيل ليڪ سان ڪنڊ 30°
 5. وڻ جي اوچائي $(40 + 20\sqrt{3})$ ميٽر
 6. ڏاڳي جي ڊيگهه 69.20 ميٽر

گڏيل آپياس 6

1. (1) A (2) B (3) C (4) A
 2. $\cos 60 = \frac{60}{61}$ 3. $\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$; $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $\operatorname{cosec}\theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$; $\sec\theta = \sqrt{5}$; $\cot\theta = \frac{1}{2}$
 4. $\sin\theta = \frac{5}{13}$; $\cos\theta = \frac{12}{13}$; $\operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{5}$; $\tan\theta = \frac{5}{12}$; $\cot\theta = \frac{12}{5}$
 6. ميٽر $16\sqrt{3}$ عمارت جي اوچائي
 7. جهاز جو روشن گهر کان مفاصلو $\frac{100\sqrt{3}}{3}$ ميٽر
 8. ميٽر $(12 + 15\sqrt{3})$ عمارت جي اوچائي
 9. ڏاکڻ جو ٻيو چيڙو وڌ ڇوڌ زمين 20.80 م کان مٿي .

جهاز زمين کان 1026 م مٿي. 10.

باب 7 علم پيمائش

آپياس 7.1

1. 616 س.م. (ڪٽو $\pi = 3.14$) 2. 1413 س.م. 3. 113.04 ڪعب س.م. 4. 11.79 ڪعب س.م.
5. 20 گولا 6. 273π س.م. 7. 5 س.م. 8. 12 س.م. 9. 21 س.م.
10. 38772.72 ڪعب س.م. , 5538.96 س.م. 11. 103.62 س.م. , 94.20 ڪعب س.م.
12. 1468.67π ڪعب س.م.

آپياس 7.2

1. 1984.48 ڪعب س.م. (3) 2. 1356.48 س.م. (2) 3. 628 س.م. (1) 4. 10.780 ليٽر

آپياس 7.3

1. 47.1 س.م. 2. 25.12 س.م. 3. 3.85 س.م. 4. 214 س.م. 5. 4 س.م.
6. 154 س.م. (1) 7. 10.2 س.م. (3) 8. 128.3 س.م. (2) 9. 25.7 س.م. (1) 10. 7.3 س.م. ; 22 س.م. ; 90° (1) 11. 3.5 س.م.
12. $x = 154$ س.م. ; $y = 38.5$ س.م. ; $z = 101.5$ س.م.
13. 84.87 س.م. (1) 2. 25.67 س.م. (3) 77.01 س.م. (4) 7.86 س.م.




آپياس 7.4

1. 3.72 س.م. 2. 9.08 س.م. 3. 0.65625 چورس ايڪا 4. 20 س.م.
5. 20.43 س.م. ; 686.07 س.م.

گڏيل آپياس 7

1. (1) A, (2) D, (3) B, (4) B, (5) A, (6) A, (7) D, (8) C.
2. 20.35 ليٽر 3. 7830 گولا 4. 2800 سڪا ($\pi = \frac{22}{7}$ ڪٽو) 5. 6336 ر
6. 452.16 س.م. ; 3385.94 گرام 7. 2640 س.م. 8. 108 ميٽر
9. 150° ; 5π س.م. 10. 39.28 س.م.





- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.










पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.



ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर - ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९५५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपूर - ☎ २५४७७९६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५



مہاراشٹر راجیہ پائیہ پُستک نرمتی
وَ ایپاسکرمنشوتن منڈل، پُٹی



सिंधी (अरे.) गणित इ. १० वी भाग-२

₹ 77.00