



గణితశాస్త్రం II వ భాగం

పదవ తరగతి



భారత సంవిధానము

పార్ట్ - IV A

ప్రాథమిక బాధ్యతలు

51 ఎ) ప్రాథమిక బాధ్యతలు

ప్రతి పౌరుడు ఈ క్రింది బాధ్యతలను మనసారా స్వీకరించి బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించవలెను.

- ఎ) రాజ్యాంగ శాసనబద్ధుడై యుండుట. శాసనమందలి ఆశయములనూ, శాసనం స్థాపించే సంస్థలనూ, జాతీయ పతకాన్ని, జాతీయ గీతాన్ని అంకితభావంతో గౌరవించుట.
- బి) స్వాతంత్ర్యోద్యమ స్ఫూర్తితో అన్ని రంగాలలో వ్యవహరించుట.
- సి) దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, సమన్వయతనూ, సమగ్రతను రక్షించుట.
- డి) దేశరక్షణలో అనుక్షణం సంసిద్ధుడై ఉండుట.
- ఇ) ప్రజాజీవనంలో అన్యోన్యతనూ, భ్రాతృభావాన్ని పోషించుట, మత, భాషప్రాంతీయతత్వాలకు వర్గవైరుధ్యములకు అతీతముగా ఉండుట. స్త్రీలను అగౌరవపరచే ఆచారములను విడనాడుట.
- ఎఫ్) అమూల్యమైన భారతీయ చారిత్రక సంపదనూ, నుసంపన్న సంస్కృతినీ పరిరక్షించుట.
- జి) పర్యావరణాన్ని అడవులను, కొలనులనూ, నదులనూ రక్షించుట, అభివృద్ధి పరచుట, మృగరక్షణ జలజంతు జీవరాసులపై కరుణాత్రత.
- హెచ్) శాస్త్రీయ మరియు మానవతా దృక్పథాలను అలవరచుకొనుట, జిజ్ఞాసను పెంపొందించు కొనుట, సంస్కరణ తత్వమును పెంపొందించుట.
- ఐ) హింసను విడనాడుట, ప్రజల ఆస్తుల విధ్వంసం చర్యలను నిరోధించుట.
- జె) వ్యక్తిత్వ శక్తి సామర్థ్యాల ఔన్నత్యాన్ని పెంపొందించుకొనుట ద్వారా మరియు సమిష్టి కృషి ద్వారా అన్ని రంగాలలో గణనీయమైన స్థాయిని చేరుటకొరకు, శిఖరాగ్ర సాధనకొరకు నిరంతరం కృషి సల్పుట.
- కె) రక్షకులు లేదా సంరక్షకులుగా ఉన్నవారందరూ ఆరు నుంచి 14 సంవత్సరముల లోపల పసివారికి విద్యాభ్యాసము చేయు అవకాశమును కల్పించవలెను.

ప్రభుత్వ తీర్మానం క్రమ సంఖ్య : అభ్యాస్-2116/(ప్ర.క్ర.43/16) ఎస్డి-4 తేదీ 25.4.2016 ప్రకారం స్థాపించబడిన
సమన్వయ సమితి యొక్క తేదీ 29.12.2017 రోజు సమావేశంలో ఈ పాఠ్య పుస్తకమును 2018-19 విద్యాసంవత్సరం
నుంచి నిర్దేశించుటకుగాను అనుమతి ఇవ్వబడినది.

గణితశాస్త్రం

II వ భాగం

పదవ తరగతి



మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి మరియు పాఠ్యప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థ, పుణె-411 004.



మీ స్మార్ట్ఫోన్తో DIKSHA App నువయోగించి పాఠ్యపుస్తకం మొదటి పుటలోని
QR CODE ను స్కాన్ చేసిన డిజిటల్ పాఠ్యపుస్తకం మరియు ప్రతి పాఠంలోని
QR CODE ను స్కాన్ చేసిన ఆ పాఠానికి సంబంధించిన అధ్యయన-అధ్యాపనలకు
ఉపయుక్తమగు దృశ్య-శ్రవణ సాహిత్యం లభిస్తుంది.

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి మరియు పాఠ్య ప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థ,
పుణె-411004.

ఈ పుస్తకమునకు సంబంధించిన సర్వహక్కులు మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి మరియు పాఠ్య ప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థవి. ఈ పుస్తకము నందలి ఏ భాగమును సంచాలకులు, మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థ వారి లిఖిత అనుమతి లేకుండా ఉటంకించటం చేయరాదు.

గణిత విషయనిపుణుల సమితి

డా॥ మంగళ నార్లకర్	(అధ్యక్షులు)
డా॥ జయశ్రీ అత్రే	(సభ్యులు)
శ్రీ వినాయక్ గోడ్బోలే	(సభ్యులు)
శ్రీ రమాకాంత్ సరోదే	(సభ్యులు)
శ్రీమతి ప్రాజక్తి గోఖలే	(సభ్యులు)
శ్రీ సందీప్ పంచభాయ్	(సభ్యులు)
శ్రీమతి పూజ జాదవ్	(సభ్యులు)
శ్రీమతి ఉజ్వల గోడ్బోలే	(సభ్యకార్యదర్శి)

గణిత విషయం - రాష్ట్ర అధ్యయనవర్గ సభ్యులు

శ్రీమతి జయశ్రీ పురందరె	శ్రీమతి తరూబెన్ పోపట్
శ్రీ రాజేంద్ర చౌదరి	శ్రీ. ప్రమోద్ తొంబరే
శ్రీ రామా వన్యాళకర్	డా. భారతి సహస్రబుద్ధే
శ్రీ అన్నాప్పా పారిట్	శ్రీ వసంత్ శెవాలే
శ్రీ అన్నార్ శేఖ్	శ్రీ ప్రసాద్ కాశిద్
శ్రీ శ్రీపాద్ దేశ్పాండే	శ్రీ మిలింద్ భాకరే
శ్రీ సురేష్ దాతె	శ్రీ జానేశ్వర్ మషాల్కర్
శ్రీ ఉమేశ్ రేఖే	శ్రీ గణేష్ కోల్తే
శ్రీ బన్సీ హావళే	శ్రీ సందేష్ సానావ్ణే
శ్రీమతి రోహిణి శిర్కె	శ్రీ సుధీర్ పాటిల్
శ్రీ ప్రకాష్ జెండే	శ్రీ ప్రకాశ్ కాప్సే
శ్రీ లక్ష్మణ్ దావణ్కర్	శ్రీ రవీంద్ర ఖందారే
శ్రీ శ్రీకాంత్ రత్న పార్ఖి	శ్రీమతి స్వాతి ధర్మాధికారి
శ్రీ సునిల్ శ్రీవాస్తవ్	శ్రీ అరవింద్ కుమార్ తివారి
శ్రీ అన్నారి అబ్దుల్ హమిద్	శ్రీ మల్లేషం బేతి
శ్రీమతి సువర్ణ దేశ్పాండే	శ్రీమతి ఆర్యా భిడే

ముఖచిత్రం మరియు కంప్యూటర్ స్క్రీన్

శ్రీ సందీప్ కోలి, చిత్రకారులు, పుణె

అక్షర కూర్పు :

శ్రీ విజయ్ కుమార్ దండె, పుణె

ప్రధాన సంయోజకులు :

శ్రీమతి ఉజ్వల శ్రీకాంత్ గోడ్బోలే

ఇ. విశేషాధికారిణి, గణితం
పాఠ్యపుస్తక సంస్థ, పుణె.

అనువాదం మరియు : శ్రీ మల్లేషం కృష్ణహరి బేతి
సమీక్ష : శ్రీమతి ఈరబత్తి ప్రతిభ అనిత్

పునఃసమీక్ష : శ్రీ గంగాధర్ మిట్టపెల్లి
అనువాద } : డా॥ శ్రీమతి తులసి భారత్,
సంయోజకులు } విశేషాధికారిణి-తెలుగు,
పాఠ్యపుస్తక సంస్థ, పుణె

నిర్మితి :

శ్రీ సచ్చిదానంద్ ఆఫ్ థే

ముఖ్యనిర్మితి అధికారి

శ్రీ సంజయ్ కాంబ్లే

నిర్మితి అధికారి

శ్రీ ప్రశాంత్ హరణ్

నిర్మితి సహాయకులు

కాగితం :

70 జి.యస్.యమ్. క్రీమ్ వోవ్

ముద్రణాదేశం :

N/PB/2018-19/1,000

ముద్రకులు :

SHARP INDUSTRIES, RAIGAD

ప్రకాశకులు

శ్రీ వివేక్ ఉత్తమ్ గోసావి, నియంత్రకులు,

పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి సంస్థ,

ప్రభాదేవి, ముంబయి-25.

భారత సంవిధానము

ప్రస్తావన

భారతదేశ ప్రజలమగు మేము, భారతదేశమును సార్వభౌమ్య
సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణరాజ్యముగ
నెలకొల్పుటకు మరియు అందలి పౌరులెల్లరకు
సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయమును,
భావము, భావప్రకటన, విశ్వాసము,
ధర్మము, ఆరాధన -- వీటి స్వాతంత్ర్యమును,
అంతస్తులోను, అవకాశములోను సమానత్వమును
చేకూర్చుటకు; మరియు వారందరిలో
వ్యక్తి గౌరవమును, జాత్యైక్యతను,
అఖండతను తప్పక ఒనగూర్చు సాభాత్రమును,
పెంపొందించుటకు; సత్యనిష్ఠా పూర్వకముగ తీర్మానించుకొని,
ఈ 1949వ సంవత్సరము నవంబరు ఇరువది యారవ
దినమున మా సంవిధాన సభయందు ఇందుమూలముగ,
ఈ సంవిధానమును అంగీకరించి, అభిశాసనము చేసి
మాకు మేము ఇచ్చుకొన్నవారమైతిమి.

జాతీయ గీతము

జనగణమన - అధినాయక జయ హే

భారత - భాగ్యవిధాతా

పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,

ద్రావిడ, ఉత్కల, బంగ,

వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా,

ఉచ్చల జలధితరంగ,

తవ శుభ నామే జాగే, తవ శుభ ఆశిస మాగే,

గాహే తవ జయగాథా,

జనగణ మంగలదాయక జయ హే,

భారత - భాగ్యవిధాతా

జయ హే, జయ హే, జయ హే,

జయ జయ జయ, జయ హే

ప్రతిజ్ఞ

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ
నా సహోదరులు.

నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన,
బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు
గర్వకారణం. దీనికి అర్హత పొందడానికి సర్వదా నేను
కృషిచేస్తాను.

నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందరినీ
గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడచుకొంటాను.

నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో
ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా
ఆనందానికి మూలం.

ప్రస్తావన

విద్యార్థి మిత్రులారా,

పదవతరగతి పాఠ్యప్రణాళికకు మీకు స్వాగతం!

ఈ సంవత్సరం గణితం Iవ భాగం మరియు గణితం IIవ భాగం పాఠ్యపుస్తకాలను అభ్యసించాలి.

గణితం II వ భాగంలో రేఖాగణితం, త్రికోణమితి, నిరూపక రేఖాగణితం మరియు క్షేత్రమితి లాంటి ముఖ్యభాగాలున్నాయి. 9వ తరగతి వరకు పరిచయం చేయబడిన అంశాలను గూర్చి కొంత అధికంగా అభ్యాసం చేయాలి. ఇచ్చిన ఉదాహరణలనుంచి నిత్యజీవితంలో వాటి ఉపయోగం స్పష్టమవుతుంది. ఎక్కడయితే కొత్త భాగం, సూత్రాలు లేదా వాటి వినియోగం ఉన్నాయో అక్కడ సరళమైన వివరణ ఇవ్వబడినది. సాధించబడిన మాదిరి ఉదాహరణలు, అభ్యాసమునకై సమస్యలునూ ఉన్నాయి. అంతేగాక ప్రజ్ఞావంతులైన విద్యార్థులకై కొన్ని సవాళ్ళవంటి ప్రశ్నలు నక్షత్ర చిహ్నం కింద చేసి ఇవ్వబడినవి. సామాన్య విద్యార్థులు పదవతరగతి అనంతరం గణితం అభ్యసించదలచుకోనట్లైతే, వాటిలోని మూలాధార (కనీస) సంకల్పనలను అర్థం చేసుకోవాలి, అలాగే ఇతర రంగాలలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అవసరమైన గణితజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించగల పరిజ్ఞానం వారికి ఈ పుస్తకం నుండి లభిస్తుంది. 'అధిక వివరాలకై' ఈ శీర్షిక క్రింద యివ్వబడిన సారము ఏ విద్యార్థులకయితే పదవతరగతి అనంతరం గణితాన్ని అభ్యసించి ప్రావీణ్యం పొందాలన్న కోరికకలదో, వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది, కాబట్టి ఇలాంటి విద్యార్థులు దీనిని తప్పకుండా అభ్యసించాలి. మొత్తం పుస్తకాన్ని కనీసం ఒక్కసారి చదివి, అర్థం చేసుకోండి.

యాప్సనుపయోగించి క్యూ.ఆర్.కోడ్ ద్వారా ప్రతి అధ్యాయమునకు సంబంధించి ఉపయుక్తమైన దృశ్య-శ్రవణ సాహిత్యం లభిస్తుంది. అది అధ్యనయం కొరకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది.

పదవతరగతి పరీక్షలు అతిముఖ్యమైనవిగా భావించబడుతాయి. ఈ అంశాలను గూర్చి ఒత్తిడికి లోనుగాకుండా బాగా అభ్యసించి కోరుకున్న కార్యసాఫల్యతను పొందడానికై విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు.



(డా. సునీల్ మగర్)

పుణె

మార్చి 18వ తేది, 2018 ఉగాది

భారతీయ సౌరదినం: 27 ఫాల్గుణం 1939.

సంచాలకులు

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి మరియు
పాఠ్యప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థ, పుణె-411004.

10వ తరగతి గణితశాస్త్రం IIవ భాగం పాఠ్యప్రణాళిక నుండి క్రింది సామర్థ్యాలు విద్యార్థులలో అభివృద్ధి చెందుతాయి.

క్షేత్రం	అంశాలు	సామర్థ్య వివరణ
1. రేఖాగణితం	1.1 సర్పాప త్రిభుజాలు 1.2 వృత్తము	- సర్పాప త్రిభుజాల ధర్మాలు, సర్వసమాన త్రిభుజాల ధర్మాలు మరియు పైథాగరస్ సిద్ధాంతం దానిని ఉపయోగించి ఉదాహరణలను సాధించగల్గుట. - సర్పాప త్రిభుజాలను నిర్మించగల్గుట. - వృత్త జ్యా మరియు స్పర్శరేఖ ధర్మములను ఉపయోగించగల్గుట. - వృత్త స్పర్శరేఖలను నిర్మించగల్గుట.
2. నిరూపక రేఖాగణితం	2.1 నిరూపక రేఖాగణితం	- రెండు బిందువుల మధ్య దూరము - విభజించే బిందు నిరూపకలను కనుగొనగల్గుట. - రేఖ యొక్క వాలును కనుగొనగల్గుట.
3. క్షేత్రమితి	3.1 ఉపరితలవైశాల్యం, ఘనపరిమాణం	- వృత్త చాప పొడవును కనుగొనగల్గుట. - వృత్త సెక్టరు, వృత్త ఖండ వైశాల్యములను కనుగొనగల్గుట. - ఇవ్వబడిన త్రిమితీయ పటాల ఉపరితల వైశాల్యం, ఘనపరిమాణాలను కనుగొనగల్గుట.
4. త్రికోణమితి	4.1 త్రికోణమితి	- త్రికోణమితీయ సర్వసమానతలను ఉపయోగించి ఉదాహరణలను సాధించగల్గుట. - వృక్షాల ఎత్తును కనుగొనుట. సదీ ప్రవాహ వెడల్పును కనుగొనుట ఇలాంటి సమస్యలకై త్రికోణమితిని ఉపయోగించగల్గుట.

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

మొట్టమొదట పుస్తకమును కూలంకషంగా చదివి, దానిని అర్థం చేసుకోండి. వివిధ అంశాల వివరణ మరియు సూత్రాలను సరిచూసుకోవడంలాంటి వాటికై కృత్యాల సహాయం తీసుకోండి.

ప్రయోగాల నుండి మూల్యమాపన చేయవలసినది, అందుకై కూడా కృత్యాలుపయోగించవచ్చు. విద్యార్థులను స్వంతంగా ఆలోచించుటకై ఉత్తేజపరచండి. ఏదేని సమస్యను వేరే విధంగా, కానీ తార్కిక పద్ధతిలో సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాన్నివ్వండి.

రేఖాగణితంలోని సిద్ధాంత వాక్యాలను దృష్టియందుంచుకొని వాటిని వినియోగించి సమస్యలను సాధించే నైపుణ్యంను అభివృద్ధిపరచడానికి పుస్తకంలోని కృత్యాలేగాక మరికొన్ని కృత్యాలు తయారుచేయవచ్చు.

ప్రయోగముల పట్టిక

- (1) అట్టపై ఒక త్రిభుజాన్ని కత్తిరించుకోండి. టేబల్‌పై కొవ్వొత్తి లేదా చిన్న దీపం వెలిగించండి. గోడ మరియు దీపం/కొవ్వొత్తిల మధ్య త్రిభుజాన్ని పట్టుకోండి. దాని నీడను పరిశీలించండి. నీడ మరియు త్రిభుజంల సరూపములుగా ఉన్నాయా చూడండి. (త్రిభుజం మరియు దాని నీడ ఒకదానితోనొకటి సరూపముగా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొంటారు?)
- (2) ఒకేరకమైన కొలతలుగల రెండు లంబకోణ త్రిభుజాలను కత్తిరించండి. త్రిభుజాలకు రెండువైపులా A, B, C ఇలా పేర్కొనండి. వాటిలోఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణంపై లంబశీర్షాన్ని గీయండి. లంబపాదానికి 'D' అని పేర్కొనండి. లంబంపై కత్తిరించి రెండు చిన్న లంబకోణ త్రిభుజాలను తయారు చేయండి. మూడు లంబకోణత్రిభుజాలు ఒకదానికొకటి సదృశ్యంతో ఒకదానితోనొకటి సరూపమవుతాయోరాయండి.
- (3) ఒక వృత్తాన్ని గీయండి. దాని అంతర్భాగంలో, బాహ్యభాగంలో, మరియు వృత్తంపై ఒక్కొక్కటి ఇలా మూడు బిందువులను తీసుకోండి. ప్రతి బిందువునుండి వృత్తానికి ఎన్ని స్పర్శరేఖలను గీయవచ్చును? దాని పట్టికను తయారుచేయండి. పట్టికలో చిత్తుపటం గీసి చూపండి.
- (4) రెండు బిందువులనుండి అసంఖ్యాకమైన వృత్తాలను గీయవచ్చు. దీనిని సూచించడానికి, ఇచ్చిన రెండు బిందువులనుండి కనీసం 5 వేర్వేరు వృత్తాలను గీయండి.
- (5) వృత్తాకారంలో మేకులు అమర్చబడిన జియోబోర్డ్ తీసుకోండి. రబర్‌బ్యాండ్‌నుపయోగించి కిందివాటిలో ఏదేని ఒక సిద్ధాంతానికి జియోబోర్డ్‌పై పటాన్ని తయారుచేయండి. (1) అంతర్నితకోణాల సిద్ధాంతము (2) స్పర్శ-ఖండన రేఖల కోణ సిద్ధాంతము (3) వ్యతిరేకవృత్తఖండాలలోనికి కోణాల సిద్ధాంతము.
- (6) ఒక వృత్తం, ఒక కోణం యొక్క నమూనాలను తీసుకొని వేర్వేరు స్థితులలోని అంతరఖండిత చాపాలను తయారు చేయండి. ఆ పటాలను నోట్‌బుక్‌లో గీయండి.
- (7) కంపాస్ మరియు స్కేలునుపయోగించి ఒక కోణాన్ని నాలుగు సమానభాగాలు చేయండి.
- (8) ఒక బీకరు తీసుకోండి. దాని ఎత్తు మరియు అడుగు యొక్క వ్యాసార్థాన్ని కొలవండి. దానినిబట్టి అందులో ఎంత నీరు పడుతుందో దానిని సూత్రంతో కనుగొనండి. దానిని నీటితో నింపి దాని పరిమాణంను కొలపాత్ర సహాయంతో కొలవండి. రెండు సమాధానాలను బట్టి ఒక నిష్కర్షకురండి.
- (9) శంకుచ్ఛేద ఆకారం గల ఒక కాగితం కప్పును తీసుకోండి. దాని అడుగు భాగం మరియు పైవృత్తాకారం యొక్క వ్యాసార్థాలను కొలవండి. కప్పు ఎత్తును కొలవండి. ఆ కప్పులో ఎంత నీరు పడుతుందో, సూత్రంతో కనుగొనండి. దానిని నీటితో పూర్తిగా నింపి, ఆ నీటి పరిమాణంను కొలవండి. నీటిపరిమాణం, సూత్రంతో కనుగొనిన ఘనపరిమాణంలను పోల్చి, సరిచూసుకోండి.
- (10) మందపాటి అట్టతో రెండు సరూప త్రిభుజాలను కత్తిరించండి. వాటివైశాల్యాల నిష్పత్తి (i) వాటి చుట్ట-కొలతల యొక్క వర్గాలు అనుపాతంలో ఉన్నాయా? లేదా? (ii) వాటి మధ్యగతల యొక్క వర్గాలు అనుపాతంలో ఉన్నాయా? దీనిని ప్రత్యక్షంగా కొలిచి నిర్ణయించండి.

విషయసూచిక

అధ్యాయాలు	పేజీలు
1. సరూపత	1 నుండి 29
2. హైథాగరస్ సిద్ధాంతం	30 నుండి 46
3. వృత్తము	47 నుండి 90
4. రేఖాగణిత నిర్మాణములు	91 నుండి 99
5. నిరూపక రేఖాగణితం	100 నుండి 123
6. త్రికోణమితి	124 నుండి 139
7. క్షేత్రమితి	140 నుండి 163
● జవాబులు	164 నుండి 168



పదండి నేర్చుకుందాం

- రెండు త్రిభుజాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి
- ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం
- ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత వివర్యము
- త్రిభుజ కోణసమద్విఖండన రేఖ సిద్ధాంతం
- మూడు సమాంతర రేఖలు మరియు వాటి తిర్యగ్గ్రేఖల వలన ఏర్పడిన అంతరఖండముల నిష్పత్తి
- త్రిభుజముల సరూపత నియమములు
- సరూప త్రిభుజాల వైశాల్యాల ధర్మములు



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం

మీరు నిష్పత్తి మరియు అనుపాతముల గురించి నేర్చుకున్నారు. a, b అనే రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి $\frac{m}{n}$, ఇదేవ్యాక్యాన్ని a, b అను రెండు సంఖ్యలు $m:n$ ఈ నిష్పత్తితో ఉన్నాయని కూడా రాస్తారు.

వీటి గురించి మనం సాధారణంగా ధన వాస్తవ సంఖ్యలను పరిగణలోకి తీసుకొంటాం. రేఖ ఖండం యొక్క పొడవు మరియు ఏదైనా జ్యామితీయాకృతి యొక్క వైశాల్యములు ధన వాస్తవ సంఖ్యలుగా ఉంటాయని తెలుసు.

త్రిభుజము యొక్క వైశాల్య సూత్రం మనకు తెలుసు.

$$\text{త్రిభుజము వైశాల్యం} = \frac{1}{2} \text{ భూమి} \times \text{ఎత్తు}$$



తెలుసుకొందాం


రెండు త్రిభుజాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి (Ratio of areas of two triangles)

ఏదైనా రెండు త్రిభుజాల వైశాల్యాల నిష్పత్తిని కనుగొందాం.


ఉదాహరణ: ΔABC యొక్క భూమి BC మరియు ఎత్తు AD .

ΔPQR యొక్క భూమి QR ఎత్తు PS .

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{\frac{1}{2} \times BC \times AD}{\frac{1}{2} \times QR \times PS}$$



పటం 1.1



పటం 1.2




$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AD}{QR \times PS}$$

దీనినుండి రెండు త్రిభుజాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి వాటి భూములు మరియు సదృశ ఎత్తుల లబ్ధాల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది.


ఒక త్రిభుజము యొక్క భూమి b_1 ఎత్తు h_1 రెండవ త్రిభుజ భూమి b_2 ఎత్తు h_2 అయిన వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి = $\frac{b_1 \times h_1}{b_2 \times h_2}$

ఈ రెండు త్రిభుజాలకు సంబంధించి కొన్ని షరతులను వర్తింపజేసిచూద్దాం.

షరతు 1 : రెండు త్రిభుజాల ఎత్తులు సమానము అయినట్లయితే -



పటం 1.3




పటం 1.4

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times h}{QR \times h} = \frac{BC}{QR}$$

$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{b_1}{b_2}$$

ధర్మము : సమాన ఎత్తులు కలిగిన త్రిభుజాల వైశాల్యాలు వాటి సదృశ భుజాలకు అనుపాతములో ఉంటాయి.

షరతు 2 : రెండు త్రిభుజాల భూములు సమానం అయినట్లయితే -



పటం 1.5

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APB)} = \frac{AB \times h_1}{AB \times h_2}$$


$$\therefore \frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APB)} = \frac{h_1}{h_2}$$

ధర్మము : సమాన పాదపుల భూములు గల రెండు త్రిభుజముల యొక్క వైశాల్యాలు వాటి సదృశ ఎత్తులకు అనుపాతంలో ఉంటాయి.

కృత్యము:


కింది ఖాళీలను సరియైన విధంగా పూరించండి.

(i)



పటం 1.6

(ii)



పటం 1.7


$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APQ)} = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{} \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\frac{A(\Delta LMN)}{A(\Delta DMN)} = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{} \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

(iii) రే.ఖం. AB యొక్క మధ్య బిందువు 'M'

ΔABC యొక్క మధ్యగతరేఖ రే.ఖం. CM.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{A(\Delta AMC)}{A(\Delta BMC)} &= \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ &= \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \end{aligned}$$




పటం 1.8

కారణములు రాయండి.

సాధించిన ఉదాహరణలు

ఉదా. (1)



పటం 1.9

పక్కనున్న పటంలో

രേ.ഖം. $AE \perp$ രേ.ഖം. BC , രേ.ഖം. $DF \perp$ രേ.ഖം. BC


$AE = 4, DF = 6$ అయిన $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta DBC)}$ ను కనుగొనుండి.

సాధన : $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta DBC)} = \frac{AE}{DF}$ భూములు సమానం కావున వైశాల్యములు ఎత్తుల అనుపాతము.

$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

ఉదా. (2) ΔABC యొక్క భుజము BC పై DC = 6, BC = 15 అయ్యేట్లు 'D' ఒక బిందువు కలదు.
 $A(\Delta ABD) : A(\Delta ABC)$ మరియు $A(\Delta ABD) : A(\Delta ADC)$ లను కనుగొనుండి.

సాధన : ΔABD , ΔADC , ΔABC ఈ
 మూడు త్రిభుజముల ఉమ్మడి శీర్ష బిందువు
 A మరియు వాటి భూములు ఒకేరేఖపై
 ఉన్నందున వాటి ఎత్తులు సమానం.



పటం 1.10

$$BC = 15, DC = 6 \therefore BD = BC - DC = 15 - 6 = 9$$


$$\frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ABC)} = \frac{BD}{BC} \dots\dots\dots \text{ఎత్తులు సమానం కావున వైశాల్యాల నిష్పత్తి భూముల అనుపాతములోనుండును.}$$

$$= \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ADC)} = \frac{BD}{DC} \dots\dots\dots \text{ఎత్తులు సమానం కావున వైశాల్యాల నిష్పత్తి భూముల అనుపాతములోనుండును.}$$

$$= \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

ఉదా. (3)



పటం 1.11

□ ABCD సమాంతర చతుర్భుజము. భుజము BC పై P అనేది ఏదేని ఒక బిందువు. అయిన సమాన వైశాల్యాలు గల త్రిభుజముల రెండు జతలను వెతకండి.

సాధన : □ ABCD ఒక సమాంతర చతుర్భుజము.

$$\therefore AD \parallel BC \text{ మరియు } AB \parallel DC$$

ΔABC , ΔBDC లను పరిగణలోకి తీసుకోండి.

ఈ రెండు త్రిభుజాలు రెండు సమాంతర రేఖల మధ్య గీయబడ్డాయి. అందుచేత సమాంతర రేఖల మధ్యదూరం ఆ రెండు త్రిభుజాల ఎత్తులు అగును.


ΔABC మరియు ΔBDC లో BC అనే భూములు సమానం అయి, ఎత్తులు సమానం

$$\therefore A(\Delta ABC) = A(\Delta BDC)$$

ΔABC మరియు ΔABD లో AB అనే భూమి సమానం మరియు ఎత్తులు కూడా సమానం

$$\therefore A(\Delta ABC) = A(\Delta ABD)$$

ఉదా. (4)



పటం 1.12

ప్రక్కపటంలోని ΔABC యొక్క భుజము AC పై $AC = 16$, $DC = 9$ అయ్యేట్లు 'D' ఒక బిందువు. $BP \perp AC$, అయిన కింది నిష్పత్తులను కనుగొనండి.

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ABC)} & \text{ii)} \quad & \frac{A(\Delta BDC)}{A(\Delta ABC)} \\ \text{iii)} \quad & \frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta BDC)} \end{aligned}$$

సాధన : ΔABC యొక్క భుజము AC పై గల బిందువులు P మరియు D కావున ΔABD , ΔBDC , ΔABC , ΔAPB ల ఉమ్మడి శీర్ష బిందువు 'B' ను పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే వాటి భుజములు AD, DC, AC, AP ఒకే రేఖలో కలవు. ఈ అన్ని త్రిభుజముల ఎత్తులు సమానం. కావున ఆ త్రిభుజ వైశాల్యములకు వాటి భూములు అనుపాతములో ఉంటాయి. $AC = 16$, $DC = 9$

$$\therefore AD = 16 - 9 = 7$$

$$\therefore \frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ABC)} = \frac{AD}{AC} = \frac{7}{16} \dots \dots \dots (\text{సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజాలు})$$

$$\frac{A(\Delta BDC)}{A(\Delta ABC)} = \frac{DC}{AC} = \frac{9}{16} \dots \dots \dots (\text{సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజాలు})$$

$$\frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta BDC)} = \frac{AD}{DC} = \frac{7}{9} \dots \dots \dots (\text{సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజాలు})$$




ఇది గుర్తుంచుకోదాం.

- రెండు త్రిభుజముల వైశాల్యముల నిష్పత్తి ఆ త్రిభుజముల భూముల మరియు సదృశ ఎత్తుల లబ్ధాల నిష్పత్తికి సమానం.
- సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజాల వైశాల్యాలు వాటి సదృశ భూములకు అనుపాతములో ఉంటాయి.
- సమాన భూములు గల త్రిభుజాల వైశాల్యాలు వాటి సదృశ ఎత్తులకు అనుపాతములో ఉంటాయి.


అభ్యాసమాలిక 1.1

1. ఒక త్రిభుజ భూమి 9 మరియు ఎత్తు 5 రెండవ త్రిభుజ భూమి 10 మరియు ఎత్తు 6 అయిన ఆ త్రిభుజముల యొక్క వైశాల్యముల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

2. ఇచ్చిన పటం 1.13 లో $BC \perp AB$,
 $AD \perp AB$, $BC = 4$, $AD = 8$ అయిన
 $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta ADB)}$ ని కనుగొనండి.




పటం 1.13




పటం 1.14

4. పక్కనున్నపటంలో $AP \perp BC$, $AD \parallel BC$,
 అయిన $A(\Delta ABC) : A(\Delta BCD)$ ని
 కనుగొనండి.



పటం 1.15



పటం 1.16

5. పక్కనున్న పటంలో, $PQ \perp BC$, $AD \perp BC$
 అయిన కింది నిష్పత్తులను రాయండి.

- i) $\frac{A(\Delta PQB)}{A(\Delta PBC)}$ ii) $\frac{A(\Delta PBC)}{A(\Delta ABC)}$
 iii) $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta ADC)}$ iv) $\frac{A(\Delta ADC)}{A(\Delta PQC)}$



తెలుసుకుందాం.


ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము (Basic Proportionality Theorem)

సిద్ధాంతము : త్రిభుజము యొక్క ఒక భుజానికి సమాంతరంగా ఉండే సరళ రేఖ దాని తక్కిన భుజములను భిన్న బిందువుల వద్ద ఖండించినట్లయితే ఆ సరళ రేఖ ఆ భుజాలను ఒకే నిష్పత్తిలో విభజించును.

దత్తాంశము : ΔABC లో రేఖ $l \parallel$ రే.ఖం. BC, రేఖ l భుజము AB ని P వద్ద భుజము AC ని Q వద్ద ఖండించును.

సారాంశం : $\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$

నిర్మాణం : రే.ఖం. PC, రే.ఖం. BQ లను గీయుము.



పటం 1.17

ఉపపత్తి : ΔAPQ మరియు ΔPQB లు సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజములు.

$$\therefore \frac{A(\Delta APQ)}{A(\Delta PQB)} = \frac{AP}{PB} \quad \dots\dots\dots (\text{వైశాల్యం, భూముల అనుపాతము}) \dots\dots (I)$$

$$\text{అదేవిధంగా} \frac{A(\Delta APQ)}{A(\Delta PQC)} = \frac{AQ}{QC} \quad \dots\dots\dots (\text{వైశాల్యం, భూముల అనుపాతము}) \dots\dots (II)$$

$\Delta PQB, \Delta PQC$ ల భూమి రే.ఖం. PQ సమానం, రే.ఖం. PQ $\parallel$ రే.ఖం. BC

కావున $\Delta PQB, \Delta PQC$ ల ఎత్తులు సమానం.

$$\therefore A(\Delta PQB) = A(\Delta PQC) \quad \dots\dots\dots (III)$$

$$\therefore \frac{A(\Delta APQ)}{A(\Delta PQB)} = \frac{A(\Delta APQ)}{A(\Delta PQC)} \quad \dots\dots\dots [(I), (II) \text{ మరియు } (III)]$$


$$\therefore \frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC} \quad \dots\dots\dots [(I), (II)] \text{ ల నుండి}$$

ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యయము. (converse of B.P.T.)

సిద్ధాంతము : ఏదేని ఒక రేఖ త్రిభుజము యొక్క రెండు భుజాలను భిన్న బిందువుల వద్ద ఖండించి ఒకే నిష్పత్తిలో విభజించినట్లయితే ఆ రేఖ తక్కిన భుజమునకు సమాంతరంగా ఉంటుంది.

పటం 1.18 లో రేఖ l అనేది ΔABC యొక్క భుజము AB, భుజము AC లను వరుసగా P, Q బిందువులలో ఖండించింది. మరియు $\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$ అయిన రేఖ $l \parallel$ రే.ఖం. BC.

ఈ సిద్ధాంత నిరూపణ పరోక్ష పద్ధతిలో చేయవచ్చును.



పటం 1.18


కృత్యము :

- ΔABC అనే ఏదేని ఒక త్రిభుజమును గీయండి.
- త్రిభుజము యొక్క $\angle B$ ని సమద్విఖండనం చేయండి. అది AC ని ఎచటనైతే ఖండిస్తుందో దానికి D అని పేరు పెట్టండి.

- భుజములను కొలిచి రాయండి.

AB = సెం.మీ. BC = సెం.మీ.

AD = సెం.మీ. DC = సెం.మీ.



పటం 1.19

- $\frac{AB}{BC}$ మరియు $\frac{AD}{DC}$ ఈ నిష్పత్తులను కనుగొనండి.
- రెండు నిష్పత్తులు దగ్గరదగ్గర సమానం అని తెలుసుకోండి.
- ఇది త్రిభుజములోని ఇతర కోణములను సమద్విఖండనం చేసిన విధంగా నిష్పత్తులను కనుగొనండి. ఆ నిష్పత్తులు కూడా సమానంగా వస్తాయని తెలుసుకోండి.



తెలుసుకుందాం.


త్రిభుజ కోణసమద్విఖండన సిద్ధాంతము (Theorem of an angle bisector of a triangle)

సిద్ధాంతము : త్రిభుజము యొక్క కోణ సమద్విఖండనము కోణము ఎదుటి భుజమును తక్కిన భుజముల యొక్క పొడవుల నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది.

దత్తాంశము : ΔABC లో $\angle C$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ. AB ని E బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.

సారాంశము : $\frac{AE}{EB} = \frac{CA}{CB}$

నిర్మాణము : బిందువు B గుండా, కిరణం CE కి సమాంతరంగా రేఖను గీయండి. అది పొడిగించబడిన AC ని D బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.



పటం 1.20

ఉపపత్తి : కిరణము CE $\parallel$ కిరణము BD, రేఖ AD తిర్యగ్గీఖ

$$\therefore \angle ACE \cong \angle CDB \quad \dots\dots\dots (\text{సదృశ కోణములు})\dots(I)$$

ఇప్పుడు BC తిర్యగ్గీఖను తీసుకొనిన

$$\angle ECB \cong \angle CBD \quad \dots\dots\dots (\text{ఏకాంతర కోణములు})\dots(II)$$

$$\text{కాని } \angle ACE \cong \angle ECB \quad \dots\dots\dots (\text{దత్తాంశము})\dots(III)$$

$$\therefore \angle CBD \cong \angle CDB \quad \dots\dots\dots [(I), (II), (III) \text{ ల నుండి}]$$

ΔCBD లో, భుజము CB $\cong$ భుజము CD $\dots\dots\dots$ (సర్వసమానకోణముల ఎదుటి భుజములు)

$$\therefore CB = CD \quad \dots(IV)$$

ఇప్పుడు, ΔABD లో, రే.ఖం. EC $\parallel$ భుజము BD $\dots\dots\dots$ (నిర్మాణము)

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{AC}{CD} \quad \dots\dots\dots (\text{ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం})\dots(V)$$

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{AC}{CB} \quad \dots\dots\dots [(IV), (V) \text{ ల నుండి}]$$

అధిక వివరాలకై :


పై సిద్ధాంత ఉపపత్తి మరొక పద్ధతిలో మీరు రాయండి.

దాని కొరకు పటం 1.21 లో చూపిన విధంగా ΔABC ని గీయండి.


మరియు $DM \perp AB$, $DN \perp AC$ లను గీయండి.

- (1) సమాన ఎత్తులు గల త్రిభుజాల వైశాల్యాలు వాటి సదృశ భూములకు అనుపాతంలో ఉంటాయి.
మరియు

- (2) కోణ సమద్విఖండన రేఖపై ప్రతి బిందువు కోణము యొక్క భుజాల నుండి సమాన దూరంలో ఉంటుంది.
అనే ధర్మాలను ఉపయోగించండి.



పటం 1.21



పటం 1.22

కోణసమద్విఖండన సిద్ధాంత వివర్యము. (Converse of angle bisector of triangle)

ΔABC యొక్క భుజము BC పై $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$, అయ్యెట్లు D బిందువు ఉన్నట్లయితే కిరణము AD, $\angle BAC$


యొక్క సమద్విఖండనము అవుతుంది.

మూడు సమాంతర రేఖలు, వాటి తిర్యగ్గేఖల ధర్మము

(Property of three parallel lines and their transversal)

కృత్యము :

- మూడు సమాంతర రేఖలను గీయండి.
- వాటికి l, m, n అని పేర్లు పెట్టండి.
- t_1, t_2 అనే రెండు తిర్యగ్గేఖలను గీయండి.
- t_1 తిర్యగ్గేఖపై AB, BC అంతరఖండములు కలవు.
- t_2 తిర్యగ్గేఖపై PQ, QR అంతరఖండములు కలవు.



పటం 1.23

- $\frac{AB}{BC}, \frac{PQ}{QR}$ అనే నిష్పత్తులను కనుగొనండి. అది దగ్గరదగ్గర సమానం అని తెలుసుకోండి.

సిద్ధాంతము : మూడు సమాంతర రేఖలు, ఒక తిర్యగ్గేఖతో ఏర్పరచిన అంతర ఖండముల నిష్పత్తి అవే రేఖలు ఏదైనా మరొక తిర్యగ్గేఖపై ఏర్పరచిన అంతరఖండముల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది.

దత్తాంశము : రేఖ $l \parallel$ రేఖ $m \parallel$ రేఖ n

t_1, t_2 లు వాటి తిర్యగ్గేఖలు


t_1 అనే తిర్యగ్గేఖ ఆ రేఖలను వరుసగా A,

B, C బిందువులలో ఖండిస్తుంది. t_2 అనే

తిర్యగ్గేఖ ఈ రేఖలను వరుసగా P, Q, R

బిందువులలో ఖండిస్తుంది.

సారాంశము : $\frac{AB}{BC} = \frac{PQ}{QR}$



పటం 1.24

ఉపపత్తి : రే.ఖం. PC గీసాము. ఇది రేఖ m ను D బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.

ΔACP లో $BD \parallel AP$

$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PD}{DC}$ (I) (ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం)

ΔCPR లో $DQ \parallel CR$


$\therefore \frac{PD}{DC} = \frac{PQ}{QR}$ (II) (ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం)

$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PD}{DC} = \frac{PQ}{QR}$ (I), (II) ల నుండి.

$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{PQ}{QR}$



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.



పటం 1.25

- (1) ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం
 ΔABC లో రే.ఖం. $PQ \parallel$ రే.ఖం. AC అయిన


$$\frac{BP}{PA} = \frac{BQ}{QC}$$

- (2) ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యయము.


ΔPQR లో ఒక వేళ $P-S-Q$; $P-T-R$

$$\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR} \text{ అయిన}$$

రే.ఖం. $ST \parallel$ రే.ఖం. QR .




పటం 1.26



పటం 1.27

- (3) కోణ సమద్విఖండన సిద్ధాంతం
 ΔABC లోని $\angle ABC$ యొక్క
 సమద్విఖండనం BD , $A-D-C$,
 అయిన $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$

- (4) మూడు సమాంతర రేఖలు వాటి తిర్యగ్రేఖల ధర్మము
 ఒకవేళ రేఖ $AX \parallel$ రేఖ $BY \parallel$ రేఖ CZ
 రేఖ l , రేఖ m లు తిర్యగ్రేఖలు వాటిని వరుసగా A ,
 B , C మరియు X , Y , Z లలో ఖండించినట్లయితే
 అయిన $\frac{AB}{BC} = \frac{XY}{YZ}$.




పటం 1.28

ఉదా. (1) ΔABC లో $DE \parallel BC$ (పటం 1.29)

ఒకవేళ $DB = 5.4$ సెం.మీ., $AD = 1.8$ సెం.మీ.

$EC = 7.2$ సెం.మీ. అయిన AE ని కనుగొనుండి.



పటం 1.29

సాధన : ΔABC లో $DE \parallel BC$

$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \dots\dots (\text{ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము})$$

$$\therefore \frac{1.8}{5.4} = \frac{AE}{7.2}$$

$$\therefore AE \times 5.4 = 1.8 \times 7.2$$


$$\therefore AE = \frac{1.8 \times 7.2}{5.4} = 2.4$$

$AE = 2.4$ సెం.మీ.

ఉదా. (2) పటం 1.30 లోని ΔPQR లో రే.ఖం. RS అనేది $\angle R$ యొక్క సమద్విఖండనము.

$PR = 15$, $RQ = 20$, $PS = 12$

అయిన SQ ను కనుగొనండి.



పటం 1.30

సాధన : ΔPRQ లో రే.ఖం. RS , $\angle R$ యొక్క సమద్విఖండనము


$$\frac{PR}{RQ} = \frac{PS}{SQ} \dots\dots\dots (\text{కోణసమద్విఖండన సిద్ధాంతము})$$

$$\frac{15}{20} = \frac{12}{SQ}$$

$$SQ = \frac{12 \times 20}{15} = 16$$

$$\therefore SQ = 16$$

కృత్యము :



పటం 1.31

ఇచ్చిన పటం 1.31లో, $AB \parallel CD \parallel EF$

ఒక వేళ $AC = 5.4$, $CE = 9$, $BD = 7.5$ అయిన


ఖాళీలను పూరించి DF ని కనుగొనండి.

సాధన : $AB \parallel CD \parallel EF$

$$\frac{AC}{CE} = \frac{BD}{DF} \dots\dots\dots (\text{ })$$

$$\frac{5.4}{9} = \frac{7.5}{DF} \therefore DF = \text{ }$$

కృత్యము :



పటం 1.32

ΔABC లో కిరణం BD , $\angle ABC$ యొక్క సమద్విఖండనము. $A-D-C$ రే.ఖం. $DE \parallel$ భుజము BC , $A-E-B$, అయిన $\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{EB}$ అని చూపండి.

సాధన : ΔABC లో కిరణము BD , $\angle B$ యొక్క సమద్విఖండనము.

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} \quad \dots\dots\dots (\text{కోణసమద్విఖండన సిద్ధాంతము}) \quad \dots\dots\dots (I)$$


ΔABC లో $DE \parallel BC$

$$\frac{AE}{EB} = \frac{AD}{DC} \quad \dots\dots\dots (\dots\dots\dots) \quad \dots\dots\dots (II)$$


$$\frac{AB}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{EB} \quad \dots\dots\dots (I), (II) \text{ ల నుండి}$$

అభ్యాసమాలిక 1.2


1. కింద కొన్ని త్రిభుజాలు మరియు రేఖా ఖండాల పొడవులు ఇవ్వబడినవి. వాటి నుండి ఏ పటంలో కిరణం PM , $\angle QPR$ యొక్క సమద్విఖండనము అవుతుందో గుర్తించండి.



పటం 1.33




పటం 1.34




పటం 1.35

2. ΔPQR లో $PM = 15$, $PQ = 25$, $PR = 20$, $NR = 8$ అయిన రేఖ NM భుజము RQ కు సమాంతరము అవుతుందా? కారణమును రాయండి.




పటం 1.36

3. ΔMNP లో NQ అనేది $\angle N$ యొక్క సమద్విఖండనం. $MN = 5$, $PN = 7$, $MQ = 2.5$ అయితే QP ని కనుగొనండి.




పటం 1.37




పటం 1.38

5. త్రైకోణం (సమలంబ చతుర్భుజం) $ABCD$ లో భుజము $AB \parallel$ భుజము $PQ \parallel$ భుజము DC ఒకవేళ $AP = 15$, $PD = 12$, $QC = 14$ అయిన BQ ని కనుగొనండి.




పటం 1.39




పటం 1.40

7. పక్క పటం 1.41 లో $AB \parallel CD \parallel FE$ అయిన X యొక్క విలువను మరియు AE ని కనుగొనండి.




పటం 1.41



పటం 1.42


9. ΔABC లో రే.ఖం. BD, $\angle ABC$ యొక్క సమద్విఖండనం. $AB = x$, $BC = x + 5$, $AD = x - 2$, $DC = x + 2$ అయిన x విలువను కనుగొనండి.



పటం 1.44

8. ΔLMN లో కిరణం MT, $\angle LMN$ యొక్క సమద్విఖండనం.

$LM = 6$, $MN = 10$, $TN = 8$ అయిన LT ని కనుగొనుండి.



పటం 1.43

10. పక్కనున్న పటం 1.44 లో త్రిభుజ అంతరములో X ఏదేని ఒక బిందువు X బిందువు త్రిభుజము యొక్క శీర్షబిందువులతో కలపబడింది. అదే విధంగా రే.ఖం. PQ $\parallel$ రే.ఖం. DE, రే.ఖం. QR $\parallel$ రే.ఖం. EF అయిన రే.ఖం. PR $\parallel$ రే.ఖం. DF అని నిరూపించుటకు కింది ఖాళీలను పూర్తి చేయండి.

ఉపపత్తి: ΔXDE లో PQ $\parallel$ DE

.....

$$\therefore \frac{XP}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{QE}$$

..... (I) (ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము)

ΔXEF లో QR $\parallel$ EF

.....

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

.....(II)

..... (I), (II) ల నుండి.


$\therefore$ రే.ఖం. PR $\parallel$ రే.ఖం. DF

..... (ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత వివర్యము)

- 11*. ΔABC లో $AB = AC$, $\angle B$ మరియు $\angle C$ ల సమద్విఖండనములు భుజము AC, భుజము AB లను వరసగా D, E బిందువులలో ఖండిస్తాయి. అయిన రే.ఖం. ED $\parallel$ రే.ఖం. BC అని నిరూపించండి.



సరూప త్రిభుజాలు (Similar triangles)



పటం 1.45


ΔABC మరియు ΔDEF లో $\angle A \cong \angle D$,

$\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$

మరియు $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$

అయిన ΔABC , ΔDEF లు సరూపములు అవుతాయి.

ΔABC , ΔDEF ల సరూపమును $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ అని రాస్తారు.



త్రిభుజముల సరూపత నియమములు (Tests for similarity of triangles)

రెండు త్రిభుజముల సరూపములు కావాలంటే వాటి మూడు సదృశ భుజములు అనుపాతములో ఉండుట మరియు మూడు సదృశ కోణములు సర్వసమానం అగుట తప్పనిసరి అవుతుంది. కాని ఈ ఆరు షరతులలోని మూడు ప్రత్యేకమైన షరతులను పాటించినట్లయితే తక్కిన షరతులు వాటింతటవే పాటించబడతాయి. అనగా రెండు త్రిభుజాలు సరూపములు కావడానికి మూడు ప్రత్యేకమైన షరతులు సరిపోతాయి. ఈ మూడు షరతులను పరిక్షించి రెండు త్రిభుజాలు సరూపములు అవుతాయని నిర్ణయించవచ్చు. ఇలాంటి సరిపడే షరతుల సమూహము అనగా సరూప నియమాలు అవుతాయి. కావున రెండు త్రిభుజాలు సరూపములు అవుతాయా అని నిర్ణయించుటకు ఆ ప్రత్యేక షరతులతో పరక్షిస్తే సరిపోతుంది.


సరూపత యొక్క కో.కో.కో. నియమము (AAA test for similarity of triangles)

రెండు త్రిభుజముల యొక్క శీర్షబిందువులలో ఇవ్వబడిన ఒకదానికొకటి సదృశమయ్యే మూడు సదృశ కోణములు సర్వసమానం అయిన ఆ త్రిభుజాలు సరూపాలు అవుతాయి.

ΔABC , ΔPQR లలో $ABC \leftrightarrow PQR$

ఈ సదృశములో $\angle A \cong \angle P$, $\angle B \cong \angle Q$,


$\angle C \cong \angle R$, అయిన $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.




పటం 1.46

అధిక వివరాలకై

కో.కో.కో. నియమము యొక్క నిరూపణ



పటం 1.47



దత్తాంశం : $\Delta ABC, \Delta PQR$ లలో
 $\angle A \cong \angle P, \angle B \cong \angle Q,$
 $\angle C \cong \angle R.$

సారాంశం : $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ఉపపత్తి : ΔABC అనేది ΔPQR కంటే పెద్దది అని అనుకుందాం. $AM = PQ, AN = PR.$ అయ్యేట్లు AB పై M బిందువును, AC పై N బిందువును తీసుకోండి. వాటి నుండి $\Delta AMN \cong \Delta PQR$ అని చూపండి.

దానినుండి $MN \parallel BC$ అని చూపవచ్చు.

ఇప్పుడు ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము నుండి $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$

అనగా, $\frac{MB}{AM} = \frac{NC}{AN}$ (విలోమ నియమము)

$\frac{MB + AM}{AM} = \frac{NC + AN}{AN}$ (సంయోగ నియమము)

$$\therefore \frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$$

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}. \text{ అదేవిధంగా } \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} \text{ అని చూపవచ్చు.}$$

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} \quad \therefore \Delta ABC \sim \Delta PQR$$

సరూప త్రిభుజాల కో.కో. నియమము (AA test for similarity of triangles)

సదృశ శీర్షబిందువులననుసరించి ఒక త్రిభుజములోని రెండు కోణములు రెండవ త్రిభుజములోని రెండు సదృశ కోణాలకు సర్వసమానంగా ఉన్నట్లయితే మొదటి త్రిభుజ తక్కిన కోణం, రెండవ త్రిభుజ తక్కిన కోణానికి సర్వసమానంగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు. అనగా ఒక త్రిభుజము యొక్క రెండు కోణములు రెండవ త్రిభుజ రెండు సదృశ కోణములకు సర్వసమానంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ షరతు (నియమము) రెండు త్రిభుజములు సరూపములు కావడానికి సరిపోతుంది.

దీని నుండి ఒక త్రిభుజ రెండు కోణములు రెండవ త్రిభుజ రెండు కోణములకు సర్వసమానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు త్రిభుజాలు సరూపాలు అవుతాయి.

ఈ ధర్మమును సరూపత యొక్క కో.కో. నియమము అంటారు.

రెండు త్రిభుజముల యొక్క సదృశ శీర్ష బిందువులననుసరించి వాటి సదృశ భుజముల రెండు జతలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉండి, ఆ భుజముల మధ్య కోణములు సర్వసమానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు త్రిభుజాలు సరూపంగా ఉంటాయి.

$$\frac{KL}{RS} = \frac{LM}{ST}$$

అయిన $\Delta KLM \sim \Delta RST$


రెండు త్రిభుజముల యొక్క సదృశ శీర్షబిందువులననుసరించి ఎప్పుడైతే ఒక త్రిభుజము యొక్క మూడు భుజములు రెండవ త్రిభుజము యొక్క మూడు భుజములతో ఒకే అనుపాతములో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ త్రిభుజములు సరూపములవుతాయి. సరూపత యొక్క ఈ ధర్మమును భు.భు.భు. నియమము అంటారు.

$$\triangle PQR \sim \triangle ZYX$$

సర్వాప త్రిభుజాల ధర్మములు :

- (1) $\Delta ABC \sim \Delta ABC$ - పరావర్తితము (Reflexivity)
- (2) ఒకవేళ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ అయిన $\Delta DEF \sim \Delta ABC$ - సౌష్ఠవత (Symmetry)
- (3) ఒకవేళ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$, $\Delta DEF \sim \Delta GHI$ అయిన $\Delta ABC \sim \Delta GHI$ -సంక్రమణ (Transitivity)

ఉదా. (1) ΔXYZ లో $\angle Y = 100^\circ$,
 $\angle Z = 30^\circ$,
 ΔLMN లో $\angle M = 100^\circ$,
 $\angle N = 30^\circ$, అయిన $\Delta XYZ, \Delta LMN$ లు
సరూపాలు అవుతాయా?
అయినట్లయితే ఏ నియమము ప్రకారం?




18

సాధన : $\Delta XYZ, \Delta LMN$ లలో,
 $\angle Y = 100^\circ, \angle M = 100^\circ \therefore \angle Y \cong \angle M$
 $\angle Z = 30^\circ, \angle N = 30^\circ \therefore \angle Z \cong \angle N$
 $\therefore \Delta XYZ \sim \Delta LMN$ (కో.కో. నియమము ప్రకారం)

ఉదా. (2) పటం 1.51 లో ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం
 త్రిభుజముల సరూపాలు అవుతాయా?
 అయినట్లయితే ఏ నియమం ప్రకారం?

సాధన : $\Delta PMN, \Delta UVW$ లలో
 $\frac{PM}{UV} = \frac{6}{3} = \frac{2}{1}, \frac{MN}{VW} = \frac{10}{5} = \frac{2}{1}$
 $\therefore \frac{PM}{UV} = \frac{MN}{VW}$




పటం 1.51

మరియు $\angle M \cong \angle V$ (దత్తాంశం)
 $\therefore \Delta PMN \sim \Delta UVW$ (భు.కో.భు. సరూప నియమము)

ఉదా. (3) పటం 1.52 లో ఇచ్చిన సమాచారం నుండి
 త్రిభుజాలు సరూపాలు అని చెప్పవచ్చునా?
 చెప్పగలిగినట్లయితే ఏ నియమం ప్రకారం?


సాధన : $\Delta XYZ, \Delta MNP$ లలో
 $\frac{XY}{MN} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3},$
 $\frac{YZ}{NP} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$
 $\therefore \frac{XY}{MN} = \frac{YZ}{NP}$



పటం 1.52

$\angle Z \cong \angle P$ అని ఇవ్వబడింది. కాని $\angle Z, \angle P$ లు అనుపాతములో గల భుజముల మధ్య
 కోణములు కావు.
 $\therefore \Delta XYZ, \Delta MNP$ సరూపములు అని చెప్పలేము.

ఉదా. (4)



పటం 1.53

పక్కపటంలో $BP \perp AC$, $CQ \perp AB$, $A-P-C$, $A-Q-B$ అయిన ΔAPB , ΔAQC లు సరూపములు అని చూపండి.

సాధన : ΔAPB , ΔAQC లలో

$$\angle APB = \boxed{}^\circ \quad (I)$$


$$\angle AQC = \boxed{}^\circ \quad (II)$$

$$\therefore \angle APB \cong \angle AQC \dots (I), (II) \text{ అనుండి.}$$

$$\angle PAB \cong \angle QAC \dots (\dots\dots\dots)$$

$$\therefore \Delta APB \sim \Delta AQC \dots (\text{కో.కో. నియమము})$$

ఉదా. (5) చతుర్భుజం ABCD యొక్క కర్ణములు Q బిందువు వద్ద ఖండించుకొనిన మరియు $2QA = QC$, $2QB = QD$. అయిన $DC = 2AB$ అని చూపండి.



పటం 1.54

$$\text{దత్తాంశం : } 2QA = QC$$

$$2QB = QD$$

$$\text{సారాంశం : } CD = 2AB$$

$$\text{ఉపపత్తి : } 2QA = QC \therefore \frac{QA}{QC} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots (I)$$

$$2QB = QD \therefore \frac{QB}{QD} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore \frac{QA}{QC} = \frac{QB}{QD} \dots\dots\dots (I), (II) \text{ అనుండి.}$$

ΔAQB , ΔCQD లలో

$$\frac{QA}{QC} = \frac{QB}{QD} \dots\dots\dots (\text{నిరూపించాం})$$


$$\angle AQB \cong \angle DQC \dots\dots\dots (\text{శీర్షాభిముఖ కోణములు})$$

$$\therefore \Delta AQB \sim \Delta CQD \dots\dots\dots (\text{భు.కో.భు. సరూప నియమము})$$


$$\therefore \frac{AQ}{CQ} = \frac{QB}{QD} = \frac{AB}{CD} \dots\dots\dots (\text{సదృశ భుజాల అనుపాతము})$$

$$\begin{aligned} \therefore, \quad \frac{AQ}{CQ} &= \frac{1}{2} \therefore \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2} \\ \therefore 2AB &= CD \end{aligned}$$

1. పటం 1.55 లో $\angle ABC = 75^\circ$,
 $\angle EDC = 75^\circ$ అయిన ఏ రెండు త్రిభుజాలు ఏ
 నియమము ప్రకారం సరూపాలు అవుతాయి?
 వీటి సరూపత సరియైన సదృశ రూపంలో రాయండి.




పటం 1.55




పటం 1.56

2. పటం 1.56 లోని త్రిభుజములు సరూపములా?
 అయినట్లయితే ఏ నియమము ప్రకారం?

3. పటం 1.57 లో చూపిన విధంగా 8 మీటర్లు, 4
 మీటర్లు ఎత్తుగల రెండు స్థంభములు చదునైన నేలపై
 నిటారుగా ఉన్నాయి. ఎండచేత చిన్న స్థంభం యొక్క
 నీడ 6 మీటర్లు ఏర్పడినట్లయితే అదే సమయంలో
 పెద్ద స్థంభం యొక్క నీడ ఎంత పొడవు ఉంటుంది?




పటం 1.57




పటం 1.58

4. ΔABC లో $AP \perp BC$, $BQ \perp AC$
 $B-P-C$, $A-Q-C$ అయిన
 $\Delta CPA \sim \Delta CQB$ అని చూపండి.
 ఒక వేళ $AP = 7$, $BQ = 8$, $BC = 12$
 అయిన AC ని కనుగొనండి.

5. పటంలో ట్రేపీజియం (సమలంబచతుర్భుజం) PQRS లో, భుజము PQ || భుజము SR, AR = 5AP, AS = 5AQ అయిన SR = 5PQ అని నిరూపించండి.




పటం 1.59




పటం 1.60

7. □ABCD ఒక సమాంతర చతుర్భుజము. భుజము BC పై E ఒక బిందువు కలదు, రేఖ DE కిరణము AB ని T బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది. అయిన $DE \times BE = CE \times TE$ అని చూపండి.




పటం 1.61



పటం 1.62

8. పటంలో రే.ఖం. AC, రే.ఖం. BD పరస్పరం P బిందువు వద్ద ఖండించుకొనిన మరియు $\frac{AP}{CP} = \frac{BP}{DP}$ అయిన $\Delta ABP \sim \Delta CDP$ అని నిరూపించండి.

9. పటంలోని ΔABC లో $\angle BAC = \angle ADC$ అయ్యేట్లు భుజము BC పై D ఒక బిందువు కలదు. అయిన, $CA^2 = CB \times CD$ అని నిరూపించండి.




పటం 1.63



తెలుసుకుందాం.

సరూప త్రిభుజ వైశాల్యాల సిద్ధాంతం. (Theorem of areas of similar triangles)

సిద్ధాంతము : రెండు త్రిభుజాలు సరూపాలు అయిన వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి వాటి సదృశ భుజాల వర్గముల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది.



పటం 1.64

దత్తాంశము : $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, $AD \perp BC$, $PS \perp QR$

సారాంశము :
$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AC^2}{PR^2}$$

ఉపపత్తి :
$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AD}{QR \times PS} = \frac{BC}{QR} \times \frac{AD}{PS} \quad \dots\dots\dots (I)$$

ΔABD మరియు ΔPQS లలో

$\angle B = \angle Q \quad \dots\dots\dots (\text{దత్తాంశము})$

$\angle ADB = \angle PSQ = 90^\circ$

$\therefore$ కో.కో. నియమము ప్రకారం $\Delta ABD \sim \Delta PQS$

$\therefore \frac{AD}{PS} = \frac{AB}{PQ} \quad \dots\dots\dots (II)$

కాని $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} \quad \dots\dots\dots (III)$

(II), (III) ల నుండి

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{BC}{QR} \times \frac{AD}{PS} = \frac{BC}{QR} \times \frac{BC}{QR} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{BC^2}{QR^2}$$

1. రెండు సరూప త్రిభుజాల సదృశ భుజాల నిష్పత్తి 3:5 అయిన వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

2. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ మరియు $AB : PQ = 2:3$, అయిన కింది ఖాళీలను పూర్తి చేయండి.

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{2^2}{3^2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

3. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, $A(\Delta ABC) = 16$, $A(\Delta PQR) = 25$, అయిన కింది ఖాళీలను పూర్తి చేయండి.

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta PQR)} = \frac{16}{25} \quad \therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

4. $\Delta LMN \sim \Delta PQR$, $9 \times A(\Delta PQR) = 16 \times A(\Delta LMN)$, $QR = 20$ అయిన MN ను కనుగొనండి.

5. రెండు సరూప త్రిభుజాల వైశాల్యాలు 225 చ.సెం.మీ., 81 చ.సెం.మీ. గలవు ఒక వేళ చిన్న త్రిభుజము యొక్క ఒక భుజము 12 సెం.మీ. ఉన్నట్లయితే పెద్ద త్రిభుజ సదృశ భుజమును కనుగొనండి.

6. ΔABC , ΔDEF లు రెండు సమబాహు త్రిభుజములు. $A(\Delta ABC) : A(\Delta DEF) = 1 : 2$

$AB = 4$ అయిన DE యొక్క పొడవును కనుగొనండి.

7. పటం 1.66 లో రే.ఖం. $PQ \parallel$ రే.ఖం. DE , $A(\Delta PQF) = 20$ చ.యూ. $PF = 2 DP$ అయిన $A(\square DPQE)$ కనుగొనుటకు కింది కృత్యమును పూర్తి చేయండి.

$A(\Delta PQF) = 20$ చ.యూనిట్లు, $PF = 2 DP$, $DP = x$ అనుకొనిన $\therefore PF = 2x$

$$DF = DP + \boxed{} = \boxed{} + \boxed{} = 3x$$

ΔFDE , ΔFPQ లో

$$\angle FDE \cong \angle \boxed{} \quad (\text{సదృశ కోణము})$$

$$\angle FED \cong \angle \boxed{} \quad (\text{సదృశ కోణము})$$

$$\therefore \Delta FDE \sim \Delta FPQ \dots\dots\dots (\text{కో.కో. నియమము})$$


$$\therefore \frac{A(\Delta FDE)}{A(\Delta FPQ)} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{(3x)^2}{(2x)^2} = \frac{9}{4}$$

$$A(\Delta FDE) = \frac{9}{4} A(\Delta FPQ) = \frac{9}{4} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A(\square DPQE) = A(\Delta FDE) - A(\Delta FPQ)$$

$$= \boxed{} - \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



పటం 1.66


1. కింది ఉపప్రశ్నలకు బహుశ్చైచ్ఛికములు (మల్టిపుల్ ఛాయిస్) ఇవ్వబడినవి వాటిలోని సరియైన ఐచ్ఛికమును గుర్తించండి.

(1) ΔABC , ΔPQR లో సదృశ భుజాలు

$$\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ} \text{ అయిన}$$

కిందివాటిలో ఏది సత్యము?

- (A) $\Delta PQR \sim \Delta ABC$
 (B) $\Delta PQR \sim \Delta CAB$
 (C) $\Delta CBA \sim \Delta PQR$
 (D) $\Delta BCA \sim \Delta PQR$




పటం 1.67

(2) ΔDEF , ΔPQR లో,

$\angle D \cong \angle Q$, $\angle R \cong \angle E$, అయిన

కిందివాటిలో ఏది అసత్యము?

- (A) $\frac{EF}{PR} = \frac{DF}{PQ}$ (B) $\frac{DE}{PQ} = \frac{EF}{RP}$
 (C) $\frac{DE}{QR} = \frac{DF}{PQ}$ (D) $\frac{EF}{RP} = \frac{DE}{QR}$




పటం 1.68

(3) ΔABC , ΔDEF లో $\angle B = \angle E$,

$\angle F = \angle C$, $AB = 3 DE$, అయిన ఆ రెండు

త్రిభుజాలకు సంబంధించిన సరియైన వాక్యము ఏది?

- (A) అవి సర్వసమానం కావు మరియు సరూపములు కూడా కావు.
 (B) అవి సరూపములు కాని సర్వసమానం కావు.
 (C) అవి సర్వసమానం మరియు సరూపములు కూడా అవుతాయి.
 (D) పై వాక్యాలలో ఏదీ సత్యము కాదు.



పటం 1.69


(4) ΔABC , ΔDEF లు రెండు సమబాహు

త్రిభుజములు, $A(\Delta ABC) : A(\Delta DEF)$

$= 1 : 2$, $AB = 4$ అయినట్లయితే DE

యొక్క పొడవు ఎంత?

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 4 (C) 8 (D) $4\sqrt{2}$




పటం 1.70

(5) పటం 1.71 లో రే.ఖం. $XY \parallel$ రే.ఖం. BC అయిన కింది వాటిలో ఏది సత్యము?

(A) $\frac{AB}{AC} = \frac{AX}{AY}$ (B) $\frac{AX}{XB} = \frac{AY}{AC}$

(C) $\frac{AX}{YC} = \frac{AY}{XB}$ (D) $\frac{AB}{YC} = \frac{AC}{XB}$



పటం 1.71


2. ΔABC లో $B - D - C$, $BD = 7$,

$BC = 20$ అయిన కింది నిష్పత్తులను కనుగొనండి.

(1) $\frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ADC)}$

(2) $\frac{A(\Delta ABD)}{A(\Delta ABC)}$


(3) $\frac{A(\Delta ADC)}{A(\Delta ABC)}$



పటం 1.72

3. సమాన ఎత్తులు గల రెండు త్రిభుజాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి 2:3 చిన్న త్రిభుజము భూమి 6 సెం.మీ. అయిన పెద్ద త్రిభుజ సదృశ భూమి ఎంత ఉంటుంది?

4.



పటం 1.73

పటం 1.73 లో $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$

$AB = 6$, $DC = 8$


అయిన $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta DCB)} =$ ఎంత?

5. పటం 1.74 లో $PM = 10$ సెం.మీ.

$A(\Delta PQS) = 100$ చ.సెం.మీ.

$A(\Delta QRS) = 110$ చ.సెం.మీ.

అయిన NR కనుగొనండి.



పటం 1.74


6. $\Delta MNT \sim \Delta QRS$ బిందువు T నుండి గీసిన లంబం యొక్క పొడవు 5 అయి, S బిందువు నుండి గీసిన లంబము

పొడవు 9 అయిన $\frac{A(\Delta MNT)}{A(\Delta QRS)}$ యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.


7. పటం 1.75 లో $A - D - C$ మరియు $B - E - C$.

రేఖం. $DE \parallel$ భుజము AB . $AD = 5$,

$DC = 3$, $BC = 6.4$ అయిన BE కనుగొనండి.



పటం 1.75



పటం 1.76

8. పటం 1.76 లో, రేఖం. PA , రేఖం. QB , రేఖం. RC మరియు రేఖం. SD లు రేఖ AD కి లంబాలు. $AB = 60$, $BC = 70$, $CD = 80$, $PS = 280$, అయిన PQ , QR , RS లను కనుగొనండి.

9. $\triangle PQR$ లో రేఖం. PM అనేది మధ్యగత రేఖ $\angle PMQ$, $\angle PMR$ ల యొక్క సమద్విఖండనాలు భుజము PQ , భుజము PR లను వరసగా X , Y లలో ఖండిస్తాయి. అయిన $XY \parallel QR$ అని నిరూపించండి.

నిరూపణలోని ఖాళీలను పూరించి నిరూపణను పూర్తిచేయండి.

$\triangle PMQ$ లో కిరణం MX అనేది $\angle PMQ$ యొక్క సమద్విఖండనం.

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots (I) \text{ (కోణ సమద్విఖండన సిద్ధాంతం)}$$


$\triangle PMR$ లో కిరణం MY అనేది $\angle PMR$ యొక్క కోణసమద్విఖండనం.

$$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots (II) \text{ (కోణ సమద్విఖండన సిద్ధాంతం)}$$

$$\therefore \frac{MP}{MQ} = \frac{MP}{MR} \dots\dots\dots (M \text{ అనేది } QR \text{ యొక్క మధ్యబిందువు అనగా } MQ = MR)$$


$$\therefore \frac{PX}{XQ} = \frac{PY}{YR}$$

$$\therefore XY \parallel QR \dots\dots\dots (\text{ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యయము})$$




పటం 1.77

- 10*. పటం 1.78 లోని ΔABC యొక్క $\angle B$, $\angle C$ కోణాల సమద్విఖండన రేఖలు ఒకదానినొకటి X వద్ద ఖండించుకుంటాయి. రేఖ AX భుజము BC ని Y వద్ద ఖండిస్తుంది. ఒక వేళ $AB = 5$, $AC = 4$, $BC = 6$ అయిన $\frac{AX}{XY}$ యొక్క విలువను కనుగొనండి.




పటం 1.78



పటం 1.79

11. $\square ABCD$ లో రే.ఖం. $AD \parallel$ రే.ఖం. BC . కర్ణము AC, BD లు పర్పవరం P బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి. అయిన $\frac{AP}{PD} = \frac{PC}{BP}$ అని చూపండి.



పటం 1.80

12. పటం 1.80 లో $XY \parallel$ భుజము AC. ఒక వేళ $2AX = 3BX$ మరియు $XY = 9$ అయిన AC యొక్క విలువను కనుగొనుటకు కింది కృత్యమును పూర్తి చేయండి.

కృత్యము : $2AX = 3BX \therefore \frac{AX}{BX} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

$\frac{AX+BX}{BX} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots$ (సంయోగ నియమము)


$\frac{AB}{BX} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots$ (I)

$\Delta BCA \sim \Delta BYX \dots\dots\dots$ (సరూపత యొక్క $\boxed{}$ నియమం)

$\therefore \frac{BA}{BX} = \frac{AC}{XY} \dots\dots\dots$ (సరూప త్రిభుజాల సదృశ భుజములు)

$\therefore \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{AC}{9} \therefore AC = \boxed{} \dots\dots\dots$ (I) నుండి

- 13*. ΔABC లో $\angle A = 90^\circ$. $\square DEFG$ చతురస్రం యొక్క శీర్షములు D, E లు BC భుజము పై కలవు. F బిందువు భుజము AC పై G భుజము భుజం AB పై గలవు. అయిన $DE^2 = BD \times EC$ అని చూపండి. (ΔGBD , ΔCFE లు సరూపములు అని చూపండి. $GD = FE = DE$ ను ఉపయోగించండి)



పటం 1.81





పదండి నేర్చుకుందాం.


- పైథాగరస్ త్రికములు
- సర్వాపత మరయు లంబకోణ త్రిభుజము
- గుణమధ్యమము యొక్క సిద్ధాంతం
- పైథాగరస్ సిద్ధాంతం
- పైథాగరస్ సిద్ధాంతం యొక్క ఉపయోగం
- అపోలోనియస్ సిద్ధాంతం



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

పైథాగరస్ సిద్ధాంతం :

లంబకోణ త్రిభుజములోని కర్ణము యొక్క వర్గం మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తమునకు సమానం.



పటం 2.1

$$\Delta PQR \text{ లో } \angle PQR = 90^\circ$$

$$l(PR)^2 = l(PQ)^2 + l(QR)^2$$

దీనిని మనం $PR^2 = PQ^2 + QR^2$ అని రాద్ధాం.

ΔPQR యొక్క PQ , QR , PR భుజముల పొడవులు వరుసగా r , p మరియు q ఈ అక్షరాలతో నూచించే చిహ్నాలు వీటిని బట్టి పటం 2.1 సందర్భంలో పైథాగరస్ సిద్ధాంతమును $q^2 = p^2 + r^2$ అని రాయవచ్చును.

పైథాగరస్ త్రికములు :

సహజ సంఖ్యలలోని త్రికములలో ఒక సంఖ్య యొక్క వర్గం ఇతర రెండు సంఖ్యల వర్గాల మొత్తమునకు సమానంగా ఉన్నచో, వాటిని పైథాగరస్ త్రికములు అని అంటారు.

ఉదాహరణకు : (11, 60, 61) ఈ సంఖ్యల త్రికములలో

$$11^2 = 121, \quad 60^2 = 3600, \quad 61^2 = 3721 \quad \text{మరియు} \quad 121 + 3600 = 3721$$

ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్య యొక్క వర్గం మిగిలిన ఇతర రెండు సంఖ్యల వర్గాల మొత్తమునకు సమానంగా ఉంది.

$\therefore$ 11, 60, 61 లు పైథాగరస్ త్రికములు.

ఇదేవిధంగా (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (24, 25, 7) వీటిలో పైథాగరస్ త్రికములు ఏవి అవుతాయో సరిచూడండి.

పైథాగరస్ త్రికములలోని సంఖ్యలను ఏ క్రమములోనైన రాయవచ్చు.



తెలుసుకుందాం.

ఇప్పుడు మనం పైథాగరస్ సిద్ధాంతం యొక్క నిరూపణ సరూప త్రిభుజాల యొక్క ఆధారంగా చేయబోతున్నాము. దీనిని నిరూపించుటకు అవసరమయ్యే లంబకోణ త్రిభుజాల సరూప సంబంధ ధర్మములను నేర్చుకుందాం.

సరూపత మరియు లంబకోణ త్రిభుజం (Similarity and right angled triangle)

సిద్ధాంతం : ఒక లంబకోణ త్రిభుజమునందు లంబకోణము నుండి కర్ణమునకు ఒక లంబమును గీయగా దీనికి ఇరువైపుల ఏర్పడు రెండు త్రిభుజములు పరస్పరం సరూపంగా ఉండి దత్త త్రిభుజముతో సరూపతను కలిగి ఉంటాయి.


దత్తాంశం : ΔABC లో $\angle ABC = 90^\circ$,

రే.ఖం. $BD \perp$ రే.ఖం. AC , $A-D-C$

సారాంశం : $\Delta ADB \sim \Delta ABC$

$\Delta BDC \sim \Delta ABC$

$\Delta ADB \sim \Delta BDC$



పటం 2.5

ఉపపత్తి : ΔADB మరియు ΔABC లలో

$\angle DAB \cong \angle BAC \dots$ (ఉమ్మడి కోణాలు)

$\angle ADB \cong \angle ABC \dots$ (90° కోణము)

$\Delta ADB \sim \Delta ABC \dots$ (కో.కో. నియమం)..(I)

అదేవిధంగా, ΔBDC మరియు ΔABC లలో

$\angle BCD \cong \angle ACB \dots$ (ఉమ్మడి కోణాలు)

$\angle BDC \cong \angle ABC \dots$ (90° కోణము)

$\Delta BDC \sim \Delta ABC \dots$ (కో.కో. నియమం)..(II)

$\therefore \Delta ADB \sim \Delta BDC$ సమీ (I) మరియు (II) ల నుండి ... (III)

$\therefore \Delta ADB \sim \Delta BDC \sim \Delta ABC$ (I), (II) మరియు (III) ల నుండి.... సంక్రమణ ధర్మము.

గుణమధ్యమము యొక్క సిద్ధాంతం (Theorem of geometric mean)

లంబకోణ త్రిభుజములో కర్ణమునకు దాని ఎదుటి శీర్షముండి గీచిన లంబరేఖ పొడవు కర్ణములో ఏర్పడే రేఖాఖండముల యొక్క గుణ మధ్యమము అగును.


ఉపపత్తి : లంబకోణ త్రిభుజం PQR లో రే.ఖం. $QS \perp$ కర్ణం PR

$\Delta QSR \sim \Delta PSQ \dots\dots\dots$ (లంబకోణ త్రిభుజాల సరూపత)

$$\therefore \frac{QS}{PS} = \frac{SR}{SQ}$$

$$\therefore \frac{QS}{PS} = \frac{SR}{QS}$$

$$QS^2 = PS \times SR$$



పటం 2.6

$\therefore$ శీర్షలంబం QS అనేది రే.ఖం. PS మరియు రే.ఖం. SR ల గుణమధ్యమం.



పైథాగరస్ సిద్ధాంతం (Theorem of Pythagoras)

లంబకోణ త్రిభుజమునందలి కర్ణము యొక్క వర్గము మిగిలిన రెండు భుజముల వర్గముల మొత్తమునకు సమానమగును.

దత్తాంశం : ΔABC లో, $\angle ABC = 90^\circ$

సారాంశం : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

నిర్మాణం : బిందువు B నుండి భుజం AC పై రే.ఖం. BD ను లంబముగా గీయుము. A-D-C

ఉపపత్తి : లంబకోణ త్రిభుజం ΔABC లో రే.ఖం. $BD \perp$ కర్ణం AC (నిర్మాణం)

$\therefore \Delta ABC \sim \Delta ADB \sim \Delta BDC$ (లంబకోణ త్రిభుజముల సరూపత) పటం 2.7

$\Delta ABC \sim \Delta ADB$

$$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DB} = \frac{AC}{AB} \text{ - (సదృశ భుజాలు)}$$

$$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AB}$$

$$AB^2 = AD \times AC \text{ (I)}$$

(I) మరియు (II) లను కూడగా


$$AB^2 + BC^2 = AD \times AC + DC \times AC$$

$$= AC (AD + DC)$$

$$= AC \times AC \text{ (A-D-C)}$$

$$\therefore AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$$



$\Delta ABC \sim \Delta BDC$

$$\therefore \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{BC} \text{ - (సదృశ భుజాలు)}$$

$$\therefore \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{BC}$$

$$BC^2 = DC \times AC \text{ (II)}$$


పైథాగరస్ సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యయము (Converse of Pythagoras' theorem)

ఏదేని త్రిభుజమునందలి ఒక భుజము యొక్క వర్గము మిగిలిన రెండు భుజముల వర్గముల మొత్తమునకు సమానమైనచో


ఆ త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజము అవుతుంది.

దత్తాంశం : ΔABC లో, $AC^2 = AB^2 + BC^2$

సారాంశం : $\angle ABC = 90^\circ$



పటం 2.8



పటం 2.9

నిర్మాణం : $AB = PQ$, $BC = QR$, $\angle PQR = 90^\circ$ అగునట్లు $\triangle PQR$ గీయుము.

ఉపపత్తి : $\triangle PQR$ లో, $\angle Q = 90^\circ$

$$PR^2 = PQ^2 + QR^2 \quad \dots\dots\dots (\text{పైథాగరస్ సిద్ధాంతం})$$

$$= AB^2 + BC^2 \quad \dots\dots\dots (\text{నిర్మాణం})$$

$$= AC^2 \quad \dots\dots\dots (\text{దత్తాంశం})$$

$$\therefore PR^2 = AC^2,$$

$$\therefore PR = AC$$


$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle PQR \quad \dots\dots\dots (\text{భు-భు-భు నియమం})$$

$$\therefore \angle ABC = \angle PQR = 90^\circ$$



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

(1) (a) సరూపత మరియు లంబకోణ త్రిభుజము.



పటం 2.10

$\triangle PQR$ లో $\angle Q = 90^\circ$, రే.ఖం. $QS \perp$ రే.ఖం. PR
ఇచ్చట $\triangle PQR \sim \triangle PSQ \sim \triangle QSR$ ఈ విధంగా
పటంలో ఏర్పడిన అన్ని లంబకోణ త్రిభుజాలు పరస్పర
సరూపములు.

(b) గుణమధ్యమము యొక్క సిద్ధాంతం.

$$\text{పై పటంలో } \triangle PSQ \sim \triangle QSR$$

$$\therefore QS^2 = PS \times SR$$

$$\therefore \text{రే.ఖం. } QS, \text{ అనేది రే.ఖం. } PS \text{ మరియు రే.ఖం. } SR \text{ ల గుణ మధ్యమము.}$$

(2) పైథాగరస్ సిద్ధాంతం:

లంబకోణ త్రిభుజమునందలి కర్ణము యొక్క వర్గము దానిలో మిగిలిన రెండు భుజముల వర్గముల మొత్తమునకు సమానమగును.

(3) పైథాగరస్ సిద్ధాంతం యొక్క వివర్యము:

ఏదేని త్రిభుజమునందలి ఒక భుజము యొక్క వర్గము దానిలో మిగిలిన రెండు భుజముల వర్గముల మొత్తమునకు సమానమైనచో ఆ త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజము అవుతుంది.

ఇవే కాకుండా మరో ధర్మము చాలా ఉపయోగబడును, దానిని కూడా గుర్తుంచుకొందాం.


(4) లంబకోణ త్రిభుజములో ఒక భుజం కర్ణములో సగం ఉన్నచో దానికి ఎదురుగా ఉన్న కోణం 30° అవుతుంది.

ఈ ధర్మమును $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ కోణము త్రిభుజ సిద్ధాంతం యొక్క వివర్యము.



ఉదా. (1) పటం 2.11 లో ΔABC లో $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, $AC = 14$ అయిన AB మరియు BC లను కనుగొనండి.

సాధన :



పటం 2.11

ΔABC లో,

$$\angle B = 90^\circ, \angle A = 30^\circ, \therefore \angle C = 60^\circ$$

$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ సిద్ధాంతం ప్రకారం,

$$BC = \frac{1}{2} \times AC$$

$$AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \times AC$$

$$BC = \frac{1}{2} \times 14$$


$$AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 14$$

$$BC = 7$$

$$AB = 7\sqrt{3}$$

ఉదా. (2) పటం 2.12 లో ΔABC లో రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC , $\angle C = 45^\circ$, $BD = 5$ మరియు $AC = 8\sqrt{2}$, అయినచో AD మరియు BC లను కనుగొనండి.

సాధన :



పటం 2.12

ΔADC లో,

$$\angle ADC = 90^\circ, \angle C = 45^\circ, \therefore \angle DAC = 45^\circ$$

$$AD = DC = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 8\sqrt{2} \dots (45^\circ - 45^\circ - 90^\circ \text{ సిద్ధాంతం ప్రకారం})$$

$$\therefore DC = 8 \quad \therefore AD = 8$$

$$BC = BD + DC$$

$$= 5 + 8$$

$$= 13$$

ఉదా. (3) పటం 2.13 లో $\angle PQR = 90^\circ$, రే.ఖం. $QN \perp$ రే.ఖం. PR , $PN = 9$, $NR = 16$ అయిన QN కనుగొనండి.

సాధన : ΔPQR లో, రే.ఖం. $QN \perp$ రే.ఖం. PR


$$\therefore QN^2 = PN \times NR \dots (\text{గుణమధ్యమం యొక్క ధర్మం})$$

$$\therefore QN = \sqrt{PN \times NR}$$

$$= \sqrt{9 \times 16}$$

$$= 3 \times 4$$


$$= 12$$



పటం 2.13

సాధన : ΔPQR లో, $\angle PQR = 90^\circ$, రే.ఖం. $QS \perp$ రే.ఖం. PR

$$\begin{aligned} QS &= \sqrt{PS \times SR} \dots\dots\dots (\text{గుణ మధ్యమం యొక్క సిద్ధాంతం}) \\ &= \sqrt{10 \times 8} \\ &= \sqrt{5 \times 2 \times 8} \\ &= \sqrt{5 \times 16} \\ &= 4\sqrt{5} \\ x &= 4\sqrt{5} \end{aligned}$$



పటం 2.14


$$\begin{aligned} \Delta \text{ QSR } 6, \angle \text{ QSR } &= 90^\circ \\ \therefore \text{ QR}^2 &= \text{ QS}^2 + \text{ SR}^2 \\ &= (4\sqrt{5})^2 + 8^2 \\ &= 16 \times 5 + 64 \\ &= 80 + 64 \\ &= 144 \\ \therefore \text{ QR} &= 12 \end{aligned}$$

వీటి నుండి, $x = 4\sqrt{5}$, $y = 12$, $z = 6\sqrt{5}$

$$\begin{aligned} \Delta \text{PSQ} &\text{ is a right angled triangle, } \angle \text{QSP} = 90^\circ \\ \therefore \text{PQ}^2 &= \text{QS}^2 + \text{PS}^2 \\ &= (4\sqrt{5})^2 + 10^2 \\ &= 16 \times 5 + 100 \\ &= 80 + 100 \\ &= 180 \\ &= 36 \times 5 \\ \therefore \text{PQ} &= 6\sqrt{5} \end{aligned}$$

ఉదా. (5) లంబకోణ త్రిభుజములో లంబకోణంను ఏర్పరచు భుజాలు 9 సెం.మీ. మరియు 12 సెం.మీ. అయిన ఆ త్రిభుజము యొక్క కర్ణమును కనుగొనండి.

సాధన : ΔPQR లో, $\angle Q = 90^\circ$



పటం 2.15

$$\begin{aligned} PR^2 &= PQ^2 + QR^2 \text{ (పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం)} \\ &= 9^2 + 12^2 \\ &= 81 + 144 \\ \therefore PR^2 &= 225 \\ \therefore PR &= 15 \\ \text{ప్రతిభుజ కర్తము} &= 15 \text{ సెం.మీ.} \end{aligned}$$

సాధన : $l = 5, \quad m = 13, \quad n = 12$
 $l^2 = 25, \quad m^2 = 169, \quad n^2 = 144$
 $\therefore m^2 = l^2 + n^2$

ఉదా. (7) పటం 2.16 లోని ΔABC లో, రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC , అయిన $AB^2 + CD^2 = BD^2 + AC^2$ అని నిరూపించుము.

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$\therefore AD^2 = AC^2 - CD^2 \dots (I)$$


 $\Delta ADB \cong$

$$AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$\therefore AD^2 = AB^2 - BD^2 \dots (II)$$

$$\therefore AB^2 - BD^2 = AC^2 - CD^2 \dots\dots\dots [(I) \text{ మరియు } (II) \text{ నుండి}]$$

$$\therefore AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2$$



పటం 2.16

అభ్యాసమాలిక 2.1


1. కింది ప్రకముల నుండి పెథాగరస్ ప్రకములు ఏవో వాటిని గుర్తించి కారణముతో రాయండి.

- (1) (3, 5, 4) (2) (4, 9, 12) (3) (5, 12, 13)
(4) (24, 70, 74) (5) (10, 24, 27) (6) (11, 60, 61)


2. పటం 2.17 లో $\angle MNP = 90^\circ$,

രേ.ഖം. $NQ \perp$ രേ.ഖം. MP , $MQ = 9$,

QP = 4 అయిన NQ ను కనుగొనండి.



పటం 2.18




పటం 2.17

3. పటం 2.18 లో $\angle QPR = 90^\circ$,

రే.ఖం. $PM \perp$ రే.ఖం. QR మరియు $Q-M-R$,

PM = 10, QM = 8 అనుండి QR ని కనుగొనండి.

-




పటం 2.20

5. పటం 2.20 లో ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా AB మరియు BC కనుగొనుటకు కింది కృత్యమును పూర్తి చేయండి.

$$\begin{aligned} AB &= BC \dots\dots\dots \boxed{} \\ \therefore \angle BAC &= \boxed{} \\ \therefore AB &= BC = \boxed{} \times AC \\ &= \boxed{} \times \sqrt{8} \\ &= \boxed{} \times 2\sqrt{2} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

6. ఒక చతురస్రపు కర్ణము పొడవు 10 సెం.మీ. అయిన భుజము పొడవు మరియు చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.


7. పటం 2.21 లో $\angle DFE = 90^\circ$,
రే.ఖం. $FG \perp$ రే.ఖం. ED . ఒక వేళ $GD = 8$,
 $FG = 12$, అయిన (1) EG (2) FD
(3) EF ల ను కనుగొనండి.



పటం 2.21

8. ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు 35 సెం.మీ. మరియు వెడల్పు 12 సెం.మీ. అయినచో దాని కర్ణం పొడవును కనుగొనండి.

- 9★. పటం 2.22 లో భుజము QR యొక్క మధ్యబిందువు M. $\angle PRQ = 90^\circ$ అయిన $PQ^2 = 4PM^2 - 3PR^2$ అని నిరూపించండి.



పటం 2.22

- 10*. రహదారికి ఇరువైపుల గల భవనాలు ఒకదానికొకటి సమాతరంగా ఉన్నవి. 5.8 మీ పొడవు గల నిచ్చెన కింది భాగము రహదారికి ఒక వైపున పెట్టిన దాని పైభాగము మొదటి భవనమును 4 మీ ఎత్తులో కిటికీ వద్ద ఉంటుంది. అదే స్థానము నుండి నిచ్చెనను రహదారికి ఇంకోవైపు మల్లించిన దాని పై భాగము రెండవ భవనమును 4.2 మీ ఎత్తులోగల కిటికీ వద్ద ఉంటుంది. అయిన రహదారి వెడల్పును కనుగొనండి.



తెలుసుకుందాం.

పైథాగరస్ సిద్ధాంతం యొక్క ఉపయోగాలు :

పైథాగరస్ సిద్ధాంతంలో లంబకోణ త్రిభుజంలోని కర్ణం మరియు లంబకోణంను ఏర్పరచు భుజాల వరస్పర సంబంధాన్నే అనగా లంబకోణము ఎదుటి భుజము మరియు ఇతర రెండు భుజాల మధ్య సంబంధం గురించి తెలుసుకున్నాం.


త్రిభుజంలోని అల్పకోణపు ఎదుటి భుజము ఇతర రెండు భుజాల మధ్యగల సంబంధమును, అధికకోణము ఎదుటి భుజము యొక్క ఇతర రెండు భుజాలకు మధ్యగల సంబంధంను పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. ఈ సంబంధమును కింది ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఉదా.(1) ΔABC లో, $\angle C$ అల్పకోణం, రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC అయిన

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \times DC \text{ అని నిరూపించండి.}$$

ఇచ్చిన పటంలో, $AB = c$, $AC = b$, $AD = p$, $BC = a$, $DC = x$ అనుకుందాం.

$$\therefore BD = a - x$$



పటం 2.23

ΔADB లో, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం

$$c^2 = (a-x)^2 + \square$$

$$c^2 = a^2 - 2ax + x^2 + \square \dots\dots\dots (I)$$

ΔADC లో, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం

$$b^2 = p^2 + \square$$

$$p^2 = b^2 - \square \dots\dots\dots (II)$$

(II) లోని p^2 విలువను, (I) లో ప్రతిక్షేపించగా,

$$c^2 = a^2 - 2ax + x^2 + b^2 - x^2$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 - 2ax$$

$$\therefore AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \times DC$$

ఉదా.(2) ΔABC లో, $\angle ACB$ అధికకోణం, రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC , అయిన

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2BC \times CD \text{ అని నిరూపించండి.}$$

ఒకవేళ $AD = p$, $AC = b$, $AB = c$,


$BC = a$, $DC = x$ అనుకుందాం.

$$DB = a + x$$

ΔADB లో, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం,

$$c^2 = (a + x)^2 + p^2$$

$$c^2 = a^2 + 2ax + x^2 + p^2 \dots\dots\dots (I)$$



పటం 2.24

ఇదేవిధంగా ΔADC లో,

$$b^2 = x^2 + p^2$$

$$\therefore p^2 = b^2 - x^2 \quad \dots\dots\dots (II)$$


$\therefore$ (I) లో (II) లోని p^2 విలువను ప్రతిక్షేపించగా,

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + 2ax + x^2 + b^2 - x^2 \\ &= a^2 + 2ax + b^2 \end{aligned}$$

$$\therefore AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2BC \times CD$$

అపోలోనియస్ సిద్ధాంతం (Appollonius' Theorem)

ΔABC లో, భుజం BC యొక్క మధ్య బిందువు M అయినచో $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$ అవుతుంది.



పటం 2.25

దత్తంశం : ΔABC లో భుజము BC యొక్క మధ్య బిందువు M .

$$\text{సారాంశం : } AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$$

నిర్మాణం : రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC గీయుము.

ఉపపత్తి : ఒకవేళ రే.ఖం. AM , రే.ఖం. BC కి లంబంగా లేనట్లయితే $\angle AMB$ మరియు $\angle AMC$ లలో ఒకటి అధికకోణము మరియు రెండవది అల్పకోణము అవుతుంది.

పటంలో $\angle AMB$ అధిక కోణము $\angle AMC$ అల్పకోణము.

పై ఉదా (1) మరియు (2) ల నుండి,

$$AB^2 = AM^2 + MB^2 + 2BM \times MD \quad \dots\dots (I)$$

$$\text{మరియు } AC^2 = AM^2 + MC^2 - 2MC \times MD$$

$$\therefore AC^2 = AM^2 + MB^2 - 2BM \times MD \quad (\because BM = MC) \quad \dots\dots\dots (II)$$

$\therefore$ (I) మరియు (II) లను కూడగా,

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$$

ఒక వేళ రే.ఖం. $AM \perp$ భుజము BC అయిన ఈ సిద్ధాంతము యొక్క నిరూపణ మీరు రాయండి.

ఈ ఉదాహరణ ద్వారా త్రిభుజము యొక్క భుజాలు మరియు మధ్యగత రేఖలకు పరస్పర సంబంధం గలదు అని తెలుస్తుంది. దీనినే అపోలోనియస్ సిద్ధాంతం అంటారు.

సాధించిన ఉదాహరణలు

ఉదా.(1) ΔPQR లో, రే.ఖం. PM మధ్యగత రేఖ. $PM=9$ మరియు $PQ^2 + PR^2 = 290$, అయిన QR ని కనుగొనండి.

సాధన : ΔPQR లో, రే.ఖం. PM మధ్యగత రేఖ
 M అనేది రే.ఖం. QR యొక్క మధ్య బిందువు



ఉదా.(2) సమభుజ చతుర్భుజము (రాంబస్)లోని భుజాల వర్గాల మొత్తము దాని కర్ణాల వర్గాల మొత్తానికి సమానమని నిరూపించండి.



సారాంశం : $PS^2 + SR^2 + QR^2 + PQ^2 = PR^2 + QS^2$

(ఈ ఉదాహరణను పైథాగరస్ సిద్ధాంతమును ఉపయోగించి కూడా నిరూపించవచ్చు.)

- (3) కింది వాటిలో ఏ తేదిలోని సంఖ్యలు సైథాగోరస్ త్రికము?
- (A) 15/08/17 (B) 16/08/16 (C) 3/5/17 (D) 4/9/15
- (4) a, b, c భుజాల పొడవులు గల త్రిభుజంలో $a^2 + b^2 = c^2$ అయినచో అది ఏ రకమైన త్రిభుజం అగును?
- (A) అధికకోణ త్రిభుజం (B) అల్పకోణ త్రిభుజం (C) లంబకోణ త్రిభుజం (D) సమబాహు త్రిభుజం
- (5) ఒక చతురస్రపు కర్ణం $10\sqrt{2}$ సెం.మీ. అయినచో దాని చుట్టుకొలత అవుతుంది.
- (A) 10 సెం.మీ. (B) $40\sqrt{2}$ సెం.మీ. (C) 20 సెం.మీ. (D) 40 సెం.మీ.
- (6) ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణముపై శీర్షలంబము వలన కర్ణము 4 సెం.మీ. మరియు 9 సెం.మీ. పొడవులు గల రెండు భాగాలు అయినట్లయితే ఆ శీర్షలంబము పొడవు ఎంత?
- (A) 9 సెం.మీ. (B) 4 సెం.మీ. (C) 6 సెం.మీ. (D) $2\sqrt{6}$ సెం.మీ.
- (7) లంబకోణ త్రిభుజములో లంబకోణమును ఏర్పరచు భుజాలు 24 సెం.మీ. మరియు 18 సెం.మీ. అయినచో దాని కర్ణం పొడవు అవుతుంది.
- (A) 24 సెం.మీ. (B) 30 సెం.మీ. (C) 15 సెం.మీ. (D) 18 సెం.మీ.
- (8) $\triangle ABC$ లో, $AB = 6\sqrt{3}$ సెం.మీ., $AC = 12$ సెం.మీ. మరియు $BC = 6$ సెం.మీ. అయిన $\angle A$ యొక్క కొలత ఎంత?
- (A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 45°

2. కింది ఉదాహరణలు సాధించండి.

- (1) ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క భుజము $2a$ అయినచో దాని ఎత్తును కనుగొనండి.
- (2) 7 సెం.మీ., 24 సెం.మీ., 25 సెం.మీ. భుజాలు గల త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజం అగునా? కారణమును రాయండి.
- (3) దీర్ఘచతురస్రము యొక్క భుజాలు 11 సెం.మీ. మరియు 60 సెం.మీ. అయినచో దాని కర్ణం పొడవును కనుగొనండి.
- (4) ఏదేని లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణమును ఏర్పరచు భుజాలు 9 సెం.మీ. మరియు 12 సెం.మీ., అయిన ఆ త్రిభుజంలోని కర్ణం పొడవును కనుగొనండి.
- (5) సమద్విబాహు లంబకోణ త్రిభుజము యొక్క భుజం x అయినచో దాని కర్ణం పొడవును కనుగొనండి.
- (6) $\triangle PQR$ లో; $PQ = \sqrt{8}$, $QR = \sqrt{5}$, $PR = \sqrt{3}$; అయిన $\triangle PQR$ లంబకోణ త్రిభుజము అగునా? అయినచో దాని ఏ కోణము లంబకోణము అవుతుంది?

3. $\triangle RST$ లో, $\angle S = 90^\circ$, $\angle T = 30^\circ$, $RT = 12$ సెం.మీ. అయినచో RS మరియు ST లను కనుగొనండి.


4. దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యం 192 చ.సెం.మీ. దాని పొడవు 16 సెం.మీ. అయినచో దీర్ఘచతురస్ర కర్ణము పొడవును కనుగొనండి.

5*. ఒక సమబాహు త్రిభుజము ఎత్తు $\sqrt{3}$ సెం.మీ. అయిన త్రిభుజము యొక్క భుజాలు మరియు చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.

6. $\triangle ABC$ లో రే.ఖం. AP మధ్యగత రేఖ. ఒకవేళ $BC = 18$, $AB^2 + AC^2 = 260$ అయినచో AP ని కనుగొనండి.

- 7★. ΔABC సమబాహు త్రిభుజం. భూమి BC పై బిందువు P, $PC = \frac{1}{3} BC$, అగునట్లు ఉంది. ఒకవేళ $AB = 6$ సెం.మీ. అయిన AP ని కనుగొనండి.


8. పటం 2.31 లో, M-Q-R-N. ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా
 $PM = PN = \sqrt{3} \times a$ అని నిరూపించండి.



పటం 2.31

9. సమాంతర చతుర్భుజములోని కర్ణాల వర్గాల మొత్తము ఆ చతుర్భుజ భుజాల వర్గాల మొత్తమునకు సమానము అని నిరూపించండి.
10. ఒకే చోటు నుండి ప్రణాళి మరియు ప్రసాద్లు సమవేగముతో తూర్పు మరియు ఉత్తర దిశలకు బయదేరి రెండు గంటల తరువాత వారి మధ్య దూరము $15\sqrt{2}$ కి.మీ. అయిన వారు గంటకు ఎంత వేగముతో ప్రయాణించిరి.


- 11★. ΔABC లో, $\angle BAC = 90^\circ$,
 రే.ఖం. BL మరియు రే.ఖం. CM లు ΔABC
 యొక్క మధ్యగత రేఖలు అయినచో
 $4(BL^2 + CM^2) = 5 BC^2$ అని నిరూపించండి.



పటం 2.32

12. ఒక సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క రెండు ఆసన్నభుజాల వర్గాల మొత్తము 130 చ.సెం.మీ. అయి దాని ఒక కర్ణము పొడవు 14 సెం.మీ. అయినచో రెండవ కర్ణము పొడవు ఎంత?


13. ΔABC లో, రే.ఖం. $AD \perp$ రే.ఖం. BC అయిన
 $DB = 3CD$, అయిన
 $2AB^2 = 2AC^2 + BC^2$ అని నిరూపించండి.



పటం 2.33


- 14★. సమద్విబాహు త్రిభుజములో సర్వసమాన భుజాల పొడవు 13 సెం.మీ. దాని భూమి 10 సెం.మీ., అయిన ఆ త్రిభుజ మధ్యగతరేఖ నుండి భూమికి ఎదురుగా ఉన్న శీర్షబిందువుకు మధ్య దూరంను కనుగొనండి.

15. సమలంబ చతుర్భుజము ABCD లో,
 రే.ఖం. $AB \parallel$ రే.ఖం. DC
 రే.ఖం. $BD \perp$ రే.ఖం. AD ,
 రే.ఖం. $AC \perp$ రే.ఖం. BC ,
 ఒకవేళ $AD=15$, $BC=15$ మరియు $AB=25$
 అయినచో $A(\square ABCD)$ ఎంత?



పటం 2.34

- 16*. పటంలో ΔPQR సమబహుత్రిభుజం
 $QS = \frac{1}{3} QR$ అగునట్లు రే.ఖం. QR పై
 బిందువు S గలదు. అయిన $9 PS^2 = 7 PQ^2$ అని
 నిరూపించండి.



పటం 2.35

- 17*. రే.ఖం. PM , ΔPQR యొక్క మధ్యగత రేఖ. ఒకవేళ $PQ = 40$, $PR = 42$ మరియు $PM = 29$, అయినచో
 QR ని కనుగొనండి.
18. రే.ఖం. AM , ΔABC యొక్క మధ్యగత రేఖ. ఒకవేళ $AB = 22$, $AC = 34$, $BC = 24$, అయినచో
 భుజము AM పొడవును కనుగొనండి.



ICT Tools or Links

అంతర్జాలము నుండి 'Story on the life of Pythagoras' యొక్క సమాచారమును సేకరించండి.

Slide show తయారు చేయండి.









పదండి నేర్చుకుందాం.

- ఒకటి, రెండు, మూడు బిందువుల గుండా పోయే వృత్తములు
- స్పర్శ వృత్తములు
- అంతర్లీఖిత కోణము మరియు అంతరఖండిత చాపము
- స్పర్శరేఖ ఛేదనరేఖల కోణ సిద్ధాంతం.
- వృత్త ఛేదన రేఖ మరియు స్పర్శరేఖ
- వృత్తచాపము
- చక్రీయ చతుర్భుజము.
- జ్యాల యొక్క ఖండన సిద్ధాంతం (ఛేదన రేఖల ఖండన సిద్ధాంతం)



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

వృత్తమునకు సంబంధించిన కేంద్రం, వ్యాసార్థము, వ్యాసము, జ్యా, అంతర్భాగము, బాహ్యభాగములు వాటి పరిచయం మీకు ఏర్పడింది. సర్వసమాన వృత్తములు, ఏక కేంద్ర వృత్తములు మరియు ఖండన వృత్తములు వాటి సంజ్ఞలను గుర్తు తెచ్చుకోండి.



సర్వసమాన వృత్తాలు

ఏకకేంద్ర వృత్తాలు

ఖండన వృత్తాలు

తొమ్మిదవ తరగతిలో నేర్చుకున్న జ్యా యొక్క ధర్మాలు కింది కృత్యముల సహాయంతో గుర్తు తెచ్చుకోండి.


కృత్యము I : పక్క పటంలోని C కేంద్రంగా గల వృత్తము

యొక్క జ్యా, రే.ఖం. DE, రే.ఖం. CF

$\perp$ జ్యా DE. వృత్తం యొక్క వ్యాసము 20

సం.మీ. DE = 16 సం.మీ. అయినట్లయితే

CF = ఎంత?



పటం 3.1

ఈ ప్రశ్నను సాధించుటకు ఉపయోగపడే సిద్ధాంతము మరియు ధర్మములను గుర్తుతెచ్చుకొని రాయండి.


(1) వృత్త కేంద్రంనుండి జ్యా మీదకు గీసిన లంబం _____

(2) _____

(3) _____

ఈ ధర్మములను ఉపయోగించి ప్రశ్నను సాధించండి.





పటం 3.2

కృత్యము II: పక్క పటంలో కేంద్రం 'O' గా గల వృత్తం యొక్క జ్యా, రే.ఖం. QR. జ్యా QR యొక్క మధ్య బిందువు P. ఒక వేళ $QR = 24$, $OP = 10$ అయిన వృత్త వ్యాసార్థంను కనుగొనండి.

ఈ ప్రశ్నను సాధించడానికి ఉపయోగపడే సిద్ధాంతములను రాయండి.

(1) _____

(2) _____

ఈ సిద్ధాంతాలను ఉపయోగించి పై ఉదాహరణను సాధించండి.

కృత్యము III : పటంలో వృత్తం కేంద్రం M మరియు


రే.ఖం. AB అనేది వ్యాసము

రే.ఖం. $MS \perp$ జ్యా AD

రే.ఖం. $MT \perp$ జ్యా AC

$\angle DAB \cong \angle CAB$ అయిన

జ్యా AD $\cong$ జ్యా AC అని చూపండి.



పటం 3.3

ఈ ప్రశ్నను సాధించుటకు కింది వాటిలో ఏ సిద్ధాంతమును ఉపయోగిస్తారు?

(1) వృత్తం యొక్క రెండు జ్యాలు వృత్త కేంద్రం నుండి సమాన దూరంలో ఉన్నట్లయితే వాటి పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి.

(2) ఒకే వృత్తమందలి సర్వసమాన జ్యాలు వృత్త కేంద్రం నుండి సమాన దూరంలో ఉంటాయి.

ఇవి కాకుండా కింది నియమాలలోని ఏ త్రిభుజ సర్వసమాన నియమం ఉపయోగపడుతుంది.

(1) భు.కో.భు., (2) కో.భు.కో., (3) భు.భు.భు., (4) కో.కో.భు., (5) క.భు.

సరిపడు నియమము మరియు సిద్ధాంతమును ఉపయోగించి ఉపపత్తిని రాయండి.




తెలుసుకుందాం.

ఒకటి, రెండు, మూడు బిందువుల గుండా పోయే వృత్తములు

పక్కనున్న పటంలో ఒక తలంలోని బిందువు A చూపబడింది. కేంద్ర బిందువులు P, Q, R లు గల మూడు వృత్తములు A బిందువు గుండా పోతాయి. A బిందువు గుండా పోయే ఇంకా ఎన్ని వృత్తములు ఉండవచ్చని మీకు అనిపిస్తుంది?


మీ సమాధానం ఎన్నైనా 'లేదా' అసంఖ్యాకము అని అయినట్లయితే అది సరియైన సమాధానం.

ఒకే ఒక బిందువు గుండా పోయే వృత్తములు అసంఖ్యాకము.



పటం 3.4






పక్క పటంలోని A మరియు B అనే రెండు విభిన్న బిందువుల గుండా పోయే వృత్తములు ఎన్ని?

A, B, C అనే మూడు బిందువుల గుండా పోయే వృత్తములు ఎన్ని? కింద ఇవ్వబడిన కృత్యముల ద్వారా ఏదైనా సమాధానం లభిస్తుందో చూడండి.

పటం 3.5

కృత్యము I : బిందువు A మరియు బిందువు B లను కలిపే రేఖ. AB ని గీయండి. ఈ రేఖ ఖండం యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖ l గీయండి. రేఖ l పై బిందువు P కేంద్రంగా మరియు PA వ్యాసార్థంగా తీసుకొని వృత్తమును గీయండి. ఈ వృత్తము B బిందువునుండి పోతుందో చూడండి. దీనికి గల కారణంను చెప్పండి. (లంబ సమద్విఖండన రేఖ ధర్మమును గుర్తుతెచ్చుకోండి)




పటం 3.6

రేఖ l పై మరొక బిందువు Q ను కేంద్రంగా QA ను వ్యాసార్థంగా తీసుకుని గీసిన వృత్తం కూడా బిందువు B గుండా పోతుందా? ఆలోచించండి.

బిందువు A మరియు బిందువు B ల గుండా పోయే ఇంకెన్ని వృత్తములను గీయవచ్చు? వాటి కేంద్ర బిందువులు ఏ స్థానంలో ఉంటాయి?

కృత్యము II : భిన్నరేఖీయ బిందువులు A, B, C లను గీయండి. ఈ మూడుబిందువుల గుండా పోయే వృత్తమును గీయుటకు ఏమి చేయాలి? ఈ మూడు బిందువుల ద్వారా పోయే వృత్తమును గీయండి. ఇవే మూడు బిందువుల గుండా పోయే ఇంకొక వృత్తాన్ని గీయవచ్చా? ఆలోచించండి.



పటం 3.7

కృత్యము III : D, E, F అనే సరేఖీయ బిందువులను గీయండి. ఈ మూడు బిందువుల ద్వారా పోయే వృత్తమును గీసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇలాంటి వృత్తమును గీయరానట్లయితే ఎందుకు గీయరావడం లేదు ఆలోచించండి.



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.


- (1) ఒకే ఒక బిందువు ద్వారా పోయే వృత్తములు అసంఖ్యాకము.
- (2) రెండు విభిన్న బిందువుల గుండా పోయే వృత్తములు అసంఖ్యాకము.
- (3) మూడు భిన్న రేఖీయ బిందువుల ద్వారా పోయే ఒకే ఒక వృత్తము ఉంటుంది.
- (4) మూడు సరేఖీయ బిందువుల ద్వారా పోయే వృత్తము ఒకటి కూడా ఉండదు.





తెలుసుకుందాం.

వృత్తఖండన రేఖ మరియు స్పర్శరేఖ (Secant and tangent)



పటం 3.8

పటంలో, రేఖ l మరియు వృత్తములకు ఒక్క ఉమ్మడి బిందువు కూడా లేదు.


రేఖ m మరియు వృత్తముల ఉమ్మడి బిందువు P ఇచ్చట రేఖ m వృత్తం యొక్క స్పర్శరేఖ అని, బిందువు P ను స్పర్శ బిందువు అని అంటారు.

రేఖ n మరియు వృత్తములకు రెండు ఉమ్మడి బిందువులు కలవు. Q మరియు R లను రేఖ మరియు వృత్తముల ఛేదన బిందువులని, రేఖ n ను వృత్త ఖండన రేఖ అని అంటారు.

వృత్త స్పర్శరేఖ యొక్క ముఖ్యమైన ధర్మమును కృత్యము ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం.

కృత్యము :

కేంద్రం O గల సరివచేంత ఒక పెద్ద వృత్తమును గీయండి. ఆ వృత్తము యొక్క రేఖం. OP అనే వ్యాసార్థం గీయండి. ఈ వ్యాసార్థానికి లంబంగా ఉండే ఒక రేఖను గీయండి. ఈ రేఖ మరియు వృత్తముల ఛేదన బిందువులకు A, B అని పేరు పెట్టండి. రేఖ AB అనేది బిందువు O నుండి బిందువు P వైపు, దాని ముందు స్థితికి సమాంతరంగా ఉండేట్లు అనగా జరుపవలసిన రేఖ AB వ్యాసార్థంల మధ్య ఎల్లప్పుడూ లంబకోణం ఉండేట్లు జరిపారనుకోండి.



పటం 3.9

ఇది జరుగుతున్నప్పుడు బిందువు A మరియు B వృత్తంపై పరస్పరం ఒకదానికొకటి దగ్గరగా రావడం మొదలుపెడతాయి. చివరికి అవి బిందువు P లో కలిసిపోతాయి.

ఈ సందర్భంలో రేఖ AB యొక్క నూతన స్థానము అనేది వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ అవుతుంది. కాని వ్యాసార్థం OP మరియు రేఖ AB ల మధ్య కోణం మాత్రం లంబకోణం ఉంటుంది.

దీనిని బట్టి, వృత్తము యొక్క ఏదేని బిందువు గుండా పోయే స్పర్శరేఖ ఆ బిందువును కలిపే వ్యాసార్థంనకు లంబంగా ఉంటుందని మనకు తెలుస్తుంది. ఈ ధర్మమును 'స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతం' అంటారు.

స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతము (Tangent theorem)

సిద్ధాంతము : వృత్తము యొక్క ఏదేని బిందువు గుండా పోయే స్పర్శరేఖ ఆ బిందువు, కేంద్రాన్ని కలిపే వ్యాసార్థానికి లంబంగా ఉంటుంది.
ఈ సిద్ధాంతమును పరోక్ష పద్ధతి ద్వారా నిరూపించవచ్చు.

అధిక వివరాలకై :

దత్తంశం : కేంద్రం O గా గల వృత్తమును రేఖ l బిందువు A వద్ద స్పృశిస్తుంది. రే.ఖం. OA వృత్త వ్యాసార్థం.

సారాంశం : రేఖ $l \perp$ వ్యాసార్థం OA.

ఉపపత్తి : రేఖ l అనేది రే.ఖం. OA కు లంబం కాదు అనుకుందాం.

బిందువు O నుండి రేఖ l పై OB లంబంను గీసామనుగోండి.

వాస్తవంగా బిందువు B అనేది బిందువు A కంటే భిన్నంగా ఉండాలి. (పటం 3.11 చూడండి.)

రేఖ l పై బిందువు C ని A-B-C మరియు $BA = BC$ అయ్యేట్లు తీసుకోవచ్చు.

ఇప్పుడు, ΔOBC మరియు ΔOBA లలో,

రే.ఖం. $BC \cong$ రే.ఖం. BA (నిర్మాణము)

$\angle OBC \cong \angle OBA$ (ప్రతికోణము లంబకోణము)

రే.ఖం. $OB \cong$ రే.ఖం. OB

$\therefore \Delta OBC \cong \Delta OBA$ (భు.కో.భు. నియమం)

$\therefore OC = OA$

కాని, రే.ఖం. OA అనేది వ్యాసార్థము.

కావున రే.ఖం. OC అనేది కూడా వ్యాసార్థము అవుతుంది.

$\therefore$ బిందువు C అనేది వృత్తముపై ఉండాలి.


అనగా రేఖ l అనేది వృత్తమును A మరియు C అనే రెండు బిందువులలో ఖండించును. ఇది దత్తాంశమునకు నిరుద్ధం.

కారణం రేఖ l స్పర్శ రేఖ


అనగా రేఖ l వృత్తమును ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించును (దత్తాంశం)

$\therefore$ రేఖ l అనేది వ్యాసార్థం OA కు లంబం కాదు అనేది అసత్యము.

$\therefore$ రేఖ $l \perp$ వ్యాసార్థం OA.



పటం 3.10




పటం 3.11



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

మనం నేర్చుకున్న ఏ సిద్ధాంతాలనుపయోగించి లంబకోణత్రిభుజంలో కర్ణం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద భుజం అవుతుందని నిరూపించవచ్చు.




పటం 3.12



తెలుసుకుందాం.

స్పర్శ రేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంత వివర్యము (Converse of Tangent theorem)

సిద్ధాంతము : వృత్త వ్యాసార్థం యొక్క బాహ్య బిందువు (చివర) ద్వారా పోయే మరియు వ్యాసార్థానికి లంబంగా ఉండే రేఖ ఆ వృత్తం యొక్క స్పర్శ రేఖ అవుతుంది.



పటం 3.13

దత్తాంశం : M కేంద్రంగాగల వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థం రే.ఖం. MN. బిందువు N నుండి పోయే రేఖ l వ్యాసార్థం MN కు లంబం.

సారాంశం : రేఖ l వృత్త స్పర్శరేఖ.

ఉపపత్తి : రేఖ l పై P అనేది N కాకుండా వేరొక బిందువును తీసుకొని రే.ఖం. MP గీసాము.

ఇప్పుడు, ΔMNP లో $\angle N$ ఒక లంబకోణం

$\therefore$ రే.ఖం. MP అనేది కర్ణం అవుతుంది.

$\therefore$ రే.ఖం. $MP >$ రే.ఖం. MN.

$\therefore$ బిందువు P వృత్తంపై ఉంటే అవకాశం లేదు.

అనగా రేఖ l పై N కాకుండా వేరే ఏ ఇతర బిందువు వృత్తంపై లేదు.

$\therefore$ రేఖ l వృత్తమును N అనే ఒకే ఒక బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.

$\therefore$ రేఖ l వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ అవుతుంది.




పదండి చర్చిద్దాం.

కేంద్రం A గాగల వృత్తంపై B ఒక బిందువు ఇవ్వబడింది. ఈ వృత్తం యొక్క బిందువు B నుండి పోయే స్పర్శరేఖను గీయవలెను.

B అనే బిందువు ద్వారా పోయే రేఖలు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. వాటిలో ఏ రేఖ ఈ వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ అవుతుంది? దానిని ఎలా గీయవచ్చు?


బిందువు B నుండి పోయే ఒకటికంటే ఎక్కువ స్పర్శరేఖలు ఉండవచ్చునా?



పటం 3.14

•D

వృత్తం యొక్క అంతర్భాగంలోని C బిందువు గుండా ఆ వృత్తమునకు స్పర్శరేఖను గీయవచ్చా?



పటం 3.15

వృత్తం యొక్క బాహ్యభాగంలోని D బిందువు గుండా పోయే రేఖ ఆ వృత్తానికి స్పర్శరేఖ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఉంటే అలాంటి ఎన్ని స్పర్శరేఖలు ఉంటాయి?

పటంలో చూపిన విధంగా వృత్తం యొక్క బాహ్య బిందువునుండి రెండు స్పర్శరేఖలు గీయవచ్చని చర్చ ద్వారా మీకు అర్థమయి ఉండవచ్చు.

పక్క పటంలో రేఖ DP మరియు రేఖ DQ లు స్పర్శరేఖలు. కేంద్రం A గా గల వృత్తమును P, Q బిందువుల వద్ద స్పృశిస్తాయి.

రే.ఖం. DP మరియు రే.ఖం. DQ లను స్పర్శరేఖా ఖండములు అంటారు.

స్పర్శరేఖ రేఖాఖండ సిద్ధాంతము (Tangent Segment Theorem)

సిద్ధాంతం : వృత్తము యొక్క బాహ్యబిందువు నుండి గీయబడిన స్పర్శరేఖా రేఖాఖండములు సర్వసమానం.

పక్క పటం ఆధారంగా దత్తాంశము మరియు సారాంశంలను నిర్ణయించుము.

వ్యాసార్థం AP మరియు AQ లను గీసి కింద ఇవ్వబడిన ఉపపత్తిలోని ఖాళీలను పూరించండి.

ఉపపత్తి : $\triangle PAD, \triangle QAD$ లలో,


భుజము $PA \cong$ _____ (ఒకే వృత్తవ్యాసార్థాలు)

భుజము $AD \cong$ భుజము AD _____

$\angle APD \cong \angle AQD = 90^\circ$ (స్పర్శరేఖ సిద్ధాంతం)

$\therefore \triangle PAD \cong \triangle QAD$ _____

$\therefore$ భుజము $DP \cong$ భుజము DQ _____



పటం 3.16

సాధించిన ఉదాహరణలు

ఉదా. (1) ఇవ్వబడిన పటంలో D కేంద్రంగాగల వృత్తం

$\angle ACB$ కోణ భుజములు A, B

బిందువులలో స్పృశించును. $\angle ACB = 52^\circ$,

అయిన $\angle ADB$ కొలతను కనుగొనండి.

సాధన : చతుర్భుజ నాలుగు కోణాల కొలతల మొత్తం


360° అవుతుంది.

$\therefore \angle ACB + \angle CAD + \angle CBD + \angle ADB = 360^\circ$

$\therefore 52^\circ + 90^\circ + 90^\circ + \angle ADB = 360^\circ$ స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతం

$\therefore \angle ADB + 232^\circ = 360^\circ$


$\therefore \angle ADB = 360^\circ - 232^\circ = 128^\circ$



పటం 3.17

ఉదా. (2) రేఖ a , రేఖ b లు కేంద్రం O గాగల వృత్తం యొక్క సమాంతర స్పర్శరేఖలు. వృత్తమును వరుసగా P, Q బిందువులలో స్పృశించును. అయిన రే.ఖం. PQ అనేది వృత్త వ్యాసము అని నిరూపించండి.

నిరూపణ : a, b, c రేఖలపై వరుసగా T, S, R బిందువులను పటంలో చూపిన విధంగా తీసుకోండి. బిందువు O గుండా రేఖ a కు సమాంతరంగా రేఖ c ని గీయండి. వ్యాసార్థం OP , వ్యాసార్థం OQ లను గీయండి.



పటం 3.18

ఇప్పుడు $\angle OPT = 90^\circ \dots$ స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతం
 $\therefore \angle SOP = 90^\circ \dots$ (అంతరకోణముల ధర్మం) . (I)

ఇప్పుడు, రేఖ $a \parallel$ రేఖ $c \dots$ (నిర్మాణం)

రేఖ $a \parallel$ రేఖ $b \dots$ (దత్తాంశం)

రేఖ $b \parallel$ రేఖ c

ఇప్పుడు, $\angle OQR = 90^\circ \dots$ స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతం.

$\therefore \angle SOQ = 90^\circ \dots$ (అంతరకోణముల ధర్మం) .. (II)

$\therefore$ (I), (II) ల నుండి


$$\angle SOP + \angle SOQ = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$\therefore$ కిరణం OP , కిరణం OQ లు విరుద్ధ కిరణములు

$\therefore P, O, Q$ బిందువులు సరేఖీయాలు

$\therefore$ రే.ఖం. PQ వృత్త వ్యాసము అవుతుంది.

వర్షాకాలంలో కొంచెం తడసిన రోడ్డుపై మోటారుసైకిల్ పోయేప్పుడు దాని వెనుక చక్రంపై నుండి ఎగిరే నీటి ధారను మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ నీటిధార వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ వలె కనిపిస్తుంది. అని మీ దృష్టికి వచ్చే ఉండవచ్చు. ఆ నీటి ధార ఆ విధంగా ఎందుకు ఉంటుందో మీ విజ్ఞానశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడి వద్దనుండి సమాచారమును పొందండి.



తిరిగే భూచక్రమునుండి వెలువడే కాంతివంతమైన మెరుగులు, కత్తికి సాన వట్టేపుడు వెలువడే మిరుగులను పరీక్షించండి. ఇవన్నీ కూడా స్పర్శరేఖల వలె కనిపిస్తాయా?



ఇవి గుర్తించుకుందాం.


- (1) స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంతం : వృత్తం యొక్క ఏదేని బిందువుగుండా పోయే స్పర్శరేఖ ఆ బిందువును, కేంద్రంను కలిపే వ్యాసార్థానికి లంబంగా ఉంటుంది.
- (2) స్పర్శరేఖ-వ్యాసార్థ సిద్ధాంత వివర్యము : వృత్త వ్యాసార్థ బాహ్య బిందువు గుండా పోయే మరియు దానికి లంబంగా ఉండే రేఖ ఆ వృత్తానికి స్పర్శరేఖ అవుతుంది.
- (3) వృత్త బాహ్య బిందువునుండి గీయబడిన స్పర్శరేఖ రేఖాఖండములు సర్వసమానం.






1. పక్క పటంలో C కేంద్రంగాగల వృత్త వ్యాసార్థం 6 సెం.మీ. రేఖ AB వృత్తమును A బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది. ఈ సమాచారం నుండి కింది ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వండి.

- (1) $\angle CAB$ యొక్క కొలత ఎంత? ఎందుకు?
- (2) 'C' బిందువు రేఖ AB నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది? ఎందుకు?
- (3) $d(A,B) = 6$ సెం.మీ., అయిన $d(B,C)$ ను కనుగొనండి.
- (4) $\angle ABC$ యొక్క కొలత ఎంత? ఎందుకు?



పటం 3.19




పటం 3.20

2. పక్క పటంలో O కేంద్రంగాగల వృత్త బాహ్యబిందువు R నుండి గీయబడిన స్పర్శరేఖా ఖండాలు RM, RN లు వృత్తమును M, N బిందువులలో స్పృశించును. $OR = 10$ సెం.మీ. వృత్త వ్యాసార్థం 5 సెం.మీ. అయిన -

- (1) ప్రతి స్పర్శరేఖ రేఖా ఖండం పొడవు ఎంత?
- (2) $\angle MRO$ యొక్క కొలత ఎంత?
- (3) $\angle MRN$ యొక్క కొలత ఎంత?

3. రే.ఖం. RM, రే.ఖం. RN లు O కేంద్రంగాగల వృత్త స్పర్శరేఖ రేఖాఖండములు అయిన రే.ఖం. OR అనేది $\angle MRN$, $\angle MON$ ఈ రెండు కోణముల సమద్విఖండనం అని చూపండి.



పటం 3.21

4. వ్యాసార్థం 4.5 సెం.మీ. గల వృత్తం యొక్క రెండు స్పర్శరేఖలు పరస్పరం సమాంతరము. అయిన ఆ స్పర్శ రేఖల మధ్యదూరం ఎంత. సకారణంగా రాయండి.



ICT Tools or Links

కంప్యూటర్లో జియోజిబ్రా సాఫ్ట్వేర్ సహాయముతో వృత్తము మరియు వృత్తము యొక్క బాహ్యబిందువు నుండి స్పర్శరేఖలను గీసి స్పర్శరేఖ రేఖాఖండములు సర్వసమానము అవుతాయని సరిచూడండి.






తెలుసుకుందాం.

స్పృశించుకునే వృత్తములు (Touching Circles)

కృత్యము I :

పటం 3.22 లో చూపినవిధంగా $X-Y-Z$ అనే సరేఖీయ బిందువులను గీయండి.

కేంద్రం X , వ్యాసార్థం XY ని తీసుకొని వృత్తాన్ని గీయండి. కేంద్రం Z , వ్యాసార్థం YZ తీసుకొని రెండవ వృత్తమును గీయండి. ఈ రెండు వృత్తములు Y అనే ఒకే బిందువు వద్ద ఒక దానినొకటి ఖండించుకుంటాయని గమనించండి. బిందువు Y గుండా రేఖ XZ కు లంబరేఖను గీయండి. ఈ రేఖ రెండు వృత్తముల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అని గుర్తుంచుకోండి.



పటం 3.22

కృత్యము II :


పటం 3.23 లో చూపిన విధంగా $Y-X-Z$ అనే సరేఖీయ బిందువులను గీయండి.

కేంద్రం Z , వ్యాసార్థం ZY గా తీసుకుని వృత్తాన్ని గీయండి.

కేంద్రం X , వ్యాసార్థం XY గా తీసుకుని వృత్తాన్ని గీయండి.

రెండు వృత్తములు Y అనే ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయని గుర్తించండి.

బిందువు Y గుండా రేఖ YZ కు లంబరేఖను గీయండి. ఈ రేఖ రెండు వృత్తాల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అని గుర్తుంచుకోండి.




పటం 3.23

రెండు పటాలలోని వృత్తాలు ఒకే తలంలో ఒకదానినొకటి ఒకే ఒక బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయని పై కృత్యాలు ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి వృత్తాలను పరస్పరం స్పృశించుకునే వృత్తములు లేదా స్పర్శ వృత్తములు అంటారు.


స్పృశించుకునే వృత్తములను కింది విధంగా నిర్వచించవచ్చు.

ఒకే తలంలోని రెండు వృత్తములు అదే తలంలోని ఒక రేఖను ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించినట్లయితే వాటిని స్పృశించుకునే వృత్తములు అంటారు. ఆ రేఖ రెండు వృత్తముల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అవుతుంది.

రెండు వృత్తములు మరియు రేఖ యొక్క ఉమ్మడి బిందువును ఉమ్మడి స్పర్శ బిందువు అంటారు.



పటం 3.24



పటం 3.25

పటం 3.24 లో, R, S కేంద్రాలుగా గల వృత్తములు రేఖ l ను T అనే ఒకేఒక బిందువు వద్ద ఖండిస్తాయి. కావున రెండు వృత్తములు స్పర్శించుకునే వృత్తములు అయి రేఖ l వాటి ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అవుతుంది. ఈ పటంలోని వృత్తములు బాహ్యస్పర్శ వృత్తములు అవుతాయి.

ఈ పటం 3.25 లోని వృత్తములు అంతర స్పర్శ వృత్తములు అయి, రేఖ p వాటి ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖ అవుతుంది.




ఆలోచిద్దాం.


- (1) పటం 3.24 లోని వృత్తముల వలె పరస్పరం స్పృశించుకునే వృత్తములను బాహ్యస్పర్శ వృత్తములు అని ఎందుకు అంటారు?
- (2) పటం 3.25 లోని వృత్తముల వలె పరస్పరం స్పృశించుకునే వృత్తములను అంతర స్పర్శ వృత్తములు అని ఎందుకు అంటారు?
- (3) పటం 3.26 లోని, A, B కేంద్రాలుగాగల వృత్తముల వ్యాసార్థాలు వరసగా 3 సెం.మీ., 4 సెం.మీ. అయినట్లయితే
 - (i) పటం 3.26 (a) లో $d(A,B)$ ఎంత ఉంటుంది?
 - (ii) పటం 3.26 (b) లో $d(A,B)$ ఎంత ఉంటుంది?

స్పృశించుకునే వృత్తముల సిద్ధాంతం (Theorem of touching circles)

సిద్ధాంతం : పరస్పరం స్పృశించుకునే వృత్తముల స్పర్శబిందువు వాటి వృత్త కేంద్రాలను కలిపే రేఖపై ఉంటుంది.



(a)



(b)

పటం 3.26



దత్తాంశం : A, B లు కేంద్రాలుగాగల వృత్తముల స్పర్శబిందువు C.

సారాంశం : బిందువు C, రేఖ AB పై గలదు.

ఉపపత్తి : రేఖ l అనేది బిందువు C గుండాపోయే స్పృశించుకునే వృత్తముల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అనుకోండి.

రేఖ $l \perp$ రే.ఖం. AC, రేఖ $l \perp$ రే.ఖం. BC. $\therefore$ రే.ఖం. AC, రే.ఖం. BC లు రేఖ l కు లంబాలు.

బిందువు C నుండి రేఖ l కు ఒకేఒక లంబరేఖ గీయవచ్చును. $\therefore$ C, A, B లు సరేఖీయాలు అవుతాయి.



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

- (1) పరస్పరం స్పృశించుకునే వృత్తముల స్పర్శబిందువు ఆ వృత్త కేంద్రాలను కలిపే రేఖపై ఉంటుంది.
- (2) బాహ్యస్పర్శ వృత్తముల కేంద్రాల మధ్యదూరం వాటి వ్యాసార్థాల మొత్తంనకు సమానం.
- (3) అంతరస్పర్శ వృత్తముల కేంద్రాల మధ్య దూరం వాటి వ్యాసార్థాల భేదంనకు సమానం.



అభ్యాసమాలిక 3.2




1. పరస్పరం అంతరంగా స్పృశించుకునే రెండు వృత్తముల వ్యాసార్థాలు వరసగా 3.5 సెం.మీ., 4.8 సెం.మీ. అయిన వాటి కేంద్రముల మధ్య దూరం ఎంత?
2. బాహ్యంగా స్పృశించుకునే రెండు వృత్తముల వ్యాసార్థాలు వరసగా 5.5 సెం.మీ., 4.2 సెం.మీ. అయిన వాటి కేంద్రముల మధ్య దూరం ఎంత?
3. వ్యాసార్థాలు వరసగా 4 సెం.మీ., 2.8 సెం.మీ. గా గల, (i) బాహ్య స్పర్శ వృత్తములు (ii) అంతర స్పర్శ వృత్తములను గీయండి.
4. పటం 3.27 లో, P, Q లు కేంద్రాలుగాగల వృత్తములు పరస్పరం R బిందువు వద్ద స్పృశించుకుంటాయి. R బిందువు గుండా పోయే రేఖ ఆ వృత్తములను వరసగా A, B బిందువులలో ఖండిస్తుంది. అయిన

(1) రే.ఖం. AP $\parallel$ రే.ఖం. BQ అని చూపండి.


(2) $\Delta APR \sim \Delta RQB$ అని చూపండి.

(3) $\angle PAR$ కొలత 35° అయిన

$\angle RQB$ కొలతను నిర్ణయించండి.



పటం 3.27



పటం 3.28


5. పటం 3.28 లో, A, B లు కేంద్రాలుగా గల వృత్తములు E బిందువు వద్ద స్పృశించుకుంటాయి. రేఖ l అనేది వాటి ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ వాటిని వరసగా C, D బిందువులలో స్పృశిస్తుంది. వృత్తముల వ్యాసార్థాలు వరసగా 4 సెం.మీ., 6 సెం.మీ. అయినట్లయితే రే.ఖం. CD యొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుంది?





కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకుందాం.

వృత్తచాపము (Arc of a circle)



పటం 3.29

వృత్త ఖండన రేఖ వలన వృత్తం రెండు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. వీటిలో ఏదేని ఒక భాగము మరియు వృత్తఖండన రేఖ యొక్క వృత్తముపై గల బిందువులను కలువగా ఏర్పడే ఆకృతిని వృత్త చాపము అంటారు.


వృత్తము, వృత్త ఖండన రేఖల ఖండన బిందువులను చాపము యొక్క అంత్యబిందువులు లేదా చాపము యొక్క సీమ (చివరి) బిందువులు అంటారు.

పటం 3.29 లో, వృత్తఖండన రేఖ k ద్వారా C కేంద్రంగా గల వృత్తంలో AYB, AXB అనే రెండు చాపములు ఏర్పడినవి.

వృత్త ఖండన రేఖకు ఏనైపు వృత్త కేంద్రం ఉంటుందో ఆ చాపమును **అధిక చాపము** మరియు దాని వ్యతిరేక దిశనైపు ఉన్న చాపమును **అల్ప చాపము** అని అంటారు. పటం 3.29 లో చాపము AYB అనేది అధిక చాపము మరియు చాపము AXB అనేది అల్పచాపములు. ఏదైనా వృత్త చాపము యొక్క పేరును మూడు అక్షరములను ఉపయోగించి రాస్తాము. కాని ఎలాంటి అనుమానం లేకుంటే అల్ప చాపమును దాని అంత్య బిందువులను సూచించే అక్షరాలతో రాస్తారు. ఉదాహరణకు పటం 3.29 లో చాపము AXB ని చాపము AB అనికూడా రాస్తారు.

మనం చాపము పేరు రాయడానికి ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం.

కేంద్రీయ కోణము (Central angle)



పటం 3.30

ఏ కోణం యొక్క శీర్షబిందువు వృత్తకేంద్రం వద్ద ఉంటుందో ఆ కోణాన్ని **కేంద్రీయకోణం** అంటారు.

పటం 3.30 లో O కేంద్రంగాగల వృత్తంలో $\angle AOB$ అనేది కేంద్రీయ కోణం.

వృత్త ఖండన రేఖ వలనే కేంద్రీయ కోణం ద్వారా కూడా వృత్తం రెండు చాపములుగా విభజించబడుతుంది.

చాపము కొలత (Measure of an arc)

కొన్నిసార్లు రెండు చాపములను పోల్చవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. దానికొరకు చాపముల కొలతల నిర్వచనం ఈ విధంగా నిర్వచించబడింది.



(1) అల్పచాపము కొలత దాని సదృశ కేంద్రీయ కోణమునకు సమానంగా ఉంటుంది.

పటం 3.30 లో $\angle AOB$ కేంద్రీయ కోణము కొలత θ కావున అల్ప చాపము APB యొక్క కొలత θ అవుతుంది.

(2) అధిక చాపము కొలత = 360° - సదృశ అల్పచాపము కొలత

పటం 3.30 లో అధికచాపము AQB యొక్క కొలత = 360° - చాపము APB కొలత = $360^\circ - \theta$

(3) అర్ధవృత్త చాపము కొలత అనగా అర్ధవృత్తము కొలత 180° అవుతుంది.

(4) మొత్తం వృత్తం యొక్క కొలత 360° అవుతుంది.



తెలుసుకుందాం.


చాపముల సర్వసమానత్వం (Congruence of arcs)

ఎప్పుడైతే రెండు తలాలలోని ఆకృతులు (వటాలు) ఒకదానికొకటి సరిపోల్చబడతాయో అప్పుడు ఆ ఆకృతులు ఒకదానికొకటి సర్వసమానం అని అంటారు. దీని ఆధారంగా సమాన కొలతలు గల కోణములు సర్వసమానంగా ఉంటాయని మనకు తెలుసు.

అదే విధంగా రెండు చాపముల కొలతలు సమానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు చాపములు సర్వసమానం అవుతాయా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని కింది కృత్యము చేసి రాబట్టండి.

కృత్యము :

పటం 3.31 లో చూపిన విధంగా C కేంద్రంగా గల రెండు వృత్తములను గీయండి. $\angle DCE$ మరియు $\angle FCG$



పటం 3.31

అనే సమాన కొలతలు గల కోణములను గీయండి. ఈ కోణముల కొలతలకు విభిన్నంగా వేరే కొలత ఉండే $\angle ICJ$ ను గీయండి.

$\angle DCE$ యొక్క భుజములు లోపలి వృత్తమును ఖండించుట వలన లభించే చాపమునకు AB అని పేరు పెట్టండి.

చాపము కొలత యొక్క నిర్వచనం ద్వారా చాపము AB మరియు చాపము DE ల కొలతలు సమానమని తెలిసిందా? ఈ చాపములు పరస్పరం సరిపోతాయా? ఖచ్చితంగా సరిపోలేవు.

ఇప్పుడు C-DE; C-FG మరియు C-IJ ఈ వృత్త పరిధులను కత్తిరించి వేరు చేయండి. వాటిని ఒకదానితో ఒకటి సరిపాల్చి DE, FG మరియు IJ వీటిలో ఏ చాపము పరస్పరం సరిపోతాయో చూడండి.


ఈ కృత్యము ద్వారా రెండు చాపములు సర్వసమానం అవుటకు వాటి కొలతలు సమానంగా ఉండటం సరిపోదని తెలిసిందా?

రెండు చాపములు సర్వసమానంగా అగుటకు ఇంకా ఎలాంటి నియమాలను పాటించవలెనని మీకు అనిపిస్తుంది?

రెండు చాపముల వ్యాసార్థాలు మరియు కొలతలు సమానంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ రెండు చాపములు పరస్పరం సర్వసమానంగా ఉంటాయి. అని పై కృత్యం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది.

‘చాపము DE చాపము GF సర్వసమానం’ దీనిని చాపము $DE \cong$ చాపము GF అని చిహ్నరూపంలో చూపిస్తారు.

చాపముల కొలతల మొత్తం యొక్క ధర్మము (Property of sum of measures of arcs)




పటం 3.32

పటం 3.32 లో A, B, C, D, E అనేవి ఒకే వృత్త బిందువులు. ఈ బిందువుల ద్వారా అనేక చాపముల ఏర్పడినవి. వీటిలో చాపము ABC, చాపము CDE లలో C అనే ఒకే ఒక బిందువు ఉమ్మడిగా ఉంది. కావున చాపము ABC, చాపము CDE ల కొలతల మొత్తం చాపము ACE యొక్క కొలతకు సమానం.

$$m(\text{చాపము } ABC) + m(\text{చాపము } CDE) = m(\text{చాపము } ACE)$$

కాని చాపము ABC, చాపము BCE లలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ బిందువులు [చాపము BC యొక్క అన్ని] ఉమ్మడిగా ఉన్నాయి. కావున చాపము ABC, చాపము BCE ల కొలతల మొత్తం చాపము ABE యొక్క కొలతకు సమానంగా ఉండదు
సిద్ధాంతం: ఒక వృత్తం యొక్క (లేదా సర్వసమాన వృత్తముల) సర్వసమాన చాపముల సదృశ జ్యాలు సర్వసమానంగా ఉంటాయి.



పటం 3.33

దత్తాంశం : B కేంద్రంగాగల వృత్తంలో చాపము APC $\cong$ చాపము DQE

సారాంశం : జ్యా AC $\cong$ జ్యా DE

ఉపపత్తి : (ఖాళీలను పూరిస్తూ ఉపపత్తిని పూర్తి చేయండి)

$\triangle ABC$, $\triangle DBE$ లలో,

భుజము AB $\cong$ భుజము DB (.....)


భుజము $\cong$ భుజము (.....)

$\angle ABC \cong \angle DBE$ (సర్వసమాన చాపముల నిర్వచనం)

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DBE$ (.....)

$\therefore$ జ్యా AC $\cong$ జ్యా DE (.....)

సిద్ధాంతం : ఒకే వృత్తం యొక్క (లేదా సర్వసమాన వృత్తముల) సర్వసమాన జ్యాల యొక్క సదృశ చాపములు సర్వసమానంగా ఉంటాయి.



పటం 3.34

దత్తాంశం : రే.ఖం. PQ, రే.ఖం. RS లు O కేంద్రంగా గల వృత్తం యొక్క సర్వసమాన జ్యాలు.

సారాంశం : చాపము PMQ $\cong$ చాపము RNS

కింది అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఉపపత్తిని రాయండి.

రెండు చాపములు సర్వసమానం కావడానికి వాటి వ్యాసార్థాలు మరియు కొలతలు సమానంగా ఉండాలి.

చాపము PMQ చాపము RNS అనేవి ఒకే వృత్తం యొక్క



ఉదా. (2) పటం 3.36 లోని T కేంద్రంగాగల వృత్తము లో దీర్ఘచతురస్రము PQRS గీయబడి ఉంది.

అయితే -

(i) చాపము $PQ \cong$ చాపము SR

(ii) చాపము $SPQ \cong$ చాపము PQR అని చూపండి.

సాధన : $\square$ PQRS అనేది ఒక దీర్ఘచతురస్రము

$\therefore$ జ్యా $PQ \cong$ జ్యా SR (దీర్ఘచతురస్ర ఎదుటి భుజాలు)

$\therefore$ చాపము $PQ \cong$ చాపము SR (సర్వసమాన జ్యాల సదృశ చాపములు)

జ్యా $PS \cong$ జ్యా QR (దీర్ఘచతురస్ర ఎదుటి భుజాలు)

$\therefore$ చాపము $SP \cong$ చాపము QR (సర్వసమాన జ్యాల సదృశ చాపములు)


$\therefore$ చాపము SP , చాపము QR ల కొలతలు సమానం

ఇప్పుడు, చాపము SP , చాపము PQ ల కొలతల మొత్తం

= చాపము PQ , చాపము QR కొలతల మొత్తం.

$\therefore$ చాపము SPQ కొలత = చాపము PQR కొలత

$\therefore$ చాపము $SPQ \cong$ చాపము PQR



పటం 3.36



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

(1) ఏ కోణం యొక్క శీర్ష బిందువు వృత్తా కేంద్రం వద్ద ఉంటుందో ఆ కోణంను కేంద్రీయ కోణము అంటారు.

(2) చాపము కొలతల నిర్వచనం - (i) అల్పచాపము కొలత దాని సదృశ కేంద్రీయ కొలతకు సమానంగా ఉంటుంది.

(ii) అధిక చాపము కొలత = 360° - సదృశ అల్పకోణ చాపము కొలత. (iii) అర్ధవృత్తచాపము కొలత 180° ఉంటుంది.

(3) రెండు వృత్త చాపముల వ్యాసార్థాలు మరియు కొలతలు సమానంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ చాపములు సర్వసమానంగా ఉంటాయి.

(4) ఒక వృత్త చాపము ABC, చాపము CDE లలో ఎప్పుడైతే C అనే బిందువు ఉమ్మడిగా ఉంటుందో అప్పుడు $m(\text{చాపము ABC}) + m(\text{చాపము CDE}) = m(\text{చాపము ACE})$

(5) ఒకే వృత్తం (లేదా సర్వసమాన వృత్తముల) యొక్క సర్వసమాన చాపముల సదృశ జ్యాలు సర్వసమానంగా ఉంటాయి.

(6) ఒకే వృత్తం (లేదా సర్వసమాన వృత్తముల) యొక్క సర్వసమాన జ్యాల సదృశ చాపములు సర్వసమానంగా ఉంటాయి.



అభ్యాసమాలిక 3.3




1. పటం 3.37 లో, G, D, E మరియు F అనే బిందువులు

C కేంద్రంగాగల వృత్తముపై గలవు $\angle ECF$ కొలత 70°


చాపము DGF కొలత 200° అయిన చాపము DE

చాపము DEF కొలతలను నిర్ణయించండి.



పటం 3.37





పటం 3.38

2*. పటం 3.38 లో ΔQRS సమబాహు త్రిభుజం అయిన -


- (1) చాపము $RS \cong$ చాపము $QS \cong$ చాపము QR
- (2) చాపము QRS కొలత 240° అని చూపండి.

3. పటం 3.39 లో,

జ్యా $AB \cong$ జ్యా CD ,

అయిన -

చాపము $AC \cong$ చాపము BD అని చూపండి.



పటం 3.39




తెలుసుకుందాం.

వృత్తము మరియు బిందువులు, వృత్తము మరియు రేఖ (స్పర్శరేఖ)ల పరస్పర సంబంధం కల్గిన కొన్ని ధర్మాలను మనం చూసాం. ఇప్పుడు వృత్తము మరియు కోణములకు సంబంధించిన కొన్ని ధర్మాలను చూద్దాం. వాటిలో కొన్ని ధర్మాలను ముందు కృత్యముల ద్వారా తెలుసుకుందాం.

కృత్యము I :

C కేంద్రంగాగల ఒక సరిపడినంత పెద్ద వృత్తమును గీయండి. పటం 3.40 లో చూపిన విధంగా దాని జ్యా AB



పటం 3.40

ని గీయండి. కేంద్రీయ కోణం $\angle ACB$ ని గీయండి. జ్యా AB వలన ఏర్పడిన అధిక చాపముపై D బిందువును అల్ప చాపముపై E బిందువును తీసుకోండి.

- (1) $\angle ADB$, $\angle ACB$ లను కొలవండి. వాటి కొలతలను పోల్చండి.
- (2) $\angle ADB$, $\angle AEB$ లను కొలవండి. లభించిన కొలతల మొత్తంను కూడి చూడండి.


- (3) చాపము ADB పై F, G, H లాంటి ఇంకా కొన్ని బిందువులను తీసుకోండి. $\angle AFB$, $\angle AGB$, $\angle AHB$, ల కొలతను కొలవండి. ఈ కొలతలతో $\angle ADB$ కొలతను మరియు వాటి పరస్పర కొలతలతో పోల్చండి.
- (4) చాపము AEB పై I అనే మరొక ఏదైనా బిందువు తీసుకోండి. $\angle AIB$ ని కొలిచి ఆ కొలతతో $\angle AEB$ కొలతను పోల్చండి

ఈ కృత్యం ద్వారా మీకు కింది విషయములు తెలుస్తాయి -

- (1) $\angle ACB$ కొలత $\angle ADB$ కొలతకు రెట్టింపు ఉంటుంది.
- (2) $\angle ADB$, $\angle AEB$ ల కొలతల మొత్తం 180° ఉంటుంది.
- (3) $\angle AHB$, $\angle ADB$, $\angle AFB$, $\angle AGB$ ల కొలతలు సమానంగా ఉంటాయి.
- (4) $\angle AEB$, $\angle AIB$ ల కొలతలు సమానంగా ఉంటాయి.

కృత్యము II :

పటం 3.41 లో చూపిన విధంగా C కేంద్రంగాగల సరిపడే ఒక పెద్ద వృత్తంను గీయండి. రే.ఖం. PQ అనే ఏదైనా ఒక వ్యాసాన్ని గీయండి. ఈ వ్యాసం వలన ఏర్పడిన రెండు అర్థవృత్తాలపై R, S, T అనే కొన్ని బిందువులను తీసుకోండి. $\angle PRQ$, $\angle PSQ$, $\angle PTQ$ లను కొలవండి. ఇందులోని ప్రతి కోణం లంబకోణం అని తెలుస్తుంది.



పటం 3.41


పై కృత్యముల ద్వారా మీకు కనిపించిన ధర్మములు అనగా వృత్తము కోణములకు సంబంధించిన సిద్ధాంతములు.

ఈ సిద్ధాంతముల నిరూపణ మనం చూద్దాం. దానికోరకు ముందుగా కొన్ని గుర్తులను పరిచయం చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

అంతర్లిఖిత కోణము (Inscribed angle)

పటం 3.42 లో C కేంద్రంగాగల ఒక వృత్తము $\angle PDQ$ యొక్క శీర్షబిందువు D వృత్తంపై ఉంది. కోణం యొక్క భుజములు DP మరియు DQ వృత్తమును వరుసగా A మరియు B లలో ఖండిస్తాయి ఇలాంటి కోణంను వృత్తంలోని లేదా చాపములోని అంతర్లిఖిత కోణము అంటారు.


పటం 3.42 లో $\angle ADB$ అనేది చాపము ADB లో అంతర్లిఖిత కోణం.



పటం 3.42

అంతరఖండిత చాపము (Intercepted arc)

కింది పటం 3.43 లో (i) నుండి (vi) వరకు గల అన్ని పటములను పరిశీలించండి.




పటం 3.43

ప్రతి పటంలోని $\angle ABC$ యొక్క అంతర్భాగంలో ఉన్న వృత్త చాపమును $\angle ABC$ ని అంతరఖండిత చాపము అని అంటారు. అంతరఖండిత చాపము యొక్క అంత్యబిందువులనే వృత్తము మరియు కోణముల ఖండన బిందువులు అవుతాయి. కోణం యొక్క ప్రతి భుజంపై చాపము యొక్క ఒక అంత్య బిందువు ఉండవలసిన అవసరం ఉంది.

పటం 3.43 లోని (i), (ii), (iii) పటాలలోని కోణాలు ఒకే ఒక చాపమును అంతర ఖండితము చేస్తాయి. కాని (iv), (v), (vi) పటాలలోని కోణాలు రెండు చాపములను అంతరఖండితము చేస్తాయి.

పటం (ii), (v) లోని కోణం యొక్క ఒక భుజం (vi) పటంలోని కోణం యొక్క రెండు భుజాలు వృత్తమును స్పృశిస్తున్నాయని గమనించండి.


పటం 3.44 లోని చాపము అంతరఖండిత చాపము కాదు. ఎందుకనగా కోణం యొక్క భుజం BC పై చాపము యొక్క ఒక్క అంత్య బిందువు కూడా లేదు.



పటం 3.44

అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతము (Inscribed angle theorem)

సిద్ధాంతము : వృత్తంలో అంతర్లిఖిత కోణ కొలత దాని అంతరఖండిత చాపము కొలతలో సగం ఉంటుంది.



పటం 3.45

దత్తాంశం : O కేంద్రంగాగల వృత్తంలో $\angle BAC$ అనేది BAC చాపములోని అంతర్లిఖిత కోణము. ఆ కోణము వలన ఏర్పడిన చాపము BDC అంతర ఖండిత చాపము.

సారాంశం : $\angle BAC = \frac{1}{2} m(\text{చాపము BDC})$

నిర్మాణం : కిరణం AO ను గీసాము. అది వృత్తమును E బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది వ్యాసార్థం OC ని గీసాము.

ఉపపత్తి : ΔAOC లో.

భుజము $OA \cong$ భుజము OC (ఒకే వృత్త వ్యాసార్థాలు)

$\therefore \angle OAC = \angle OCA$ (సమద్విబాహు త్రిభుజ సిద్ధాంతం)

$\angle OAC = \angle OCA = x$ అని అనుకొనిన. (I)

ఇప్పుడు, $\angle EOC = \angle OAC + \angle OCA$ (త్రిభుజ బాహ్యకోణ సిద్ధాంతం)
 $= x^\circ + x^\circ = 2x^\circ$

కాని $\angle EOC$ అనేది కేంద్రీయ కోణం.

$\therefore m(\text{చాపము } EC) = 2x^\circ$ (చాపము కొలత నిర్వచనం) (II)

$\therefore$ (I) మరియు (II) ల నుండి

$\angle OAC = \angle EAC = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } EC)$ (III)

ఇదే విధంగా, వ్యాసార్థం OB ని గీసి, $\angle EAB = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } BE)$ ను నిరూపించవచ్చు..... (IV)

$\therefore \angle EAC + \angle EAB = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } EC) + \frac{1}{2} m(\text{చాపము } BE)$ (III), (IV) ల నుండి

$\therefore \angle BAC = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము } EC) + m(\text{చాపము } BE)]$

$= \frac{1}{2} [m(\text{చాపము } BEC)] = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము } BDC)]$ (V)

వృత్తంలో అంతర్లిఖిత కోణము మరియు వృత్త కేంద్రములకు సంబంధించి మూడు సందర్భములు కలవని గమనించండి. వృత్త కేంద్ర కోణం యొక్క భుజంపై ఉండవచ్చు, అంతర్భాగంలో లేదా బాహ్యభాగంలో ఉండవచ్చు. వీటిలోని మొదటి, రెండు సందర్భాలు (III), (V) లలో నిరూపించబడ్డాయి. ఇప్పుడు మిగిలిన మూడవ సందర్భమును ఆలోచించుదాం.


పటం 3.46 లో,

$\angle BAC = \angle BAE - \angle CAE$

$= \frac{1}{2} m(\text{చాపము } BCE) - \frac{1}{2} m(\text{చాపము } CE)$
 (III) నుండి.

$= \frac{1}{2} [m(\text{చాపము } BCE) - m(\text{చాపము } CE)]$

$= \frac{1}{2} [m(\text{చాపము } BC)]$ (VI)



పటం 3.46


ఈ సిద్ధాంతము యొక్క వాక్యమును కింది విధంగా కూడా రాస్తారు.

వృత్త చాపము, మిగిలిన వృత్తముపై ఏదేని బిందువు వలన ఏర్పడిన కోణము (Subtended) కొలత ఆ చాపము వలన ఏర్పడే కేంద్రీయ కోణ కొలతలో సగం ఉంటుంది.

ఈ సిద్ధాంతము యొక్క స్వీకృతాలను ప్రతిపాదలను కూడా ఈ పరిభాషలోనే రాయవచ్చు.

అంతర్లీఖిత కోణ సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలు (Corollaries of inscribed angle theorem)

1. ఒకే చాపములోని అంతర్లిఖిత కోణములన్ని సర్వసమానంగా ఉంటాయి.



పటం 3.47


పటం 3.47 ఆధారంగా దత్తాంశము సారాంశములను రాయండి.

కింది ప్రశ్నలను ఆధారంగా చేసుకొని ఉపపత్తిని రాయండి.

- (1) $\angle PQR$ ఏ చాపమును అంతరఖండితము చేసింది?
- (2) $\angle PSR$ ఏ చాపమును అంతరఖండితము చేసింది?
- (3) అంతర్లీఖిత కోణ కొలత మరియు అది అంతరఖండితం చేసిన చాపము కొలతల మధ్య ఏ సంబంధం ఉంటుంది?

2. అర్థవృత్తంలోని అంతర్నిఖిత కోణము లంబకోణం అవుతుంది.

పక్కనున్న పటం 3.48 ఆధారంగా ఈ సిద్ధాంతము యొక్క దత్తాంశం, సారాంశం మరియు ఉపపత్తులను రాయండి.



పటం 3.48


చక్రీయ చతుర్భుజం (Cyclic quadrilateral)

చతుర్భుజం యొక్క నాలుగు శీర్షబిందువులు వృత్తంపై ఉన్నట్లయితే ఆ చతుర్భుజంను చక్రీయ చతుర్భుజం అంటారు.

చక్రీయ చతుర్భుజ సిద్ధాంతం (Theorem of cyclic quadrilateral)

చక్రీయ చతుర్ముఖ ఎదుటి కోణములు పరస్పరం సంపూర్ణకోణములు అవుతాయి.

కింద ఇవ్వబడిన ఉపపత్తిలో ఖాళీలను పూరించి ఉపపత్తిని పూర్తి చేయండి.



పటం 3.49

దత్తాంశం : ☐ అనేది చక్రీయ చతుర్భుజం

సాదాంశం : $\angle B + \angle D = \boxed{}$
 $\boxed{} + \angle C = 180^\circ$

ఉపపత్తి : $\angle$ ADC అంతర్భుజ కోణము, చాపము ABC ని అంతరఖండీతము చేసినది.

$$\therefore \angle ADC = \frac{1}{2} \boxed{} \dots\dots\dots (I)$$

అదేవిధంగా అనే అంతరిక్షిత కోణము చాపము ADC అని అంతర ఖండితము చేసింది.

$$\therefore \boxed{} = \frac{1}{2} m(\text{చాపము ADC}) \dots (II)$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle ADC + \boxed{} &= \frac{1}{2} \boxed{} + \frac{1}{2} m(\text{చాపము ADC}) \dots [(I), (II) \text{ ల నుండి}] \\ &= \frac{1}{2} [\boxed{} + m(\text{చాపము ADC})] \\ &= \frac{1}{2} \times 360^\circ \dots [\text{చాపము ABC, చాపము ADC లు కలిసి} \\ &\quad \text{పూర్తి వృత్తామౌతుంది}] \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

అదే విధంగా $\angle A + \angle C = \boxed{}$ దీనిని నిరూపించవచ్చును.

చక్రీయ చతుర్భుజ సిద్ధాంత ప్రతిపాదన (Corollary of cyclic quadrilateral theorem)

సిద్ధాంతము : చక్రీయ చతుర్భుజ బాహ్యకోణం దాని ఆసన్న కోణం యొక్క అభిముఖ కోణమునకు సర్వసమానంగా ఉంటుంది
ఈ సిద్ధాంత ఉపపత్తిని మీరే రాయండి.



ఆలోచించుదాం

పై సిద్ధాంతంలో $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ని నిరూపించిన మిగిలిన ఎదుటి కోణముల మొత్తం కూడా 180° అవుతుంది, దీనిని వేరే విధంగా నిరూపించవచ్చా?

చక్రీయ చతుర్భుజ సిద్ధాంత వివర్యము (Converse of cyclic quadrilateral theorem)

సిద్ధాంతము : చతుర్భుజంలోని ఎదుటి కోణములు సంపూర్ణములు అయిన ఆ చతుర్భుజం చక్రీయ చతుర్భుజం అవుతుంది.

ఈ సిద్ధాంతమును పరోక్ష పద్ధతి ద్వారా నిరూపించవచ్చు. మీరు ప్రయత్నించండి.

పై వివర్యము నుండి చతుర్భుజం యొక్క ఎదుటికోణాలు సంపూర్ణములు అయినట్లయితే ఆ చతుర్భుజానికి పరివృత్తం ఉంటుందని మనకు తెలుస్తుంది.

ప్రతి త్రిభుజానికి పరివృత్తము ఉంటుందని మనకు తెలుసు, కాని ప్రతి చతుర్భుజానికి పరివృత్తము ఉండాలని లేదు అని మీరు తెలుసుకోండి.

ఏ వృత్తులు వర్తించినట్లయితే చతుర్భుజానికి పరివృత్తము ఉంటుంది. అనగా చతుర్భుజ శీర్ష బిందువులు ఒకే వృత్తముపై ఉంటాయని మనకు తెలుస్తుంది.

మరొక విభిన్న సందర్భంలో నాలుగు అరేఖీయ బిందువులు చక్రీయం అవుతాయి. దీనిని తరువాతి సిద్ధాంతములో చెప్పడం జరిగింది.



సారాంశం : A, B, C, D బిందువులు ఒకే వృత్తంపై ఉన్నాయి (అనగా $\square ABCD$ చక్రీయము) ఇంతకు ముందు దానివలె దీనిని కూడా పరోక్ష పద్ధతిలో నిరూపించవచ్చు.




$\therefore m(\text{చాపము LN}) = 2 \times \angle M \dots\dots (\text{అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతము})$

$$= 2 \times \frac{145^\circ}{2}$$

$$= 145^\circ$$

ఉదా. (2) పటం 3.52 లో, జ్యా PQ, జ్యా RS ఒకదానికొకటి T బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి.



పటం 3.52

(i) $\angle STQ = 58^\circ$, $\angle PSR = 24^\circ$, అయిన $m(\text{చాపము SQ})$ ను కనుగొనండి.

(ii) $\angle STQ = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము PR}) + m(\text{చాపము SQ})]$ దీనిని సరిచూడండి.

(iii) జ్యా PQ, జ్యా RS లలోని కోణముల కొలతలు ఎంతైనా ఉన్నట్లయితే

$$m\angle STQ = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము PR}) + m(\text{చాపము SQ})] \text{ అని చూపండి.}$$

(iv) ఈ ఉదాహరణలో నిరూపించబడే ధర్మము అక్షరాలలో రాయండి.

సాధన : (i) $\angle SPQ = \angle SPT = 58^\circ - 24^\circ = 34^\circ \dots\dots (\text{త్రిభుజ బాహ్యకోణ సిద్ధాంతం})$

$$m(\text{చాపము QS}) = 2 \angle SPQ = 2 \times 34^\circ = 68^\circ$$

(ii) $m(\text{చాపము PR}) = 2 \angle PSR = 2 \times 24^\circ = 48^\circ$

$$\text{ఇప్పుడు, } \frac{1}{2} [m(\text{చాపము PR}) + m(\text{చాపము SQ})] = \frac{1}{2} [48 + 68]$$

$$= \frac{1}{2} \times 116 = 58^\circ$$

$$= \angle STQ$$

(iii) ఈ ధర్మము యొక్క నిరూపనలో ఖాళీలను పూరించి, దానిని పూర్తి చేయండి.


$$\angle STQ = \angle SPQ + \boxed{} \dots\dots (\text{త్రిభుజ బాహ్యకోణ సిద్ధాంతం})$$

$$= \frac{1}{2} m(\text{చాపము SQ}) + \boxed{} \dots\dots (\text{అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతం})$$

$$= \frac{1}{2} [\boxed{} + \boxed{}]$$

(iv) వృత్తం యొక్క జ్యాలు ఒకదానినొకటి వృత్త అంతర్భాగంలో ఖండించుకున్నట్లయితే వాటితో ఏర్పడే కోణముల కొలతలు ఆ కోణం వలన ఏర్పడే అంతరఖండిత చాపము మరియు దాని నిరుద్ధ కోణం అంతర ఖండిత చాపముల కొలతల మొత్తంలో సగం ఉంటుంది.

ఉదా. (3) వృత్తము యొక్క పొడగించబడిన జ్యాల రేఖలు వృత్తము బయట ఖండించుకున్నట్లయితే ఆ రేఖల మధ్య కోణం కొలత ఆ కోణం అంతరఖండిత చాపముల కొలతల వ్యత్యాసంనకు సగం ఉంటుందని నిరూపించండి.



పటం 3.53

దత్తాంశము: వృత్త జ్యా AB, జ్యా CD లు వృత్తం బయట E బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి.

సారాంశం : $\angle AEC = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము AC}) - m(\text{చాపము BD})]$

నిర్మాణం : రే.ఖం. AD ని గీసాము.

ఉపపత్తి : ఈ ధర్మము యొక్క నిరూపణ పై ఉదా. (2) లో ఇవ్వబడిన నిరూపణ వలె చేయవచ్చు. దానికొరకు ΔAED యొక్క కోణం ఆ త్రిభుజం యొక్క బాహ్యకోణములను పరిగణలోకి తీసుకొని ఉపపత్తిని రాయండి.




ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

- (1) వృత్తంలోని అంతర్లిఖిత కోణకొలత అది అంతర ఖండితం చేసిన చాపము కొలతలో సగం ఉంటుంది.
- (2) వృత్తం యొక్క ఒకే చాపములోని అంతర్లిఖిత కోణములు సర్వసమానములు.
- (3) అర్ధవృత్తంలోని అంతర్లిఖిత కోణము లంబకోణము అవుతుంది.
- (4) చతుర్భుజ నాలుగు శీర్షబిందువులు ఒకే వృత్తంపై ఉంటే ఆ చతుర్భుజమును చక్రీయ చతుర్భుజం అంటారు.
- (5) చక్రీయ చతుర్భుజ ఎదుటి కోణములు సంపూరకాలు.
- (6) చక్రీయ చతుర్భుజ బాహ్యకోణము దాని ఆసన్న-అభిముఖ కోణానికి సమానం.
- (7) చతుర్భుజ ఎదుటి కోణములు పరస్పరం సంపూరకములు అయిన అది చక్రీయము అవుతుంది.
- (8) రేఖ యొక్క రెండు భిన్న బిందువులు, ఆ రేఖకు ఒకేవైపు గల రెండు భిన్న బిందువులు సమాన కోణములను ఏర్పరిచినట్లయితే ఆ నాలుగు బిందువులు ఒకే వృత్తంపై ఉంటాయి.

(9) పక్క పటం 3.54 లో,

(i) $\angle AEC = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము AC}) + m(\text{చాపము DB})]$

(ii) $\angle CEB = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము AD}) + m(\text{చాపము CB})]$




పటం 3.54



(10) పక్క పటం 3.55 లో,


$$\angle BED = \frac{1}{2} [m(\text{చాపము BD}) - m(\text{చాపము AC})]$$




పటం 3.55

అభ్యాసమాలిక 3.4

1. పటం 3.56 లో, O కేంద్రంగా గల వృత్త జ్యా AB యొక్క పొడవు వృత్త వ్యాసార్థానికి సమానం. అయిన (1) $\angle AOB$ (2) $\angle ACB$ (3) చాపము AB (4) చాపము ACB ల కొలతలను కనుగొనండి.



పటం 3.56




పటం 3.57

2. పటం 3.57 లో, $\square PQRS$ ఒక చక్రీయం. భుజము $PQ \cong$ భుజము RQ . $\angle PSR = 110^\circ$, అయిన
- (1) $\angle PQR =$ ఎంత?
 - (2) $m(\text{చాపము } PQR) =$ ఎంత?
 - (3) $m(\text{చాపము } QR) =$ ఎంత?
 - (4) $\angle PRQ =$ ఎంత?


3. చక్రీయ $\square MRPN$ లో, $\angle R = (5x - 13)^\circ$, $\angle N = (4x + 4)^\circ$, అయిన $\angle R$, $\angle N$ ల కొలతలను నిర్ణయించండి.

4. పటం 3.58 లో రే.ఖం. RS అనేది O కేంద్రంగాగల వృత్త వ్యాసం. T బిందువు వృత్త బాహ్య భాగంలోని బిందువు అయిన $\angle RTS$ అల్పకోణం అని చూపండి.



పటం 3.58

5. ఏదేని దీర్ఘచతురస్రం చక్రీయ చతుర్భుజం అవుతుందని నిరూపించండి.




పటం 3.59


6. పటం 3.59 లో, రే.ఖం. YZ, రే.ఖం. XT లు ΔWXY యొక్క శీర్షలంబరేఖలు P వద్ద ఖండించుకొనిన.

- (1) $\square WZPT$ ఒక చక్రీయ చతుర్భుజం.
- (2) X, Z, T, Y బిందువులు ఒకే వృత్తముపై ఉంటాయని చూపండి.

7. పటం 3.60 లో $m(\text{చాపము NS}) = 125^\circ$, $m(\text{చాపము EF}) = 37^\circ$, అయిన $\angle NMS$ యొక్క కొలతను కనుగొనండి.



పటం 3.60



పటం 3.61


8. పటం 3.61 లో జ్యా AC, జ్యా DE లు B బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి. $\angle ABE = 108^\circ$ మరియు $m(\text{చాపము AE}) = 95^\circ$ అయిన $m(\text{చాపము DC})$ ను కనుగొనండి.



తెలుసుకుందాం.


కృత్యము :

ఒక సరివడేంత పెద్ద వృత్తమును గీయండి. పటం 3.62 లో వృత్తములో రే.ఖం. AC ఒక జ్యాను గీయండి. వృత్తంపై ఏదేని బిందువు B ని తీసుకోండి. $\angle ABC$ అంతర్లీఖిత కోణంను గీయండి. $\angle ABC$ కొలతను కొలిచి రాసి పెట్టండి.



పటం 3.62

ఇప్పుడు పటం 3.63 లో చూపినవిధంగా అదే వృత్తంనకు స్పర్శరేఖ CD ని గీయండి. $\angle ACD$ యొక్క కొలతను కొలవండి.



పటం 3.63



$\angle ACD$ కొలత, $\angle ABC$ కొలతకు సమానమని మీకు తెలుస్తుంది.


$$\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } AC) \text{ అని మీకు తెలుసు.}$$

దీని నుండి $\angle ACD$ కొలత కూడా చాపము AC కొలతలో సగం అని సమాధానం లభిస్తుంది.

వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖల ఒక ముఖ్యమైన ధర్మము కలదు. దానిని మనం ఇప్పుడు నిరూపిద్దాం.

స్పర్శరేఖ-ఖండన రేఖ కోణ సిద్ధాంతము (Theorem of angle between tangent and secant)

సిద్ధాంతము: శీర్షబిందువు వృత్తంపై గల కోణము యొక్క ఒక భుజం వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ మరియు రెండవ భుజము వృత్తమును మరొక బిందువు వద్ద ఖండించిన ఆ కోణము కొలత దాని వలన ఏర్పడే అంతర ఖండిత చాపము కొలతలో సగం ఉంటుంది.



పటం 3.64

దత్తాంశము: $\angle ABC$ యొక్క శీర్షబిందువు, M కేంద్రంగా గల వృత్తంపై గలదు. దాని భుజం BC స్పృశిస్తుంది భుజం BA వృత్తమును A వద్ద ఖండిస్తుంది. చాపము ADB అనేది $\angle ABC$ యొక్క అంతరఖండిత్ చాపము

సారాంశం : $\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } ADB)$

ఉపపత్తి : ఈ సిద్ధాంత నిరూపణ, మూడు సందర్భాలను ఆలోచిస్తూ చేయ వలసివస్తుంది.

(1) పటం 3.64 (i) లో వలె వృత్త కేంద్రం M , $\angle ABC$ యొక్క ఒక భుజంపై ఉన్నట్లయితే

$$\angle ABC = \angle MBC = 90^\circ \dots\dots (\text{స్పర్శరేఖ సిద్ధాంతము})\dots\dots(I)$$

చాపము ADB అర్థవృత్తము అవుతుంది.

$$\therefore m(\text{చాపము } ADB) = 180^\circ \dots\dots (\text{చాప కోణకొలత నిర్వచనం})\dots\dots(II)$$

(I), (II) ల నుండి.


$$\angle ABC = \frac{1}{2} m(\text{చాపము } ADB)$$

(2) పటం 3.64 (ii) విధంగా, కేంద్రము M , $\angle ABC$ కు బాహ్యంగా ఉన్నట్లయితే

వ్యాసార్థం MA , వ్యాసార్థం MB లను గీయండి.

$$\text{ఇప్పుడు, } \angle MBA = \angle MAB \dots\dots (\text{సమద్విభాహు త్రిభుజ సిద్ధాంతము})$$

$$\text{అదే విధంగా, } \angle MBC = 90^\circ \dots\dots (\text{స్పర్శరేఖ సిద్ధాంతము}) \dots\dots (I)$$



పటం 3.64(i)


స్పర్శరేఖ - ఖండనరేఖ కోణ సిద్ధాంత వివరణము:

వృత్తము జ్యా యొక్క ఒక అంత్య బిందువు గుండా పోయే ఒక రేఖను గీసిన ఆ రేఖ, ఆ జ్యాతో ఏర్పరిచిన కోణము కొలత కోణము అంతర ఖండితము చేసిన చాపముకొలతలో సగం ఉన్న, ఆ రేఖ వృత్తమునకు స్పర్శరేఖ అవుతుంది.

పటం 3.66 లో,

$$\text{ఒకవేళ } \angle PQR = \frac{1}{2} m(\text{చాపము PSQ}) \text{ అయిన}$$

$$[\text{లేదా } \angle PQT = \frac{1}{2} m(\text{చాపము PUQ}) \text{ అయిన}]$$



పటం 3.66

రేఖ TR వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ అవుతుంది. ఈ వివరణ సాధారణ సిద్ధాంతం వృత్తానికి స్పర్శరేఖను గీయుటకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సిద్ధాంతమును పరోక్ష పద్ధతిలో నిరూపించవచ్చు.

జ్యా అంతరఖండన సిద్ధాంతము (Theorem of internal division of chords)

ఒక వృత్తము యొక్క రెండు జ్యాలు వృత్తము యొక్క అంతర్భాగంలో ఖండించుకొనిన మొదటి జ్యాతో ఏర్పడిన రెండు భాగముల పొడవుల లబ్ధం. రెండవ జ్యా యొక్క రెండు భాగాల పొడవుల లబ్ధానికి సమానం.

దత్తాంశము: P కేంద్రంగాగల వృత్తము యొక్క జ్యాలు AB,

CD లు వృత్త అంతర్భాగంలో E బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నాయి.

సారాంశం : $AE \times EB = CE \times ED$

నిర్మాణం : రే.ఖం. AC, రే.ఖం. DB లను గీసితిమి.

ఉపపత్తి : $\triangle CAE, \triangle BDE$ లలో,


$$\angle AEC \cong \angle DEB \quad \dots \text{ (అభిముఖ కోణములు)}$$

$$\angle CAE \cong \angle BDE \quad \dots \text{ (ఒకే వృత్తచాపములోని అంతర్లిఖిత కోణములు)}$$

$$\therefore \triangle CAE \sim \triangle BDE \quad \dots \text{ (కో.కో. సరూప నియమం)}$$

$$\therefore \frac{AE}{DE} = \frac{CE}{BE} \quad \dots \text{ (సరూప త్రిభుజాల సదృశ భుజాలు)}$$

$$\therefore AE \times EB = CE \times ED$$



పటం 3.67



ఆలోచించుదాం.

పటం 3.67 లో, రే.ఖం. AC, రే.ఖం. DB లను గీసి మనం సిద్ధాంతమును నిరూపించాము. దానికి బదులు రే.ఖం. AD, రే.ఖం. CB లను గీసి ఈ సిద్ధాంతమును నిరూపించవచ్చునా?

అధిక వివరాలకై


పటం 3.67 లో జ్యా AB యొక్క బిందువు E వలన AE, EB అనే రెండు భాగములు అయినవి. రే.ఖం. AE, రే.ఖం. EB లు ఆసన్న భుజాలుగా ఒక దీర్ఘచతురస్రమును గీసితిమి. అయిన $AE \times EB$ ఆ దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యము అవుతుంది. అదేవిధంగా $CE \times ED$ జ్యా CD యొక్క రెండు భాగాల వలన ఏర్పడే దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యం అవుతుంది. మనం $AE \times EB = CE \times ED$ దీనిని నిరూపించాము.

కావున ఈ సిద్ధాంతము వేరే రకంగా కింది విధంగా చెప్పవచ్చును.

ఒకే వృత్తము యొక్క రెండు జ్యాలు వృత్త అంతర్భాగములో ఖండించుకొనిన ఒక జ్యా యొక్క రెండు భాగాల ద్వారా ఏర్పడే దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యం రెండవ జ్యా యొక్క రెండు భాగాల ద్వారా ఏర్పడే దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యానికి సమానం.

జ్యాల బాహ్యఖండన సిద్ధాంతము (Theorem of external division of chords)

ఒకే వృత్తము యొక్క జ్యాలు AB, CD లను పొడగించిన వృత్తఖండన రేఖలు పరస్పరం వృత్త బాహ్య భాగంలో E బిందువు వద్ద ఖండించు కొనిన $AE \times EB = CE \times ED$ అవుతుంది.



పటం 3.68

పై సిద్ధాంతము ఆధారంగా దత్తాంశము సారాంశము మీరే నిర్ణయించండి.

నిర్మాణం : రే.ఖం. AD, రే.ఖం. BC లను గీసితిమి.

ఖాళీలను పూరించి నిరూపణ పూర్తి చేయండి.

ఉపపత్తి : $\triangle ADE$, $\triangle CBE$ లలో,

$\angle AED \cong \angle CEB$ (ఉమ్మడి కోణములు)

$\angle DAE \cong \angle BCE$ ()


$\therefore \triangle ADE \sim \triangle CBE$ ()

$\therefore \frac{(AE)}{(CE)} = \frac{(ED)}{(EB)}$ (సరూప త్రిభుజాల సదృశభుజాలు)

$\therefore AE \times EB = CE \times ED$

స్పర్శరేఖ-ఖండనరేఖ, రేఖాఖండ సిద్ధాంతము (Tangent secant segments theorem)

వృత్త బాహ్య బిందువు E నుండి గీసిన ఖండన రేఖ వృత్తమును A, B బిందువులలో ఖండించిన, ఆ బిందువు నుండి పోయే స్పర్శరేఖ వృత్తమును T బిందువు వద్ద స్పృశించిన $EA \times EB = ET^2$ అవుతుంది.



పటం 3.69

సిద్ధాంతము యొక్క పై వాక్యములను బట్టి దత్తాంశము సారాంశములను నిర్ణయించుము.

నిర్మాణం : రే.ఖం. TA, రే.ఖం. TB లను గీసితిమి.

ఉపపత్తి : $\Delta EAT, \Delta ETB$ లలో,

$\angle AET \cong \angle TEB \dots$ (ఉమ్మడి కోణములు)

$\angle ETA \cong \angle EBT \dots$ (స్పర్శరేఖ ఖండన రేఖ సిద్ధాంతం)

$\therefore \Delta EAT \sim \Delta ETB \dots$ (కో.కో. సరూపత)

$\therefore \frac{ET}{EB} = \frac{EA}{ET} \dots$ (సరూప త్రిభుజాల సదృశ భుజాలు)

$\therefore EA \times EB = ET^2$




ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.


(1) పటం 3.70 ప్రకారం

$$AE \times EB = CE \times ED$$

ఈ దర్శమును జ్యాల అంతరఖండన సిద్ధాంతము అంటారు.



పటం 3.70



పటం 3.71

(2) పటం 3.71 ప్రకారం


$$AE \times EB = CE \times ED$$

ఈ దర్శమును జ్యాల బాహ్య ఖండన సిద్ధాంతం అంటారు.

(3) పటం 3.72 ప్రకారం

$$EA \times EB = ET^2$$

ఈ దర్శమును స్పర్శరేఖ-ఖండనరేఖ సిద్ధాంతం అంటారు.



పటం 3.72

ఉదా. (1) పటం 3.73 లో, రేఖం. PS స్పర్శరేఖాఖండము. రేఖ PR

వృత్తఖండన రేఖ

$$PQ = 3.6,$$

QR = 6.4 అయిన PS ను కనుగొనండి.

సాధన : $PS^2 = PQ \times PR$ (స్పర్శరేఖ-ఖండనరేఖ

రేఖాఖండ సిద్ధాంతము)


$$= PQ \times (PQ + QR)$$

$$= 3.6 \times [3.6 + 6.4]$$

$$= 3.6 \times 10$$

$$= 36$$

$$\therefore PS = 6$$



పటం 3.74

ఉదా. (2)

పటం 3.74 లో, జ్యా MN, జ్యా RS లు పరస్పరం

P బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి.

$$PR = 6, PS = 4, MN = 11$$

అయిన PN కనుగొనండి.

సాధన : జ్యాల అంతర ఖండన సిద్ధాంతము నుండి,

$$PN \times PM = PR \times PS \dots (I)$$

$$PN = x \text{ అనుకొని } \therefore PM = 11 - x$$

ఈ విలువను (I) లో ప్రతిక్షేపించగా

$$x(11 - x) = 6 \times 4$$

$$\therefore 11x - x^2 - 24 = 0$$

$$\therefore x^2 - 11x + 24 = 0$$


$$\therefore (x - 3)(x - 8) = 0$$

$$\therefore x - 3 = 0 \text{ లేదా } x - 8 = 0$$

$$\therefore x = 3 \text{ లేదా } x = 8$$

$$\therefore PN = 3 \text{ లేదా } PN = 8$$

ఉదా.(3) పటం 3.75 లో, రెండు వృత్తములు పరస్పరం X, Y బిందువులలో ఖండించుకొంటాయి. రేఖ XY పై గల M బిందువుద్వారా గీసిన స్పర్శరేఖలు ఆ వృత్తములను P, Q బిందువులలో స్పృశించుచున్నాయి. అయిన రే.ఖం. PM $\cong$ రే.ఖం. QM అని నిరూపించండి.



పటం 3.75

ఉపపత్తి : ఖాళీలను పూరించి సాధనను రాయండి.

రేఖ MX అనేది రెండు వృత్తముల ఉమ్మడి

$$\therefore PM^2 = MY \times MX \dots (I)$$


అదేవిధంగా = $\times$, (స్పర్శరేఖ-ఖండనరేఖ రేఖాఖండ సిద్ధాంతం) ... (II)

$$\therefore (I), (II) \text{ ల నుండి } \dots = QM^2$$

$$\therefore PM = QM$$

రే.ఖం. PM $\cong$ రే.ఖం. QM

ఉదా. (4)



పటం 3.76

పటం 3.76 లో, రే.ఖం. PQ అనేది O కేంద్రంగాగల వృత్త వ్యాసము. R బిందువు వృత్తముపై ఏదేని ఒక బిందువు.

రే.ఖం. RS $\perp$ రే.ఖం. PQ.

అయిన SR అనేది

PS, SQ ల గుణ మధ్యమము అని నిరూపించండి.

$$[\text{అనగా } SR^2 = PS \times SQ]$$

సాధన : కింద ఇచ్చిన సోపానాలతో నిరూపణ రాయండి.

(1) కిరణం RS ను గీయండి. అది వృత్తమును ఏ బిందువు వద్ద ఖండిస్తుందో ఆ బిందువును T గా పేరు పెట్టండి.

(2) RS = TS అని చూపండి.

(3) జ్యాల అంతర ఖండన సిద్ధాంతమును ఉపయోగించి సమానత్వమును రాయండి.

(4) RS = TS ను ఉపయోగించి సారాంశము నిరూపించండి.




ఆలోచించుదాం.

(1) పై పటం 3.76 లో రే.ఖం. PR, రే.ఖం. RQ లను గీసిన ΔPRQ ఏ రకమైన త్రిభుజం అవుతుంది?


(2) పై ఉదా. (4) లో నిరూపించిన ధర్మము ఇంతకు ముందు వేరే పద్ధతిలో నిరూపించడం జరిగిందా?



1. పటం 3.77 లో, Q అనేది స్పర్శబిందువు
 $PQ = 12$, $PR = 8$,
 అయిన $PS =$ ఎంత? $RS =$ ఎంత?




పటం 3.77




పటం 3.78

2. పటం 3.78 లో, జ్యాలు MN, RS లు
 పరస్పరం D బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి.
 (1) $RD = 15$, $DS = 4$,
 $MD = 8$ అయిన $DN =$ ఎంత?
 (2) $RS = 18$, $MD = 9$,
 $DN = 8$ అయిన $DS =$ ఎంత?

3. పటం 3.79 లో, O కేంద్రంగాగల వృత్త
 స్పర్శబిందువు B.
 రేఖం. $OE \perp$ రేఖ AD, $AB = 12$,
 $AC = 8$, అయిన (1) AD (2) DC
 (3) DE లను కనుగొనండి.




పటం 3.79



పటం 3.80

4. పటం 3.80 లో, $PQ = 6$,
 $QR = 10$, $PS = 8$
 అయిన $TS =$ ఎంత?

5. పటం 3.81 లో, రేఖం. EF ఒక వ్యాసము
 మరియు DF స్పర్శరేఖాఖండం. వృత్త
 వ్యాసార్థము r అయిన
 $DE \times GE = 4r^2$ అని చూపండి.



పటం 3.81

1. కింది ప్రతి ప్రశ్నకు (A), (B), (C), (D) అనే నాలుగు ఐచ్ఛికములు ఇవ్వబడినవి. వాటినుండి సరియైన సమాధానమును ఎంచుకోండి.
 - (1) 5.5 సెం.మీ., 3.3 సెం.మీ. వ్యాసార్థాలు గాగల రెండు వృత్తములు పరస్పరం స్పృశించుకొంటాయి. వాటి కేంద్రముల మధ్యదూరం ఎన్ని సెం.మీ. ఉంటుంది?

(A) 4.4 (B) 8.8 (C) 2.2 (D) 8.8 లేదా 2.2
 - (2) పరస్పరం ఖండించుకునే రెండు వృత్తములలోని ప్రతి వృత్తము రెండవ వృత్త కేంద్రం గుండా పోతాయి. వాటి కేంద్రముల మధ్యదూరం 12 సెం.మీ. అయిన ప్రతి వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము ఎన్ని సెం.మీ. ఉంటుంది?

(A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) చెప్పలేము.
 - (3) ఒక వృత్తము ఒక సమాంతర చతుర్భుజ అన్ని భుజాలను స్పృశిస్తుంది. అయిన ఆ సమాంతర చతుర్భుజము కావలెను. ఈ వాక్యములోని ఖాళీలో సరియైన పదమును రాయండి.

(A) దీర్ఘచతురస్రము (B) రాంబస్ (C) చతురస్రము (D) ట్రెపీజియం
 - (4) ఒక వృత్త కేంద్రము నుండి 12.5 సెం.మీ. దూరంలో గల ఒక బిందువు నుండి ఆ వృత్తమునకు గీసిన స్పర్శరేఖా రేఖాఖండ పొడవు 12 సెం.మీ. అయిన ఆ వృత్త వ్యాసము ఎన్ని సెం.మీ. అవుతుంది?

(A) 25 (B) 24 (C) 7 (D) 14
 - (5) ఒకదానికొకటి బాహ్యంగా స్పృశించే రెండు వృత్తములకు ఎక్కువలో ఎక్కువ ఎన్ని ఉమ్మడి స్పర్శరేఖలను గీయవచ్చు?

(A) ఒకటి (B) రెండు (C) మూడు (D) నాలుగు
 - (6) O కేంద్రంగాగల వృత్త చాపము ACB లో $\angle ACB$ అంతర్లీఖితము చేయబడినది. $m\angle ACB = 65^\circ$ అయిన $m(\text{చాపము ACB}) =$ ఎంత?

(A) 65° (B) 130° (C) 295° (D) 230°
 - (7) ఒక వృత్త జ్యాలు AB, CD పరస్పరం వృత్త అంతర్భాగంలోని E బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి. $(AE) = 5.6$, $(EB) = 10$, $(CE) = 8$ అయిన $(ED) =$ ఎంత?

(A) 7 (B) 8 (C) 11.2 (D) 9
 - (8) చక్రీయ $\square ABCD$ లో, రెండు రెట్లు కోణము $\angle A$ కొలతకు, మూడురెట్లు కోణము $\angle C$ కొలతకు సమానము అయిన $\angle C$ కొలత ఎంత?

(A) 36 (B) 72 (C) 90 (D) 108
 - (9)* A, B, C బిందువులు ఒకే వృత్తంపై గల బిందువులు $m(\text{చాపము AB}) = m(\text{చాపము BC}) = 120^\circ$, రెండు చాపములకు B కాకుండా ఒకటికూడా ఉమ్మడి బిందువు లేదు. అయిన $\triangle ABC$ ఏ రకమైన త్రిభుజం?


(A) సమబాహు త్రిభుజం (B) విషమబాహు త్రిభుజం
(C) లంబకోణ త్రిభుజం (D) సమద్విబాహు త్రిభుజం

(10) రే.ఖం. XZ వ్యాసము గల వృత్త అంతర్భాగములో Y ఒక బిందువు. అయిన కింది వాక్యాలలో ఎన్ని వాక్యాలు సత్యములు?


- (i) $\angle XYZ$ అల్పకోణము అయ్యే అవకాశం లేదు.
 - (ii) $\angle XYZ$ లంబకోణం అయ్యే అవకాశం లేదు.
 - (iii) $\angle XYZ$ అధికకోణము అవుతుంది.
 - (iv) $\angle XYZ$ కొలతతో ఖచ్చిత వాక్యము రాయలేము.
- (A) ఒకటి మాత్రమే (B) రెండు మాత్రమే (C) మూడు మాత్రమే (D) పైవన్నీ

2. O కేంద్రంగాగల వృత్తమును రేఖ l బిందువు P వద్ద స్పృశిస్తుంది. వ్యాసార్థం 9 సెం.మీ. అయిన క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

- (1) $d(O, P) =$ ఎంత? ఎందుకు?
- (2) $d(O, Q) = 8$ సెం.మీ. అయిన Q బిందు స్థానము ఎచ్చట ఉంటుంది?
- (3) $d(O, R) = 15$ సెం.మీ. అయిన బిందువు R ఎన్ని స్థానములలో l రేఖ పై ఉంటుంది? అవి R బిందువు నుండి ఎంత దూరంలో ఉంటాయి?



పటం 3.82




పటం 3.83

3. పక్క పటంలో బిందువు M వృత్త కేంద్రం, రే.ఖం KL స్పృశరేఖా ఖండము.


$$MK = 12, KL = 6\sqrt{3} \text{ అయిన}$$

- (1) వృత్త వ్యాసార్థంను కనుగొనండి.
- (2) $\angle K, \angle M$ ల కొలతలను నిర్ణయించండి.

4. పటం 3.84 లో, వృత్తకేంద్రం O రే.ఖం. AB, రే.ఖం. AC లు స్పృశరేఖాఖండములు వృత్త వ్యాసార్థం r అయి $l(AB) = r$, అయిన $\square ABOC$ ఒక చతురస్రం అవుతుందని చూపండి.



పటం 3.84




పటం 3.85

5. పటం 3.85 లో, సమాంతర చతుర్భుజము $\square ABCD$ అనేది T కేంద్రంగాగల వృత్తం చుట్టు పరిలిఖితం చేయబడింది. (అనగా ఆ చతుర్భుజ భుజములు వృత్తమును స్పృశిస్తాయి) E, F, G, H లు స్పర్శబిందువులు. $AE = 4.5$, $EB = 5.5$, అయిన AD ను కనుగొనండి.


6. పటం 3.86 లో, N కేంద్రం గాగల వృత్తము, M కేంద్రం గాగల వృత్తమును T బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది. పెద్ద వృత్త వ్యాసార్థం చిన్న వృత్తమును S బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది. పెద్ద మరియు చిన్న వృత్తముల వ్యాసార్థాలు వరసగా 9 సెం.మీ., 2.5 సెం.మీ. అయిన కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలను రాసి వాటి నుండి $MS : SR$ నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

(1) $MT =$ ఎంత? (2) $MN =$ ఎంత?

(3) $\angle NSM =$ ఎంత?



పటం 3.86



పటం 3.87

7. పక్క పటంలో కేంద్రం X, Y లు గాగల వృత్తములు వరస్పరం బిందువు Z వద్ద స్పృశించుకుంటాయి. Z బిందువు గుండా పోయే వృత్త ఖండన రేఖ ఈ వృత్తములను వరసగా A, B బిందువులలో ఖండిస్తుంది. అయిన వ్యాసార్థం $XA \parallel$ వ్యాసార్థం YB . అని చూపండి. కింద ఇచ్చిన ఉపపత్తిలో ఖాళీలను పూరించి దానిని పూర్తి చేయండి.

నిర్మాణం : రే.ఖం. XZ మరియు గీసితిమి.

ఉపపత్తి : స్పృశించుకునే వృత్తముల సిద్ధాంతము ప్రకారం X, Z, Y బిందువులు

$\therefore \angle XZA \cong$ శీర్షాభిముఖ కోణములు

$\angle XZA = \angle BZY = a$ అనుకొనిన (I)

ఇప్పుడు రే.ఖం. $XA \cong$ రే.ఖం. XZ (.....)


$\therefore \angle XAZ =$ = a (సమద్విభాహు త్రిభుజ సిద్ధాంతం) (II)

అదే విధంగా రే.ఖం. $YB \cong$ (.....)


$\therefore \angle BZY =$ = a (.....) (III)

$\therefore$ వ్యాసార్థము $XA \parallel$ వ్యాసార్థము YB (.....)

- అయిన రే.ఖం. $AX \parallel$ రే.ఖం. BY అనిచూపండి.




పటం 3.89



పటం 3.88

- RS 12 సెం.మీ. అయిన వృత్త వ్యాసార్థమును కనుగొనండి.


- 10*. పటం 3.90 లో, రేఖాఖండం AB, C కేంద్రంగాల
 వృత్తము యొక్క వ్యాసము. వృత్త స్పర్శ రేఖ PQ
 వృత్తమును T బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది.
 రే.ఖం. $AP \perp$ రేఖ PQ, రే.ఖం. $BQ \perp$ రేఖ
 PQ. అయిన రే.ఖం. $CP \cong$ రే.ఖం. CQ అని
 చూపండి.



పటం 3.90

- 11*. A, B, C, లు కేంద్రాలుగాగల మూడు వృత్తములను 3 సెం.మీ. వ్యాసార్థంలో ప్రతి వృత్తము మిగిలిన రెండు వృత్తమును స్పృశించే విధంగా గీయండి.

- 12*. వృత్తము యొక్క ఏవేని మూడు బిందువులు సరేఖీయములు కావు అని నిరూపించండి.



పటం 3.91

13. పటం 3.91 లో రేఖ PR వృత్తమును Q బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది. ఈ పటం ఆధారంగా కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలను రాయండి.


- (1) $\angle TAQ$, $\angle TSQ$ ల కొలతల మొత్తం ఎంత?
- (2) $\angle AQP$ కి సర్వసమానం అయ్యే కోణాలేవి?
- (3) $\angle QTS$ కి సర్వసమానం అయ్యే కోణాలేవి?
- (4) $\angle TAS = 65^\circ$, అయిన $\angle TQS$, చాపము TS కొలతలను కనుగొనండి.

(5) $\angle AQP = 42^\circ$, $\angle SQR = 58^\circ$, అయిన $\angle ATS$ కొలతను కనుగొనండి.

14. పక్క పటంలో O కేంద్రంగాగల వృత్తములో రే.ఖం. PQ, రే.ఖం. RS లు సర్వసమాన జ్యాలు.

$m\angle POR = 70^\circ$, $m(\text{చాపము RS}) = 80^\circ$, అయిన -


- (1) $m(\text{చాపము PR})$ ఎంత?
- (2) $m(\text{చాపము QS})$ ఎంత?
- (3) $m(\text{చాపము QSR})$ ఎంత?



పటం 3.92

15. పటం 3.93 లో, $m(\text{చాపము WY}) = 44^\circ$, $m(\text{చాపము ZX}) = 68^\circ$, అయిన

- (1) $\angle ZTX$ కొలతను నిర్ణయించండి.
- (2) $WT = 4.8$, $TX = 8.0$, $YT = 6.4$ అయిన $TZ =$ ఎంత?
- (3) $WX = 25$, $YT = 8$, $YZ = 26$, అయిన $WT =$ ఎంత?.



పటం 3.93



16. పటం 3.94 లో,

(1) $m(\text{చాపము CE}) = 54^\circ$,


$m(\text{చాపము BD}) = 23^\circ$, అయిన $\angle \text{CAE} =$ ఎంత?

(2) $AB = 4.2$, $BC = 5.4$,

$AE = 12.0$ అయిన $AD =$ ఎంత?

(3) $AB = 3.6$, $AC = 9.0$,

$AD = 5.4$ అయిన $AE =$ ఎంత?



పటం 3.94

17. పక్క పటంలో జ్యా $EF \parallel$ జ్యా GH . అయిన జ్యా $EG \cong$ జ్యా FH అని నిరూపించండి.

కిందనివ్వబడిన నిరూపణలో ఖాళీలను పూరించి ఉపపత్తిని రాయండి.

ఉపపత్తి : రే.ఖం. GF గీసితిమి.


$\angle EFG = \angle FGH$ (I)

$\angle EFG =$ (అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతం) (II)


$\angle FGH =$ (అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతం) (III)

$\therefore m(\text{చాపము EG}) =$ [(I), (II), (III) అనుండి]

జ్యా $EG \cong$ జ్యా FH ()



పటం 3.95



పటం 3.96

18. పక్క పటంలో P బిందువు స్పర్శబిందువు.

(1) $m(\text{చాపము PR}) = 140$,

$\angle \text{POR} = 36^\circ$ అయిన


$m(\text{చాపము PQ}) =$ ఎంత?

(2) $OP = 7.2$, $OQ = 3.2$,

$OR =$ ఎంత? $QR =$ ఎంత?

(3) $OP = 7.2$, $OR = 16.2$, అయిన

$QR =$ ఎంత?




పటం 3.97

19. పక్క పటంలో C కేంద్రంగాగల వృత్తము D కేంద్రంగాగల వృత్తమును బిందువు E వద్ద అంతరంగా స్పృశిస్తుంది. D బిందువు అంతరంలోని వృత్తముపై గలదు. బాహ్యవృత్తం యొక్క జ్యా EB అంతర వృత్తమును బిందువు A వద్ద ఖండిస్తుంది.

అయిన రే.ఖం. $EA \cong$ రే.ఖం. AB అని నిరూపించండి.

20. పటం 3.98 లో O కేంద్రంగాగల వృత్తము యొక్క వ్యాసము రే.ఖం. AB . అంతర్లిఖిత కోణము ACB యొక్క సమద్విఖండన రేఖ వృత్తమును బిందువు D వద్ద ఖండిస్తుంది. అయిన రే.ఖం. AD $\cong$ రే.ఖం. BD అని చూపండి. కింద ఇవ్వబడిన ఉపపత్తిలోని ఖాళీలను పూరించి దానిని పూర్తి చేయండి.




పటం 3.98


ఉపపత్తి : రే.ఖం. OD గీసితిమి

- $\angle ACB = \square$ (అర్ధవృత్త అంతర్లిఖిత కోణము)
 $\angle DCB = \square$ (రే.ఖం. CD, $\angle C$ యొక్క సమద్విఖండనం.)
 $m(\text{చాపము DB}) = \square$ (అంతర్లిఖిత కోణ సిద్ధాంతం)
 $\angle DOB = \square$ (చాపము కొలతల నియమము) (I)
రే.ఖం. OA $\cong$ రే.ఖం. OB $\square$ (II)
 $\therefore$ రేఖ OD అనేది రే.ఖం. AB యొక్క $\square$ రేఖ (I), (II) ల నుండి
 $\therefore$ రే.ఖం. AD $\cong$ రే.ఖం. BD

21. పక్క పటంలో O కేంద్రంగాగల వృత్తము యొక్క జ్యా రే.ఖం. MN
MN = 25, ML = 9, $d(O, L) = 5$
అయ్యేట్లు జ్యా MN పై L బిందువు ఉన్నట్లయితే వృత్త వ్యాసార్థం ఎంత అవుతుంది?




పటం 3.99



పటం 3.100


- 22^{*}. పటం 3.100 లో రెండు వృత్తములు పరస్పరం S, R బిందువులలో ఖండించుకుంటాయి. వాటి యొక్క ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ PQ వాటిని P, Q లలో స్పృశించినట్లయితే
 $\angle PRQ + \angle PSQ = 180^\circ$ అని నిరూపించండి.



పటం 3.101


- 24*. రెండు వృత్తములు పరస్పరము A మరియు E బిందువులలో ఖండించుకుంటాయి. బిందువు E గుండా గీయబడిన వాటి ఉమ్మడి ఖండన రేఖ వృత్తములను B మరియు D బిందువులలో ఖండిస్తుంది B మరియు D బిందువుల గుండా గీయబడిన స్పర్శరేఖలు ఒకదానినొకటి C బిందువువద్ద ఖండించుకుంటాయి.

నిరూపించండి: $\square ABCD$ ఒక చక్రీయ చతుర్భుజము.



పటం 3.103

- 23*. పటం 3.101 లో, రెండు వృత్తములు ఒక దానినొకటి M, N లో ఖండించుకుంటాయి. M, N బిందువుల గుండా గీసిన వృత్త ఖండన రేఖలు బిందువులు R, S లలో, మరియు P, Q లలో ఖండిస్తాయి. అయిన రే.ఖం. $PR \parallel$ రే.ఖం. QS అని నిరూపించండి.



పటం 3.102

- 25*. ΔABC లో, రే.ఖం. $AD \perp$ భుజము BC , రే.ఖం. $BE \perp$ భుజము AC , రే.ఖం. $CF \perp$ భుజము AB . బిందువు O లంబరేఖల మిశ్రిత బిందువు. అయినచో బిందువు O, ΔDEF యొక్క అంతరంలో ఉంటుంది. అని నిరూపించండి.



ICT Tools or Links

జియోజిబ్రా సహాయముతో వివిధ వృత్తములను గీయండి.
వాటిలో జ్యా మరియు స్పర్శరేఖలను గీసి వాటి ధర్మములను పరీక్షించండి.





పదండి నేర్చుకుందాం

- సరూప త్రిభుజాలు నిర్మాణం
 - * రెండు సరూప త్రిభుజాలలో ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజము రెండవ త్రిభుజము యొక్క సదృశ భుజాల నిష్పత్తి ఇచ్చినచో రెండవ త్రిభుజమును నిర్మించుట.
 - (i) ఉమ్మడి శీర్షబిందువులు ఒకటి కూడా లేనపుడు.
 - (ii) ఒక శీర్షబిందువు ఉమ్మడిగా ఉన్నపుడు.
- వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖను గీయుట.
 - * వృత్తమునకు వృత్తముపై గల బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖను గీయుట.
 - (i) వృత్త కేంద్రమును ఉపయోగించి.
 - (ii) వృత్త కేంద్రమును ఉపయోగించకుండా.
 - * వృత్తమునకు బాహ్య బిందువునుండి స్పర్శరేఖలను గీయుట.



కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకుందాం

కింది తరగతులలో మనము కింది నిర్మాణాల గురించి నేర్చుకున్నాము. వానిని పునర్విమర్శించుకుందాం.

- ఇచ్చిన రేఖకు దాని బాహ్యబిందువునుండి సమాంతర రేఖను గీయుట.
- ఇచ్చిన రేఖాఖండమునకు లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీయుట.
- త్రిభుజము యొక్క భుజములు మరియు కోణములలో సరివడు ఘటకములను ఇచ్చినచో త్రిభుజమును నిర్మించుట.
- ఇచ్చిన రేఖాఖండమును ఇచ్చిన సంఖ్యననుసరించి సమాన భాగములుగా చేయుట.
- ఇచ్చిన రేఖాఖండమును దత్త నిష్పత్తిలో విభజించుట.
- ఇచ్చిన కోణమునకు సర్వసమాన కోణమును గీయుట.

తొమ్మిదవ తరగతిలో మీరు పాఠశాల పరిసరాల మానచిత్రమును తయారు చేయు కృత్యము చేసారు. ఏదేని భవనము నిర్మించుటకు ముందు ఆ భవనము యొక్క నమూనా చిత్రమును తయారు చేసుకుంటాం. పాఠశాల పరిసరాలు మరియు దాని మానచిత్రము, భవనము మరియు వాటి నమూనాచిత్రములు పరస్పరము సరూపములుగానే ఉంటాయి. భూగోళము, వాస్తుశాస్త్రము, యంత్రశాస్త్రము మొదలగు క్షేత్రాలలో సరూప పటములను గీయుట అవసరము ఉంటుంది. త్రిభుజము అనేది అన్నింటికంటే సాధారణ సంవృతపటం కావున ఇచ్చిన త్రిభుజము యొక్క సరూప త్రిభుజమును ఏవిధముగా గీయవచ్చునో, దానిని చూదాం.






తెలుసుకుందాం.

సరూప త్రిభుజాల నిర్మాణం

ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాలు ఇవ్వబడుతాయి, దానికి సరూపంగా ఉండే మరియు నిష్పత్తుల వరతులను పాటించే త్రిభుజమును నిర్మించుట.

రెండు సరూప త్రిభుజముల సదృశ భుజాలు ఒకే అనుపాతములో ఉంటాయి మరియు వాటి సదృశ కోణాలు సర్వసమానముగా ఉంటాయి. దీనిని ఉపయోగించి ఇచ్చిన త్రిభుజానికి సరూపముగల త్రిభుజమును గీయవచ్చును.

ఉదా. (1) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, ΔABC లో $AB = 5.4$ సెం.మీ., $BC = 4.2$ సెం.మీ., $AC = 6.0$ సెం.మీ..
 $AB: PQ = 3:2$ అయిన ΔABC మరియు ΔPQR లను గీయండి.



పటం 4.1

చిత్తు పటం

మొదట ఇచ్చిన కొలతలతో ΔABC ని గీయుము.

ΔABC మరియు ΔPQR లు సరూపాలు

$\therefore$ వాటి సదృశ భుజాలు ఒకే అనుపాతములో ఉంటాయి.


$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots (I)$$

AB, BC, AC ఈ భుజాల పొడవులు తెలుసుకొన్న పై సమీకరణములతో PQ, QR, PR ఈ భుజాల కొలతలను కనుగొనవచ్చును.

సమీకరణము [I] నుండి

$$\frac{5.4}{PQ} = \frac{4.2}{QR} = \frac{6.0}{PR} = \frac{3}{2}$$

$\therefore PQ = 3.6$ సెం.మీ., $QR = 2.8$ సెం.మీ. మరియు $PR = 4.0$ సెం.మీ.



పటం 4.2

ΔPQR యొక్క అన్ని భుజాల కొలతలు తెలిసిన వెంటనే మనము ఆ త్రిభుజము నిర్మాణము చేద్దాం.

అధిక వివరాలకై

కొనిసార్లు, ఇచ్చిన త్రిభుజానికి సరూపముగా ఉండే ఏ త్రిభుజమును నిర్మించవలెనో, దాని భుజములు స్కేలుతో కొలిచి గీసే విధముగా ఉండవు. ఇలాంటి సమయంతో ఇచ్చిన రేఖాఖండము యొక్క ‘దత్తా సంఖ్యకు సమాన భాగములుగా చేయుట’ ఈ వద్దతిని ఉపయోగించి త్రిభుజము యొక్క భుజాలను గీయవచ్చును.

ఉదాహరణకు... భుజం AB యొక్క పొడవు $\frac{11.6}{3}$ సెం.మీ. అయినచో 11.6 సెం.మీ. కొలతగల రేఖాఖండమును 3 సమాన భాగాలుగా చేసి AB రేఖాఖండమును గీయవచ్చును.

ఉదా. (1) లోని నిర్మాణములో గీయవలసిన త్రిభుజములో ఉమ్మడి శీర్షబిందువు లేదు. ఒక ఉమ్మడి శీర్షబిందువు ఉన్నచో త్రిభుజ నిర్మాణము కింది ఉదాహరణలో చూపిన విధముగా చేయుట సులువు అవుతుంది.

ఉదా.(2) ΔABC అను ఏదేని త్రిభుజమును గీయండి.

$AB : A'B = 5:3$ అయ్యేట్లు ΔABC కి

$\Delta A'BC'$ సరూపముగా గీయండి.

వివరణ : ఒకే రేఖపై B, A, A' లను అదేవిధంగా B, C, C' లను తీసుకుందాం.

$\Delta ABC \sim \Delta A'BC' \therefore \angle ABC = \angle A'BC'$


$$\frac{AB}{A'B} = \frac{BC}{BC'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{5}{3}$$

$\therefore \Delta ABC$ యొక్క భుజము $\Delta A'BC'$ లు సదృశ భుజాలకంటే పెద్దగా ఉంటాయి.

$\therefore$ రే.ఖం. BCను 5 సమాన భాగాలు చేసినచో వాటి నుండి మూడు భాగాలంత రే.ఖం. BC' యొక్క పొడవు ఉంటుంది.

ΔABC ని గీసి రే.ఖం. BC పై బిందువు B నుండి మూడు భాగాల దూరములో బిందువు C' ఉండవలెను.

బిందువు C' నుండి రే.ఖం. AC కి సమాంతరంగా గీసిన రేఖ, రే.ఖం. BA ని ఏ బిందువు వద్ద ఖండించునో, ఆ బిందువు A' అవుతుంది.




పటం 4.3

చిత్తు పటం

$$\frac{BA'}{BA} = \frac{BC'}{BC} = \frac{3}{5} \text{ అనగా, } \frac{BA}{BA'} = \frac{BC}{BC'} = \frac{5}{3} \dots\dots\dots \text{ విలోమ ప్రక్రియ ప్రకారం.}$$


నిర్మాణ క్రమము:

- (1) ΔABC అను ఏదేని త్రిభుజమును గీయండి.
- (2) రే.ఖం. BC ని ఐదు సమాన భాగాలుగా చేయండి.
- (3) B బిందువు నుండి మూడవ బిందువుకు C' అను పేరు పెట్టండి. $\therefore BC' = \frac{3}{5} BC$
- (4) ఇప్పుడు C' నుండి రే.ఖం. CA కి సమాంతర రేఖను గీయండి. అది రే.ఖం. AB ని ఎక్కడ ఖండించునో ఆ బిందువును A' అని పేరు పెట్టండి.
- (5) ΔABC కి సరూపముగా గల $\Delta A'BC'$ అనేది కావలసిన త్రిభుజం అవుతుంది.



పటం 4.4

సూచన : BC ని ఐదు సమాన భాగాలుగా చేయుచున్నప్పుడు, రేఖ BC యొక్క ఏవైనా A గలదో దానికి ఎదుటి వైపున B నుండి ఒక కిరణమును గీసి భాగాలుగా చేయుట సులభమవుతుంది. ఆ కిరణముపై $BT_1 = T_1T_2 = T_2T_3 = T_3T_4 = T_4T_5$ అను సమాన భాగాలను తీసుకోండి. T_5C ని కలుపుము. మరియు T_1, T_2, T_3, T_4 ల నుండి T_5C కి సమాంతర రేఖలను గీయండి.




పటం 4.5



ఆలోచిద్దాం.

సరూప త్రిభుజాలు గీయుటకు పక్క పటములో చూపిన విధముగా $\Delta A'BC'$ ని గీయవచ్చును. ఈ పటములో చూపిన విధముగానే $\Delta A'BC'$ గీయవలసినచో నిర్మాణ క్రమములో ఏ విధముగా మార్చవలెను?



పటం 4.6

ఉదా.(3) $AB : A'B = 5:7$ అయ్యేట్లు ΔABC కి సరూప త్రిభుజము $\Delta A'BC'$ ను గీయండి.

వివరణ : ఒకే రేఖపై B, A, A' బిందువులు అదేవిధంగా B, C, C' బిందువులను తీసుకుందాం.


$\Delta ABC \sim \Delta A'BC'$ మరియు $AB : A'B = 5:7$

$\therefore \Delta ABC$ యొక్క భుజాలు $\Delta A'BC'$ సదృశ భుజాలకంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి.

అదేవిధంగా $\angle ABC \cong \angle A'BC'$

వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని చిత్తు పటమును గీద్దాం.

$$\text{ఇప్పుడు } \frac{BC}{BC'} = \frac{5}{7}$$



పటం 4.7

చిత్తు పటం

$\therefore$ రే.ఖం. BC ని 5 సమాన భాగాలుగా చేసినచో దానిలోని ఒక భాగము యొక్క 7 రెట్లు BC' యొక్క పొడవు ఉంటుంది.


$\therefore \Delta ABC$ గీసి రే.ఖం. BC ని ఐదు సమాన భాగాలుగా చేద్దాం. బిందువు C' అనేది కిరణం BC పై B నుండి ఏడుభాగాల దూరంలో ఉంటుంది.

ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము ప్రకారం, బిందువు C' నుండి భుజము AC కి సమాంతర రేఖను గీసినచో అది కిరణము BA ను ఏ బిందువు వద్ద ఖండించునో, అది A' బిందువు అవుతుంది. రే.ఖం. A'C' గీసిన $\Delta A'BC'$ అనే కావాల్సిన త్రిభుజము లభిస్తుంది.

నిర్మాణ క్రమము:

- (1) ΔABC అను ఏదేని ఒక త్రిభుజమును గీద్దాం.
- (2) రే.ఖం. BC ను 5 సమాన భాగాలుగా చేయండి. రే.ఖం. BC యొక్క ఒక భాగము యొక్క ఏడు రెట్లు అయ్యేట్లు కిరణము BC పై బిందువు C' ని తీసుకుందాం.
- (3) రే.ఖం. AC కి C' నుండి సమాంతర రేఖను గీద్దాం. ఆ రేఖ కిరణము BA ని ఎక్కడ ఖండించునో ఆ బిందువును A' అను పేరు పెట్టండి.

$\Delta A'BC'$ అనేది ΔABC కి సరూపముగా గల కావలసిన త్రిభుజము అవుతుంది.



పటం 4.8

1. $\Delta ABC \sim \Delta LMN$, $AB = 5.5$ సెం.మీ., $BC = 6$ సెం.మీ., $CA = 4.5$ సెం.మీ. మరియు $\frac{BC}{MN} = \frac{5}{4}$ అయిన ΔABC ని మరియు ΔLMN లను గీయండి.
2. $\Delta PQR \sim \Delta LTR$, ΔPQR లో $PQ = 4.2$ సెం.మీ., $QR = 5.4$ సెం.మీ., $PR = 4.8$ సెం.మీ. మరియు $\frac{PQ}{LT} = \frac{3}{4}$ అయిన ΔPQR మరియు ΔLTR లను గీయండి.
3. $\Delta RST \sim \Delta XYZ$, ΔRST లో $RS = 4.5$ సెం.మీ., $\angle RST = 40^\circ$, $ST = 5.7$ సెం.మీ. మరియు $\frac{RS}{XY} = \frac{3}{5}$ అయిన ΔRST మరియు ΔXYZ లను గీయండి.
4. $\Delta AMT \sim \Delta AHE$, ΔAMT లో $AM = 6.3$ సెం.మీ., $\angle TAM = 50^\circ$, $AT = 5.6$ సెం.మీ. మరియు $\frac{AM}{AH} = \frac{7}{5}$ అయిన ΔAHE గీయండి.




తెలుసుకుందాం.

ఇచ్చిన వృత్తమునకు దానిపైగల బిందువు నుండి స్పర్శరేఖను గీయుట.

(i) వృత్త కేంద్రమును ఉపయోగించి.

వివరణ :



పటం 4.9


C కేంద్రముగల వృత్తముపై బిందువు P నుండి పోవు రేఖ l అనే స్పర్శరేఖను గీయవలెను అని అనుకుందాం.

వ్యాసార్థము యొక్క బయటి చివరి బిందువు వద్ద గీసిన లంబరేఖయే ఆ వృత్తమునకు స్పర్శరేఖ అవుతుంది అనే ధర్మమును ఉపయోగించుదాం. ఒక వేళ వ్యాసార్థం CP ని గీసినచో రేఖం. $CP \perp$ రేఖ l అనగా వ్యాసార్థం CP కి బిందువు P నుండి పోవు లంబరేఖ గీసినచో, అదే మనకు కావల్సిన స్పర్శరేఖ అవుతుంది.

రేఖపై ఇచ్చిన బిందువునుండి పోవు, ఆ రేఖకు లంబముగా వుండు రేఖ యొక్క నిర్మాణమును ఇక్కడ చేయవలెను. కావున వీటికొరకు కిరణం CP ని గీసి రేఖ l ని నిర్మించుదాం.

నిర్మాణ క్రమము :

- (1) C కేంద్రము గల ఒక వృత్తమును గీయండి, దానిపై P అను ఒక బిందువును తీసుకోండి.
- (2) కిరణము CP ని గీయండి.
- (3) బిందువు P నుండి కిరణము CX కు లంబ రేఖ l ను గీయండి. రేఖ l అనేది, P బిందువు నుండి పోయే వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ అవుతుంది.




పటం 4.10

ii) వృత్తకేంద్రమును ఉపయోగించకుండా వృత్తముపై ఇచ్చిన బిందువు నుండి స్పర్శరేఖను గీయుట.

ఉదాహరణ : ఏదేని వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తమును గీయండి. దానిపై C అనేది ఏదేని ఒక బిందువును తీసుకోండి. వృత్త కేంద్రమును ఉపయోగించకుండా, బిందువు C నుండి పోయే స్పర్శరేఖను గీయండి.

వివరణ :



పటం 4.11

పటములో చూపించిన విధంగా రేఖ l అనేది బిందువు C నుండి పోయే స్పర్శరేఖ అనుకోండి. రే.ఖం. CB అనే జ్యా మరియు $\angle CAB$ అనేది అంతర్లిఖిత కోణమును గీసాము. స్పర్శరేఖ ఖండనరేఖ కోణ సిద్ధాంతము ప్రకారము $\angle CAB \cong \angle BCD$. స్పర్శరేఖ-ఖండన రేఖ కోణ సిద్ధాంతము యొక్క వివర్యయము ప్రకారము.

ఒక $\angle CAB \cong \angle BCD$, అయిన రేఖ l అనేది వృత్తమునకు స్పర్శరేఖ అవుతుంది.


కావున రే.ఖం. CB కూడా వృత్తము యొక్క జ్యా మరియు $\angle CAB$ అనే అంతర్లిఖిత కోణమును గీయండి.

$\angle BCD \cong \angle BAC$ అయ్యేట్లు, $\angle BCD$ అనే కోణమును గీయండి.

రేఖ CD అనేది ఇచ్చిన వృత్తముపై గల బిందువు C నుండి పోయే స్పర్శరేఖ అవుతుంది.

నిర్మాణ క్రమము:

- (1) ఒక వృత్తమును గీయండి. వృత్తముపై C అనే ఏదేని ఒక బిందువును తీసుకోండి.
- (2) జ్యా CB మరియు అంతర్లిఖిత $\angle CAB$ లను గీయండి.
- (3) వృత్తలేఖినిలో యోగ్యమైన వ్యాసార్థమును తీసుకుని బిందువు A కేంద్రముగా తీసుకొని $\angle BAC$ యొక్క భుజములను బిందువు M మరియు N లలో ఖండించే చాపములను గీయండి.



పటం 4.12


- (4) అదే వ్యాసార్థము, C కేంద్రముగా తీసుకొని జ్యా CB ని ఖండించే చాపమును గీయండి. ఖండన బిందువుకు R అను పేరివ్వండి.
- (5) వృత్తలేఖినిలో MN కి సమానమైన వ్యాసార్థము తీసుకొని, R ను కేంద్రముగా తీసుకొని ముందు గీసిన చాపమును ఖండించు విధంగా ఇంకో ఒక చాపమును గీయండి. వాటి ఖండనబిందువుకు D అని పేరు ఇవ్వండి. రేఖ CD ని గీయండి. రే.ఖం. CD అనేది వృత్తమునకు స్పర్శరేఖ అవుతుంది.

(పై పటములో $\angle MAN \cong \angle BCD$ దీనికి గల కారణమును గుర్తుంచుకోండి. రే.ఖం. MN మరియు రే.ఖం.

RD లను కలవండి. భు.భు.భు నియమం ప్రకారం $\Delta MAN \cong \Delta RCD$. $\therefore \angle MAN \cong \angle BCD$)

ఇచ్చిన వృత్తమునకు బాహ్యబిందువు నుండి స్పర్శరేఖలను గీయుట.

వివరణ :



పటం 4.13


పటములో చూపించిన విధంగా O కేంద్రముగల వృత్తము యొక్క బాహ్యబిందువును P అని అనుకుందాం. బిందువు P నుండి గీయబడిన స్పర్శరేఖలు ఈ వృత్తమును బిందువు A మరియు బిందువు B ల వద్ద స్పృశిస్తాయి. బిందువు A మరియు బిందువు B లు వృత్తముపై స్థానాలను నిర్ణయించ బడినచో స్పర్శరేఖ PA మరియు స్పర్శరేఖ PB లను గీయవచ్చును. ఎందుకనగా వ్యాసార్థము OA మరియు OB లను గీసినచో వ్యాసార్థము $OA \perp$ రేఖ PA మరియు వ్యాసార్థం $OB \perp$ రేఖ PB.

ΔOAP మరియు ΔOBP లు లంబకోణ త్రిభుజాలు అయి, OP అనేది రెండింటి యొక్క కర్ణము అవుతుంది. రే.ఖం. OP వ్యాసముగా గల వృత్తమును గీసినచో O కేంద్రము గల వృత్తమును ఏ బిందువుల వద్ద ఖండించునచో అవి A మరియు B లు అవుతాయి. ఎందుకనగా అర్థవృత్తములోని అంతర్లిఖిత కోణము నిల్లస్పృడు లంబకోణము అవుతుంది.

నిర్మాణ క్రమము:

- (1) O కేంద్రముగల ఏదేని వ్యాసార్థంగాగల వృత్తమును గీయండి.
- (2) వృత్త బాహ్యభాగములో P అనే బిందువును తీసుకోండి.
- (3) రే.ఖం. OP ని గీయండి. రే.ఖం. OP యొక్క లంబసమద్విఖండనమును గీసి మధ్యబిందువు M ను గుర్తించండి.
- (4) కేంద్రము M మరియు OM వ్యాసార్థముగా తీసుకొని వృత్త చాపమును గీయండి.
- (5) ఈ వృత్తచాపము ఇచ్చిన వృత్తమును A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండించుతుంది.
- (6) రేఖ PA, రేఖ PB లను గీయండి.

రేఖ PA, రేఖ PB లు కావాల్సిన స్పర్శరేఖలు.



పటం 4.14



అభ్యాసమాలిక 4.2



1. P కేంద్రము, 3.2 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగాగల వృత్తముపై M బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖను గీయండి.
2. 2.7 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగల వృత్తమును గీయండి. ఈ వృత్తము పైగల బిందువునుండి స్పర్శరేఖను గీయండి.
3. 3.6 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగల వృత్తమును గీయండి. ఈ వృత్తముపై గల ఏదేని బిందువువద్ద వృత్తకేంద్రమును ఉపయోగించకుండా స్పర్శరేఖను గీయండి.
4. 3.3 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగల వృత్తమును గీయండి. దానిలో 6.6 సెం.మీ. పొడవుగల జ్యా PQ ను గీయండి. బిందువు P మరియు బిందువు Q ల నుండి స్పర్శరేఖలను గీయండి. స్పర్శరేఖలను పరిశీలించి మీ అభిప్రాయమును రాయండి.
5. 3.4 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగల వృత్తమును గీయండి. దానిలో 5.7 సెం.మీ. పొడవుగల జ్యా MN ను గీయండి. బిందువు M మరియు బిందువు N ల నుండి పోవు వృత్తమునకు స్పర్శరేఖలను గీయండి.





పదండి నేర్చుకుందాం


- మధ్య దూరమునకు సూత్రము
- విభజన సూత్రము
- రేఖ యొక్క వాలు



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

సంఖ్యరేఖపైనున్న ఏవేని రెండు బిందువుల మధ్య దూరమును కనుగొనుట మనకు తెలుసు.

P, Q మరియు R బిందువుల నిరూపకములు వరుసగా $-1, -5$ మరియు 4 గా కలవు అయిన రే.ఖం. PQ, రే.ఖం. QR ల పొడవులను కనుగొనుము.



పటం 5.1

బిందువు A మరియు B ల నిరూపకములు x_1 మరియు x_2 అయి $x_2 > x_1$ అయినచో

రేఖాఖండం AB యొక్క పొడవు $= d(A, B) = x_2 - x_1$

పటములో చూపిన విధముగా బిందువు P, Q మరియు R ల నిరూపకములు $-1, -5$ మరియు 4 గా కలవు.

$$\therefore d(P, Q) = (-1) - (-5) = -1 + 5 = 4$$

$$\text{మరియు } d(Q, R) = 4 - (-5) = 4 + 5 = 9$$

ఈ భావనను ఉపయోగించి మనము XY తలములలో, ఒకే అక్షముపైగల రెండు బిందువుల మధ్య దూరంను కనుగొందాం.




తెలుసుకుందాం.

(1) ఒకే అక్షముపై ఉన్న రెండు బిందువుల మధ్య దూరమును కనుగొనుట.

ఒకే అక్షముపై ఉన్న రెండు బిందువులు అనగా ఒకే సంఖ్యరేఖపై గల రెండు బిందువులు అవుతాయి. X అక్షముపై గల బిందువుల నిరూపకములు $(2, 0), (\frac{-5}{2}, 0), (8, 0)$ ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే Y అక్షములపైగల బిందు నిరూపకములు $(0, 1), (0, \frac{17}{2}), (0, -3)$ గా ఉంటాయి అని గుర్తించండి.

X అక్షము యొక్క ఋణ నిరూపకములను సూచించే భాగము కిరణము OX' మరియు Y అక్షము యొక్క ఋణ నిరూపకములను సూచించే భాగము కిరణము OY' లు అవుతాయి.


- i) X-అక్షము పైగల రెండు బిందువుల మధ్య దూరమును కనుగొనుట.



పటం 5.2

పై పటములో $A(x_1, 0)$ మరియు $B(x_2, 0)$ అను రెండు బిందువులు X- అక్షముపై, $x_2 > x_1$ అయ్యేట్లుగా కలవు.
 $\therefore d(A, B) = x_2 - x_1$


- ii) Y-అక్షముపైగల రెండు బిందువుల మధ్య దూరమును కనుగొనుట.



పటం 5.3

పై పటములో $P(0, y_1)$ మరియు $Q(0, y_2)$ అను రెండు బిందువులు Y- అక్షముపై, $y_2 > y_1$ అయ్యేట్లుగా కలవు.
 $\therefore d(P, Q) = y_2 - y_1$

- 2) రెండు బిందువులను కలుపు XY తలములోని రేఖాఖండము ఏదేని అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉన్నచో ఆ రెండు బిందువుల మధ్య దూరమును కనుగొనుట.



పటం 5.4

- i) పటములో రే.ఖం. AB అనేది X- అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉంది. కావున బిందువు A మరియు బిందువు B ల y నిరూపకములు సమానంగా ఉన్నాయి.


రే.ఖం. AL మరియు రే.ఖం. BM లను X-అక్షమునకు లంబముగా గీయండి.

$\therefore \square ABML$ ఒక దీర్ఘచతురస్రం అగును.

$\therefore AB = LM$

కాని, $LM = x_2 - x_1$

$\therefore d(A, B) = x_2 - x_1$



పటం 5.5

- ii) పటములో రే.ఖం. PQ అనేది Y- అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉంది. కావున బిందువు P మరియు బిందువు Q ల x నిరూపకములు సమానంగా ఉన్నాయి.

రే.ఖం. PR మరియు రే.ఖం. QS లను Y-అక్షమునకు లంబముగా గీయండి.

$\therefore \square PQSR$ ఒక దీర్ఘచతురస్రం అగును.

$\therefore PQ = RS$

కాని, $RS = y_2 - y_1$

$\therefore d(P, Q) = y_2 - y_1$



కృత్యము :

పటములో రే.ఖం. $AB \parallel Y$ -అక్షము మరియు
రే.ఖం. $CB \parallel X$ -అక్షము అయి A, C బిందు
నిరూపకములను ఇచ్చారు.

AC ని కనుగొనుటకు కింది ఖాళీలను పూరించండి.

ΔABC అనేది లంబకోణ త్రిభుజం.

పైథాగరస్ సిద్ధాంతము ప్రకారం

$$(AB)^2 + (BC)^2 = \boxed{}$$

AB, BC లను కనుగొనుట కొరకు బిందువు B యొక్క
నిరూపకములను కనుగొందాం.

$$CB \parallel X\text{-అక్షము} \therefore B \text{ యొక్క } y \text{ నిరూపకం} = \boxed{}$$


$$BA \parallel Y\text{-అక్షం} \therefore B \text{ యొక్క } x \text{ నిరూపకం} = \boxed{}$$

$$AB = \boxed{3} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$BC = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{4}$$

$$\therefore AC^2 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\therefore AC = \boxed{\sqrt{17}}$$




పటం 5.6



తెలుసుకుందాం.

మధ్య దూరమునకు సూత్రము (Distance formula)



పటం 5.7

పటము 5.7 లో, $A(x_1, y_1)$ మరియు $B(x_2, y_2)$ లు
XY తలములో ఏవేని రెండు బిందువులు.

బిందువు B నుండి X-అక్షముపై లంబముగా BP
గీయండి. అదే విధంగా బిందువు A నుండి రే.ఖం. BP పై
AD ని లంబముగా గీయండి.

రే.ఖం. BP అనేది Y-అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉంది.

$\therefore$ బిందువు D యొక్క x నిరూపకము x_2 .

రే.ఖం. AD అనేది X-అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉంది.

$\therefore$ బిందువు D యొక్క y నిరూపకము y_1

$$\therefore AD = d(A, D) = x_2 - x_1,$$

$$BD = d(B, D) = y_2 - y_1$$

$$\Delta ABD \text{ లంబకోణ త్రిభుజములో, } AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\therefore AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

దీనినే మధ్య దూరమునకు సూత్రము అని అంటారు.

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \text{ అని గుర్తుపెట్టుకోండి.}$$

వెనుక కృత్యములో మనము AB, BC ల పొడవులను కనుగొని పైథాగరస్ సిద్ధాంతమును ఉపయోగించి. రే.ఖం. AC ని కనుగొన్నాము. ఇప్పుడు మధ్య దూరము సూత్రమును ఉపయోగించి అదే రేఖాఖండం పొడవును కనుగొందాం.

A(2, 3) మరియు C(-2, 2) లు ఇవ్వబడినవి.

A(x₁, y₁) మరియు C(x₂, y₂) అనుకుందాం.

$$x_1 = 2, y_1 = 3, x_2 = -2, y_2 = 2$$


$$AC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (2 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 1}$$

$$= \sqrt{17}$$



రే.ఖం. AB || Y-అక్షము మరియు రే.ఖం. BC || X-అక్షము.

∴ బిందువు B యొక్క నిరూపకాలు (2, 2)

$$\therefore AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(2 - 2)^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{0 + 1} = 1$$

$$BC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 0} = 4$$

పటం 5.1 లోని P, Q బిందువుల మధ్యదూరం $(-1) - (-5) = 4$; అని కనుగొన్నాము. ఆ బిందువులు నిరూపక తలంలో $(-1, 0)$ మరియు $(-5, 0)$ గా ఉంటాయి. మధ్యదూరం యొక్క పై సూత్రాన్ని ఉపయోగించి P మరియు Q ల మధ్య దూరమును కనుగొనిన అంతే లభించునని సరిచూడండి.



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

- మూలబిందువు O యొక్క నిరూపకాలు (0, 0) గా ఉంటాయి. కావున P బిందువు యొక్క నిరూపకములు (x, y) గా ఉన్నచో $d(O, P) = \sqrt{x^2 + y^2}$ అని గుర్తుంచుకోండి.

- P(x₁, y₁), Q(x₂, y₂) అను రెండు బిందువులు XY తలములోనున్నచో

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{అనగా, } PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$$



ఉదా. (3) P(6, -6), Q(3, -7) మరియు R(3, 3) బిందువులు సరేఖీయాలు అవునా కాదా నిర్ణయించండి.

సాధన : PQ = $\sqrt{(6-3)^2 + (-6+7)^2}$ (మధ్య దూరమునకు సూత్రము ఆధారంగా)

$$= \sqrt{(3)^2 + (1)^2} = \sqrt{10} \text{ (I)}$$

$$QR = \sqrt{(3-3)^2 + (-7-3)^2}$$

$$= \sqrt{(0)^2 + (-10)^2} = \sqrt{100} \text{ (II)}$$

$$PR = \sqrt{(3-6)^2 + (3+6)^2}$$

$$= \sqrt{(3)^2 + (9)^2} = \sqrt{90} \text{ (III)}$$

(I), (II) మరియు (III) లనుండి $\sqrt{10}$, $\sqrt{100}$ మరియు $\sqrt{90}$ వీటిలో $\sqrt{100}$ అనేది అన్నింటికంటే

పెద్ద సంఖ్య.

$(\sqrt{100})$ మరియు $(\sqrt{10} + \sqrt{90})$ ఈ సంఖ్యలు సమానంగా ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం.

దీనికొరకు $(\sqrt{100})^2$ మరియు $(\sqrt{10} + \sqrt{90})^2$ లను పోల్చండి.

దీనినుండి $(\sqrt{10} + \sqrt{90}) > (\sqrt{100})$ అని మీరు గమనిస్తారు. $\therefore PQ + PR \neq QR$

$\therefore P(6, -6), Q(3, -7)$ మరియు $R(3, 3)$ బిందువులు సరేఖీయాలు కావు.

ఉదా. (4) (1, 7), (4, 2), (-1, -1) మరియు (-4, 4) బిందువులు చతురస్ర శీర్షములు అని చూపుము.

సాధన : ఎప్పుడైతే చతురస్రము యొక్క అన్ని భుజములు పొడవులు మరియు కర్ణముల పొడవులు సమానముగా నున్నచో అప్పుడు అది చతురస్రము అవుతుంది. $\therefore$ అన్ని భుజాల పొడవులు మరియు కర్ణముల పొడవులను మధ్య దూరము సూత్రమును ఉపయోగించి కనుగొందాం.

A(1, 7), B(4, 2), C(-1, -1) మరియు D(-4, 4) అని ఇవ్వబడ్డాయి అనుకుందాం.

$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{(4+1)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$


$$CD = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$DA = \sqrt{(1+4)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$AC = \sqrt{(1+1)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{4+64} = \sqrt{68}$$

$$BD = \sqrt{(4+4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$$

$\therefore AB = BC = CD = DA$ మరియు $AC = BD$



పటం 5.9

$\therefore (1,7), (4,2), (-1,-1)$ మరియు $(-4,4)$ ఈ శీర్షబిందువులనుండి ఏర్పడిన చతుర్భుజము చతురస్రము అవుతుంది.


సాధన : బిందువు $P(0, y)$ బిందువు M, N ల నుండి సమానదూరంలో Y -అక్షముపై ఉన్నదనుకొందాం.

$$\begin{aligned} \therefore PM &= PN & \therefore PM^2 &= PN^2 \\ \therefore [0 - (-5)]^2 + [y - (-2)]^2 &= (0 - 3)^2 + (y - 2)^2 \\ \therefore 25 + (y + 2)^2 &= 9 + y^2 - 4y + 4 \\ \therefore 25 + y^2 + 4y + 4 &= 13 + y^2 - 4y \\ \therefore 8y &= -16 & \therefore y &= -2 \end{aligned}$$

ఉదా. (6) $A(-3, -4)$, $B(-5, 0)$, $C(3, 0)$ లు ΔABC యొక్క శీర్షబిందువులు. ΔABC యొక్క పరికేంద్రము యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.

సాధన : $P(a, b)$ అనేది ΔABC యొక్క పరికేంద్ర బిందువు అనుకుందాం. $\therefore$ బిందువు P అనేది A, B, C నుండి సమానదూరములో ఉంటుంది.

$$\begin{aligned} \therefore PA^2 &= PB^2 = PC^2 \dots\dots\dots (I) & \therefore PA^2 &= PB^2 \\ (a+3)^2 + (b+4)^2 &= (a+5)^2 + (b-0)^2 \\ \therefore a^2 + 6a + 9 + b^2 + 8b + 16 &= a^2 + 10a + 25 + b^2 \quad \text{B} \\ \therefore -4a + 8b &= 0 \quad (-5,0) \\ \therefore a - 2b &= 0 \dots\dots\dots (II) \\ \text{అదే విధంగా } PA^2 &= PC^2 \dots\dots\dots (I) \text{ నుండి} \\ \therefore (a+3)^2 + (b+4)^2 &= (a-3)^2 + (b-0)^2 \\ \therefore a^2 + 6a + 9 + b^2 + 8b + 16 &= a^2 - 6a + 9 + b^2 \\ \therefore 12a + 8b &= -16 \\ \therefore 3a + 2b &= -4 \dots\dots\dots (III) \end{aligned}$$



పటం 5.10

సమీకరణము (II) మరియు (III) లను సాధించగా $a = -1$, $b = -\frac{1}{2}$
 $\therefore$ పరికేంద్రము యొక్క నిరూపకములు $(-1, -\frac{1}{2})$.

5. $P(2, -2)$, $Q(7, 3)$, $R(11, -1)$ మరియు $S(6, -6)$ లు శీర్షబిందువులు గల చతుర్భుజము సమాంతర చతుర్భుజం అని చూపండి.
6. $A(-4, -7)$, $B(-1, 2)$, $C(8, 5)$ మరియు $D(5, -4)$ లు ABCD అను సమబాహుచతుర్భుజము (రాంబస్) యొక్క శీర్షబిందువులు అని చూపండి.
7. ఒకవేళ బిందువు $L(x, 7)$ మరియు $M(1, 15)$ ల మధ్య దూరము 10 అయినచో x విలువను కనుగొనండి.
8. $A(1, 2)$, $B(1, 6)$, $C(1 + 2\sqrt{3}, 4)$ సమబాహు త్రిభుజము యొక్క శీర్షబిందువులు అని చూపండి.




కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

మూడు సమాంతర రేఖల అంతరఖండముల ధర్మం :

పటములో రేఖ $l \parallel$ రేఖ $m \parallel$ రేఖ n ,

రేఖ p మరియు q లు తిర్యగ్రేఖలు

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$



పటం 5.11



తెలుసుకుందాం.

రేఖాఖండ విభజన (Division of a line segment)



పటం 5.12

పటములో, $AP = 6$ మరియు $PB = 10$.

$$\therefore \frac{AP}{PB} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

దీనినే వేరే పదాలలో 'బిందువు P రే.ఖం. AB ని 3:5 నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుంది' అని అంటారు. ఎప్పుడైతే ఏదేని రేఖాఖండముపై బిందువు అదే రేఖాఖండమును ఇచ్చిన నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుందో అప్పుడు ఆ విభజన చేయు బిందువు యొక్క నిరూపకములను ఎలా కనుగొంటారో చూద్దాం.





తెలుసుకుందాం.

విభజన సూత్రము (Section formula)

పటము 5.13 లో, XY తలములో రే.ఖం. AB పై గల బిందువు P, రే.ఖం. AB ను $m : n$ నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుంది

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ మరియు $P(x, y)$ అనుకుందాం.


రే.ఖం. AC, రే.ఖం. PQ మరియు రే.ఖం. BD లనుండి

X-అక్షమునకు లంబరేఖా ఖండమును గీయండి.

$$\therefore C(x_1, 0); Q(x, 0)$$

మరియు $D(x_2, 0)$.

$$\therefore \left. \begin{array}{l} CQ = x - x_1 \\ \text{మరియు } QD = x_2 - x \end{array} \right\} \dots\dots\dots (I)$$



పటం 5.13

ఇదేవిధంగా రే.ఖం. AC || రే.ఖం. PQ || రే.ఖం. BD.

$$\therefore \text{మూడు సమాంతర రేఖల అంతరఖండాల ధర్మము ప్రకారం, } \frac{AP}{PB} = \frac{CQ}{QD} = \frac{m}{n}$$

ఇప్పుడు $CQ = x - x_1$ మరియు $QD = x_2 - x \dots\dots\dots (I)$ నుండి

$$\therefore \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{m}{n}$$

$$\therefore n(x - x_1) = m(x_2 - x)$$

$$\therefore nx - nx_1 = mx_2 - mx$$

$$\therefore mx + nx = mx_2 + nx_1$$

$$\therefore x(m + n) = mx_2 + nx_1$$

$$\therefore x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

ఇదే విధంగా బిందువు A, P మరియు B ల నుండి Y- అక్షమునకు లంబరేఖలను గీసి పై విధముగా కృత్యము చేసినచో మనకు $y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$ లభిస్తుంది.


$\therefore$ బిందువు $A(x_1, y_1)$ మరియు $B(x_2, y_2)$ లను కలిపే రే.ఖం. AB ను $m : n$ నిష్పత్తిలో అంతరవిభజన

$$\text{చేసే బిందువు యొక్క నిరూపకములు } \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right).$$

రేఖాఖండము యొక్క మధ్యబిందువు సూత్రము (Mid-point formula)

$A(x_1, y_1)$ మరియు $B(x_2, y_2)$ రెండు బిందువులు అయి బిందువు $P(x, y)$ రే.ఖం. AB యొక్క మధ్యబిందువు అయినచో

$m = n$ అయినప్పుడు విభజన సూత్రము ప్రకారము,
 x మరియు y యొక్క విలువలనురాద్దాం.



$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

$$= \frac{mx_2 + mx_1}{m + m} \quad \because m = n$$

$$= \frac{m(x_1 + x_2)}{2m}$$

$$= \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$$

$$= \frac{my_2 + my_1}{m + m} \quad \because m = n$$

$$= \frac{m(y_1 + y_2)}{2m}$$

$$= \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$\therefore P$ అను మధ్య బిందువు యొక్క నిరూపకములు $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ దీనినే మధ్యబిందువు సూత్రము

అని అంటారు. కింది తరగతిలో మనము రెండు చరరాశులుగల సంఖ్య a మరియు b సంఖ్యారేఖపై చూపించి, వాటిని కలిపే రేఖాఖండము యొక్క మధ్యబిందువు $\frac{a+b}{2}$ ఉంటుంది అని చూపాము. ఆ వివరణే ఇప్పుడు వచ్చిన సూత్రము యొక్క మరొక విధానము అని గుర్తుంచుకోండి.

సాధించిన ఉదాహరణలు

ఉదా.(1) ఒకవేళ $A(3,5)$ $B(7,9)$ మరియు బిందువు Q రే.ఖం. AB ని 2:3 నిష్పత్తిలో అంతర విభజన చేసినచో Q బిందువు యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.

సాధన : ఇచ్చిన ఉదాహరణలో $(x_1, y_1) = (3, 5)$
 మరియు $(x_2, y_2) = (7, 9)$ అనుకుందాం.
 అదేవిధంగా, $m : n = 2:3$
 రేఖాఖండ అంతర విభజన సూత్రము ప్రకారం,


$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n} = \frac{2 \times 7 + 3 \times 3}{2 + 3} = \frac{23}{5}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n} = \frac{2 \times 9 + 3 \times 5}{2 + 3} = \frac{33}{5}$$

$\therefore$ బిందువు Q యొక్క నిరూపకములు $\left(\frac{23}{5}, \frac{33}{5} \right)$

ఉదా.(2) $A(-4,2)$ $B(6,2)$ ఈ రేఖాఖండము యొక్క మధ్య బిందువు P అయినచో P బిందువు నిరూపకములను కనుగొనండి.

సాధన :



పటం 5.15

$(-4, 2) = (x_1, y_1)$; $(6, 2) = (x_2, y_2)$ మరియు బిందువు P యొక్క నిరూపకములు (x, y) అనుకుందాం.

∴ మధ్య బిందువు సూత్రము ప్రకారం,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4 + 6}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

∴ మధ్యబిందువు P యొక్క నిరూపకములు $(1, 2)$ లభిస్తాయి.



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

త్రిభుజములోని మధ్యగత రేఖలు మిశితాలు అని మనకు తెలుసు.
మిశితబిందువు (centroid) మధ్యగత రేఖను 2:1 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది.




తెలుసుకుందాం.

గురుత్వ కేంద్ర సూత్రం (Centroid formula)

త్రిభుజము యొక్క మూడు శీర్షబిందువుల నిరూపకములు ఇచ్చిన విభజన సూత్రమును ఉపయోగించి గురుత్వ కేంద్రము యొక్క నిరూపకములను ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చునో మనము చూద్దాం.

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ అనేవి ΔABC యొక్క శీర్షబిందువులు అనుకుందాం మరియు రే.ఖం. AD అనేది ΔABC యొక్క మధ్యగత రేఖ. బిందువు $G(x, y)$ అనేది ఆ త్రిభుజము యొక్క మధ్యగత రేఖల మిశిత బిందువు అనుకోండి.
రే.ఖం. BC యొక్క మధ్యబిందువు D అగును.



పటం 5.16

$\therefore$ బిందువు D యొక్క నిరూపకములు $x = \frac{x_2 + x_3}{2}$, $y = \frac{y_2 + y_3}{2}$ రేఖాఖండము యొక్క
 మధ్యబిందువు సూత్రము ప్రకారం

ΔABC సురుత్వకేంద్రం $G(x, y) \therefore AG : GD = 2 : 1$

∴ రేఖాఖండము యొక్క విభజన సూత్రము ప్రకారం

$$X = \frac{2\left(\frac{x_2 + x_3}{2}\right) + 1 \times x_1}{2 + 1} = \frac{x_2 + x_3 + x_1}{3} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y = \frac{2\left(\frac{y_2 + y_3}{2}\right) + 1 \times y_1}{2 + 1} = \frac{y_2 + y_3 + y_1}{3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

అనగా, శీర్షబిందువులు $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ గల త్రిభుజము యొక్క గురుత్వకేంద్రము యొక్క

నిరూపకములు $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$.

దీనినే గురుత్వకేంద్ర సూత్రము అంటారు.



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.

- విభజన సూత్రం

(x_1, y_1) మరియు (x_2, y_2) రెండు భిన్నబిందువులను కలిపే రేఖాఖండమును $m : n$ నిష్పత్తిలో నిభజన చేయు

బిందు నిరూపకములు $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$.

- మధ్యబిందువు సూత్రం

(x_1, y_1) మరియు (x_2, y_2) రెండు భిన్నబిందువులను కలిపే రేఖాఖండము యొక్క మధ్య బిందు

నిరూపకములు $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$.

- గురుత్వకేంద్ర బిందువు సూత్రం

$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ మరియు (x_3, y_3) అనేవి త్రిభుజము యొక్క నిరూపకాలు అయినచో గురుత్వకేంద్ర

బిందువు యొక్క నిరూపకాలు $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$.

ఉదా. (1) A(-7,4) మరియు B(-6,-5) అయిన బిందువు T అనేది రే.ఖం. AB ని 7:2 నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుంది, అయిన బిందువు T నిరూపకములను కనుగొనండి.

సాధన : T యొక్క నిరూపకములను (x, y) అనుకుందాం.


∴ రేఖా ఖండము యొక్క విభజన సూత్రం ప్రకారం

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n} = \frac{7 \times (-6) + 2 \times (-7)}{7+2}$$

$$= \frac{-42-14}{9} = \frac{-56}{9}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n} = \frac{7 \times (-5) + 2 \times (4)}{7+2}$$

$$= \frac{-35+8}{9} = \frac{-27}{9} = -3$$



పటం 5.17

∴ T బిందువు యొక్క నిరూపకములు $\left(\frac{-56}{9}, -3\right)$.

ఉదా. (2) బిందువు P(-4, 6) అనేది A(-6, 10) మరియు B(r, s) బిందువులను కలిపే రేఖాఖండమును 2:1 నిష్పత్తిలో విభజించును, అయిన బిందువు B యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.

సాధన : రేఖాఖండము విభజనసూత్రము ప్రకారం

$$-4 = \frac{2 \times r + 1 \times (-6)}{2 + 1}$$

$$\therefore -4 = \frac{2r - 6}{3}$$

$$\therefore -12 = 2r - 6$$

$$\therefore 2r = -6$$

$$\therefore r = -3$$

$$6 = \frac{2 \times s + 1 \times 10}{2 + 1}$$

$$\therefore 6 = \frac{2s + 10}{3}$$

$$\therefore 18 = 2s + 10$$

$$\therefore 2s = 8$$

$$\therefore s = 4$$

∴ బిందువు B యొక్క నిరూపకములు (-3, 4).

ఉదా. (3) A(15,5), B(9,20) మరియు A-P-B. అయిన బిందువు P(11,15) రే.ఖం. AB ని ఏ నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుందో కనుగొనండి.

సాధన : బిందువు P(11,15) రే.ఖం. AB ని m : n నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుంది, అని అనుకుందాం.

∴ విభజన సూత్రము ప్రకారం,

$\therefore$ విభజన నిష్పత్తి $2 : 1$.

అధిక వివరాలకై :


A మరియు B బిందువులను కలిపే రేఖాఖండము యొక్క బాహ్య విభజన ఏ విధంగా ఉండునో చూడാം.

$A(-4, 6), B(5, 10)$ అనే బిందువులు గల AB రేఖాఖండమును 3:1 నిష్పత్తిలో బాహ్యవిభజన చేయు బిందువు P యొక్క నిరూపకములను ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చునో అది చూద్దాం.

$\frac{AP}{PB} = \frac{3}{1}$ అనగా AP, PB కంటే పెద్దది అయిన A-B-P అవుతుంది.

$\frac{AP}{PB} = \frac{3}{1}$ అనగా $AP = 3k, BP = k$, అయినచో $AB = 2k$

$$\therefore \frac{AB}{BP} = \frac{3}{2}$$



ఇప్పుడు బిందువు B రేఖాఖండము AP ని 2 : 1 నిష్పత్తి లో విభజన చేస్తుంది.

A మరియు B ల నిరూపకములు ఇచ్చినచో P యొక్క నిరూపకములను కనుగొనుట గురించి నేర్చుకున్నాం.



అభ్యాసమాలిక 5.2



- ఒకవేళ బిందువు $A(-1, 7)$ మరియు $B(4, -3)$ లను కలుపు రే.ఖం.ను బిందువు P, 2 : 3 నిష్పత్తిలో విభజన చేసినచో P నిరూపకములను కనుగొనండి.
- కింది ప్రతీ ఉదాహరణలో రే.ఖం. PQ ని $a : b$ నిష్పత్తిలో విభజన చేయు బిందువు A నిరూపకములను కనుగొనండి.
 - (1) $P(-3, 7), Q(1, -4), a : b = 2 : 1$
 - (2) $P(-2, -5), Q(4, 3), a : b = 3 : 4$
 - (3) $P(2, 6), Q(-4, 1), a : b = 1 : 2$
- P-T-Q అయి బిందువు $P(-3, 10)$ మరియు బిందువు $Q(6, -8)$ లను కలిపే రేఖాఖండమును బిందువు $T(-1, 6)$ ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది?
- రే.ఖం. AB వృత్తము యొక్క వ్యాసం మరియు P కేంద్రము $A(2, -3)$ మరియు $P(-2, 0)$ ఉండగా B బిందువు యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.
- బిందువు $A(8, 9)$ మరియు $B(1, 2)$ లను కలిపే రే.ఖం. AB ను $P(k, 7)$ బిందువు ఏ నిష్పత్తిలో విభజన చేస్తుందో దానిని కనుగొనండి మరియు k యొక్క విలువ కనుగొనండి.
- $(22, 20)$ మరియు $(0, 16)$ లను కలిపే రేఖాఖండం యొక్క మధ్యబిందు నిరూపకములను కనుగొనండి.
- కింది త్రిభుజముల యొక్క శీర్షబిందువులు ఇవ్వబడినవి. ప్రతీ త్రిభుజము యొక్క గురుత్వకేంద్ర నిరూపకములను కనుగొనండి.
 - (1) $(-7, 6), (2, -2), (8, 5)$
 - (2) $(3, -5), (4, 3), (11, -4)$
 - (3) $(4, 7), (8, 4), (7, 11)$



8. ΔABC యొక్క మధ్యగత రేఖల మిళిత బిందువు G. A, B మరియు G ల యొక్క నిరూపకాలు వరుసగా $(-14, -19)$, $(3, 5)$ మరియు $(-4, -7)$ అయినచో C బిందువు యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.
9. గురుత్వ కేంద్రం G $(1, 5)$ గా గల త్రిభుజము యొక్క శీర్షబిందువులు A $(h, -6)$, B $(2, 3)$ మరియు C $(-6, k)$ అయిన h మరియు k విలువలను కనుగొనండి.
10. బిందువులు A $(2, 7)$ మరియు B $(-4, -8)$ లను కలిపే రేఖం. AB త్రివిభజన చేయు బిందువుల నిరూపకములను కనుగొనండి.
11. A $(-14, -10)$, B $(6, -2)$ గల రేఖం. AB ను నాలుగు సమాన రేఖాఖండాలుగా చేయ బిందువుల నిరూపకములను కనుగొనండి.
12. A $(20, 10)$, B $(0, 20)$ గల రేఖం. AB ని ఐదు సమాన రేఖాఖండాలుగా విభజన చేయు బిందువుల నిరూపకములను కనుగొనండి.




తెలుసుకుందాం.

రేఖ యొక్క వాలు (Slope of a line)


మనం సమతల నేలపై నడుస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ శ్రమపడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఏటవాలు తలంగల నేలపై నడుతున్నప్పుడు కొంచెం శ్రమ పడవలసిస్తుంది. మనిషికి కొంచెం దమ్ము కూడా వస్తుంది. ఏటవాలు ఎత్తుగా ఉన్న దారిపై వెళ్ళేటప్పుడు గురుత్వకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకదిశలో పని చేయవలసి ఉంటుంది అని మనము విజ్ఞానములో చూసాం.

నిరూపక రేఖాగణితములో రేఖ యొక్క వాలు అనేది ఒక ముఖ్యమైన భావన. కింద ఇచ్చిన కృత్యము నుండి ఈ భావనను నేర్చుకొందాం.



కృత్యము I :

పక్క పటములో A $(-2, -5)$,
B $(0, -2)$, C $(2, 1)$, D $(4, 4)$,
E $(6, 7)$ అనేవి రేఖ l పై గల బిందువులు.
ఈ నిరూపకములను ఉపయోగించి
తయారుచేసిన కింది పట్టికను
పరిశీలించండి.




పటం 5.20

కృత్యము II: పటములో రేఖ l , t మరియు n మరియు

వాటిపై కొన్ని బిందువులు ఇవ్వబడ్డాయి. వాటి ఆధారంగా రేఖల వాలులను కనుగొనండి.

- (1) రేఖ l మరియు రేఖ t ల వాలు ధన్యాత్మకం.
- (2) రేఖ n వాలు ఋణాత్మకం.
- (3) రేఖ t వాలు, రేఖ l వాలు కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
- (4) X - అక్షమునకు ధనదిశలో అల్ప కోణమును ఏర్పరిచే l మరియు t రేఖల వాలులు ధనాత్మకం.



పటం 5.21

- (5) X - అక్షము ధనదిశలో అధిక కోణమును ఏర్పరిచే n రేఖల వాలులు ఋణాత్మకం. అని మనకు తెలుస్తుంది.

X -అక్షము, Y -అక్షం మరియు అక్షములకు సమాంతర రేఖల వాలు

పటము 5.21 లో, $(x_1, 0)$ మరియు $(x_2, 0)$

లు X - అక్షముపై రెండు బిందువులు.

$$X\text{- అక్షము వాలు} = \frac{0 - 0}{x_2 - x_1} = 0$$

అదే విధంగా $(0, y_1)$ మరియు $(0, y_2)$ లు


Y - అక్షముపై రెండు బిందువులు.

$$Y\text{- అక్షము వాలు} = \frac{y_2 - y_1}{0 - 0} = \frac{y_2 - y_1}{0},$$

కాని 0 చే భాగించలేము కావు Y - అక్షము వాలును నిర్ణయించలేము.

ఇదేవిధంగా రేఖ m లాగానే X - అక్షమునకు సమాంతరంగా ఉన్న ఏదేని

రేఖ వాలును కనుగొని చూడండి. దాని విలువ శూన్యము (సున్న) వచ్చును. ఇదేవిధంగా, రేఖ l లాగానే Y - అక్షమునకు సమాంతరముగా ఉన్న ఏదేని రేఖ వాలును నిర్ణయించలేము, అని చూడవచ్చును.



పటం 5.22

రేఖ యొక్క వాలు - త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులను ఉపయోగించి.

పటము 5.23 లో, $P(x_1, y_1)$ మరియు $Q(x_2, y_2)$ లు రేఖ l పై గల రెండు బిందువులు.

రేఖ l X అక్షమును T బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది.

రే.ఖం. $QS \perp X$ - అక్షం, రే.ఖం. $PR \perp$ రే.ఖం. $QS \therefore$ రే.ఖం. $PR \parallel$ రే.ఖం. $TS \dots$ సదృశ త్రికోణాల నియమము

$$\therefore QR = y_2 - y_1 \text{ మరియు } PR = x_2 - x_1$$

$$\therefore \frac{QR}{PR} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \dots\dots\dots (I)$$

రేఖ TQ, X- అక్షములో θ కోణము చేయును

$$\therefore \frac{QR}{PR} = \tan\theta \dots\dots\dots (II)$$


$$\therefore (I) \text{ మరియు } (II) \text{ అనుండి, } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan\theta$$

$$\therefore m = \tan\theta$$

ఇప్పుడు రే.ఖం. PR || రే.ఖం. TS, రేఖ l తిర్యగ్రేఖ

$$\therefore \angle QPR = \angle QTS \dots\dots\dots \text{సదృశ కోణములు}$$

దీనినుండి, రేఖ X-అక్షమును ధన దిశవైపు చేసిన కోణము యొక్క ట్యాన్ నిష్పత్తి అనగా ఆ రేఖ యొక్క ఏటవాలు తనము అవుతుంది అని అర్థం.



పటం 5.23

నిష్పత్తిలే రెండు రేఖల వాలులు సమానంగా ఉంటాయో ఆ రేఖలు X- అక్షమును ధనదిశలో సమాన కోణములను ఏర్పరుస్తాయి.

$\therefore$ ఆ రెండు రేఖలు సమాంతరముగా ఉంటాయి.

సమాంతర రేఖల వాలు (Slope of parallel lines)


కృత్యము :

పటం 5.24 లో రేఖ l మరియు రేఖ t లు X- అక్షముతో ధనదిశలో ఏర్పచిన కోణము θ .

$\therefore$ రేఖ l || రేఖ t సదృశకోణాల నియమం.

రేఖ l పై బిందువు A(-3, 0) మరియు బిందువు B(0, 3) లను గమనించండి. రేఖ AB యొక్క వాలును కనుగొనండి.

$$\begin{aligned} \text{రేఖ AB యొక్క వాలు} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{\boxed{} - \boxed{}}{\boxed{} - \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$



పటం 5.24

ఇదేవిధంగా రేఖ t పై గల యొగ్యమైన బిందువులను తీసుకొని దాని వాలును కనుగొనండి.

దీనినుండి సమాంతర రేఖల వాలులు సమానంగా ఉంటాయని మీరు గమనించగలరు.

వాలు, $m = \tan\theta$ దీనిని ఉపయోగించి కూడా రెండు సమాంతర రేఖల వాలులు సమానంగా ఉంటాయని సరిచూడండి.
ఇదేవిధంగా $\theta = 30^\circ$, $\theta = 60^\circ$ తీసుకొని సమాంతర రేఖల వాలులు సమానంగా ఉంటాయని సరిచూడండి.



X- అక్షము యొక్క లేదా X- అక్షమునకు సమాంతరరేఖల వాలులు శూన్యముగా (నున్న) ఉంటాయి.
Y- అక్షము యొక్క లేదా Y- అక్షమునకు సమాంతర రేఖల వాలులను నిర్వచించలేము.

ఉదా. (1) A (-3, 5), మరియు B (4, -1) బిందువుల గుండా పోవు రేఖ యొక్క వాలును కనుగొనండి.

$$\therefore \text{రేఖ AB యొక్క వాలు} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1-5}{4-(-3)} = \frac{-6}{7}$$

సాధన : $P(-2, 3)$, $Q(1, 2)$ మరియు $R(4, 1)$ ఇవి దత్త బిందువులు.

$$\text{రేఖ QR యొక్క వాలు} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1-2}{4-1} = -\frac{1}{3}$$

కాని బిందువు Q రెండు రేఖలపై గలదు.

ఉదా. (3) ఒకవేళ $P(k, 0)$ మరియు $Q(-3, -2)$, ఈ రెండు బిందువులను కలిపే రేఖవాలు $\frac{2}{7}$ అయినచో k విలువను కనుగొనండి.

రేఖ PQ యొక్క వాలు $\frac{2}{7}$ అని ఇవ్వబడింది.

$$\therefore \frac{-2}{-3-k} = \frac{2}{7} \quad \therefore k = 4$$

9. ఒకవేళ $P(-12, -3)$ మరియు $Q(4, k)$ ఈ బిందువుల గుండా పోయే రేఖ యొక్క వాలు $\frac{1}{2}$ అయినచో k విలువను కనుగొనండి.
10. $A(4, 8)$, $B(5, 5)$ ఈ బిందువులను కలిపే రేఖ, $C(2, 4)$, $D(1, 7)$ ఈ బిందువులను కలిపే రేఖకు సమాంతరముగా ఉంటుంది అని చూపండి.
11. $P(1, -2)$, $Q(5, 2)$, $R(3, -1)$ మరియు $S(-1, -5)$ లు సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క శీర్షబిందువులు అని చూపండి.
12. ఒకవేళ $P(2, 1)$, $Q(-1, 3)$, $R(-5, -3)$ మరియు $S(-2, -5)$ అయినచో $\square PQRS$ దీర్ఘచతురస్రము అని చూపండి.
13. $A(-1, 1)$, $B(5, -3)$ మరియు $C(3, 5)$ శీర్షబిందువులు గల త్రిభుజము యొక్క మధ్యగతరేఖల పొడవులను కనుగొనండి.
- 14*. ఒకవేళ $D(-7, 6)$, $E(8, 5)$ మరియు $F(2, -2)$ అనేవి త్రిభుజము యొక్క భుజముల మధ్యబిందువులు అయినచో వాటి గురుత్వ కేంద్రము యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.
15. $A(4, -1)$, $B(6, 0)$, $C(7, -2)$ మరియు $D(5, -3)$ చతురస్రము యొక్క శీర్షబిందువులు అని చూపండి.
16. $A(7, 1)$, $B(3, 5)$ మరియు $C(2, 0)$ శీర్షబిందువులుగల త్రిభుజము యొక్క పరివృత్త కేంద్రము యొక్క నిరూపకములు మరియు పరివృత్తము యొక్క వ్యాసార్థమును కనుగొనండి.
17. $A(4, -3)$ మరియు $B(8, 5)$, అయిన రే.ఖం. AB ని $3:1$ నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువు యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.
- 18*. $A(-4, -2)$, $B(-3, -7)$ $C(3, -2)$ మరియు $D(2, 3)$ ఈ బిందువులను వరుసగా కలిపిన ఏర్పడు $ABCD$ చతుర్భుజము ఏ రకానికి చెందిందో రాయండి.
- 19*. రే.ఖం. AB పై P, Q, R మరియు S బిందువుల వలన ఆ రేఖాఖండం ఐదు సర్వసమాన భాగాలుగా అవుతుంది. ఒకవేళ $A-P-Q-R-S-B$ మరియు $Q(12, 14)$, $S(4, 18)$ అయిన A, P, R మరియు B ల యొక్క నిరూపకములను కనుగొనండి.
20. $P(6, -6)$, $Q(3, -7)$ మరియు $R(3, 3)$ ల నుండి పోయే వృత్తము యొక్క వృత్త కేంద్ర నిరూపకములను కనుగొనండి.
- 21*. సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క మూడు శీర్షబిందువుల నిరూపకములు $A(5, 6)$, $B(1, -2)$ మరియు $C(3, -2)$ అయిన నాల్గవ బిందువు యొక్క వీలయ్యే నిరూపకముల అన్ని జతలను కనుగొనండి.
22. $A(1, 7)$, $B(6, 3)$ $C(0, -3)$ మరియు $D(-3, 3)$ అనేవి శీర్షబిందువులు గల ఒక చతుర్భుజము. ఆ చతుర్భుజము యొక్క ప్రతి కర్ణం యొక్క వాలును కనుగొనండి.






పదండి నేర్చుకుందాం

- త్రికోణమితియ నిష్పత్తులు
- త్రికోణమితియ సర్వసమీకరణాలు
- ఊర్ధ్వకోణము మరియు నిష్పకోణము
- ఎత్తులు మరియు దూరములపై ఉదాహరణలు



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.

1. కింది పటము ఆధారముగా ఖాళీలను పూరించండి.



$$\sin \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}, \cos \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}},$$

$$\tan \theta = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

2. కింది నిష్పత్తులలోని సంబంధమును పూర్తిచేయండి.

(i) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \boxed{}$ (ii) $\sin \theta = \cos (90 - \boxed{})$

(iii) $\cos \theta = \sin (90 - \boxed{})$ (iv) $\tan \theta \tan (90 - \theta) = \boxed{}$

3. కింది సమీకరణమును పూర్తి చేయండి.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \boxed{}$$

4. క్రింది త్రికోణమితియ నిష్పత్తుల విలువలను రాయండి.

(i) $\sin 30^\circ = \frac{1}{\boxed{}}$ (ii) $\cos 30^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ (iii) $\tan 30^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

(iv) $\sin 60^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ (v) $\cos 45^\circ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ (vi) $\tan 45^\circ = \boxed{}$

తొమ్మిదవ తరగతిలో మనం అల్పకోణముయొక్క కొన్ని త్రికోణమితియ నిష్పత్తులను అభ్యాసించాము. ఈ సంవత్సరము అల్పకోణము యొక్క మరికొన్ని త్రికోణమితియ నిష్పత్తుల గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము.



తెలుసుకుందాం.

కోసెక్, సెక్ మరియు కాట్ నిష్పత్తులు (cosec, sec and cot ratios)

కోణము యొక్క సైన నిష్పత్తియొక్క విలోమ నిష్పత్తిని కోసెకెంట్ (cosecant) నిష్పత్తి అంటారు

$$\text{దీనిని క్లుప్తంగా cosec అని రాస్తారు} \therefore \text{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

అదేవిధముగా కోసైన్ మరియు ట్యాంజెంట్ నిష్పత్తుల విలోమనిష్పత్తులను వరుసగా సెకెంట్ (secant) మరియు కోటాంజెంట్ (cotangent) నిష్పత్తులు అంటారు; మరియు వీటిని క్లుప్తముగా వరుసగా sec మరియు cot అని రాస్తారు.

$$\therefore \text{sec}\theta = \frac{1}{\cos\theta} \text{ మరియు } \text{cot}\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

పటం 6.2 లో,

$$\sin\theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore \text{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{AB}{AC}} \\ = \frac{AC}{AB}$$

$$\text{అనగా, cosec}\theta = \frac{\text{కర్ణము}}{\text{ఎదుటి భుజము}}$$

$$\tan\theta = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \text{cot}\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{AB}{BC}}$$

$$\text{cot}\theta = \frac{BC}{AB} = \frac{\text{అసన్న భుజము}}{\text{ఎదుటి భుజము}}$$

$$\cos\theta = \frac{BC}{AC}$$

$$\text{sec}\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{BC}{AC}} \\ = \frac{AC}{BC}$$

$$\text{అనగా sec}\theta = \frac{\text{కర్ణము}}{\text{అసన్న భుజము}}$$


$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \text{ అని మీకు తెలుసు.}$$

$$\therefore \text{cot}\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}$$

$$= \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$\therefore \text{cot}\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$



పటం 6.2



ఇవి గుర్తుంచుకుందాం.


త్రికోణమితీయ నిష్పత్తుల మధ్య అంతరసంబంధం
cosec, sec మరియు cot నిష్పత్తుల నిర్వచనాలనుండి,

- $\frac{1}{\sin \theta} = \text{cosec } \theta \quad \therefore \sin \theta \times \text{cosec } \theta = 1$
- $\frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta \quad \therefore \cos \theta \times \sec \theta = 1$
- $\frac{1}{\tan \theta} = \cot \theta \quad \therefore \tan \theta \times \cot \theta = 1$

అధిక వివరాలకై

సుప్రసిద్ధ భారతీయ గణితస్త్రవేత్త ఆర్యబట్టు కుసుమపూర్లో క్రీ.శ. 476లో జన్మించారు. ప్రస్తుతం బీహార్‌లోని పాట్నా దగ్గరలో ఈ ప్రదేశం ఉండేది. అతను అంకగణితము, బీజగణితము మరియు రేఖగణితము గణితశాఖలలో అనేక పరిశోధనలు చేశాడు, 'ఆర్యభట్టీయం' అను గ్రంథంలో అతను అనేక గణిత సిద్ధాంతాలను సూత్రరూపంలో రాసి పెట్టాడు, ఉదాహరణకు,

- (1) అంకగణితము శ్రేణిలోని n వ పదమును కనుగొనుటకు మరియు మొదటి n పదాల మొత్తము యొక్క సూత్రం.
- (2) $\sqrt{2}$ యొక్క విలువ కనుగొనే సూత్రం.
- (3) π సంఖ్య యొక్క 3.1416 అనే నాలుగు దశాంశస్థానాల వరకు సమానముగా ఉండే విలువ, మొదలగునవి.



ఖగోళశాస్త్ర అభ్యాసములో అతను త్రికోణమితీయమును ఉపయోగించెను మరియు వాటి నిష్పత్తులు (sine ratio) అను భావనను మొట్ట మొదటగా ఉపయోగించాడు.

ప్రపంచములోనే అతని కాలములో గణితము యొక్క ఆలోచన జ్ఞానము గణితములో మహత్తరమైన కృషి జరిగింది. అందువలన అతని గ్రంథం సంపూర్ణ భారతదేశంలో, అదే విధముగా అరబ్ దేశాలద్వారా యూరోప్‌లో కూడా ప్రచారం జరిగింది.

భూమి స్థిరంగా ఉండి, సూర్యుడు, చంద్రుడు, మరియు నక్షత్రాలు ప్రత్యేక వరుసలలో భూమి చుట్టు తిరుగుతాయని ఆ కాలంలోని పరిశోధకులందరి అభిప్రాయం, కాని పడవలలో ప్రయాణించే వారికి ఒడ్డునగల చెట్లు మరియు వస్తువులు వ్యతిరేక దిశలో పోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అదే విధంగా సూర్యుడు, నక్షత్రాలు మొదలైన వాటి విషయాలలో కూడా భూమిపైగల మనుషులకు అలానే అనిపిస్తుంది. అనగా భూమి భ్రమణం చేస్తుంది అని ఆర్యభట్టీయంలో రాశాడు.

19 ఏప్రిల్ 1975 రోజున భారతదేశంలో మొదటి ఉపగ్రహమును అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ ఉపగ్రహమునకు 'ఆర్యభట్టు' అనే నామకరణము చేసి ఈ ఉత్తమ గణితుడిని అత్యుత్తముగా ఈ దేశము ఎంతో గౌరవమునిచ్చింది.

* $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ మరియు 90° కొలతలుగల కోణముల యొక్క త్రికోణమితియ నిష్పత్తుల పట్టిక.

త్రికోణమితియ నిష్పత్తులు	కోణముల కొలతలు (θ)				
	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	నిర్వచించలేము
$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$	నిర్వచించలేము	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	నిర్వచించలేము
$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$	నిర్వచించలేము	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0



తెలుసుకుందాం.

త్రికోణమితియ సర్వసమీకరణాలు (Trigonometrical identities)

వక్ర పటం 6.3 లో ΔABC లంబకోణ త్రిభుజంలో, $\angle B = 90^\circ$

$$(i) \sin \theta = \frac{BC}{AC}$$

$$(ii) \cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$(iii) \tan \theta = \frac{BC}{AB}$$

$$(iv) \operatorname{cosec} \theta = \frac{AC}{BC}$$

$$(v) \sec \theta = \frac{AC}{AB}$$


$$(vi) \cot \theta = \frac{AB}{BC}$$

ఇదేవిధంగా, పైథాగరస్ సిద్ధాంతము ప్రకారం

$$BC^2 + AB^2 = AC^2 \dots\dots(I)$$

సమీకరణం (I) యొక్క ఇరువైపులా AC^2 చే భాగించగా

$$\frac{BC^2 + AB^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2}$$



పటం 6.3

ఉదా. (2) ఒకవేళ $\sec\theta = \frac{25}{7}$ అయినచో $\tan\theta$ విలువను కనుగొనండి.

సాధన : పద్ధతి I

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$

అని మనకు తెలుసు

$$\therefore 1 + \tan^2\theta = \left(\frac{25}{7}\right)^2$$

$$\therefore \tan^2\theta = \frac{625}{49} - 1$$

$$= \frac{625 - 49}{49}$$

$$= \frac{576}{49}$$

$$\therefore \tan\theta = \frac{24}{7}$$

పద్ధతి II

వటం నుండి,

$$\sec\theta = \frac{PR}{PQ}$$

$$\therefore PQ = 7k, PR = 25k$$

పై థాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం


$$PQ^2 + QR^2 = PR^2$$

$$\therefore (7k)^2 + QR^2 = (25k)^2$$

$$\therefore QR^2 = 625k^2 - 49k^2 = 576k^2$$

$$\therefore QR = 24k$$

$$\text{ఇప్పుడు, } \tan\theta = \frac{QR}{PQ} = \frac{24k}{7k} = \frac{24}{7}$$



పటం 6.5

ఉదా. (3) ఒకవేళ $5\sin\theta - 12\cos\theta = 0$ అయిన $\sec\theta$ మరియు $\operatorname{cosec}\theta$ ల విలువలను కనుగొనండి.

సాధన : $5\sin\theta - 12\cos\theta = 0$

$$\therefore 5\sin\theta = 12\cos\theta$$

$$\therefore \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{12}{5}$$

$$\therefore \tan\theta = \frac{12}{5}$$

అని మనకు తెలుసు

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$

$$\therefore 1 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \sec^2\theta$$

$$\therefore 1 + \frac{144}{25} = \sec^2\theta$$

$$\therefore \frac{25+144}{25} = \sec^2\theta$$

$$\therefore \sec^2\theta = \frac{169}{25}$$

$$\therefore \sec\theta = \frac{13}{5}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{5}{13}$$

$$\text{ఇప్పుడు, } \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\therefore \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$$

$$\therefore \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{25}{169}$$

$$= \frac{144}{169}$$

$$\therefore \sin\theta = \frac{12}{13}$$

$$\therefore \operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{12}$$



ఉదా. (4) $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ అయిన $\frac{1-\sec\theta}{1+\operatorname{cosec}\theta}$ విలువను కనుగొనండి.

సాధన : పద్ధతి I

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \sec\theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \sin^2\theta + \cos^2\theta &= 1 \\ \therefore \sin^2\theta + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 &= 1 \\ \therefore \sin^2\theta &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \\ \therefore \sin\theta &= \frac{1}{2} \quad \therefore \operatorname{cosec}\theta = 2 \\ \therefore \frac{1-\sec\theta}{1+\operatorname{cosec}\theta} &= \frac{1-\frac{2}{\sqrt{3}}}{1+2} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}}}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}-2}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

పద్ధతి II

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ అని మనకు తెలుసు.} \\ \therefore \theta &= 30^\circ \\ \therefore \sec\theta &= \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \operatorname{cosec}\theta &= \operatorname{cosec} 30^\circ = 2 \\ \therefore \frac{1-\sec\theta}{1+\operatorname{cosec}\theta} &= \frac{1-\frac{2}{\sqrt{3}}}{1+2} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}}}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}-2}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

ఉదా. (5) $\sec X + \tan X = \sqrt{\frac{1+\sin X}{1-\sin X}}$ అని చూపండి.

$$\begin{aligned}\text{సాధన : } \sec X + \tan X &= \frac{1}{\cos X} + \frac{\sin X}{\cos X} \\ &= \frac{1+\sin X}{\cos X} \\ &= \sqrt{\frac{(1+\sin X)^2}{\cos^2 X}} \\ &= \sqrt{\frac{(1+\sin X)(1+\sin X)}{1-\sin^2 X}} \\ &= \sqrt{\frac{(1+\sin X)(1+\sin X)}{(1-\sin X)(1+\sin X)}} \\ &= \sqrt{\frac{1+\sin X}{1-\sin X}}\end{aligned}$$

ఉదా. (6) కింది సమీకరణములనుండి θ ను తొలగించండి.

$$x = a \cot \theta - b \operatorname{cosec} \theta$$

$$y = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta$$

సాధన : $x = a \cot \theta - b \operatorname{cosec} \theta$ (I)

$y = a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta$ (II)

సమీకరణములు (I) మరియు (II) లను కూడగా,

$$x + y = 2a \cot \theta$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{x + y}{2a} \text{ (III)}$$

సమీకరణము (II) నుండి (I) ని తీసివేయగా,

$$y - x = 2b \operatorname{cosec} \theta$$

$$\therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{y - x}{2b} \text{ (IV)}$$

ఇప్పుడు, $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$

$$\therefore \left(\frac{y - x}{2b} \right)^2 - \left(\frac{y + x}{2a} \right)^2 = 1$$

$$\therefore \frac{(y - x)^2}{4b^2} - \frac{(y + x)^2}{4a^2} = 1$$

లేదా $\left(\frac{y - x}{b} \right)^2 - \left(\frac{y + x}{a} \right)^2 = 4$

అభ్యాసమాలిక 6.1

1. ఒకవేళ $\sin \theta = \frac{7}{25}$ అయిన $\cos \theta$ మరియు $\tan \theta$ విలువలను కనుగొనండి.
2. ఒకవేళ $\tan \theta = \frac{3}{4}$ అయిన $\sec \theta$ మరియు $\cos \theta$ విలువలను కనుగొనండి.
3. ఒకవేళ $\cot \theta = \frac{40}{9}$ అయిన $\operatorname{cosec} \theta$ మరియు $\sin \theta$ ల విలువలను కనుగొనండి.
4. ఒకవేళ $5 \sec \theta - 12 \operatorname{cosec} \theta = 0$ అయిన $\sec \theta$, $\cos \theta$ మరియు $\sin \theta$ ల విలువలను కనుగొనండి.
5. ఒకవేళ $\tan \theta = 1$ అయిన $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta}$ విలువను కనుగొనండి.
6. నిరూపించండి.
 - (1) $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$
 - (2) $\cos^2 \theta (1 + \tan^2 \theta) = 1$

$$(3) \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = \sec\theta - \tan\theta$$

$$(4) (\sec\theta - \cos\theta)(\cot\theta + \tan\theta) = \tan\theta \sec\theta$$

$$(5) \cot\theta + \tan\theta = \operatorname{cosec}\theta \sec\theta$$

$$(6) \frac{1}{\sec\theta - \tan\theta} = \sec\theta + \tan\theta$$

$$(7) \sec^4\theta - \cos^4\theta = 1 - 2\cos^2\theta$$

$$(8) \sec\theta + \tan\theta = \frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$$

$$(9) \text{ఒకవేళ } \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2 \text{ అయిన } \tan^2\theta + \frac{1}{\tan^2\theta} = 2 \text{ అని చూపండి.}$$

$$(10) \frac{\tan A}{(1+\tan^2 A)^2} + \frac{\cot A}{(1+\cot^2 A)^2} = \sin A \cos A$$

$$(11) \sec^4 A (1 - \sin^4 A) - 2\tan^2 A = 1$$

$$(12) \frac{\tan\theta}{\sec\theta - 1} = \frac{\tan\theta + \sec\theta + 1}{\tan\theta + \sec\theta - 1}$$




తెలుసుకుందాం.

త్రికోణమితి అనువర్తనాలు (Application of trigonometry)

అనేకసార్లు మనకు స్తంభాల, భవనముల లేదా చెట్ల ఎత్తులు, అదేవిధముగా ఓడ, దీప స్తంభముల మధ్య దూరము లేదా నది యొక్క లోతు మొదలగునవి తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ దూరములను మనము ప్రత్యక్షముగా కొలవలేము కాని త్రికోణమితియ నిష్పత్తులను ఉపయోగించి ఎత్తులు లేదా దూరమును నిర్ధారించవచ్చు.

ఎత్తులు లేదా దూరములను కనుగొనుట కొరకు, ఇచ్చిన వివరముల ఆధారముగా చిత్తు పటమును మొదట గీద్దాం. చెట్లు, కొండలు, స్థూపము లాంటి వస్తువులు

భూమిపై లంబముగా ఉంటాయి అని చూపించుటకొరకు మనము పటములో లంబరేఖాఖండమును ఉపయోగించుదాం. మనము పరిశీలికుని ఎత్తును లెక్కించము, సామాన్యంగా పరిశీలకుని కండ్లను లెక్కించే సమయంలో క్షితిజ సమాంతరముగా ఉంటుంది అని అనుకుంటాం.



పటం 6.6




మొదట మనము కొన్ని సంబంధిత పదాలను గురించి నేర్చుకుందాం.

(i) దృష్టిరేఖ (Line of vision) :

బిందువు 'A' వద్దగల పరిశీలకుడు బిందువు 'B' వైపుకు చూచునపుడు ఏర్పడే రేఖ AB ను దృష్టిరేఖ అంటారు.


(ii) ఊర్ధ్వకోణము (Angle of elevation) :

పరిశీలకుని సామాన్య దృష్టిరేఖ AM క్షితిజ సమాంతర రేఖ. పరిశీలించవలసిన బిందువు B, A తో సోల్పగా అది అధిక ఎత్తులో ఉన్నచో AB దృష్టిరేఖ, రేఖ AM చే చేయుకోణమే ఊర్ధ్వకోణము. పటములో $\angle MAB$ ఊర్ధ్వకోణము.



(iii) నిమ్నకోణము (Angle of depression) :

పరిశీలన బిందువు 'C' అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖ AM కు కింది వైపు ఉన్నట్లయితే దృష్టిరేఖ AC రేఖ AM తో నిమ్నకోణమును ఏర్పరుస్తుంది. పటంలోని $\angle MAC$ నిమ్నకోణము అవుతుంది.




ఎప్పుడైతే మనము క్షితిజ సమాంతరరేఖ యొక్క పైవైపుకి చూచినప్పుడు ఏర్పడు కోణము ఊర్ధ్వకోణము అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము క్షితిజ సమాంతర రేఖ యొక్క కింది వైపుకి చూచినప్పుడు ఏర్పడుకోణము నిమ్నకోణము అవుతుంది.

సాధించిన ఉదాహరణలు

ఉదా. (1) ఒక పరిశీలకుడు చెట్టునుండి 10 మీ దూరములో ఉండి చెట్టు శిఖరమును చూచినపుడు 60° ఊర్ధ్వకోణము ఏర్పడుతుంది. అయితే చెట్టు ఎత్తు ఎంత? ($\sqrt{3} = 1.73$)

సాధన : పటం 6.9 లో C బిందువు వద్ద పరిశీలకుడు గలడు AB అనేది చెట్టు ఎత్తు.



$AB = h =$ చెట్టు ఎత్తు,

చెట్టు నుండి పరిశీలకుని దూరము $BC = 10$ మీ.

ఊర్ధ్వకోణము $(\theta) \angle BCA = 60^\circ$

పటంనుండి, $\tan \theta = \frac{AB}{BC}$ (I)

$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ (II)

$\therefore \frac{AB}{BC} = \sqrt{3}$ (I) మరియు (II) లనుండి

$\therefore AB = BC \sqrt{3} = 10 \sqrt{3}$

$\therefore AB = 10 \times 1.73 = 17.3$ మీ.

$\therefore$ చెట్టు యొక్క ఎత్తు 17.3 మీ.

ఉదా. (2) 40 మీ ఎత్తుగల భవనముపై నుండి, ఆ భవనము నుండి కొన్ని మీటర్ల దూరములో నిలబెట్టిన స్కూటరును చూచుటకు. 30° కోణముగల నిమ్నకోణము ఏర్పడుతుంది, అయితే ఆ స్కూటరు భవనమునుండి ఎంత దూరములో ఉంది? ($\sqrt{3} = 1.73$)

సాధన : పటం 6.10 లో రే.ఖం. AB భవనము. భవనము నుండి 'X' మీ దూరములో 'C' వద్ద స్కూటరు గలదు. పటములో A వద్ద పరిశీలకుడు గలడు.


AM క్షితిజ సమాంతర రేఖ.

$\angle MAC$ నిమ్నకోణము

$\angle MAC$ మరియు $\angle ACB$ లు

ఏకాంతర కోణములు సమానం

అని తెలుసుకొనము.



పటం 6.10

పటము ఆధారముగా, $\tan 30^\circ = \frac{AB}{BC}$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{40}{X}$$


$$\therefore X = 40\sqrt{3}$$

$$= 40 \times 1.73$$

$$= 69.20 \text{ మీ..}$$

$\therefore$ ఆ స్కూటరు భవనము నుండి 69.20 మీ దూరములో ఉంది.

ఉదా. (3) ప్రవహించే నది యొక్క వెడల్పు కనుగొనుటకు ఒక వ్యక్తి ప్రవహించేనది యొక్క ఒక తీరముకు వ్యతిరేక తీరంలోగల దీవస్తంభ శిఖరమును చూచునప్పుడు 61° కోణముగల ఊర్ధ్వకోణము ఏర్పడింది. 50 మీ వెనకకు వెళ్లి మళ్ళీ దీవస్తంభశిఖరమును చూచునప్పుడు 35° కోణముగల ఊర్ధ్వకోణము ఏర్పడింది. అయిన ప్రవహించే నది యొక్క వెడల్పు మరియు దీవస్తంభం ఎత్తులను కనుగొనండి. ($\tan 61^\circ \approx 1.8$, $\tan 35^\circ \approx 0.7$)



పటం 6.11

సాధన : రే.ఖం. AB నది యొక్క అవతల ఒడ్డుకు గల

దీవస్తంభమును సూచించుతుంది. 'A' దీవస్తంభ

శిఖరము, రే.ఖం. BC ప్రవహించే నదియొక్క

వెడల్పును సూచిస్తుంది.

దీవస్తంభము ఎత్తు h మరియు ప్రవహించే నదియొక్క

వెడల్పు X మీ అనుకుందాం.

పటము ఆధారముగా $\tan 61^\circ = \frac{h}{X}$

$$\therefore 1.8 = \frac{h}{x}$$

$$h = 1.8 \times x$$

$$10h = 18x \dots\dots\dots (I) \dots\dots 10 \text{ చే గుణించగా}$$

లంబకోణ ΔABD లో,

అదే విధంగా , $\tan 35 = \frac{h}{x + 50}$

$$0.7 = \frac{h}{x + 50}$$

$$\therefore h = 0.7 (x + 50)$$

$$\therefore 10h = 7 (x + 50) \dots\dots\dots (II)$$

[(I), (II) నుండి]

$$18x = 7(x + 50)$$

$$\therefore 18x = 7x + 350$$


$$\therefore 11x = 350$$

$$\therefore x = \frac{350}{11} = 31.82$$

ఇప్పుడు, $h = 1.8x = 1.8 \times 31.82$
 $= 57.28 \text{ మీ.}$

$\therefore$ ప్రవహించే నది యొక్క వెడల్పు = 31.82 మీ.
 దీవస్తంభము ఎత్తు = 57.28 మీ.

ఉదా. (4) రోషిని ఇంటి గుమ్మంవద్ద నిలబడింది. ఇంటి దగ్గర నుండి కొంచెం దూరములో చెట్టు శిఖరముపై కూర్చున్న ఒక గ్రద్ద తనకు కనబడింది. అప్పుడు తన దృష్టి యొక్క ఊర్ధ్వకోణము 61° ఉంది. అది ఇంకా స్పష్టంగా కనిపించాలని తను ఇంటికి 4 మీటర్ల ఎత్తులోగల గచ్చు పైకి వెళ్ళింది. అక్కడి నుండి చూచునప్పుడు తన దృష్టి యొక్క ఊర్ధ్వకోణము 52° ఉంది. అయిన ఆ గ్రద్ద భూమి నుండి ఎంత ఎత్తులో ఉంది?



పటం 6.12

($\tan 61^\circ = 1.80$, $\tan 52^\circ = 1.28$, $\tan 29^\circ = 0.55$, $\tan 38^\circ = 0.78$)

సాధన : పటం 6.12 లో PQ ని ఇల్లు మరియు SR ను చెట్టు, గ్రద్ధస్థానము R వద్ద ఉంది అని అనుకుందాం.

రే.ఖం. QT $\perp$ రే.ఖం. RS గీయండి.

$\therefore \square$ TSPQ ఒక దీర్ఘచతురస్రం

SP = x అని అనుకుందాం TR = y అని అనుకుందాం.

ఇప్పుడు, Δ RSP లో, $\angle$ PRS = $90^\circ - 61^\circ = 29^\circ$

అదేవిధంగా, Δ RTQ లో, $\angle$ QRT = $90^\circ - 52^\circ = 38^\circ$

$$\therefore \tan \angle PRS = \tan 29^\circ = \frac{SP}{RS}$$

$$\therefore 0.55 = \frac{x}{y+4}$$

$$\therefore x = 0.55(y + 4) \dots\dots\dots (I)$$

అదే విధంగా, $\tan \angle QRT = \frac{TQ}{RT}$

$$\therefore \tan 38^\circ = \frac{x}{y} \dots\dots\dots [\because SP = TQ = x]$$

$$\therefore 0.78 = \frac{x}{y}$$

$$\therefore x = 0.78y \dots\dots\dots (II)$$

$$\therefore 0.78y = 0.55(y + 4) \dots\dots\dots (I), (II) \text{ నుండి}$$

$$\therefore 78y = 55(y + 4)$$

$$\therefore 78y = 55y + 220$$

$$\therefore 23y = 220$$

$$\therefore y = 9.565 = 10 \text{ (సుమారు పూర్ణసంఖ్య వరకు)}$$

$$\therefore RS = y + 4 = 10 + 4 = 14$$

$\therefore$ గ్రద్ధ భూమినుండి 14 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది.

ఉదా. (5) తుఫాను వలన ఒక చెట్టు విరిగెను మరియు చెట్టు శిఖరము భూమిపై వాలెను మరియు విరిగిన భాగము భూమిచే 30° ల కోణం చేసింది. చెట్టు శిఖరము మరియు మొదలు మధ్యదూరము 10 మీ అయినచో చెట్టు ఎత్తును కనుగొనండి.

సాధన : పటం 6.13 లో AB అనే చెట్టు యొక్క శిఖరము 'A', తుఫాను వలన చెట్టు 'C' వద్ద విరగడం వలన శిఖరం D వద్ద వాలెను.

$$\angle CDB = 30^\circ, BD = 10 \text{ మీ}, BC = x \text{ మీ}$$

$$CA = CD = y \text{ మీ.}$$

లంబకోణ ΔCDB లో,

$$\tan 30^\circ = \frac{BC}{BD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{10}$$

$$x = \frac{10}{\sqrt{3}}$$


$$y = \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$x + y = \frac{10}{\sqrt{3}} + \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{30}{\sqrt{3}}$$

$$x + y = 10\sqrt{3}$$

చెట్టుయొక్క ఎత్తు $10\sqrt{3}$ మీ.



పటం 6.13

అభ్యాసమాలిక 6.2

- ఒక వ్యక్తి ఒక చర్చివద్దనుండి 80 మీ దూరములో నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి చర్చిపైకి చూచునప్పుడు 45° ఊర్ధ్వకోణము గలదు. అయిన చర్చి ఎత్తు ఎంత?
- దీన స్థంభము పై నుండి ఒక వడవను చూచునప్పుడు 60° కొలతగల నిమ్నకోణము గలదు. ఒకవేళ దీనస్థంభము ఎత్తు 90మీ. ఉన్నచో ఆ వడవ దీనస్థంభము నుండి ఎంత దూరములో ఉంది? ($\sqrt{3} = 1.73$)
- 12 మీ వెడల్పుగల రహదారికి ఇరువైపులా రెండు భవనములు కలవు. వాటినుండి 10 మీ ఎత్తులోగల మొదటి భవనముపై నుండి రెండవ భవన శిఖరమును చూచునప్పుడు 60° కొలతగల ఊర్ధ్వకోణము ఏర్పడుతుంది, అయిన రెండవ భవనము ఎత్తు ఎంత?
- 18 మీ మరియు 7 మీ ఎత్తుగల రెండు స్తంభాలు భూమి మీద నిటారుగా ఉన్నవి. వాటి రెండు పై చివరలను కలిపే తీగపొడవు 22 మీ. క్షితిజ సమాంతర తీగ ద్వారా ఏర్పడే కోణము కొలతను కనుగొనండి.
- తుఫాను వలన ఒక చెట్టు విరిగింది మరియు చెట్టు పైకొన (శిఖరము) భూమిపై వాలెను మరియు విరిగిన భాగము భూమితో 60° కోణం చేసింది. చెట్టుపైకొన మరియు మొదలుల మధ్య దూరము 20 మీ అయినట్లయితే చెట్టు ఎత్తు ఎంత?
- ఒక గాలి వటమును భూమి నుండి ఎగురవేసినప్పుడు 60 మీ. ఎత్తు వరకు ఎగిరినది. గాలివటము దారము చివరను భూమి మీద కట్టబడినది. భూమి మరియు దారము మధ్య 60° కోణము ఏర్పడుతుంది. దారము వక్రంగా లేదని భావించి దారము పొడవును కనుగొనండి. ($\sqrt{3} = 1.73$)

1. ఇవ్వబడిన బహుళైచ్ఛిక సమాధానాలలో సరియైన ఐచ్ఛికమును గుర్తించండి.

(1) $\sin\theta \operatorname{cosec}\theta =$ ఎంత?

(A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\sqrt{2}$

(2) కింది వాటిలో నుండి $\operatorname{cosec}45^\circ$ విలువ ఎంత?

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(3) $1 + \tan^2\theta =$ ఎంత?

(A) $\cot^2\theta$ (B) $\operatorname{cosec}^2\theta$ (C) $\sec^2\theta$ (D) $\tan^2\theta$

(4) ఎప్పుడైతే మనము క్షితిజ సమాంతర రేఖయొక్క పైవైపుకి చూస్తాయో, అప్పుడు అది అవుతుంది.

(A) ఊర్ధ్వకోణము (B) నిమ్మకోణం (C) శూన్యము (D) రేఖీయ కోణం

2. ఒక వేళ $\sin\theta = \frac{11}{61}$ అయిన సర్వసమీకరణాలను ఉపయోగించి $\cos\theta$ విలువను కనుగొనండి.

3. ఒక వేళ $\tan\theta = 2$, అయిన మిగిలిన త్రికోణమితియ నిష్పత్తుల విలువలను కనుగొనండి.

4. ఒకవేళ $\sec\theta = \frac{13}{12}$, అయిన మిగిలిన త్రికోణమితియ నిష్పత్తుల విలువలను కనుగొనండి.

5. నిరూపించండి.

(1) $\sec\theta (1 - \sin\theta) (\sec\theta + \tan\theta) = 1$

(2) $(\sec\theta + \tan\theta) (1 - \sin\theta) = \cos\theta$

(3) $\sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = \sec^2\theta \times \operatorname{cosec}^2\theta$

(4) $\cot^2\theta - \tan^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - \sec^2\theta$

(5) $\tan^4\theta + \tan^2\theta = \sec^4\theta - \sec^2\theta$

(6) $\frac{1}{1-\sin\theta} + \frac{1}{1+\sin\theta} = 2 \sec^2\theta$

(7) $\sec^6 X - \tan^6 X = 1 + 3\sec^2 X \times \tan^2 X$

(8) $\frac{\tan\theta}{\sec\theta+1} = \frac{\sec\theta-1}{\tan\theta}$

(9) $\frac{\tan^3\theta-1}{\tan\theta-1} = \sec^2\theta + \tan\theta$

$$(10) \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}$$

6. ఒక బాలుడు ఒక భవనము నుండి 48 మీటర్ల దూరములో నిలుబడి ఉన్నాడు. ఆ భవనము పై కొనను చూస్తున్నప్పుడు ఆ బాలుడు 30° కొలతగల ఊర్ధ్వకోణము చేయవలసి వచ్చింది అయిన ఆ భవనము ఎత్తు ఎంత?
7. స్థంభముపై నుండి పరిశీలకుడు ఒక ఓడను చూచునప్పుడు 30° కొలత గల నిమ్నకోణము ఏర్పడింది. ఒకవేళ దీప స్థంభము ఎత్తు 100 మీ అయిన ఓడ దీప స్థంభం నుండి ఎంత దూరములో ఉంది?
8. 15 మీ వెడల్పుగల రహదారికి ఇరువైపులా రెండు భవనములు ఉన్నాయి. వాటినుండి 12 మీ ఎత్తుగల మొదటి భవనము పై నుండి రెండవ భవనము పై భాగమును 30° ఊర్ధ్వకోణముతో చూచెను. అయిన రెండవ భవనము ఎత్తు ఎంత?
9. అగ్నిమాపక యంత్ర వాహనముపై అమర్చబడిన నిచ్చెన తక్కువలో తక్కువ 70° కొలతగల కోణములో లేవవచ్చును, ఆ సమయంలో ఎక్కువలో ఎక్కువ అది 20 మీ పొడవు ఉంటుంది. వాహనముపైగల నిచ్చెన మొదలు భూమినుండి 2మీ ఎత్తులో ఉంది. అయిన నిచ్చెన యొక్క రెండవ చివర భూమి నుండి ఎక్కువలో ఎక్కువ ఎంత దూరము వరకు వెళ్ళుతుంది? ($\sin 70^\circ \approx 0.94$)
10. ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానమును కిందకి దించుట మొదలుపెట్టినప్పుడు 20° నిమ్నకోణము ఏర్పడుతుంది, అప్పుడు విమానవేగము గంటకు 200 కి.మీ. ఆ విమానం 54 సెకన్లలో విమానచోదకుడు కిందికి దించాడు. భూమి మీదికి దింపే సమయములో ఆ విమానం భూమి నుండి ఎంత ఎత్తులో ఉంది? ($\sin 20^\circ \approx 0.342$)





పదండి నేర్చుకుందాం


- వివిధ ఘనాకృతుల ఉపరితల వైశాల్యములు మరియు ఘనపరిమాణములపై ఆధారిత మిశ్రమ ఉదాహరణలు.
- వృత్తచాపము - వృత్త చాపపొడవు.
- సెక్టరు వైశాల్యము.
- వృత్త ఖంఠ వైశాల్యము.



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం.


మనం కింది తరగతిలో కొన్ని త్రిమితీయ పటాల ఉపరితల వైశాల్యం, ఘనపరిమాణములను నేర్చుకున్నాము. వాటి కొరకు అవసరమయ్యే సూత్రాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం.

క్ర.సం.	త్రిమితీయ ఆకృతి	సూత్రములు
1 .	దీర్ఘఘనము	దీర్ఘఘన ప్రక్కతల వైశాల్యం = $2h (l + b)$ దీర్ఘఘన సంపూర్ణతల వైశాల్యం = $2(lb + bh + hl)$ దీర్ఘఘన ఘనపరిమాణం = lbh
2 .	ఘనం	ఘన ప్రక్కతల వైశాల్యం = $4l^2$ ఘన సంపూర్ణతల వైశాల్యం = $6l^2$ ఘన ఘనపరిమాణం = l^3
3 .	క్రమస్థూపం	క్రమస్థూప వక్రతల వైశాల్యం = $2\pi rh$ క్రమస్థూప సంపూర్ణతల వైశాల్యం = $2\pi r (r + h)$ క్రమస్థూప ఘనపరిమాణం = $\pi r^2 h$
4 .	శంకువు	శంకువు ఏటవాలు ఎత్తు (l) = $\sqrt{h^2 + r^2}$ శంకువు వక్రతల వైశాల్యం = πrl శంకువు సంపూర్ణతల వైశాల్యం = $\pi r (r + l)$ శంకువు ఘనపరిమాణం = $\frac{1}{3} \times \pi r^2 h$

క్ర.సం.	త్రిమితీయ ఆకృతి	సూత్రములు
5.	గోళము 	గోళ ఉపరితల వైశాల్యము = $4 \pi r^2$ గోళ ఘనపరిమాణము = $\frac{4}{3} \pi r^3$
6.	అర్థగోళము 	అర్థగోళ వక్రతల వైశాల్యము = $2 \pi r^2$ స్తూల అర్థగోళ సంపూర్ణతల వైశాల్యము = $3 \pi r^2$ అర్థగోళ ఘనపరిమాణము = $\frac{2}{3} \pi r^3$

క్రింది ఉదాహరణములు సాధించుము


ఉదా.(1)



పటం 7.1

పక్క పటంలో 30 సెం.మీ. ఎత్తు, 20 సెం.మీ. ల పొడవు 20 సెం.మీ. ల వెడల్పులు గల ఒక నూనె పీపా (డబ్బా) గలదు. దానిలో ఎన్ని లీటర్ల నూనె పడుతుంది. (1 లీ = 1000 సెం.మీ.³)

ఉదా.(2)



పటం 7.2


పక్క పటంలో హాస్యగాడి (విదూశకుని) (Joker) టోపి మరియు దాని కొలతలు చూపబడినవి. ఈ టోపిని తయారు చేయడానికి ఎంత బట్ట అవసరమౌతుంది?



ఆలోచిద్దాం.


పక్క పటంలో చూపినవిధంగా ఒక స్థూపంలో బంతి గలదు. బంతి స్థూప భూతలమును వక్రతలంను స్పృశిస్తుంది. స్థూప భూతల వ్యాసార్థం r అయిన

1. బంతి (గోళ) వ్యాసార్థము ఎంత ఉంటుంది? మరియు స్థూపము యొక్క వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి ఎంత?
2. స్థూప వక్రతల వైశాల్యము మరియు బంతి (గోళ) వక్రతల వైశాల్యముల నిష్పత్తి ఎంత?
3. స్థూప ఘనపరిమాణము మరియు బంతి (గోళ) ఘనపరిమాణముల నిష్పత్తి ఎంత?




పటం 7.3


కృత్యము :



పటం 7.4



పటం 7.5



పటం 7.6

పై పటాలలో చూపిన విధంగా ఒక బంతి మరియు బంతి వ్యాసార్థానికి (r) సమాన వ్యాసార్థంగల ఒక బీకరును తీసుకోండి. బీకరుయొక్క వ్యాసమంత పొడవు ($2r$) గల ఒక కాగితపు పట్టీని తీసుకోండి. దాని పొడవును మూడు సమాన భాగాలుగా విభజించే రెండు గీతలను పట్టిపై గీయండి. ఆ పట్టీని బీకరు భూతలం నుండి నిలువుగా దానిపై ఆతికించండి. బీకరులో కాగితపు పట్టీ కింది నుండి మొదటి భాగం వరకు నీటిని నింపండి. తరువాత బంతిని బీకరులో భూతలం చివరను తాకే విధంగా నిదానంగా దించండి. బీకరులోని నీటి యొక్క మట్టము ఎక్కడి వరకు పెరిగిందో చూడండి.

నీటి మట్టము కాగితపు పట్టీ యొక్క మొత్తం ఎత్తు వరకు వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది.

ఈ పరీశీలన నుండి బంతు యొక్క ఘనపరిమాణ నూత్రము ఏ విధంగా లభిస్తుందో అర్థం చేసుకోండి.

బీకరు క్రమ స్థాపకారంలో ఉంది. కావున బీకరు యొక్క $2r$ ఎత్తువరకు గల భాగము యొక్క ఘనపరిమాణము, క్రమస్థాప ఘనపరిమాణము సూత్రము నుండి లభిస్తుంది. ఈ ఘనపరిమాణంను V అనుకొందాం.

$$\therefore V = \pi \times r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

$$\begin{aligned} \text{కానీ } V &= \text{బంతి ఘనపరిమాణము} + \text{ముందుగా నింపిన నీటి ఘనపరిమాణం} \\ &= \text{బంతి ఘనపరిమాణము} + \frac{1}{3} \times 2\pi r^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{బంతి ఘనపరిమాణము} = V - \frac{1}{3} \times 2\pi r^3$$

$$= 2\pi r^3 - \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{6\pi r^3 - 2\pi r^3}{3} = \frac{4\pi r^3}{3}$$

$\therefore$ గోళ ఘనపరిమాణ సూత్రము $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ గా లభిస్తుంది.

(ఈ సూత్రమును ఉపయోగించి పటం 7.3 సందర్భంలో 3వ ప్రశ్నయొక్క సమాధానమును మీరు కనుగొనవచ్చు.)

ఉదా. (1) ఒక స్థూపాకార నీటి తొట్టి (టాకి) వ్యాసార్థం 2.8 మీ. మరియు ఎత్తు 3.5 మీ. అయిన ఆ తొట్టిలో ఎన్ని లీటర్ల నీరు పడుతుంది? ఒక వ్యక్తికి రోజుకు సరాసరి 70 లీటర్ల నీరు అవసరం అయిన నిండా నింపిన తొట్టిలోని నీరు రోజుకు ఎంత మందికి సరిపోతుంది? ($\pi = \frac{22}{7}$)

సాధన : వ్యాసార్థం (r) = 2.8 మీ., ఎత్తు (h) = 3.5 మీ., $\pi = \frac{22}{7}$

$$\begin{aligned} \text{నీటితొట్టి సామర్థ్యం} &= \text{స్థూపాకార తొట్టి ఘనపరిమాణం} \\ &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 2.8 \times 2.8 \times 3.5 \\ &= 86.24 \text{ మీ.}^3 \\ &= 86.24 \times 1000 \text{ లీ. } (\because 1 \text{ మీ.}^3 = 1000 \text{ లీ.}) \\ &= 86240.00 \text{ లీ.} \end{aligned}$$

$\therefore$ తొట్టిలో 86240 లీటర్ల నీరు పడుతుంది.

ఒక వ్యక్తికి రోజుకు 70 లీ. నీరు అవసరమౌతుంది.

$$\therefore \text{పూర్తిగా నిండిన తొట్టిలోని నీరు } \frac{86240}{70} = 1232 \text{ మందికి సరిపోతుంది.}$$

ఉదా. (2) 30 సెం.మీ. వ్యాసార్థంగల ఘనగోళమును కరిగించి దానినుండి 10 సెం.మీ. వ్యాసార్థం, 6 సెం.మీ. ఎత్తుగల స్థూపమును తయారు చేసినట్లయితే ఎన్ని స్థూపములు తయారువుతాయి?

సాధన : గోళ వ్యాసార్థము $r = 30$ సెం.మీ.

స్థూప వ్యాసార్థము $R = 10$ సెం.మీ.

స్థూపము ఎత్తు $H = 6$ సెం.మీ.

n స్థూపములు తయారవుతాయని అనుకొనిన

$$\therefore \text{గోళ ఘనపరిమాణము} = n \times \text{ఒక స్థూప ఘనపరిమాణము}$$


$$\begin{aligned} \therefore \text{స్థూపముల సంఖ్య} = n &= \frac{\text{గోళ ఘనపరిమాణము}}{\text{ఒక స్థూప ఘనపరిమాణము}} \\ &= \frac{\frac{4}{3} \pi (r)^3}{\pi (R)^2 H} \\ &= \frac{\frac{4}{3} \times (30)^3}{10^2 \times 6} = \frac{\frac{4}{3} \times 30 \times 30 \times 30}{10 \times 10 \times 6} = 60 \end{aligned}$$

$\therefore$ మొత్తం 60 స్థూపములు తయారువుతాయి.

144


1. ఒక శంకువు భూతల వ్యాసార్థం 1.5 సెం.మీ. ఎత్తు 5 సెం.మీ. అయిన ఆ శంకువు ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి.
2. 6 సెం.మీ. వ్యాసంగల గోళ ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి.
3. ఒక క్రమ స్థూప భూతల వ్యాసార్థం 5 సెం.మీ., ఎత్తు 40 సెం.మీ. అయిన దాని సంపూర్ణతల వైశాల్యమును కనుగొనండి.
4. ఒక గోళము యొక్క వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ. అయిన దాని వక్రతల వైశాల్యంను కనుగొనండి.
5. ఒక లోహ దీర్ఘఘనము పొడవు, వెడల్పు మరియు ఎత్తులు వరుసగా 44 సెం.మీ., 21 సెం.మీ. మరియు 12 సెం.మీ. గా గల దానిని కరిగించి 24 సెం.మీ. ఎత్తుగల శంకువును తయారు చేశారు. అయిన శంకువు యొక్క వ్యాసార్థంను కనుగొనండి.

6.



పటం 7.8

శంకువు ఆకార నీళ్ళ జగ్గు




పటం 7.9

స్థూపాకార పాత్ర


పటం 7.8 మరియు 7.9 లోని పాత్రల కొలతలు పరిశీలించి వాటి ఆధారముగా స్థూపాకార పాత్రలో ఎన్ని జగ్గుల నీరు పడుతుందో కనుగొనుము.

7. స్థూపము మరియు శంకువుల భూతలాలు సమానంగా ఉన్నాయి. స్థూపముపై శంకువును ఉంచారు. స్థూపాకార భాగము యొక్క ఎత్తు 3 సెం.మీ. భూతల వైశాల్యం 100 చ.సెం.మీ. కలదు. ఒకవేళ మొత్తం ఘనాకృతి యొక్క ఘనపరిమాణము 500 ఘ.సెం.మీ. అయిన సంపూర్ణ ఘనాకృతి యొక్క ఎత్తును కనుగొనండి.



పటం 7.10

8. పటములో ఇవ్వబడిన సమాచారం నుండి అర్థగోళము, స్థూపము మరియు శంకువుల ద్వారా తయారైన ఆటవస్తువు (బొమ్మ) సంపూర్ణతల వైశాల్యమును కనుగొనండి.




పటం 7.11

9. పటం 7.12 లో స్థూపాకార చదునైన మాత్రల 10 సెం.మీ.ల పొడవుగల లిఫాఫా కలదు. ఒక మాత్రయొక్క వ్యాసార్థం 7 మి.మీ. మరియు ఎత్తు 5 మి.మీ. గాగల ఎన్ని మాత్రలు ఆ లిఫాఫాలో పడతాయి.



పటం 7.12


10. పటం 7.13లో ఒక పిల్లల ఆట వస్తువు కలదు. అది ఒక అర్థగోళము మరియు ఒక శంకువుల సహాయంతో చేయబడింది. పటములో చూపించిన కొలతల ఆధారంగా (1) ఆట వస్తువు ఘనపరిమాణం (2) ఆట వస్తువు ఉపరితల వైశాల్యములను కనుగొనుము.



పటం 7.13

($\pi = 3.14$)

11. పటంలో చూపిన బీచ్ బాల్ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, ఘనపరిమాణములను కనుగొనండి.




పటం 7.14

12. పటంలో చూపిన విధంగా ఒక స్థూపాకార గ్లాసులో నీరు కలదు. అందులో 2 సెం.మీ. వ్యాసంగల లోహపు గోటి మునిగింది. అయిన ఆ నీటి ఘనపరిమాణమును కనుగొనండి.




పటం 7.15




శంకుచ్ఛేదము (frustum of the cone)

మనం నీరు త్రాగడానికి కుప్పలాంటి గ్లాసును వాడుతాము. ఈ గ్లాసు ఆకృతి అదేవిధంగా దానిలోని నీటి ఆకృతి శంకుచ్ఛేద ఆకృతి అవుతుంది.




పటం 7.16




పటం 7.17

శంకువును కోస్తున్నప్పుడు




పటం 7.18

శంకువుకు కోసిన తర్వాత వేరయిన రెండు భాగాలు



పటం 7.19

శంకుచ్ఛేదము



పటం 7.20

బోర్లించిన గ్లాసు

పటంలో బోర్లించిన ఒక శంకువు చూపబడింది. ఈ శంకువు భూతలానికి సమాంతరంగా కోయబడింది. తద్వారా ఏర్పడిన రెండు భాగాలలో ఒకటి శంకువు ఆకారంలోనే ఉంది. మిగిలిన భాగమును శంకుచ్ఛేదము (frustum) అంటారు.

శంకువులాగానే శంకుచ్ఛేదముకు కూడా ఉపరితల వైశాల్యం, ఘనపరిమాణములను కనుగొనవచ్చును. వాటికొరకు కింది సూత్రాలను మనం ఉపయోగించబోతున్నాము.

$$\begin{aligned}\text{శంకుచ్ఛేద వక్రతల వైశాల్యం} &= \pi(r_1 + r_2) l \\ &= 3.14 \times (14 + 8) \times 10 \\ &= 690.8 \text{ చ.సెం.మీ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{శంకుచ్ఛేద సంపూర్ణతల వైశాల్యం} &= \pi(r_1 + r_2)l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2 \\ &= 3.14 \times 10 (14 + 8) + 3.14 \times 14^2 + 3.14 \times 8^2 \\ &= 690.8 + 615.44 + 200.96 \\ &= 690.8 + 816.4 \\ &= 1507.2 \text{ చ.సెం.మీ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{శంకుచ్ఛేద ఘనపరిమాణము} &= \frac{1}{3} \pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 \times r_2) \\ &= \frac{1}{3} \times 3.14 \times 8 (14^2 + 8^2 + 14 \times 8) \\ &= 3114.88 \text{ ఘ.సెం.మీ.}\end{aligned}$$

అభ్యాసమాలిక 7.2

1. 30 సెం.మీ. ఎత్తుగల శంకుచ్ఛేద ఆకార నీళ్ళ బకెట్టు యొక్క రెండు వృత్తాకార భాగాల వ్యాసార్థాలు 14 సెం.మీ., 7 సెం.మీ. అయిన బకెట్టులో ఎన్ని లీటర్ల నీరు పడుతుంది? (1 లీ = 1000 ఘ.సెం.మీ.)
2. శంకుచ్ఛేద వృత్తాకార భాగముల వ్యాసార్థాలు 14 సెం.మీ., 6 సెం.మీ. మరియు ఎత్తు 6 సెం.మీ. అయిన కింది విలువలను కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)
(1) శంకుచ్ఛేద వక్రతల వైశాల్యం (2) శంకుచ్ఛేద సంపూర్ణతల వైశాల్యము (3) శంకుచ్ఛేద ఘనపరిమాణం.
3. పటం 7.23 లో వృత్తాకార భూభాగం పై భాగముల పరిధులు వరుసగా 132 సెం.మీ., 88 సెం.మీ. మరియు ఎత్తు 24 సెం.మీ. అయిన ఆ శంకుచ్ఛేద వక్రతల వైశాల్యమును కనుగొనుటకు కింది కృత్యమును పూర్తిచేయండి. ($\pi = \frac{22}{7}$)

$$\begin{aligned}\text{వృత్తపరిధి}_1 &= 2\pi r_1 = 132 \\ r_1 &= \frac{132}{2\pi} = \boxed{} \text{ సెం.మీ.}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\text{వృత్తపరిధి}_2 &= 2\pi r_2 = 88 \\ r_2 &= \frac{88}{2\pi} = \boxed{} \text{ సెం.మీ.}\end{aligned}$$

$$\text{శంకుచ్ఛేద ఏటవాలు ఎత్తు} = l$$

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}$$

$$l = \sqrt{\boxed{}^2 + \boxed{}^2}$$

$$l = \boxed{} \text{ సెం.మీ.}$$



పటం 7.23

$$\text{శంకుచ్ఛేద వక్రతల వైశాల్యము} = \pi(r_1 + r_2)l$$

$$= \pi \times \boxed{} \times \boxed{}$$


$$= \boxed{} \text{ చ.సెం.మీ.}$$



కొంచెం గుర్తుతెచ్చుకుందాం

పక్క పటంనుండి పట్టికను పూర్తిచేయండి.

చాపముయొక్క రకము	చాపము పేరు	చాపముకొలత
అల్పచాపము	చాపము AXB	
.....	చాపము AYB	




పటం 7.24



తెలుసుకుందాం.

వృత్తము యొక్క సెక్టరు (Sector of a circle)



పటం 7.25

పటంలో కేంద్రీయ కోణం వలన వృత్తవైశాల్యం రెండు భాగాలలో విభజించబడింది. ఈ ప్రతి భాగాన్ని వృత్తము యొక్క సెక్టరు అంటారు.

వృత్తము యొక్క రెండు వ్యాసార్థాలు మరియు వాటి అంత్యబిందువులను కలిపే వృత్త చాపముల హద్దులోని భాగమును సెక్టరు అంటారు.

పటంలో O-PMQ మరియు O-PBQ అనే రెండు సెక్టర్లు కలవు.

అల్ప సెక్టరు (Minor sector) :





రెండు వ్యాసార్థాలు వాటి మధ్యలోని అల్పచాపముల హద్దులోని సెక్టరును అల్ప సెక్టరు అని అంటారు. పటంలో O-PMQ అనేది అల్పసెక్టరు.

అధిక సెక్టరు (Major sector) :

రెండు వ్యాసార్థాలు వాటి మధ్యలోని అధిక చాపముల హద్దులోని సెక్టరును అధిక సెక్టరు అని అంటారు. పటంలో O-PBQ అనేది అధిక సెక్టరు.

సెక్టరు వైశాల్యం (Area of a sector)

కింది పటాలలో చూపిన విధంగా సమాన వ్యాసార్థాలుగల వృత్తముల ఛాయంకిత భాగాల వైశాల్యాలను పరిశీలించి కింది పట్టికను పూర్తి చేయండి.

$\theta = 360^\circ$  $A_1 = \pi r^2$	$\theta = 180^\circ$  $A_2 = \frac{1}{2} \pi r^2$	$\theta = 90^\circ$  $A_3 = \frac{1}{4} \pi r^2$	$\theta = 60^\circ$  $A_4 = \frac{1}{6} \pi r^2$
--	--	---	---

పటం 7.26

వృత్త కేంద్రీయ కోణ కొలత = 360° = సంపూర్ణ కోణము

వృత్త కేంద్రీయ కోణము = 360° , వృత్త వైశాల్యము = πr^2			
వృత్త సెక్టరు	వృత్తం సెక్టరు చాపము యొక్క కొలత	$\frac{\theta}{360}$	వృత్త సెక్టరు వైశాల్యం A
A_1	360°	$\frac{360}{360} = 1$	$1 \times \pi r^2$
A_2	180°	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \pi r^2$
A_3	90°	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times \pi r^2$
A_4	60°		
A	θ	$\frac{\theta}{360}$	$\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$





పట్టికనుండి వృత్తవైశాల్యమును $\frac{\theta}{360}$ చే గుణించగా, చాపము కొలత θ గా గల సెక్టరు వైశాల్యం లభిస్తుందని మనకి తెలుస్తుంది. దీనిని సూత్ర రూపంలో కింది విధంగా రాయవచ్చును.

$$\text{సెక్టరు వైశాల్యం (A)} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$\text{ఈ సూత్రం నుండి } \frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{360} \quad ; \quad \text{అనగా } \frac{\text{సెక్టరు వైశాల్యము}}{\text{వృత్త వైశాల్యము}} = \frac{\theta}{360}$$

వృత్త చాపము యొక్క పొడవు (Length of an arc)

కింద చూపిన విధంగా సమాన వ్యాసార్థాలుగల వృత్తములలో మందమైన గీతతో చూపబడిన వృత్త చాపముల యొక్క పొడవులను పరిశీలించి కింది పట్టికను పూర్తి చేయండి.

$\theta = 360^\circ$  $l_1 = 2\pi r$	$\theta = 180^\circ$  $l_2 = \frac{1}{2} \times 2\pi r$	$\theta = 90^\circ$  $l_3 = \frac{1}{4} \times 2\pi r$	$\theta = 60^\circ$  $l_4 = \frac{1}{6} \times 2\pi r$
---	--	--	---

పటం 7.27

వృత్త పరిధి = $2\pi r$			
వృత్త చాపము పొడవు	వృత్త చాపము కొలత (θ)	$\frac{\theta}{360}$	వృత్త చాపము పొడవు (l)
l_1	360°	$\frac{360}{360} = 1$	$1 \times 2\pi r$
l_2	180°	$\frac{180}{360} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 2\pi r$
l_3	90°	$\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 2\pi r$
l_4	60°		
l	θ	$\frac{\theta}{360}$	$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

పై పట్టిక నుండి వృత్త పరిధిని $\frac{\theta}{360}$ చే గుణించగా చాపము కొలత θ గాగల వృత్త చాపము పొడవు లభిస్తుంది? దీనిని సూత్రరూపంలో కింది విధంగా రాయవచ్చును.


$$\text{వృత్త చాపము పొడవు } (l) = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r$$

ఈ సూత్రము నుండి

$$\therefore \frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{360}$$

$$\frac{\text{వృత్త చాపము పొడవు}}{\text{వృత్తపరిధి}} = \frac{\theta}{360}$$

ఉదా. (2) పటంలోని వృత్తములో P వృత్తకేంద్రం,
వ్యాసార్థం 6 సెం.మీ. రే.ఖం. QR స్పర్శరేఖ
PR = 12 సెం.మీ. అయిన ఛాయాంశిత
భాగము యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి.
($\sqrt{3} = 1.73$)



పటం 7.29

సాధన : వృత్తము యొక్క స్పర్శ బిందువు గుండా గీసిన వ్యాసార్థం స్పర్శరేఖకు లంబంగా ఉంటుంది.

$\therefore \Delta PQR$ లో, $\angle PQR = 90^\circ$, $PQ = 6$ సెం.మీ., $PR = 12$ సెం.మీ.

$$\therefore PQ = \frac{PR}{2}$$

ఒక వేళ లంబకోణ త్రిభుజము యొక్క ఒక భుజం కర్ణంలో సగం పొడవు కల్గిఉన్నట్లయితే ఆ భుజానికి ఎదురుగా ఉన్న కోణం కొలత 30° ఉంటుంది.

$\therefore \angle R = 30^\circ$ మరియు $\angle P = 60^\circ$

$$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ \text{ సిద్ధాంతం నుండి, } QR = \frac{\sqrt{3}}{2} \times PR = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12 = 6\sqrt{3}$$

$$QR = 6\sqrt{3} \text{ సెం.మీ.}$$

$$\therefore A(\Delta PQR) = \frac{1}{2} QR \times PQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6$$

$$= 18\sqrt{3} = 18 \times 1.73$$

$$= 31.14 \text{ సెం.మీ.}^2$$

$$\text{వృత్త సెక్టరు వైశాల్యం} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$\therefore A(P-QAB) = \frac{60}{360} \times 3.14 \times 6^2$$

$$= \frac{1}{6} \times 3.14 \times 6 \times 6 = 3.14 \times 6$$

$$= 18.84 \text{ సెం.మీ.}^2$$

$$\text{ఛాయాంశిత భాగ వైశాల్యం} = A(\Delta PQR) - A(P-QAB)$$

$$= 31.14 - 18.84$$

$$= 12.30 \text{ సెం.మీ.}^2$$


$$\text{ఛాయాంశిత భాగ వైశాల్యం} = 12.30 \text{ సెం.మీ.}^2$$

ఉదా. (3) ఇచ్చిన పటంలో ABCD చతురస్రంలోని ప్రతి భుజం 7 సెం.మీ., D కేంద్రంగా తీసుకొని DA వ్యాసార్థంతో గీసిన సెక్టరు D - AXC, అయిన ఛాయాంకిత భాగ వైశాల్యమును కనుగొనుటకు ఖాళీలను నింపి ఉదాహరణను పూర్తి చేయండి.

సాధన :

$$\begin{aligned} \text{చతురస్ర వైశాల్యము} &= \boxed{} \text{ (నూత్రము)} \\ &= \boxed{} \\ &= 49 \text{ చ.సెం.మీ.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{వృత్తసెక్టరు (D- AXC) వైశాల్యము} &= \boxed{} \text{ (నూత్రము)} \\ &= \frac{\boxed{}}{360} \times \frac{22}{7} \times \boxed{} \\ &= 38.5 \text{ చ.సెం.మీ.} \end{aligned}$$



పటం 7.30

$$\begin{aligned} \text{ఛాయాంకిత భాగ వైశాల్యము} &= \boxed{} \text{ యొక్క వైశాల్యము} - \boxed{} \text{ యొక్క వైశాల్యం} \\ &= \boxed{} \text{ చ.సెం.మీ.} - \boxed{} \text{ చ.సెం.మీ.} \\ &= \boxed{} \text{ చ.సెం.మీ.} \end{aligned}$$




అభ్యాసమాలిక 7.3



1. వృత్త వ్యాసార్థము 10 సెం.మీ. వృత్త చాపము కొలత 54° అయిన ఆ చాపము ద్వారా ఏర్పడిన సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)
2. ఒక వృత్తములోని వృత్త చాపము కొలత 80° మరియు వ్యాసార్థం 18 సెం.మీ., అయిన వృత్త చాపము పొడవును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)
3. వృత్త సెక్టరు వ్యాసార్థము 3.5 సెం.మీ. వృత్తచాపము పొడవు 2.2 సెం.మీ. అయిన వృత్త సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి.
4. వృత్త వ్యాసార్థం 10 సెం.మీ. దాని సెక్టరు వైశాల్యము 100 చ.సెం.మీ., అయిన దాని అధిక వృత్త సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)
5. 15 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గల వృత్తము యొక్క ఒక సెక్టరు వైశాల్యము 30 చ.సెం.మీ. అయిన దానికి సంబంధించిన వృత్త చాపము పొడవును కనుగొనండి.


6. పక్క పటంలోని వృత్త వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ. మరియు $m(\text{చాపము MBN}) = 60^\circ$
అయిన (1) వృత్తవైశాల్యమును కనుగొనండి.
(2) $A(O - MBN)$ ను కనుగొనండి.
(3) $A(O - MCN)$ ను కనుగొనండి.




పటం 7.31



7. 3.4 సెం.మీ. వ్యాసార్థంగాగల సెక్టరు చుట్టుకొలత 12.8 సెం.మీ. అయిన సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి.



పటం 7.33



పటం 7.32


8. పటంలో, O బిందువు వృత్త కేంద్రం $\angle ROQ = \angle MON = 60^\circ$, $OR = 7$ సెం.మీ., $OM = 21$ సెం.మీ., అయిన చాపము RXQ చాపము MYN ల పొడవులను కనుగొనండి. ($\pi = \frac{22}{7}$)

9. పటంలో $A(P-ABC) = 154$ చ.సెం.మీ. మరియు

వృత్త వ్యాసార్థం 14 సెం.మీ. అయినచో

(1) $\angle APC$ యొక్క కొలతను కనుగొనండి.

(2) చాపము ABC పొడవును కనుగొనండి.




పటం 7.34

10. వృత్తవ్యాసార్థము 7 సెం.మీ. ఒక వేళ చాపముల యొక్క కొలతలు కింది విధంగా ఉన్నట్లయితే సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి.

(1) 30° (2) 210° (3) 3 లంబకోణము

11. అల్పసెక్టరు వైశాల్యము 3.85 చ.సెం.మీ. దాని కేంద్రీయ కోణకొలత 36° అయిన వృత్త వ్యాసార్థమును కనుగొనండి.

12. పటంలో $\square PQRS$ అనేది దీర్ఘచతురస్రం $PQ = 14$ సెం.మీ., $QR = 21$ సెం.మీ., అయిన పటంలో చూపిన x, y మరియు z భాగముల యొక్క వైశాల్యములను కనుగొనండి.



పటం 7.35

13. $\triangle LMN$ అనేది ఒక సమబాహు త్రిభుజం $LM = 14$ సెం.మీ.


త్రిభుజ ప్రతి శీర్షబిందువును కేంద్ర బిందువుగా తీసుకొని 7 సెం.మీ. వ్యాసార్థంతో పటంలో చూపిన విధంగా మూడు సెక్టర్లను గీసితిమి వాటి నుండి.

(1) $A(\triangle LMN) = ?$

(2) ఒక సెక్టరు వైశాల్యమును కనుగొనండి.

(3) మూడు సెక్టర్ల మొత్తం వైశాల్యమును కనుగొనండి.

(4) గీతలు గీయబడిన భాగము యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి.



పటం 7.36

$$\begin{aligned}
\text{వృత్తఖండము AXB వైశాల్యము} &= \text{సెక్టరు (O - AXB) వైశాల్యము} - A(\Delta OAB) \\
&= 37.68 - 36 \\
&= 1.68 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$


పద్ధతి II :

$$\begin{aligned}
\text{వృత్తఖండము AXB వైశాల్యము} &= r^2 \left[\frac{\pi\theta}{360} - \frac{\sin\theta}{2} \right] \\
&= 12^2 \left[\frac{3.14 \times 30}{360} - \frac{\sin 30}{2} \right] \\
&= 144 \left[\frac{3.14}{12} - \frac{1}{2 \times 2} \right] \\
&= \frac{144}{4} \left[\frac{3.14}{3} - 1 \right] \\
&= 36 \left[\frac{3.14 - 3}{3} \right] \\
&= \frac{36}{3} \times 0.14 = 12 \times 0.14 \\
&= 1.68 \text{ చ.సెం.మీ..}
\end{aligned}$$

ఉదా. (2) P కేంద్రంగా గల వృత్త వ్యాసార్థం 10 సెం.మీ. జ్యా AB ద్వారా వృత్త కేంద్రంతో లంబకోణము ఏర్పరచిన అల్ప వృత్త ఖండము యొక్క మరియు అధిక వృత్తఖండము యొక్క వైశాల్యములను కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)

సాధన : $r = 10$ సెం.మీ., $\theta = 90^\circ$, $\pi = 3.14$

$$\begin{aligned}
\text{వృత్త సెక్టరు వైశాల్యము} &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\
&= \frac{90}{360} \times 3.14 \times 10^2 \\
&= \frac{1}{4} \times 314 \\
&= 78.5 \text{ చ.సెం.మీ.} \\
A(\Delta APB) &= \frac{1}{2} \times \text{భూమి} \times \text{ఎత్తు} \\
&= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \\
&= 50 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$



పటం 7.41

$$\begin{aligned}
\text{అల్పవృత్తఖండము వైశాల్యము} &= \text{సెక్టరు వైశాల్యము} - \text{త్రిభుజ వైశాల్యము} \\
&= 78.5 - 50 \\
&= 28.5 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
\text{అధిక వృత్త ఖండము వైశాల్యము} &= \text{వృత్త వైశాల్యము} - \text{అల్పవృత్తఖండ వైశాల్యం} \\
&= 3.14 \times 10^2 - 28.5 \\
&= 314 - 28.5 \\
&= 285.5 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$

ఉదా. (3) 14 సెం.మీ. వ్యాసార్థంగాగల వృత్తములో ఒక క్రమ షడ్భుజిని అంతర్లిఖించబడిన షడ్భుజి బాహ్య మరియు వృత్తము యొక్క అంతర భాగం యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = \frac{22}{7}$, $\sqrt{3} = 1.732$)

సాధన : క్రమషడ్భుజి భుజము = క్రమషడ్భుజి పరివృత్త వ్యాసార్థము.

$$\begin{aligned}
\therefore \text{క్రమషడ్భుజి భుజము} &= 14 \text{ సెం.మీ.} \\
\text{క్రమషడ్భుజి వైశాల్యము} &= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{భుజము})^2 \\
&= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 14^2 \\
&= 509.208 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{వృత్త వైశాల్యము} &= \pi r^2 \\
&= \frac{22}{7} \times 14 \times 14 \\
&= 616 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$



పటం 7.42


$$\begin{aligned}
\text{క్రమషడ్భుజి బాహ్య మరియు వృత్తము యొక్క అంతర భాగము యొక్క వైశాల్యము} &= \text{వృత్త వైశాల్యము} - \text{క్రమషడ్భుజి వైశాల్యము} \\
&= 616 - 509.208 \\
&= 106.792 \text{ చ.సెం.మీ.}
\end{aligned}$$



అభ్యాసమాలిక 7.4




- పటంలో A కేంద్రంగాగల వృత్తంలో $\angle ABC = 45^\circ$, $AC = 7\sqrt{2}$ సెం.మీ., అయిన వృత్తఖండము BXC వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$, $\sqrt{2} = 1.41$)



పటం 7.43

-




పటం 7.44


పటం 7.44 లో O కేంద్రంగాగల వృత్తము కలదు, $m(\text{చాపము PQR}) = 60^\circ$, $OP = 10$ సెం.మీ., అయిన ఛాయాంకిత భాగము యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)



3. A కేంద్రంగాగల వృత్తములో $\angle PAR = 30^\circ$
 $AP = 7.5$ అయిన, వృత్తఖండము PQR
యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$)



పటం 7.45



పటం 7.46

4. O కేంద్రంగాగల వృత్తములో PQ అనేది జ్యా
 $\angle POQ = 90^\circ$, మరియు ఛాయాంకితము చేయబడిన
భాగము వైశాల్యము 114 చ.సెం.మీ. అయిన వృత్త
వ్యాసార్థమును కనుగొనండి.
($\pi = 3.14$)


5. 15 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గా గల వృత్తము యొక్క జ్యా PQ వృత్త కేంద్రం వద్ద 60° కోణము చేస్తుంది. ఆ జ్యా వలన ఏర్పడిన
అధిక వృత్త ఖండము మరియు అల్ప వృత్త ఖండముల వైశాల్యాలను కనుగొనండి. ($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)

సంకీర్ణప్రశ్న సంగ్రహము 7

1. కింద ఇచ్చిన ఐచ్ఛికములలోని సరియైన ఐచ్ఛికమును ఎన్నుకోండి.
- (1) ఒక వేళ వృత్తపరిధి, వృత్త వైశాల్యముల నిష్పత్తి 2:7 అయిన వృత్తపరిధి ఎంత?
(A) 14π (B) $\frac{7}{\pi}$ (C) 7π (D) $\frac{14}{\pi}$
 - (2) 44 సెం.మీ. ల పొడవు గల వృత్త చాపము కొలత 160° అయిన ఆ వృత్తపరిధి ఎంత?
(A) 66 సెం.మీ. (B) 44 సెం.మీ. (C) 160 సెం.మీ. (D) 99 సెం.మీ.
 - (3) చాపము కొలత 90° మరియు వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ. గల వృత్త సెక్టరు చుట్టు కొలతను కనుగొనండి.
(A) 44 సెం.మీ. (B) 25 సెం.మీ. (C) 36 సెం.మీ. (D) 56 సెం.మీ.
 - (4) భూతల వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ. ఎత్తు 24 సెం.మీ. గాగల శంకువు వక్రతల వైశాల్యము ఎంత?
(A) 440 సెం.మీ.^2 (B) 550 సెం.మీ.^2 (C) 330 సెం.మీ.^2 (D) 110 సెం.మీ.^2
 - (5) 5 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గల స్థూపము వక్రతల వైశాల్యము 440 సెం.మీ.^2 అయిన ఆ స్థూపము యొక్క ఎత్తు ఎంత?
(A) $\frac{44}{\pi}$ సెం.మీ. (B) 22π సెం.మీ. (C) 14π సెం.మీ. (D) $\frac{22}{\pi}$ సెం.మీ.
 - (6) ఒక శంకువును కరిగించి దానిభూతల వ్యాసార్థానికి సమానమైన వ్యాసార్థంగల స్థూపమును తయారు చేశారు. స్థూపము యొక్క ఎత్తు 5 సెం.మీ. అయిన ఆ శంకువు ఎత్తు ఎంత?
(A) 15 సెం.మీ. (B) 10 సెం.మీ. (C) 18 సెం.మీ. (D) 5 సెం.మీ.

- (7) 0.01 సెం.మీ. భుజంగా గల ఘనము యొక్క ఘనపరిమాణం ఎన్ని ఘ.సెం.మీ.?
 (A) 1 (B) 0.001 (C) 0.0001 (D) 0.000001
- (8) ఒక ఘనపు మీటరు ఘనపరిమాణము గల ఘనము యొక్క భుజము పొడవు ఎంత?
 (A) 1 సెం.మీ. (B) 10 సెం.మీ. (C) 100 సెం.మీ. (D) 1000 సెం.మీ.
2. ఒక శంఖుచ్ఛేద ఆకృతిలోగల బట్టలు ఉతికే టబ్బు ఎత్తు 21 సెం.మీ. టబ్బు యొక్క రెండు వృత్తాకార భాగముల వ్యాసార్థాలు 20 సెం.మీ., 15 సెం.మీ. అయిన ఆ టబ్బులో ఎన్ని లీటర్ల నీరు పడుతుంది? ($\pi = \frac{22}{7}$)
- 3*. 1 సెం.మీ. వ్యాసార్థముగల చిన్న ప్లాస్టిక్ గోళీలను కరిగించి ఒక స్థూపాకార డబ్బాను తయారు చేశారు. డబ్బా యొక్క మందము 2 సెం.మీ. ఎత్తు 90 సెం.మీ. మరియు 30 సెం.మీ. బాహ్యవ్యాసార్థం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ డబ్బా తయారి కొరకు ఎన్ని గోళీలను కరిగించిరి?
4. పొడవు 10 సెం.మీ., వెడల్పు 11 సెం.మీ. మరియు 10 సెం.మీ. ఎత్తుగల లోహ దీర్ఘఘనము నుండి 2 మి.మీ. మందము, 2 సెం.మీ. వ్యాసం గల కొన్ని నాణెములను తయారు చేసినట్లయితే ఎన్ని నాణెములు తయారువుతాయి?
5. ఒక రోలర్ యొక్క వ్యాసము 120 సెం.మీ. పొడవు 84 సెం.మీ. ఒక మైదానంను ఒకసారి చదును చేయుట రోలరు 200 చుట్టలో పూర్తవుతుంది. అయిన ప్రతి చదరపు మీటరుకు 10 రూపాయల చొప్పున ఆ మైదానము చదును చేయుటకు మొత్తం ఎంత ఖర్చవుతుందో కనుగొనండి.
6. వ్యాసము 12 సెం.మీ. 0.01 మీ మందము గల ఒక లోహపు గుళ్ళగోళము కలదు. అయిన ఆ గోళము యొక్క బాహ్యభాగ తలవైశాల్యమును కనుగొనండి. మరియు లోహము యొక్క సాంద్రత ప్రతి ఘనపు మీటరుకు 8.88 గ్రాములు అయిన ఆ గోళము యొక్క ద్రవ్యరాశిని కనుగొనండి.
7. ఒక పొడవైన స్థూపాకార బకెట్టు పుత్త తల వ్యాసము 28 సెం.మీ. ఎత్తు 20 సెం.మీ. ఈ బకెట్టును మొత్తం ఇసుకతో నింపారు. ఈ బకెట్టులోని ఇసుకను నేలపై శంకాకారంలో పోసిరి. ఇసుక శంకువు ఎత్తు 14 సెం.మీ. ఉన్నట్లయితే శంకువు పుత్త తల వైశాల్యమును కనుగొనండి.
8. ఒక లోహ గోళము యొక్క వ్యాసార్థము 9 సెం.మీ. దానిని కరిగించి 4 మి.మీ. వ్యాసముగా గల లోహపు తీగను తయారు చేసిన ఆ తీగయొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుంది?
9. 6 సెం.మీ. వ్యాసార్థంగా గల ఒక సెక్టరు వైశాల్యము ఒక 15π సెం.మీ.², అయిన సెక్టరు చాపము యొక్క కొలత మరియు వృత్తచాపము పొడవును కనుగొనండి.


10.



పటం 7.47

పటంలో P కేంద్రంగాగల వృత్తములో రే.ఖం. AB ఒక జ్యా PA = 8 సెం.మీ., జ్యా AB పుత్త కేంద్రం నుండి 4 సెం.మీ. దూరంలో ఉన్నట్లయితే రేఖాంశితము చేయబడిన (గీతలు గీయబడిన) భాగము యొక్క వైశాల్యమును కనుగొనండి.
 ($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)

12.



పటం 7.49

O మరియు P కేంద్రాలు గాగల వృత్తములు A బిందువు వద్ద అంతరంగా స్పృశించుకుంటున్నాయి. ఒక వేళ $BQ = 9$, $DE = 5$, అయిన వృత్త వ్యాసార్థమును కనుగొనుటకు కింది కృత్యమును చేయండి.

సాధన : పెద్ద వృత్త వ్యాసార్థమును R అనుకొనుము.

చిన్న వృత్త వ్యాసార్థమును r అనుకొనుము.

OA, OB, OC మరియు OD పెద్ద వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థాలు

$$\therefore OA = OB = OC = OD = R$$

$$PQ = PA = r$$

$$OQ = OB - BQ = \boxed{}$$

$$OE = OD - DE = \boxed{}$$

P కేంద్రంగల వృత్తములో రెండు జ్యాల అంతర ఖండన ధర్మానుసారము

$$OQ \times OA = OE \times OF$$

$$\boxed{} \times R = \boxed{} \times \boxed{} \quad (\because OE = OF)$$

$$R^2 - 9R = R^2 - 10R + 25$$

$$R = \boxed{}$$

$$AQ = 2r = AB - BQ$$

$$2r = 50 - 9 = 41$$

$$r = \boxed{} = \boxed{}$$

□□□



5. $(-7, 0)$ 6. (1) $a\sqrt{2}$ (2) 13 (3) $5a$ 7. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
 8. (1) అవును, విషమబాహు త్రిభుజం (2) కాదు. (3) అవును, సమబాహు త్రిభుజం 9. $k = 5$
 13. 5, $2\sqrt{13}$, $\sqrt{37}$ 14. $(1, 3)$ 16. $\left(\frac{25}{6}, \frac{13}{6}\right)$, వ్యాసార్థం = $\frac{13\sqrt{2}}{6}$ 17. $(7, 3)$
 18. సమాంతర చతుర్భుజం 19. $A(20, 10)$, $P(16, 12)$, $R(8, 16)$, $B(0, 20)$. 20. $(3, -2)$
 21. $(7, 6)$ మరియు $(3, 6)$ 22. 10 మరియు 0

అధ్యాయం 6 త్రికోణమితి

అభ్యాసమాలిక 6.1

1. $\cos\theta = \frac{24}{25}$; $\tan\theta = \frac{7}{24}$ 2. $\sec\theta = \frac{5}{4}$; $\cos\theta = \frac{4}{5}$
 3. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{41}{9}$; $\sin\theta = \frac{9}{41}$ 4. $\sec\theta = \frac{13}{5}$; $\cos\theta = \frac{5}{13}$; $\sin\theta = \frac{12}{13}$
 5. $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta} = \frac{1}{2}$

అభ్యాసమాలిక 6.2

1. చర్చి యొక్క ఎత్తు 80 మీటర్లు
 2. ఓడ, దీవస్థంబంల మధ్య దూరం 51.60 మీటర్లు
 3. రెండవ భవన ఎత్తు $(10 + 12\sqrt{3})$ మీటర్లు
 4. క్షితిజ సమాంతర తలంతో చేయుకోణం 30°
 5. చెట్టు యొక్క ఎత్తు $(40 + 20\sqrt{3})$ మీటర్లు
 6. గాలిపటం దారం యొక్క పొడవు 69.20 మీటర్లు

సంకీర్ణ ప్రశ్నసంగ్రహము 6

1. (1) A (2) B (3) C (4) A
 2. $\cos\theta = \frac{60}{61}$ 3. $\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$; $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $\operatorname{cosec}\theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$; $\sec\theta = \sqrt{5}$; $\cot\theta = \frac{1}{2}$
 4. $\sin\theta = \frac{5}{13}$; $\cos\theta = \frac{12}{13}$; $\operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{5}$; $\tan\theta = \frac{5}{12}$; $\cot\theta = \frac{12}{5}$
 6. భవనం యొక్క ఎత్తు $16\sqrt{3}$ మీటర్లు
 7. దీవస్థంబం నుండి ఓడ యొక్క దూరం $\frac{100\sqrt{3}}{3}$ మీటర్లు
 8. భవనం యొక్క ఎత్తు $(12 + 15\sqrt{3})$ మీటర్లు
 9. నిచ్చిన యొక్క రెండవ చివర నేల నుండి ఎక్కువలో ఎక్కువ 20.80 మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది.

10. విమానం నేల నుండి ఎక్కువలో ఎక్కువ 68.40 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండెను.

అధ్యాయం 7 క్షేత్రమితి

అభ్యాసమాలిక 7.1

1. 11.79 ఘ.సెం.మీ. 2. 113.04 ఘ.సెం.మీ. 3. 1413 చ.సెం.మీ. ($\pi=3.14$ తీసుకొనిన) 4. 616 చ.సెం.మీ.
5. 21 సెం.మీ. 6. 12 జగ్గులు 7. 5 సెం.మీ. 8. 273π చ.సెం.మీ. 9. 20 గోలీలు
10. 94.20 ఘ.సెం.మీ., 103.62 చ.సెం.మీ. 11. 5538.96 చ.సెం.మీ., 38772.72 ఘ.సెం.మీ.
12. 1468.67π ఘ.సెం.మీ.

అభ్యాసమాలిక 7.2

1. 10.780 లీటర్లు 2. (1) 628 చ.సెం.మీ. (2) 1356.48 చ.సెం.మీ. (3) 1984.48 ఘ.సెం.మీ.

అభ్యాసమాలిక 7.3

1. 47.1 చ.సెం.మీ. 2. 25.12 సెం.మీ. 3. 3.85 చ.సెం.మీ. 4. 214 చ.సెం.మీ. 5. 4 సెం.మీ.
6. (1) 154 చ.సెం.మీ. (2) 25.7 చ.సెం.మీ. (3) 128.3 చ.సెం.మీ. 7. 10.2 చ.సెం.మీ.
8. 7.3 సెం.మీ. ; 22 సెం.మీ. 9. (1) 90° (2) 22 సెం.మీ.
10. (1) 12.83 చ.సెం.మీ. (2) 89.83 చ.సెం.మీ. (3) 115.5 చ.సెం.మీ. 11. 3.5 సెం.మీ.
12. $x = 154$ చ.సెం.మీ. ; $y = 38.5$ చ.సెం.మీ.. ; $z = 101.5$ చ.సెం.మీ..
13. (1) 84.87 చ.సెం.మీ. (2) 25.67 చ.సెం.మీ. (3) 77.01 చ.సెం.మీ. (4) 7.86 చ.సెం.మీ.





అభ్యాసమాలిక 7.4

1. 3.72 చ.సెం.మీ. 2. 9.08 చ.సెం.మీ 3. 0.65625 చ.యూ. 4. 20 సెం.మీ.
5. 20.43 చ.సెం.మీ. ; 686.07 చ.సెం.మీ.

సంకీర్ణ ప్రశ్నసంగ్రహము 7

1. (1) A, (2) D, (3) B, (4) B, (5) A, (6) A, (7) D, (8) C.
2. 20.35 లీటర్లు 3. 7830 గోళీలు 4. 2800 నాణెములు ($\pi = \frac{22}{7}$ తీసుకొనిన) 5. 6336 రూపాయలు
6. 452.16 చ.సెం.మీ. ; 3385.94 గ్రా. 7. 2640 చ.సెం.మీ. 8. 108 మీటర్లు
9. 150° ; 5π సెం.మీ. 10. 39.28 చ.సెం.మీ.





- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.




पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharti.in, www.balbharti.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.



ebalbharti

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर - ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९५५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपूर - ☎ २५४७७९६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५



మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తక నిర్మితి మరియు
పాఠ్యప్రణాళిక పరిశోధన సంస్థ,
పుణె-411 004.

తెలుగు గణిత ఇ. 10 వీ భాగ-2 ₹ 77.00