

حساب پاڻو-I

درجو نائون

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a^2 - b^2) = (a+b)(a-b)$$



پارتيه سنوڌان

باب - چوٿون الف

بنيادي فرض

قلم 51A

بنيادي فرض : پارت جي هر هڪ ناگرڪ جو فرض آهي ته :

(الف) هو پارت جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي تراني، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.

(ب) آدرش ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اُتساه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.

(پ) پارت جي ايڪٽا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.

(پ) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سيوا ۾ ٽپي پوندو.

(پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪٽا جي پاونا پئدا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪيترواد جي پيداڻ کان پري هوندي. اهڙيون رسمن جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.

(ت) پارت جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجهندو.

(ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندو.

(ت) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، چاچ جوڇ ۽ سڌاري جي پاونا کي اهميت ڏيندو.

(ث) عام ملڪيت کي سلامت رکندو ۽ هنسا کان پري رهندو.

(ت) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ۾ اڳتي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جنهن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.

(ڪر) ماءُ يا پيءُ يا ڀالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر چهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

سرڪاري فيصلو نمبر : اڀياس ۲۱۱۶ (پرڪر ۱۶/۱۳) ايس. ڊي. ۴ تاريخ ۱۶-۰۴-۲۵ موجب استايت ڪيل ڪو آرڊينينٽنگ ڪاميٽيءَ جي تا. ۱۷-۳-۳ جي ميٽنگ ۾ هي درسي ڪتاب طيءَ ڪرڻ لاءِ مختصر منظوري ڏني ويئي.

حساب

پاڻو I-

درجو نائون



مھاراشٽر راجيہ پائيم پستڪ نرمتي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي



پنھنجي سمارٽ فون ۾ DIKSHA APP ذريعي درسي ڪتاب جي پھرين صفحي واري Q.R. Code ذريعي Digital درسي ڪتاب ۽ ھرھڪ سبق ۾ آيل Q.R. Code ذريعي ان سبق بابت پڙھڻ / پڙھائڻ لاءِ ڪارائتيون لنڪس ملنديون.

چاپو پھريون : 2017
 سڌاريل چاپو : 2022

© مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ نرمتي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل،
 پُٺي - ۱۰۰۴/۱۴.
 مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ نرمتي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل، هن
 ڪتاب جا سڀ حق واسطا محفوظ ٿورڪي. منڊل جي ڊائريڪٽر جي لکيل
 اجازت کان سواءِ هن ڪتاب جو ڪوبه ٽڪر، ڇپائي نٿو سگهجي.

حساب وشيم ماهر ڪاميٽي


ڊاڪٽر منٽلا نارڙيڪر (اڌيڪش)
 ڊاڪٽر جتسري آتري (ميمبر)
 شري رماڪانت سرودي (ميمبر)
 شري داداسو سرڙي (ميمبر)
 شري سنديپ پنڃ پائي (ميمبر)
 شريمتي لٽا ٽڙيڪر (ميمبر)
 شريمتي اڄولا ڳوڙ بولي (ميمبر - سيڪريٽري)

حساب وشيم ڪاربه گت ميمبر

شري سائر سڪڙي شري شريڪانت رتنپارڪي شري سوريڪانت شهاڻي شري سرپش دانئي شريمتي سورنا ديشپاندي شري پرڪاش ڪاپسي شري سلبر هاشمي شريمتي آريا پڙي شري ملند پاڪري شري گيانيشور ماهاڙڪر شري لڪشمڻ داوڻڪر شري سڌير پائيل شري گڻيش ڪولتي شري راجارام پنڊگر شريمتي روهڻي شرڪي شري بنسي هوالي شري پرديپ ڳوڏسي شري رويندر ڪنداري شري راجيندر چوڌري	شري اُميش رڙي شري چندن ڪلڪرني شريمتي انبينا جاوي شري باگيشوري چوهاڻ شريمتي پوجا جادو شري اڳيا پريٽ شري ڪلياڻ ڪڙيڪر شري سنديش سوناوڻي شري سڄيت شندي شري هنومنٽ جڳتاڀ شري شريپاد ديشپاندي شري پرتاپ ڪاشد شري ڪاشيرام بوساني شري ڀڳوڙي شري انساڙ شيخ شري راما وهنياڙڪر شري ڀرمود نومبري شري پرڪاش جهيندي
---	--

مُڪيم سنيوچڪ: شريمتي اڄولا شريڪانت ڳوڙ بولي
 انڇارج آفيسر حساب
 پائيه پُستڪ منڊل پُٺي
 ٻاهريون صفحو ۽ سجاوٽ: ڏنشوري موڪاشي، پُٺي
 ڪمپيوٽر آريڪن: شري سنديپ ڪوڙي ممبئي
 چترڪار: ڏنشوري موڪاشي

نرمتي: شري سڄيتانند آڙڙي، مڪيم نرمتي اڌڪاري
 شري سنجيه ڪامبلي، نرمتي اڌڪاري
 شري پرشانت هرڻي، نرمتي سهايڪ اڌڪاري
 ترجمو ڪندڙ: شري وجيه منڱاڻي
 چڪاس ڪندڙ: اشوڪ مُڪتا
 ڪاغذ: 70 جي. ايس. ايم ڪريٽر وو.
 ٽائيپ سيٽنگ: شريمتي شويلا لعلچنداڻي
 سنيوچڪ: شريمتي ڪيتڪي جاني
 انڇارج آفيسر سنڌي
 سنيوچن سهاي: شريمتي گيتا گڻيش ناڪر
 ڪاپي رائيٽر سنڌي
 ڇاپيندڙ: ATHARVA PRINT CREATION, PUNE
 پرنٽنگ آرڊر: N/PB/2017-18/1,000



پرڪاشڪ

ووِيڪ اُتار ڳوساوي، ڪنٽرولر
 پائيه پُستڪ نرمتي منڊل،
 پرياديوي، ممبئي - ۲۵.

شري و. ڊ. ڳوڙ بولي (نينڊ ڏنل ميمبر)
 شريمتي تروبين پوپٽ (نينڊ ڏنل ميمبر)
 شريمتي پراجڪتا گوکلي (نينڊ ڏنل ميمبر)

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور
خودمختيار سماجواڊي سَرو ڌرم ۽ سر-پاؤ وارو
لوڪشاهي گُڙاجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو
ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگرڪن کي :

سماجڪ، آرٿڪ ۽ راجنيتڪ نڀاءُ، ويچار، اظهار،
وشواس، شرڌا ۽ اُڀاسنا جي آزاديءَ درجي ۽ موقعي
جي سمانتا؛ خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن
سڀني ۾ شخصي سؤمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي
اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ پائڻيچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ ڇويهين
نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءُ سنوڌان
سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي
ارپڻ ڪريون ٿا.

راشتر گيت

جَنَ گَرُ مَنَ اَڌيناڻڪَ جِيَهَ هِي،
پَارَتَ پَاڳِيَهَ وَڌاتا
پَنجَابَ، سَنڌُ، گُجراتَ، مَراڻا،
دِراوڙَ، اُتڪَلِ، بَنگَ،
وَنڌِيَهَ، هِماچَلِ، يَمُنا، گَنگا،
اُچَچَلِ، جَلِ ڌَ تَرَنگَ،
تَوَ شُپَ نامي جاڳي،
تَوَ شُپَ آشيَسَ ماڳي،
گماهي تَوَ جِيَهَ - گاما،
جَنَ گَرُ - مَنگَلِ داڻڪَ جِيَهَ هِي
پَارَتَ پَاڳِيَهَ وَڌاتا،
جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي،
جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ هِي،

پرڳيا

’پارت منهنجو ديش آهي. سڀ
پارتواسي منهنجا ڀائر ۽ ڀينر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي ٿورو آهي. مان سدائين ان جي
لائق ٿيڻ جو جتن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن ماڻهن، استادن ۽
سڀني بزرگن جو سمن ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرڳيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سڄو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
۾ ئي منهنجو سک سميل آهي.’

پرستاونو

شاگرد دوستو،

درجي نائين جي ڪلاس ۾ توهان سڀني جو سوانت! پرائمري تعليم جي اڀياسڪرم پورو ڪري توهان سيڪنڊري تعليم جي شروعات ڪري رهيا آهيو. درجي نائين حسابن جي اڀياس لاءِ هڪ ئي درسي ڪتاب هو. هاڻي حساب ڀاڱو - I ۽ حساب ڀاڱو - II انهن ٻن ڪتابن جو اڀياس ڪرڻو آهي.

حساب ڀاڱو I ڪتاب ۾ عدد گيان الجبرا، وهناري حساب، مالي رقائون ۽ ڄاڻ جو بندوبست انهن ڪيترن جي گيان جي ڄاڻ توهان کي ٿيندي. اهو ڀاڱو سڀني شاگردن کي انيڪ ڪيترن ۾ اڀيوگي ثابت ٿيندو الجبرا ۽ عدد شاستر جو اڀياس اڻڄ تعليم جي اڀياس لاءِ ضروري آهي.

هن درسي ڪتاب ۾ ويچار سمجھڻ لاءِ انيڪ مشغوليون ڏنل آهن. دؤر لاءِ ۽ اڀياسن ۾ به مشغوليون ڏنل آهن اهي مشغوليون توهان ڪريو. انٽرنيٽ جي مدد سان ڪتاب ۾ ڏنل ويچار ڌارائن بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو. مشغولي ڪندي، مثال حل ڪندي، نتيجا ڪڍندي توهان کي دوستن / ساهيڙين سان چرچا ڪرڻي آهي. درسي ڪتاب جو اونهو اڀياس، مشغولي ڪندي سڪڻ ۽ اڀياس ڪرڻ انهن ٽن سوتن سان توهانجي حسابن جو سفر ڪندي خوش ٿيندي پار پئجي ويندو.

اچو هاڻي ماسترن، مائٽن، دوستن، انٽرنيٽ سڀني جي مدد سان اڀياس ڪريون. ان اڀياس لاءِ توهان کي خوب شپ ڪامنائون!

(ڊا. سنييل مگر)

سنچالڪ

مهاراشتر راجيه پائيه پستڪ

نرمتي و اڀياسڪرم سنشودن منڊل پٽي.

پٽي

تاريخ: ۲۸ اپريل ۲۰۱۷، اڪڻ ٿيڃ،

پارتيه سوريه: ۸ ويساڪ ۱۹۳۹

درجي 9 ۾ حساب پاڻو: I آڀياس ڪرم مان هيٺ ڏنل ليافتون ٻار حاصل ڪندا.

ڪينئر	پاڻو	لياقتي بيان
1. عدد بيان	1.1 سيٽ 1.2 حقيقي عدد ۽ ٻسگهي غير ناطف	• عددي سرشتي جا سيٽ ۽ اپ سيٽ طيءَ ڪري سگهڻ • محدود ۽ لحد سيٽ سڃاڻي سگهڻ • سيٽ ڏيکارڻ لاءِ وين شڪل جو اڀيوڱ ڪري سگهڻ • سيٽن جا مثال تيار ڪري سگهڻ • عددي ليڪ جي هر هڪ ٽپڪي سان واسطيدار هڪ عدد آهي اهو سمجھڻ. • ٻسگهي غير ناطف سڃاڻي ان تي ڪارروايون ڪرڻ.
2. الجبرا	2.1 گهٽپڊا 2.2 ٻن ڦيرائين وارن ٻن ليڪي مساوتون	• گهٽپڊو سڃاڻڻ ۽ ان تي ڪارروايون ڪري سگهڻ. • ٻن ڦيرائين جو اڀيوڱ ڪري لفظي مثال حل ڪري سگهڻ.
3. وهناري حساب	3.1 مالي رٿائون ٺاهڻ 3.2 ريشو ۽ پروپورشن	• الڳ الڳ ٽئڪسون سمجھڻ ۽ ٽئڪسن جي ڪٽ ڪري سگهڻ. • پگهاردارن جي انڪم ٽئڪس ڪٽي سگهڻ. • برابر ريشوز جي سڌيان واپرائي سگهڻ. • سڌي ڦير ۽ اڻ سڌي ڦير تي آڌار لفظي بيان حل ڪري سگهڻ.
4. ڄاڻ جو بندوبست (عدد شاستر)	4.1 جهڄائي چڄرو 4.2	• گروهيڻ ۽ اڻ گروهيڻ جهڄائي چڄرو تيار ڪري سگهڻ • گڏيل جهڄائي چڄرو ٺاهي سگهڻ • ڏنل ڄاڻ جو مرڪزي رخ سڃاڻي انهن جي ماپون واپرائي سگهڻ.

ماسٽرن لاءِ هدايتون

درجي نائين حساب ڀاڱو - I ڪتاب ۾ آيل بنيادي ويچار، چاٽل کان اڻ چاٽل نموني ٺاهيل ويچار، ارت شاستر جي حسابن سان واسطيدار ويچار، عدد شاستر کيتر جو وڪاس، اهي سڀ ڳالهائون ماسٽر سوکيهر نموني پڙهندا. ڪلاس ۾ سيکاريندي مشغوليون، چرچا، سوال جواب، گڏيل مشغوليون وغيره. **الڳ الڳ طريقن جو اپيوگه ڪرڻ ضروري آهي.** ماسٽر ڪتاب ۾ ڏنل مشغولين جو گهرو اپيلاس ڪندا ۽ اهي شاگردن کان ڪرائيندا اهڙيون ٻيون به ڪيتريون ئي مشغوليون پاڻ ٺاهي ڪرائيندا.

حسابن ۾ ڪٽ ڪرڻ کان مول ويچار سمجهڻ کي وڌيڪ اهميت آهي. شاگردن جي ترڪ شڪتيءَ کي وڌائڻ لاءِ انيڪ مثال درسي ڪتاب ۾ ڏنا ويا آهن. اهڙا ٻيا مثال ماسٽر ۽ شاگردن کي گڏجي ٺاهڻا آهن. ڪتاب ۾ لکاري ڏيندڙ سوالن کي تاري جا نشان ڏنل آهن. شاگردن ڪو حساب الڳ طريقن تي ترڪ ٻڌي سان حل ڪيو هجي ته کين همٿائجي.

ملهه ماپڻ ڪرڻ وقت آزاد سوال ۽ عملي پرچي بابت به ماسٽر ويچار ڪن. اهڙو ملهه ماپڻ طريقو ٺاهڻ بابت ماسٽر ويچار ڪن.

درسي ڪتاب ۾ نمونا عملي ڪم جي ياداشت ڏنل آهي. ان کانسواءِ به توهان ٻيا عملي ڪم ڪرايو. درسي ڪتاب جون مشغوليون انهن عملي ڪمن ۾ شامل ڪيل آهن. ان تي آڌارت ملهه ماپڻ طريقن جو اپيوگه شاگردن جي ايندڙ درجن ۽ لياقت ضرور وڌائيندو اهڙي اميد اسان کي آهي.

نموني عملي ڪم

1. پنهنجي ڪلاس جي سڀني شاگردن کي عالمي سٺ مڃي ڪوڪو، ڪبڊي وغيره کي به به رانديون ڪندڙ شاگردن جا سٺ وٺڻ شڪل وسيلي ڏيکاريو.
2. عددي ليڪ تي $5 - \sqrt{2}$, $2 + \sqrt{3}$ عدد ڏيکارڻ
3. ڊگري (پڊوي) تي يا چار هوندي گهڻپڊن کي ليکي گهڻپڊن سان الڳ الڳ طريقن وٺڻ ۽ جواب ساڳيو اچي ٿو ڇا اهو ڄاڻڻ.
4. انڪم ٽئڪس پريندڙ شخص جو تفصيل پٽر (سالياني اپٽ، سينڙپ وغيره) ڏنل هجي ته ان کي لڳندڙ ٽئڪس انڪم ٽئڪس چڄڻ وسيلي حل ڪرڻ.
5. ڏنل ڄاڻ وسيلي گروهيل جهڄائي ورهاست چڄڻ ٺاهڻ.
6. دوائن جي ڪوڪي يا ڪور تي ڏنل خبرن جو سيڪڙو ڪڍڻ
7. ڪو لکاري ڏيندڙ لفظي مثال به ڦيرائڻ استعمال ڪري حل ڪرڻ.

فهرست

باب	صفح
1. سیت	1 کان 18
2. حقیقی عدد	19 کان 35
3. گھٹپدا	36 کان 56
4. ریشو ۽ پروپورشن	57 کان 79
5. پن فیرائتن واریون لیکی مساوتون	80 کان 92
6. مالی رتناھٹ	93 کان 107
7. عدد شاستر	108 کان 128
● جوابی یادداشت	129 کان 136



سیت

1

اچو ته سکون



- سیت سڃاڻپ
- سیتن جا قسم
- وین شڪليون • برابر سیت، اپ سیت
- عاملي سیت، پورک سیت • کات سیت، سنجوڳ سیت • سیت جي جُزن جو عدد

ذرا یاد کریو



هين ڪجهه شڪليون ڏنل آهن انهن ۾ توهانجا سڃاڻل شين جا ميٽر آهن.

				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...
گلن جو ڳچو	چاڀين جو چلو	پکين جو ولر	ڪتابن جو ڍڳ	عددن جو گروه

مٿئين هر هڪ ميٽر لاءِ اسان هڪ خاص لفظ واپرائيون ٿا. انهن سڀني مثالن ۾ ميٽرن جا جُزا اسان تن نموني ٻڌائي سگهون ٿا. شين جي اهڙي ميٽر کي سیت چئجي ٿو.

هاڻي هيٺيان ميٽر ڏسو، ’ڳوٺ جا خوش ٻار‘، ’ڪلاس جا هوشيار ٻار‘ ميٽرن جي انهن مثالن ۾ ’خوش‘ ۽ ’هوشيار‘ انهن ٻنهي لفظن جي معنيٰ ٻين جي نسبت ۾ آهن. يعني ’خوشي‘ ۽ ’هوشيار‘ ٻنهي لفظن جي معنيٰ تن نموني نٿي ٻڌائي سگهجي، ان ڪري انهن ميٽرن کي سیت نٿو چئي سگهجي.

هاڻي هيٺين مثالن ۾ ڪهڙن ميٽرن کي سیت چئي سگهبو، اهو ٻڌايو.

- (1) هفتي جا ست ڏينهن
- (2) هڪ سال جا مهنا
- (3) ڪلاس جا هوشيار ٻار
- (4) پهريان ڏهه قدرتي عدد
- (5) مهاراڻي جا مضبوط قلعا
- (6) اسانجي سوريه مالها جا گهر



جنهن ميٽر جا جزا صحيح ۽ تيز نموني ٻڌائي سگهجن، انهن ميٽرن کي سيٽ چئجي ٿو. سيٽ کي نالو ڏيڻ لاءِ عام طور $A, B, C, \dots, Z$ مان انگريزي آئيووينا جا ڪئپيٽل اکر واپرائيندا آهن. سيٽ جا جزا ڏيکارڻ لاءِ $a, b, c, \dots$ اهي ننڍا اکر واپرائبا آهن. جُزن کي تنو يا پاڻي چئجي ٿو. 'a' اهو سيٽ A جو تنو آهي اهو $a \in A$ ائين لکبو آهي ۽ 'a' اهو سيٽ A جو تنو نه آهي،

اهو $a \notin A$ ائين لکبو آهي.

اچو ته هاڻي عددن جا سيٽ ڏسون.

$N = \{1, 2, 3, \dots\}$ اهو قدرتي عددن جو سيٽ (Set of natural numbers) آهي.
 $W = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ اهو سڄن عددن جو سيٽ (Set of whole numbers) آهي.
 $I = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ اهو سڄن انگي عددن جو سيٽ (Set of integers) آهي.
 Q سڀني منطق عددن جو سيٽ (Set of rational numbers) آهي.
 R اهو حقيقي عددن جو سيٽ (Set of real numbers) آهي.

سيٽ لکڻ جا طريقا

سيٽ لکڻ جا ٻه طريقا آهن.

(1) فردوار يا فهرست طريقو (Listing method or roster method)

ان طريقي ۾ سيٽ جا سڀ تنو وراڪيل برئڪيٽ ۾ لکبا آهن ۽ هر هڪ تنو کي الڳ ڪرڻ لاءِ اڌ دم ڏيندا آهن. ان ۾ تنون جو سلسلو اهميت وارو نه آهي پر سڀ تنو ڏيکارڻ ضروري آهن.

مثال 1 کان 10 درميان اڪي عددن جو سيٽ، فردوار طريقي هيٺيئن نموني ڏيکاري سگهجي ٿو.

$$A = \{7, 3, 5, 9\} \quad \text{يا} \quad A = \{3, 5, 7, 9\}$$

ڪو تنو هڪ کان وڌيڪ دفعا اچي ته به اهو هڪ دفعو ئي لکجي اهڙو نمونو آهي جيئن September لفظ ۾ اکر e ٽي دفعا آيل آهي پر ان لفظ جي اکرن جو سيٽ $\{S, e, p, t, e, m, b, e, r\}$ ائين لکبو.

(2) قاعدي وارو طريقو/سيٽ ٺاهيندڙ طريقو (Rule method or set builder form)

هن طريقي ۾ تنون جي فهرست نه ٺاهيندي، تنو ڦيرائڻي وسيلي ڏيکاري پوءِ هڪ اڀي ليک ڏبي آهي. ان ليڪ کان پوءِ انجي خاصيت لکبي آهي.

مثال: $A = \{x \mid x \in N, 1 < x < 10\}$ انکي هيٺين نموني پڙهيو آهي. سيٽ A جو x تنو آهي اهڙي طرح جو x کان 1 وڌيڪ قدرتي عدد آهي.

مثال. $B = \{x | x \text{ آهي هڪ مفرد عدد}\}$ ان ۾ 1 کان 10 وچوارا سڀ مفرد عدد شامل ٿيندا ان ڪري B سيٽ $\{2, 3, 5, 7\}$ ائين فردوار طريقي ۾ لکي سگهجي ٿو. Q منطقي انگن جو سيٽ قاعدي واري طريقي ۾ ڏيکاريل نموني لکي سگهيو.

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in I, q \neq 0 \right\}$$

پڙهڻ $\frac{p}{q}$ اهڙو عدد آهي جو p ڪوبه سڄو انگي عدد ۽ q ٻڙي کي ڇڏي سڄو انگي عدد آهي.

هينين مثالن ۾ هر هڪ سيٽ ٻنهي طريقن سان ڏيکاريل آهي.

فردوار طريقي

$$A = \{D, I, V, S, O, N\}$$

$$B = \{-3, 3\}$$

$$C = \{5, 10, 15, 20, 25\}$$

قاعدي وارو طريقي

$$A = \{x \mid x \text{ هڪ اکر آهي DIVISION لفظ ۾}\}$$

$$B = \{y \mid y^2 = 9\}$$

$$C = \{z \mid z \text{ 30 کان ننڍو سمائيندڙ انگ آهي}\}$$

مثال هينين خاڪي ۾ خالي جڳههون ڀري خاڪو پورو ڪريو

قاعدي وارو طريقي	فردوار طريقي
$A = \{x \mid x \text{ 15 کان ننڍو ٻڌي قدر تي عدد آهي}\}$	$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$
$B = \{x \mid x \text{ 20 وچ ۾ پوري ٻي سگهه وارو عدد آهي}\}$	
.....	$C = \{a, e, i, o, u\}$
$D = \{y \mid y \text{ هڪ رنگ آهي}\}$	
$P = \{x \mid x \text{ 30 کان ننڍو انگي عدد آهي}\}$	
.....	$M = \{1, 8, 27, 64, 125, \dots\}$

اڀياس 1.1

(1) هينين سيٽ فردوار طريقي سان لکو

(i) ٻڌي قدر تي عددن جو سيٽ (ii) 1 کان 50 وچ ۾ ٻڌي مفردن جو سيٽ

(iii) سڀني ڪاٿو سڄن انگي عددن جو سيٽ (iv) سنگيت جي ستن سُر جو سيٽ

(2) هيٺ ڏنل بيان لفظن ۾ لکو

$$P = \{p \mid p \text{ اڪي عدد آهي}\} \quad (iii) \quad -2 \notin N \quad (ii) \quad \frac{4}{3} \in Q \quad (i)$$

(3) ڪي به ٻه سيٽ فردوار ۽ قاعدي واري طريقي لڪو

(4) هيٺيان سيٽ فردوار طريقي لڪو

(i) ڀارتي سال جي مهنن جو سيٽ

(ii) 'COMPLEMENT' لفظ جي اکرن جو سيٽ

(iii) انسان جي حواسن جو سيٽ

(iv) 1 کان 20 وچڻ مفرد عددن جو سيٽ

(v) ڌرتيء تي ڪنڊن جو سيٽ

(5) هيٺيان سيٽ قاعدي واري طريقي لڪو

(i) $A = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$

(ii) $B = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48\}$

(iii) $C = \{S, M, I, L, E\}$

(iv) $D = \{\text{سومر، منگل، ٻڌڻ، وسپت، جمع، چنڇر، آرتوار}\}$

(v) $X = \{a, e, t\}$

ڄاڻي وٺون



سيٽن جا قسم (Types of sets)

مثال	وصف	سيٽ جو قسم
$A = \{2\}$ A ٻڌ مفرد عددن جو سيٽ آهي	جنهن سيٽ ۾ فقط هڪ نتو هوندو آهي ان کي يگانو سيٽ چئجي ٿو.	يگانو سيٽ (Singleton Set)
$B = \{x x \text{ ۽ } 3 \text{ وچڻ قدرتي عدد آهي}\}$ $\therefore B = \{\}$ يا ϕ	جنهن سيٽ ۾ ڏنل خاصيت موجب هڪ به نتو نه هوندو آهي ان کي 'خالي سيٽ' چوندا آهن. اهو سيٽ $\{\}$ يا ϕ (فاء) انهن نشانين وسيلي ڏيکاربو آهي.	خالي سيٽ (Null Set) (Empty Set)
$C = \{p p \leq 22 \text{ ۽ } 1 \text{ وچڻ } 4 \text{ جو ونڊ چنڊڙ عدد آهي}\}$ $C = \{4, 8, 12, 16, 20\}$	جنهن سيٽ جي نتون جو عدد مڪدود هجي ۽ کين ٻڌي سگهجي ٿو يا خالي سيٽ آهي ان کي مڪدود سيٽ چئجي ٿو.	مڪدود سيٽ (Finite Set)
$N = \{1, 2, 3, \dots\}$	جنهن سيٽ جي نتون جو عدد غير مڪدود هجي ۽ کين ٻڌي نه سگهجي ان کي 'لاحد سيٽ' چئجي ٿو.	لاحد سيٽ (Infinite Set)

مثال : هيٺيان سيٽ فردوار طريقي لکي انهن کي محدود ۽ لحد سيٽن ڀرور هائيو

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ ۽ } 3x - 1 = 0\} \quad (ii) \quad A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ اڪي عدد آهي}\} \quad (i)$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ ۽ } 7 \text{ جو ونڊجندڙ عدد آهي}\} \quad (iii)$$

$$E = \{x \mid x \in \mathbb{I}, x^2 = 100\} \quad (v) \quad D = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{W}, a + b = 9\} \quad (iv)$$

$$F = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}, a + b = 11\} \quad (vi)$$

$$\text{حل : (i) } A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ اڪي عدد آهي}\}$$

$$A = \{1, 3, 5, 7, \dots\} \text{ اهو لحد سيٽ آهي}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ ۽ } 3x - 1 = 0\} \quad (ii)$$

$$3x - 1 = 0 \quad \therefore 3x = 1 \quad x = \frac{1}{3}$$

$$\therefore B = \{ \} \quad \because \frac{1}{3} \notin \mathbb{N} \quad \therefore B \text{ محدود سيٽ آهي}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ ۽ } 7 \text{ جو ونڊجندڙ عدد آهي}\} \quad (iii)$$

$$C = \{7, 14, 21, \dots\} \text{ اهو لحد سيٽ آهي.}$$

$$D = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{W}, a + b = 9\} \quad (iv)$$

اسان کي a ۽ b جا اهڙا ملهه ڳولڻا پوندا جيئن a, b سڄا عدد هجن ۽ $a + b = 9$ هجي پهرين a جو پوءِ b جو ملهه اهو سلسلو رکي D سيٽ فردوار طريقي هيٺيئن نموني لکي سگهيو.

$$D = \{(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)\},$$

هن سيٽ جا تتو (جوڙا) ڳڻي سگهجن ٿا ۽ محدود آهن

$\therefore D$ محدود سيٽ آهي.

$$E = \{x \mid x \in \mathbb{I}, x^2 = 100\} \quad (v)$$

$$E = \{-10, 10\}. \text{ ان ڪري محدود سيٽ آهي.}$$

$$\therefore F = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}, a + b = 11\} \quad (vi)$$

$$F = \{(6, 5), (3, 8), (3.5, 7.5), (-15, 26), \dots\}$$

F ان ڪري لحد سيٽ آهي.

ياد رکڻ!



$\mathbb{N}, \mathbb{W}, \mathbb{I}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ اهي سڀ لحد سيٽ آهن.



برابر سیت (Equal sets)

سیت A جو هر هڪ سیت B ۾ سیت B جو هر هڪ سیت A ۾ هوندو ته اهي برابر سیت آهن، ائين چئبو.

'A ۽ B برابر سیت آهن' اهو نشانين وسيلي $A=B$ ائين لکبو

مثال (1) {listen} لفظ جو اکر آهن $A = \{x \mid x \text{ لفظ جو اکر آهن}\}$ $A = \{l, i, s, t, e, n\}$ $\therefore$

{silent} لفظ جو اکر آهي. $B = \{y \mid y \text{ لفظ جو اکر آهي}\}$ $B = \{s, i, l, e, n, t\}$ $\therefore$

$A \subseteq B$ جي تئون جو سلسلو پل الڳ آهي پر اهي تئي ساڳيا آهن ان ڪري $A \subseteq B$ برابر سیت آهن يعني $A=B$

مثال (2) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ $A = \{x \mid x = 2n, n \in N, 0 < x \leq 10\}$

$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ $B = \{y \mid y \text{ هڪ ٻڌي عدد آهي}, 1 \leq y \leq 10\}$

$\therefore A \subseteq B$ برابر سیت آهن

هاڻي هيٺين سیتن بابت ويچار ڪريون.

$$C = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$D = \{2, 3, 5, 7\}$$

ڇا $C \subseteq D$ برابر سیت آهن؟ نه.

ڇو ته $1 \in C, 1 \notin D, 2 \in D, 2 \notin C$

انڪري $C \subseteq D$ برابر سیت نه آهن يعني $C \neq D$

مثال (3) جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3\}$ ۽ $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ته ڇاچي ڏسو $A \neq B$

مثال (4) $A = \{x \mid 10 < x < 20\}$ ۽ $B = \{11, 13, 17, 19\}$

$A = B$ ته ڇاچي ڏسو

اڀياس 1.2

(1) هيٺين مان ڪهڙا سیت برابر آهن ۽ ڪهڙا نه اهو سبب ڏيئي ٻڌايو

$$A = \{x \mid 3x - 1 = 2\}$$

$$B = \{x \mid x \text{ هڪ قدرتي عدد آهي پر مفرد ۽ مرکب آهي}\}$$

$$C = \{x \mid x \in N, x < 2\}$$

(2) $A \subseteq B$ برابر سیت آهن ڇا؟ سبب ڏيئي لکو.

$$B = \{x \mid 7x - 1 = 13\}$$

$A =$ ٻڌي مفرد عدد

(3) هيٺين مان ڪهڙا سیت خالي آهن اهو سبب ڏيئي لکو.

$$(i) A = \{a \mid a \text{ کان ننڍو قدرتي عدد آهي}\}$$

$$(ii) C = \{x \mid 5x - 2 = 0, x \in N\}$$

$$(iii) B = \{x \mid x^2 = 0\}$$

(4) هيٺين مان ڪهڙا سيٽ محدود ۽ ڪهڙا سيٽ لحد آهن سبب ڏيئي لکو.

- (i) $A = \{x \mid x < 10\}$ هڪ قدرتي عدد آهي،
 (ii) $B = \{y \mid y < -1\}$ سڄو انگي عدد آهي،
 (iii) توهان جي اسڪول جي درجي 9 جي شاگردن جو سيٽ $C =$
 (iv) توهان جي شهر جي شاگردن جو سيٽ
 (v) تجربتي خالي جي اوزارن جو سيٽ
 (vi) سڄا عدد سيٽ
 (vii) منطقي عددن جو سيٽ

ڄاڻي وٺون



وين شڪليون (Venn diagrams)

سيٽ لکت لاءِ ٻن شڪلين جو پهريون استعمال برٽش ترڪ شاستري جان وين ڪيو. ان ڪري اهڙين شڪلين کي 'وين شڪليون' چئجي ٿو. الڳ الڳ سيٽن جو لاڳاپو سمجھڻ لاءِ ۽ سيٽن جا مثال حل ڪرڻ لاءِ انهن شڪلين جو اڀيوڳ ٿيندو آهي وين شڪلين وسيلي سيٽ ڪيئن ڏيکاربا آهن، اهو هيٺين مثالن وسيلي سمجھو.


ترڪ شاستر ۽ امڪان انهن
 وشين کي حسابي روپ ڏيڻ جو
 ڪم پهريون جان وين ڪيو.
 'لاجڪ آف چانس' هي
 سندس مشهور ڪتاب آهي.



1834-1923

مثال $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

وين شڪل وسيلي اهو سيٽ هيٺ ڏيکاريل آهي




$B = \{x \mid -10 \leq x \leq 0\}$ سڄو انگي عدد آهي،

پرواري وين شڪل سيٽ B ڏيکاري ٿي.

B
 0 -1 -2 -3
 -4 -5 -6 -7
 -8 -9 -10

اُپ سيٽ (Subset)

جيڪڏهن A ۽ B ٻه سيٽ آهن ۽ سيٽ B جو هر هڪ تئو، سيٽ A جو به تئو هجي ته سيٽ B کي سيٽ A جو اُپ سيٽ چوندا آهن اهو $B \subseteq A$ ائين ڏيکارجي ٿو ۽ 'انکي B اُپ سيٽ A يا A, B جو اُپ سيٽ آهي' ائين پڙهيو آهي.



مثال (1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$B = \{2, 4, 6, 8\}$

B جو هر تئو A جو به تئو آهي
 ان ڪري $B \subseteq A$.

اها ڄاڻ وين شڪل وسيلي ڏيکاريل آهي.



مشغولي : ڪلاس جي شاگرد جو سيٽ ۽ انهن شاگردن مان نري سگهندڙ شاگردن جو سيٽ وٺڻ جي شڪل وسيلي ڏيکاريل آهي.

هاڻي هيٺين اپ سيٽن جون وٺڻ جي شڪليون ڏيکاريو.

(1) (i) ڪلاس جي شاگردن جو سيٽ

(ii) انهن مان ساڻيڪل هاڻي سگهندڙ شاگردن جو سيٽ

(2) هيٺ ڪجهه ميون جو سيٽ ڏنل آهي

{زيتون، مڙس، انب، ڪنڌڙو، چڪو، چمڙو، سيتاقل، پپيتو}

انجا هيٺيان اپ سيٽ ڏيکاريو (i) هڪ ٻج هوندڙ ڦل (ii) هڪ کان وڌيڪ ٻج هوندڙ ڦل

هاڻي ٻيا ڪجهه اپ سيٽ ڏسون

مثال (2) قدرتي عددن جو سيٽ N سڄڻ انگن جو سيٽ I

هتي $N \subseteq I$ (چون ته سڀ قدرتي عدد، سڄا انگي عدد به هوندا آهن)

مثال (3) $P = \{x | x \leq 25\}$ جو ٻيو مول آهي $S = \{y | y \in I, -5 \leq y \leq 5\}$

فردوار طريقي وسيلي سيٽ $P = \{-5, 5\}$

ساڻي طريقي وسيلي سيٽ $S = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

هتي P جو هر هڪ تنو S جو به تنو آهي.

$\therefore P \subseteq S$

ياد رکڻ



(i) هر هڪ سيٽ پنهنجو اپ سيٽ هوندو آهي يعني $A \subseteq A$

(ii) خالي سيٽ هر هڪ سيٽ جو اپ سيٽ هوندو آهي يعني $\emptyset \subseteq A$

(iii) جيڪڏهن $A = B$ ته $A \subseteq B$ ۽ $B \subseteq A$


(iv) جيڪڏهن $A \subseteq B$ ته $B \subseteq A$ ته $A = B$

مثال $A = \{1, 3, 4, 7, 8\}$ انجا سڀ اپ سيٽ لکو

جيئن $P = \{1, 3\}$, $V = \{1, 4, 8\}$, $T = \{4, 7, 8\}$, $S = \{1, 4, 7, 8\}$

اهڙا اڃا ٻيا پنج اپ سيٽ لکو

مشغولي: هر هڪ شاگرد ڪاغذ جا ساڳئي آڪار جا 9 ٽڪنڊا ۽ هڪ ٽالهي کڻي ٽڪنڊن تي 1 کان 9 عدد لکي. هر هڪ شاگرد پنهنجي ٽالهي ۽ 9 هيٺ ڏيکاريل ٽڪنڊا کڻي. ان سان هر هڪ وٽ 1 کان 9 عددن جي سيٽ جو اپ سيٽ ٿيندو.



سڃاتا، حميد، ميٽا، نندني ۽ جوسف جي ٽالھين جا عدد ڏسو هر هڪ کي ٽڪنڊا ڏيڻ وقت ڪهڙو ويچار ڪيل آهي؟ هر هڪ سيٽ قاعدي واري طريقي لکو.

اچو چرچا ڪريون



مثال: هيٺ ڪجهه سيٽ ڏنل آهن.

$$\begin{aligned} A &= \{ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots \} & B &= \{ 1, 2, 3, \dots \} \\ C &= \{ \dots, -12, -6, 0, 6, 12, 18, \dots \} & D &= \{ \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \} \\ I &= \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \} \end{aligned}$$

هاڻي ٻڌايو ته هيٺين مان ڪهڙا بيان صحيح آهن؟

(i) A هو D, C, B مان هر هڪ جو اپ سيٽ آهي. (ii) B مٿين سڀني سيٽن جو اپ سيٽ آهي.

ڄاڻي وٺون




عالمي سيٽ (Universal set)

ويچار هيٺ هوندي سڀني سيٽن کي سمائيندڙ وڏي سيٽ کي عالمي سيٽ چئجي ٿو ويچار هيٺ هوندي هر هڪ سيٽ عالمي سيٽ جو اپ سيٽ هوندو آهي.

مثال (1) اسان کي درجي 9 جي هڪ ڪلاس جي شاگردن جي حاضريءَ جو اڀياس ڪرڻو آهي. ان لاءِ 9 جي شاگردن جي سيٽن جو ويچار ڪرڻو پوندو هتي درجي 9 جي سڀني شاگردن جي سيٽ يا اسڪول جي سڀني شاگردن جي سيٽ کي عالمي سيٽ کڻي سگهجي.

هاڻي ٻيو مثال ڏسون

مثال (2) توهان جي اسڪول جي ڪرڪيٽ ڪيڏندڙ شاگردن مان 15 شاگردن جي ڪرڪيٽ ٽيم ٺاهڻي آهي.




هتي ڪرڪيٽ ڪيڏندڙ سڀني شاگردن جو سيٽ عالمي سيٽ ٿيندو ڇونڊيل 15 شاگردن جو سيٽ اُن سيٽ جو اُپ سيٽ ٿيندو. عالمي سيٽ عام طور 'U' اکر سان ڏيکاربو آهي وين شڪل ۾ عالمي سيٽ گهڻو ڪري مستطيل وسيلي ڏيکاربو آهي.

پورڪ سيٽ (Complement of a set)

سمجهيو ته 'U' هڪ عالمي سيٽ آهي. جيڪڏهن $B \subseteq U$ ته B ۾ نه هوندڙ عالمي سيٽ U جي تتون جي سيٽ کي سيٽ B جو پورڪ سيٽ چئبو سيٽ B جو پورڪ سيٽ B' يا B^c وسيلي ڏيکاربو آهي.


$B' = \{x \mid x \in U, x \notin B\}$ B' کي ائين به ڏيکاري سگهيو



مثال (1) $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$\therefore A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$



مثال (2) سمجهو $U = \{1, 3, 9, 11, 13, 18, 19\}$

$B = \{3, 9, 11, 13\}$

$\therefore B' = \{1, 18, 19\}$

هاڻي B جو سيٽ لھو

(B') يعني B ۾ نه هوندڙ U سيٽ جا تتو

ائين آهي ڇا؟ $(B') = B$

مٿين ڄاڻ وين شڪل وسيلي سمجهي وٺو.

پورڪ سيٽ جو پورڪ سيٽ، سيٽ پاڻ هوندو آهي.

هي ڏيان ڀرڪو



پورڪ سيٽ جون خاصيتون

(i) $A' \notin A$ ۾ عام تتو نه هوندو آهي

(ii) $A' \subseteq U$ ۽ $A \subseteq U$

(iii) عالمي سيٽ جو پورڪ سيٽ، خالي سيٽ هوندو آهي. $U' = \phi$

(iv) خالي سيٽ جو پورڪ سيٽ عالمي سيٽ هوندو آهي. $\phi' = U$

اڀياس 1.3

(1) جيڪڏهن $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{c, d, e, f\}$, $C = \{b, d\}$, $D = \{a, e\}$ ته هيٺيان بيان صحيح آهن يا غلط لکو

(i) $C \subseteq B$ (ii) $A \subseteq D$ (iii) $D \subseteq B$ (iv) $D \subseteq A$ (v) $B \subseteq A$ (vi) $C \subseteq A$

(2) هيٺيان سيٽ وٺڻ جي شڪل وسيلي ڏيکاريو

(i) $X = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ ۽ } 7 < x < 15\}$

(ii) $Y = \{y \mid y \in \mathbb{N}, y \text{ وچڻ مفرد عدد}\}$

(3) $U = \{1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

$P = \{1, 3, 7, 10\}$

ته (i) U, P, P' وٺڻ جي شڪلن وسيلي ڏيکاريو (ii) $(P')' = P$ ڄاڻيو

(4) جيڪڏهن $A = \{1, 3, 2, 7\}$ ته A سيٽ جا ڪي به ٽي اپ سيٽ لکو

(5) هيٺيان مان ڪهڙو سيٽ ٻين ڪهڙن سيٽن جو اپ سيٽ آهي اهو لکو.

(i) P پڙهي جي رهواسين جو سيٽ آهي M مڙهي پرديش جي رهواسين جو سيٽ آهي

I انڊور جي رهواسين جو سيٽ آهي B ڀارت جي رهواسين جو سيٽ آهي

H مهاراشٽر جي رهواسين جو سيٽ آهي.

(ii) مٿين مان ڪهڙو سيٽ ٻين سيٽن جو عالمي سيٽ مقرر ڪري سگهيو؟

(6*) هيٺ ڪجهه سيٽ ڏنل آهن انهن مان ڪهڙو سيٽ ٻين سيٽن جو عالمي سيٽ مقرر ڪري سگهيو؟

(i) 5 جي سمائيندڙ عددن جو سيٽ $A =$ 7 جي سمائيندڙ عددن جو سيٽ $B =$

12 جي سمائيندڙ عددن جو سيٽ $C =$

(ii) 4 جي سمائيندڙ سڄڻ انگي عددن جو سيٽ $P =$ سڀني پوري سگهن وارن ٻڌي عددن جو سيٽ $T =$

(7) ڪلاس جي سڀني شاگردن جو سيٽ عالمي سيٽ سمجهو حسابن ۾ 50% يا ان کان وڌيڪ مارڪون

ڪٽندڙ شاگردن جو سيٽ A آهي ته A جو پورڪ سيٽ لھو.

ڄاڻي وٺون




سيٽن تي ڪاروايون

سيٽن جو ڪاٽ (Intersection of two sets)

سمجهو $B \cap A$ به سيٽ آهن $B \cap A$ جي عام نتون جي سيٽ کي انهن سيٽن جو ڪاٽ سيٽ چئجي ٿو. اهو

$A \cap B$ ائين لکجي ٿو ۽ 'A ڪاٽ B' ائين پڙهجي ٿو.

$\therefore A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ ۽ } x \in B\}$



مثال (1) $A = \{1, 3, 5, 7\}$ $B = \{2, 3, 6, 8\}$

هاڻي وين شڪليون ڪيون

$B \notin A$ ٻنهي سيٽن ۾ 3 عام نتو آهن.

$$\therefore A \cap B = \{3\}$$

مثال (2) $A = \{1, 3, 9, 11, 13\}$ $B = \{1, 9, 11\}$

A سيٽ B ۾ 1, 9, 11 عام نتو آهن.

$$\therefore A \cap B = \{1, 9, 11\}$$

$$\therefore A \cap B = B$$

ياد رکڻ هتي A, B جو اپ سيٽ آهي.

جيڪڏهن $B \subseteq A$ ته $A \cap B = B$ جيڪڏهن $B \cap A = B$ ته $B \subseteq A$

ياد رکڻ



ڪاٺ سيٽن جون خاصيتون

(2) جيڪڏهن $A \subseteq B$ ته $A \cap B = A$

$$(1) A \cap B = B \cap A$$

$$A \cap B \subseteq B \quad \& \quad A \cap B \subseteq A \quad (4)$$

(3) جيڪڏهن $B \subseteq A$ ته $A \cap B = B$

$$A \cap \phi = \phi \quad (7)$$

$$A \cap A = A \quad (6)$$

$$A \cap A' = \phi \quad (5)$$

مشغولي: الڳ الڳ مثال ڪٿي مٿيون خاصيتون ڄاڻيو.

ڄاڻي وٺون



علڪدا سيٽ (Disjoint sets)


سمجھو، $A = \{1, 3, 5, 9\}$

$B = \{2, 4, 8\}$ اهي سيٽ ڏنل آهن

سيٽ A ۽ B ۾ ڪوبه عام نتو نه آهي اهي ٻئي سيٽ

پوريءَ طرح الڳ يا علڪدا آهن انڪري کين علڪدا سيٽ


چئجي ٿو. هنن سيٽن جي وين شڪل ڏسو.




مشغولي I:

A, B, C سيٽ وين شڪل وسيلي ڏيکاريل آهن

انهن مان ڪهڙا ٻه سيٽ علڪدا سيٽ آهن اهو لکو



مشغوليون II:




سمجھو ته انگريزي اکرن جو سيٽ عالمي سيٽ آهي
سيٽ جا تنو انگريزي اکر آهن سمجھو LAUGH لفظ جي

اکرن جو هڪ سيٽ آهي ۽ CRY لفظ جي اکرن جو ٻيو سيٽ
آهي اهي ٻئي علائقي سيٽ آهن. ٻنهي سيٽن جو ڪاٺ، خالي
سيٽ آهي اهو ڇا چيو

ٻن سيٽن جو سنڃوڻ (Union of two sets)

سمجھو A ۽ B سيٽ آهن انهن ٻنهي سيٽن جي تنون جي گڏي نهندڙ سيٽ کي A ۽ B سيٽن جو
سنڃوڻ سيٽ چئبو آهي اهو $A \cup B$ ائين لکبو آهي ۽ A سنڃوڻ B ائين پڙهيو آهي.



$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ يا } x \in B\}$$


$$A = \{-1, -3, -5, 0\} \quad \text{مثال (1)}$$

$$B = \{0, 3, 5\}$$

$$A \cup B = \{-3, -5, 0, -1, 3, 5\}$$

$$A \cup B = B \cup A \text{ ياد رکيو}$$

مثال (2)



پرواري وين شڪلين جن مدد سان هيٺيان سيٽ فردوار

طريقي لکو.

$$(i) U \quad (ii) A \quad (iii) B \quad (iv) A \cup B \quad (v) A \cap B$$

$$(vi) A' \quad (vii) B' \quad (viii) (A \cup B)' \quad (ix) (A \cap B)'$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\},$$

$$B = \{1, 3, 5, 7, 8, 10\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$$

$$A \cap B = \{8, 10\}$$

$$A' = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 12\} \quad B' = \{2, 4, 6, 9, 11, 12\}$$

$$(A \cup B)' = \{9, 11, 12\} \quad (A \cap B)' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12\}$$

مثال :


$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad B = \{2, 3\}$$

هاڻي انهن سيٽن جي وين شڪل ڪڍون

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

سيٽ A ۽ A ساڳيا تنو آهن

انڪري، جيڪڏهن $B \subseteq A$ ته $A \cup B = A$



مثال (3)



سنجوبڻ سڀتن جون خاصيتون

$$A \cup B = B \quad A \subseteq B \text{ هن جيڪڏهن (2)}$$

$$A \cup B = B \cup A \quad (1)$$

$$A \cup A' = U \quad (4)$$

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B \quad (3)$$

$$A \cup \phi = A \quad (6)$$

$$A \cup A = A \quad (5)$$



سيت جي تٽون جو عدد (Number of elements in a set)

سمجھو، $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ ان سيت ۾ 5 تٽو آهن

سيت A جي تٽون جو عدد $n(A)$ ائين ڏيکاربو آهي. $\therefore n(A) = 5$

سمجھو ته $B = \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$ $\therefore n(B) = 6$

سنجوبڻ سيت ۽ ڪاٺ سيت جي تٽون جو عدد

مٿين سيتن A ۽ B نسبت ۾

$$n(A) + n(B) = 5 + 6 = 11 \text{ -----(1)}$$

$$A \cup B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36\} \therefore n(A \cup B) = 9 \text{ -----(2)}$$

$A \cap B$ سيت لهون يعني سيت A ۽ B جا عام تٽو ڏسون. ته

$$A \cap B = \{6, 12\} \therefore n(A \cap B) = 2 \text{ -----(3)}$$

ڌيان ۾ رکو، $n(A)$ ۽ $n(B)$ ڳڻڻ وقت $A \cap B$ جا تٽو ٻه دفعا ڳڻيا

$$n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 5 + 6 - 2 = 9 \text{ ته } n(A \cup B) = 9$$

سمجھو ته (1)، (2) ۽ (3)

$$\therefore n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

مٿئين نيمر کي پرواري وين شڪل وسيلي ڄاڻيو.

$$n(A) = \boxed{}, \quad n(B) = \boxed{}$$

$$n(A \cup B) = \boxed{}, \quad n(A \cap B) = \boxed{}$$

$$\therefore n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$




$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A) + n(B) = n(A \cup B) + n(A \cap B) \text{ يعني}$$

$$A = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13\} \quad B = \{1, 2, 4, 6, 8, 12, 13\} \text{ هاڻي}$$

هي سيت ڪٿي مٿئين نيمر کي ڄاڻيو





سيٽن تي آڌارت لفظي مثال

مثال : هڪ ڪلاس ۾ 70 شاگرد آهن انهن مان 45 شاگردن کي 45 ڪرڪيٽ راند وٺندي آهي 52 شاگردن کي ڪوڪو راند وٺندي آهي سڀني شاگردن کي ڪا به راند وٺندي آهي ته ڪرڪيٽ ۽ ڪوڪو ٻئي رانديون وٺندڙ شاگردن جو عدد لھو.

حل : اھو مثال ٻن عددن ۾ ڏيو

طريقو : ڪلاس ۾ ڪل شاگرد = 70

ڪرڪيٽ راند وٺندڙ شاگردن جو سيٽ A مڃينداسين ڪوڪو راند وٺندڙ شاگردن جو سيٽ B

مڃينداسين. هر هڪ شاگرد کي ڪرڪيٽ ۽ ڪوڪو مان گھٽ ۾ گھٽ هڪ راند وٺي ٿي.

ڪرڪيٽ ۽ ڪوڪو وٺندڙ شاگردن جو عدد يعني $n(A \cup B)$

$$\therefore n(A \cup B) = 70$$

ڪرڪيٽ ۽ ڪوڪو ٻئي رانديون وٺندڙ شاگردن جو عدد

$$n(A) = 45, \quad n(B) = 52$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 45 + 52 - 70 = 27$$

ٻئي رانديون وٺندڙ شاگرد 27، ڪرڪيٽ وٺندڙ شاگرد فقط 45 آهن. ڪرڪيٽ وٺندڙ شاگرد

$$= 45 - 27 = 18$$

$$\therefore n(A \cap B) = 27 \text{ سيٽ } A \cap B \text{ ٻئي رانديون وٺندڙ شاگردن جو سيٽ آهي}$$

طريقو II : ڏنل ڄاڻ وٺڻ جي وسيلي پڻ ڏيکاري ٻئي رانديون وٺندڙ شاگردن جو عدد لھي سگھجي ٿو.

$$n(A \cap B) = x \quad n(A) = 45, \quad n(B) = 52,$$


$$n(A \cup B) = 70$$

$$\therefore n(A \cap B) = x = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 45 + 52 - 70 = 27$$

$$= 45 - 27$$

$$= 18$$




اڀياس 1.4

- (1) جيڪڏهن $n(A) = 15$, $n(A \cup B) = 29$, $n(A \cap B) = 7$ ته $n(B) = ?$
- (2) هڪ هاسٽل ۾ 125 شاگرد آهن انهن مان 80 شاگرد چانهه 60 شاگرد ڪافي ۽ 20 شاگرد چانهه ۽ ڪافي پيئندا آهن. چانهه يا ڪافي ڪجهه به نه پيئندڙ شاگردن جو عدد لھو.

- (3) هڪ امتحان ۾ 50 شاگرد انگريزيءَ ۾ پاس ٿيا 60 شاگرد حسابن ۾ پاس ٿيا 40 شاگرد ٻنهي وٽين ۾ پاس ٿيا. ڪوبه شاگرد ٻنهي وٽين ۾ ناپاس نه ٿيو. ته ٻنهي وٽين مان گهٽ ۾ گهٽ هڪ ۾ پاس ٿيندڙ شاگرد ڪيترا؟

- (4*) هڪ اسڪول ۾ درجي نائين جي 220 شاگردن جي پسندگيءَ جو سروي ڪيو ويو. انهن 130 شاگردن جابلو چڙهائيءَ ۾ پسندگي ڏيکاري. 180 شاگردن آڪاش اڀياس ۾ پسندگي ڏيکاري. 110 شاگردن جابلو چڙهائي ۽ آڪاش اڀياس ٻنهي ۾ پسندگي ڏيکاري. ڪيترن شاگردن کي ٻنهي مان ڪجهه به پسند نه آهي ڪيترن شاگردن کي فقط جابلو چڙهائي وڻندي آهي؟ ڪيترن شاگردن کي فقط آڪاش اڀياس وڻندو آهي؟



U

- (5) پرواري شڪل مان هيٺيان سيٽ لکو

- (i) A (ii) B (iii) $A \cup B$ (iv) U
(v) A' (vi) B' (vii) $(A \cup B)'$

گڏيل اڀياس 1

- (1) هيٺين سوالن ۾ صحيح جواب چونڊيو
- (i) $M = \{1, 3, 5\}$, $N = \{2, 4, 6\}$, ته $M \cap N = ?$
- (A) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (B) $\{1, 3, 5\}$ (C) $\emptyset$ (D) $\{2, 4, 6\}$
- $P = \{x \mid 1 < x \leq 5\}$ اڪي قدر تي عدد آهي x
- (ii) $P = \{x \mid x, 1 < x \leq 5\}$ اهو سيٽ فرد وار طريقي ڪيئن لکبو؟
- (A) $\{1, 3, 5\}$ (B) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (C) $\{1, 3\}$ (D) $\{3, 5\}$
- (iii) $P = \{1, 2, \dots, 10\}$ ڪهڙي قسم جو سيٽ آهي؟
- (A) خالي سيٽ (B) لاهندو سيٽ (C) محدود سيٽ (D) انهن مان نه
- (vi) $M = \{1, 2, 4\}$ $M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ N سيٽ
- هيٺين ڪهڙو آهي
- (A) $\{1, 2, 3\}$ (B) $\{3, 4, 5, 6\}$ (C) $\{2, 5, 6\}$ (D) $\{4, 5, 6\}$

(v) جيڪڏهن $P \subseteq M$ ته هيٺين مان ڪهڙو سٽ $P \cap (P \cup M)$ آهي؟

- (A) P (B) M (C) $P \cup M$ (D) $P' \cap M$

(vi) هيٺين مان ڪهڙو سٽ خالي سٽ آهي؟

(A) پوروچوٽ ليڪن جي چيد ٿيڪن جو سٽ (B) ٻڌي مفرد عددن جو سٽ

(C) 30 کان گهٽ ڏينهن انگريزي مهنن جو سٽ

(D) $P = \{x \mid x \in I, -1 < x < 1\}$

(2) هيٺين سوالن لاءِ صحيح جواب چونڊيو.

(i) هيٺين مان ڪهڙو ميٽر سٽ آهي؟

(A) اسڪول ويجهو ڊگها وڻ (B) انڊلن جا رنگ

(C) ڪتاب جا سؤ سوال (D) ڳوٺ جا شاهوڪار ماڻهو

(ii) هيٺين مان $N \cap W$ سٽ ڪهڙو آهي؟

(A) $\{1, 2, 3, \dots\}$ (B) $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (C) $\{0\}$ (D) $\{\}$

(iii) $P = \{x \mid x \text{ هي indian لفظ جو هڪ اکر آهي}\}$

هيٺين مان P سٽ جو فرد وار طريقو ڪهڙو آهي؟

(A) $\{i, n, d\}$ (B) $\{i, n, d, a\}$ (C) $\{i, n, a\}$ (D) $\{n, d, a\}$

(vi) جيڪڏهن $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $M = \{3, 4, 7, 8\}$ $T \cup M = ?$

(A) $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ (B) $\{1, 2, 3, 7, 8\}$

(C) $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ (D) $\{3, 4\}$

(3) هڪ گروهه جي 100 ماڻهن مان 72 ماڻهو انگريزي ٻالهاڻيندا آهن ۽ 43 ماڻهو فرينچ ٻالهاڻيندا آهن: اهي 100 ماڻهو انگريزي يا فرينچ مان گهٽ ڇڙ گهٽ هڪ ٻولي ٻالهاڻيندا آهن ته ڪيترا ماڻهو فقط انگريزي ٻالهاڻيندا آهن؟ ڪيترا ماڻهو فقط فرينچ ٻالهاڻيندا آهن؟ ڪيترا ماڻهو انگريزي ۽ فرينچ ٻئي ٻوليون ٻالهاڻيندا آهن؟

(4) وڻ وڌائڻ واري هفتي ڇڙ ڇڙ 70 وڻ لڳايا ۽ ڇڙ ڇڙ 90 وڻ لڳايا. انهن مان ٻنهي گڏجي 25 وڻ لڳايا. ته ڇڙ ڇڙ ۽ ڇڙ ڇڙ ڪل ڪيترا وڻ لڳايا؟

(5) $n(A) = 20$, $n(B) = 28$ ۽ $n(A \cup B) = 36$ ته $n(A \cap B) = ?$ جيڪڏهن

(6) هڪ ڪلاس جي 28 شاگردن مان 8 جي گهرن ۾ فقط ڪتو پاليل آهي، 6 جي گهرن ۾ فقط ٻلي پاليل آهي.

10 شاگردن جي گهرن ۾ ڪتو ۽ ٻلي ٻئي پاليل آهن ڪيترن شاگردن جي گهرن ۾ ڪتي ۽ ٻليءَ مان ڪجهه به

پاليل نه آهي؟

(7) هيٺين مثالن جي سٽن جا سنجوڳ سٽ لکو

(i) $A = \{3, 4, 5, 7\}$ $B = \{1, 4, 8\}$

(ii) $P = \{a, b, c, e, f\}$ $Q = \{l, m, n, e, b\}$

$$(iii) X = \{x | x \text{ وچر مفرد عدد آهي } 80 \text{ ۽ } 100\}$$

$$Y = \{y | y \text{ وچر اڪي عدد آهي } 90 \text{ ۽ } 100\}$$

(8) هيٺين مان ڪهڙو سيٽ، ڪهڙي ٻئي سيٽ جو اپ سيٽ آهي؟

$Y =$ سڀني رامبسن جو سيٽ


$X =$ سڀني چوڪنڊن جو سيٽ

$T =$ سڀني پورو چوٽ پاسو چوڪنڊن جو سيٽ

$S =$ سڀني چؤرس جو سيٽ

$V =$ سڀني مستطيلن جو سيٽ

(9) جيڪڏهن M ڪوبه هڪ سيٽ آهي ته $M \cup \phi$ ۽ $M \cap \phi$ لکو.



(11) جيڪڏهن $n(A) = 7, n(B) = 13, n(A \cap B) = 4$ ، جيڪڏهن $n(A \cup B) = ?$

مشغولي I : خالن ۾ سيٽن جا تئو لکو

$$U = \{1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15\}$$

$$A = \{1, 11, 13\} \quad B = \{8, 5, 10, 11, 15\} \quad A' = \{\dots\dots\dots\} \quad B' = \{\dots\dots\dots\}$$

$$A \cap B = \{\dots\dots\dots\} \quad A' \cap B' = \{\dots\dots\dots\}$$

$$A \cup B = \{\dots\dots\dots\} \quad A' \cup B' = \{\dots\dots\dots\}$$

$$(A \cap B)' = \{\dots\dots\dots\} \quad (A \cup B)' = \{\dots\dots\dots\}$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B', \quad (A \cup B)' = A' \cap B'$$

مشغولي II : توهانجي آس پاس جي 20 ڪتابن جي هيٺين جاڻ هٿ ڪريو.

(i) مراني اخبار گهرائيندڙ ڪتابن جو عدد

(ii) انگريزي اخبار گهرائيندڙ ڪتابن جو عدد

(iii) انگريزي ۽ مراني ٻئي اخبارون گهرائيندڙ ڪتابن جو عدد

مليل جاڻ وين شکل وسيلي ڏيکاريو.





حقيقي عدد

2

اچو ته سڪون



- منطق عددن جون خاصيتون
- غير منطق عددن جون خاصيتون
- غير ناطق
- ٻسگهي غير ناطقن جي پيٽ
- ٻسگهي غير ناطقن تي ڪاروايون
- ٻسگهي غير ناطقن جو منطقي ڪرڻ

ذرا ياد ڪريون



اڳئين درجن ۾ اسين قدرتي عدد، سڃا انگي عدد ۽ حقيقي عددن جو اڀياس ڪيو آهي

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\} = \text{قدرتي عدد سيٽ}$$

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} = \text{سڃا عدد سيٽ}$$

$$I = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} = \text{سڃا انگي عدد سيٽ}$$

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in I, q \neq 0 \right\} = \text{منطق عدد سيٽ}$$

$$R = \text{حقيقي عدد سيٽ}$$

$$N \subseteq W \subseteq I \subseteq Q \subseteq R.$$

منطق انگن ۾ سلسلو لڳايو : $\frac{p}{q}$ ۽ $\frac{r}{s}$ منطق عدد آهن ۽ $q > 0, s > 0$

$$(i) \quad \frac{p}{q} = \frac{r}{s} \quad \text{ته} \quad p \times s = q \times r \quad \text{جيڪڏهن} \quad \frac{p}{q} > \frac{r}{s} \quad \text{ته} \quad p \times s > q \times r \quad \text{جيڪڏهن}$$

$$(iii) \quad \frac{p}{q} < \frac{r}{s} \quad \text{ته} \quad p \times s < q \times r \quad \text{جيڪڏهن}$$

چاڻي وٺون



منطق انگن جون خاصيتون (Properties of rational numbers)

جيڪڏهن a, b, c منطق عدد آهن ته

خاصيت	جوڙ	ضرب
1. سلسلو	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
2. نريڪشنا	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
3. لڳاپو	$a + 0 = 0 + a = a$	$a \times 1 = 1 \times a = a$
4. ابتڙ	$a + (-a) = 0$	$a \times \frac{1}{a} = 1 \quad (a \neq 0)$

ذرا ياد ڪريون



ڪنهن به منطق عدد جو ڏهائي اڻپور روپ ختم ٿيندڙ يا ختم نه ٿيندڙ واراڻتو هوندو آهي.

ختم نه ٿيندڙ واراڻتو روپ

ختم ٿيندڙ روپ

$$(1) \frac{17}{36} = 0.472222... = 0.47\dot{2}$$

$$(1) \frac{2}{5} = 0.4$$

$$(2) \frac{33}{26} = 1.2692307692307... = 1.2\overline{692307}$$

$$(2) -\frac{7}{64} = -0.109375$$

$$(3) \frac{56}{37} = 1.513513513... = 1.5\overline{13}$$

$$(3) \frac{101}{8} = 12.625$$

چاڻي وٺون



ختم نه ٿيندڙ واراڻتي ڏهائي اڻپور روپ واري منطق انگهه ڪي $\frac{p}{q}$ روپ ۾ ڏيکارڻ

مثال (1) $0.777... = 0.7\dot{7}$ اهو واراڻتو ڏهائي اڻپور $\frac{p}{q}$ روپ لکون.

حل : سمجهو $x = 0.777... = 0.7\dot{7}$

$$\therefore 10x = 7.777... = 7.\dot{7}$$

$$\therefore 10x - x = 7.\dot{7} - 0.\dot{7}$$

$$\therefore 9x = 7$$

$$\therefore x = \frac{7}{9}$$

$$\therefore 0.777... = \frac{7}{9}$$

مثال (2) $7.529529529... = 7.\overline{529}$ واراڻتو ڏهائي اڻپور $\frac{p}{q}$ روپ ۾ لکون

حل : سمجهو $x = 7.529529... = 7.\overline{529}$

$$\therefore 1000x = 7529.529529... = 7529.\overline{529}$$

$$\therefore 1000x - x = 7529.\overline{529} - 7.\overline{529}$$

$$\therefore 999x = 7522.0 \quad \therefore x = \frac{7522}{999}$$

$$\therefore 7.\overline{529} = \frac{7522}{999}$$



ويچار ڪريون

2.43 اهو عدد $\frac{p}{q}$ روپ ۾

لکڻ لاءِ ڇا ڪجي؟



(1) ڏنل عدد ڊڙهائي اڻپور ڪانپوءِ ڪيترا انگ وارا آھن ان موجب 10, 100, 1000. وغيره مناسب عدد سان ضرب ڪجي مثال 2.3 عدد ڊڙهڪ انگ 3 ٿي وارا ٿيو آھي. ان ڪري $2.3 \times \frac{p}{q}$ روپ ڊڙهڪ لاءِ 10 سان ضرب ڪجي. 1.24×100 ڊڙهڪ انگ وارا ٿيا آھن. ان ڪري 1.24×100 ضرب ڪجي. 1.513×1000 ڊڙهڪ انگ وارا ٿيا آھن، انڪري 1.513×1000 سان ضرب ڪجي.

(2) منطق انگ جا مفرد جزا ڇڏيو. ان ڊڙهڪ 5 کان سواءِ مفرد جزا نه هوندا ان منطق انگ جو ڊڙهڪي روپ ختم ٿيندڙ هوندو آھي. 2 ۽ 5 کان سواءِ به عدد جا مفرد جزا هوندا ته ان عدد جو ڊڙهڪي روپ ختم نه ٿيندڙ وارا ٿيو هوندو آھي.

2.1 اڀياس

1. هيٺين مان ڪهڙن منطق عددن جو ڊڙهڪي روپ ختم ٿيندڙ ۽ ڪهڙن جو ختم نه ٿيندڙ وارا ٿيو هوندو اهو لکو.

- (i) $\frac{13}{5}$ (ii) $\frac{2}{11}$ (iii) $\frac{29}{16}$ (iv) $\frac{17}{125}$ (v) $\frac{11}{6}$

2. هيٺين منطق عددن جو ڊڙهڪي روپ لکو.

- (i) $\frac{127}{200}$ (ii) $\frac{25}{99}$ (iii) $\frac{23}{7}$ (iv) $\frac{4}{5}$ (v) $\frac{17}{8}$


3. هيٺين منطق عددن کي $\frac{p}{q}$ روپ ڊڙهڪو.

- (i) $0.\dot{6}$ (ii) $0.\overline{37}$ (iii) $3.\overline{17}$ (iv) $15.\overline{89}$ (v) $2.\overline{514}$

ذرا ياد ڪريون



هيٺين انگن واري ليڪ تي $\sqrt{2}$ ۽ $\sqrt{3}$ عدد منطق نه آهن يعني اهي غير منطق آهن.



ان عددن واري ليڪ تي $OA=1$ ايڪو مفاصلو آھي. O جي کاٻي پاسي B ٽپڪو به هڪ ليڪ مفاصلي تي آھي. B ٽپڪي جو مساو 1 آھي P ٽپڪي جو مساو $\sqrt{2}$ آھي ۽ انجو ابتڙ عدد C ٽپڪي وسيلي ڏيکاريل آھي. C ٽپڪي جو مساو $-\sqrt{2}$ آھي. ساڳي طرح $\sqrt{3}$ جو ابتڙ عدد ڏيکاريندڙ D ٽپڪي جو مساو $-\sqrt{3}$ آھي.



غير منطق عدد ۽ حقيقي عدد (Irrational and real numbers)

$\sqrt{2}$ اهو غير منطق عدد آهي اهو ان سڌي ثابتيءَ وسيلي ثابت ڪري سگهجي ٿو.

$\sqrt{2}$ سمجهو ته منطق عدد آهي سمجهو ته اهو $\frac{p}{q}$ آهي.

$\frac{p}{q}$ ان عدد جو ننڍو روپ آهي يعني $p \in \mathbb{Q}$ انڪسواءِ عام جزو نه آهي.

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \therefore 2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \therefore (ٻنهي پاسن جي ٻي سگهه)$$

$$\therefore 2q^2 = p^2$$

$\therefore p^2$ اهو ٻڌي عدد آهي.

$\therefore p$ پڻ ٻڌي عدد آهي، يعني $p \in 2\mathbb{Q}$ جو جزو آهي. (I)

$$\therefore p = 2t \quad \therefore p^2 = 4t^2 \quad t \in \mathbb{I}$$

$$\therefore 2q^2 = 4t^2 \quad (\because p^2 = 2q^2) \quad \therefore q^2 = 2t^2$$

q^2 ٻڌي عدد آهي. $\therefore q$ پڻ ٻڌي عدد آهي.

$\therefore 2 \in \mathbb{Q}$ جو به عدد هڪ جزو آهي. (II)

بيان I ۽ II مان اهو $p \in \mathbb{Q}$ جو عام جزو آهي.

اها اڻڻي آهي. ڇو ته $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ 1 جو ڪانسواءِ ڪوبه عام جزو نه آهي.

$\therefore \sqrt{2}$ منطق عدد آهي ائين سمجهڻ غلط آهي. $\therefore \sqrt{2}$ غير منطق عدد آهي.

ساڳئي طريقي $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ وغيره غير منطق عدد آهن. اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو.

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ اهي عدد عددن واري ليڪ تي ڏيکاري سگهجي ٿو. اهو حقيقي عدد آهي ائين چئجي ٿو.

ٿوري ڀر عددن واري ليڪ تي هر هڪ ٽپڪي جو مساو حقيقي عدد هوندو آهي ۽ هر هڪ حقيقي عدد سان واسطيدار ٽپڪو عددن واري ليڪ تي هوندو آهي.

اسان کي ڄاڻ آهي ته هر هڪ منطق عدد، حقيقي هوندو آهي. پر $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$, π , $\sqrt{2} - \sqrt{2}$, $3 + \sqrt{2}$ اهڙا حقيقي عدد منطق نه آهن. يعني هر هڪ حقيقي عدد منطق نه هوندو آهي اهو سمجهو.

غير منطق عدد جي ڏهاڙي روپ ۾ لکڻ

اسين 2 ۽ 3 جا ٻيا مول وٺڻ واري طريقي لهنداسين

3 جو ٻيو مول

$$\begin{array}{r}
 1.41421... \\
 \hline
 1 \overline{) 2.00 \ 00 \ 00 \ 00 \dots} \\
 \underline{+1 \ -1} \\
 24 \ 100 \\
 \underline{+4 \ -96} \\
 281 \ 400 \\
 \underline{+1 \ -281} \\
 2824 \ 11900 \\
 \underline{+4 \ -11296} \\
 28282 \ 60400 \\
 \underline{+2 \ -56564} \\
 282841 \ 0383600
 \end{array}$$

$$\therefore \sqrt{3} = 1.732...$$

2 جو ٻيو مول

$$\begin{array}{r}
 1.732... \\
 \hline
 1 \overline{) 3.00 \ 00 \ 00 \ 00 \dots} \\
 \underline{+1 \ -1} \\
 27 \ 200 \\
 \underline{+7 \ -189} \\
 343 \ 1100 \\
 \underline{+3 \ -1029} \\
 3462 \ 007100 \\
 \underline{+2 \ -6924} \\
 3464 \ 0176
 \end{array}$$

$$\therefore \sqrt{2} = 1.41421...$$

هتي وٺڻ ڏهاڙي ۽ ڪاٺيپوءِ انگهه ختم نٿا ٿين يعني اهو ختم نه ٿيندڙ روپ آهي ٻيو ته ڪوبه انگهه يا انگن جو گروهه وري وري نٿو اچي. عدد جو ڏهاڙي ۽ روپ ختم نه ٿيندڙ غير واراڻتو آهي.

$\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$ غير منطق عدد آهن. يعني $1.4142...$ ۽ $1.732...$ پڻ غير منطق عدد آهن. ان مان سمجهو ته ختم نه ٿيندڙ غير واراڻتو ڏهاڙي روپ وارو عدد غير منطق هوندو آهي.

عدد π

مشغولي I

ٿلهن ڪارڊ بورڊس تي الڳ الڳ نيم قطر وارا ٿول ڪڍو، ٽي چار گولا ڪار تختيون ڪپيو هر هڪ تختي جي ڪناري تي ڏاڍو گهمائي انجو قطر ۽ گهيرو ماپيو هيٺيون خاڪو پورو ڪريو.

پير واري خاڪي ۾ $\frac{c}{d}$ ريشو هر وقت اٽڪل 3.1 اچي ٿو. يعني اهو اسٽر آهي. اهو ريشو π وسيلي ڏيکارجي ٿو.

نمبر	نيم قطر	قطر (d)	گهيرو (c)	ريشو $\frac{c}{d}$
1	7 س م			
2	8 س م			
3	5.5 س م			

مشغولي II

π جي اندازن ملهه لھڻ لاءِ 11 س م، 22 س م ۽ 33 س م ڏيگھه وارا تار جا ٽڪر ڪٽو، هرھڪ تار جو گول ٺاھيو، انھن گولن جا قطر ماپي ھيٺيون خاڪو پورو ڪريو.

گھيري ۽ قطر جو ريشو
اٽڪل $\frac{22}{7}$ آيو ڇا، اھو
جاچيو.

گول - نمبر	گھيرو	قطر	گھيري ۽ قطر جو ريشو
1	11 س م		
2	22 س م		
3	33 س م		

گول جي گھيري ۽ قطر جو ريشو، مقرر عدد ھوندو آھي ۽ اھو غير منطق ھوندو آھي. اھو عدد π وسيلي ڏيکاربو آھي π جو اٽڪل ملهه $\frac{22}{7}$ يا 3.1428 ڪٽبو آھي.

مھان ڀارتي حسابدان آريٽ پٽ سنه 499 ۾ π جو ملهه $3.1416 = \frac{62832}{20000}$ لٿو. اسان کي ڄاڻ آھي ته $\sqrt{3}$ غير منطق عدد آھي ڇو ته انجو ڏھائي روپ ختم نه ٿيندڙ غير واراٽنو آھي. ھاڻي $2 + \sqrt{3}$ اھو عدد غير منطق آھي ڇا؟ اھو ڏسو.

سمجھو ته، $2 + \sqrt{3}$ اھو غير منطق عدد نه آھي يعني اھو منطق آھي.

$$2 + \sqrt{3} = \frac{p}{q} \text{ جيڪڏھن } 2 + \sqrt{3} \text{ منطق آھي ته سمجھو}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{p}{q} - 2$$

ھتي ڪا به پاسي غير منطق عدد ۽ ساڄي پاسي منطق عدد اھڙي اڻڀڻت آھي. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته $2 + \sqrt{3}$ غير منطق عدد آھي.

ساڳئي نموني $2\sqrt{3}$ پڻ غير منطق آھي اھو ڏيکاري سگھجي ٿو $\frac{p}{q}$ الڳ الڳ عدد ڪٽي ھيٺيون ٻالھيون جاچي ڏسو.

$$2 + \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = 2, \quad 4\sqrt{5} \div \sqrt{5} = 4, \quad (3 + \sqrt{5}) - (\sqrt{5}) = 3,$$

$$2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 6, \quad \sqrt{2} \times \sqrt{5} = \sqrt{10}, \quad 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$$



ھي ڏيان ڀرڪو

غير منطق جون خاصيتون

- (1) منطق عدد ۽ غير منطق عدد جي جوڙاپٽ يا ڪٽ غير منطق عدد ھوندو آھي.
- (2) غير ٻڙي منطق عدد ۽ غير منطق عدد جي ضرب اپٽ يا ونڊاپٽ پڻ غير منطق عدد ھوندو آھي.
- (3) ٻن غير منطق عددن جي جوڙاپٽ، ڪٽ، ضرب اپٽ ۽ ونڊاپٽ منطق يا غير منطق عدد ٿي سگھي ٿو.



حقيقي عددن تي سلسلي لاڳاپي جون خاصيتون

- جيڪڏهن $a \neq b$ ۽ حقيقي عدد آهن ته انهن ۾ $b=a$ يا $a < b$ يا $b < a$ مان ڪوبه هڪ لاڳاپو هوندو آهي.
- جيڪڏهن $a < b$ ته $b < c$ يا $a < c$ جيڪڏهن $a < b$ ته $a + c < b + c$
- جيڪڏهن $a < b$ ۽ $c > 0$ ته $ac < bc$ جيڪڏهن $c < 0$ ته $ac > bc$
- منطق ۽ غير منطق عدد کڻي مٿيان نيمر ڄاچي ڏسو.

(ڪاٺو عدد جو ٻيو مول)

جيڪڏهن $b^2 = a$ ته $\sqrt{a} = b$ اها اسان کي ڄاڻ آهي. ان مان چئي سگهيو ته $x = \sqrt{5}$ يا $x^2 = 5$ جيڪڏهن اسان کي اها به ڄاڻ آهي ته ڪنهن به حقيقي عدد جي ٻي سگهه هميشه وڌو عدد هوندو آهي. يعني ڪنهن به حقيقي عدد جي ٻي سگهه ڪاٺو نه هوندي آهي پر $\sqrt{-5}$. $\therefore (\sqrt{-5})^2 = -5$ اهو حقيقي عدد نه آهي. يعني ڪاٺو حقيقي عدد جو ٻيو مول حقيقي عدد نه هوندو آهي.

اڀياس 2.2

- ثابت ڪريو ته $\sqrt{2}$ 4 غير منطق عدد آهي.
- ثابت ڪريو ته $\sqrt{5} + 3$ غير منطق عدد آهي.
- $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$ عددن واري ليڪ تي ڏيکارو.
- هينين عددن جي درميان ڪي به ٽي منطق عدد لکو.

(i) 0.3 ۽ -0.5	(ii) -2.3 ۽ -2.33
(iii) 5.2 ۽ 5.3	(iv) -4.5 ۽ -4.6



واڌو منطق عدد جو مول (Root of positive rational number)

جيڪڏهن $x^2 = 2$ ته $x = \sqrt{2}$ يا $x = -\sqrt{2}$ هوندو. $\sqrt{2}$ يا $-\sqrt{2}$ غير منطق عدد آهن اها اسان کي ڄاڻ آهي. $\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[3]{7}$ اهڙا عدد به غير منطق هوندا آهن. واڌو سچو انگي عدد $x^n = a$ ته x اهو a جو n مول آهي ائين چئبو اهو مول منطق يا غير منطق هوندو آهي. مثال $\therefore 2^5 = 32$ اهو 2 جو 5 مول، منطق آهي پر $\sqrt[5]{2}$ ته $x^5 = 2$ اهو غير منطق عدد آهي.

غير ناطق (Surds)

اسانکي ڄاڻ آهي ته 5 منطق عدد آهي پر $\sqrt{5}$ منطق نه آهي. جيئن حقيقي عدد جو ٻيون عمل يا ٽيون موم منطق يا غير منطق ٿي سگهي ٿو. تيئن n موم به منطق يا غير منطق ٿي سگهي ٿو.

جيڪڏهن n کان 1 وڏو سڄو انگي عدد آهي ۽ a واڏو حقيقي عدد جو n موم x سان ڏيکاريو ته $x^n = a$ يا $n\sqrt{a} = x$ منطق عدد هوندو ۽ a جو n موم يعني x هو غير منطق هوندو ته x کي غير ناطق (غير منطق موم) چئبو آهي.

$n\sqrt{a}$ غير ناطق ۾ n کي موم جي نشاني (radical sign) چئجي ٿو. n کي غير ناطق جي سگهه (order of the surd) ۽ a کي مولچندڙ عدد (radicand) چئجي ٿو.

- (1) سمجهو ته $\sqrt[3]{7}$ ته $a = 7, n = 3$ غير ناطق آهي ڇو ته $\sqrt[3]{7}$ غير منطق آهي.
- (2) سمجهو ته $a = 27, n = 3$ $\sqrt[3]{27} = 3$ ڪهڙي عدد جو ععب آهي. $\sqrt[3]{27}$
- (3) $\sqrt[3]{8}$ جو ععب آهي؟

سمجهو ته $\sqrt[3]{8} = p$ $p^3 = 8$ ڪهڙي عدد جو ععب آهي. 2, 8 جو ععب آهي.

$\sqrt[3]{8}$ ۾ $a = 8$ منطق عدد آهي. $n = 3$ واڏو سڄو انگي عدد آهي پر $\sqrt[3]{8}$ غير منطق هاڻي ڇو ته 8 جو ٽيون موم 2 آهي $\sqrt[3]{8}$. $\therefore$ غير ناطق نه آهي

4) هاڻي $\sqrt[4]{8}$ بابت ويچار ڪريون.

هتي $a = 8$ سگهه $a = 4$ پر 8 ڪنهن به عدد جي چوڻي سگهه نه آهي. $\sqrt[4]{8}$ غير منطق عدد آهي. $\therefore$ غير ناطق آهي.

هن سال اسان فقط سگهه 2 هوندڙ غير ناطق $\sqrt{42}, \sqrt{7}, \sqrt{3}$ وغيره بابت سکنداسين. سگهه 2 هوندڙ غير ناطقن کي پسگهي غير ناطق چئجي ٿو.

غير ناطق جو سادو روپ

ڪن غير ناطقن کي سادو روپ ڏيئي سگهجي ٿو جيئن $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ (i)

$\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = \sqrt{49} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$ (ii)

$\sqrt{5}, \sqrt{3}, \sqrt{2}, \dots$ وغيره سادي روپ وارا غير ناطق آهن. انهن کي وڌيڪ سادو روپ نٿو ڏيئي سگهجي.

هڪجهڙا غير ناطق (Similar or like surds)

$\sqrt{2}, -3\sqrt{2}, \frac{4}{5}\sqrt{2}$ اهي ڪجهه هڪجهڙا غير ناطق آهن. جيڪڏهن p ۽ q منطق عدد آهن ته $p\sqrt{a}, q\sqrt{a}$ کي هڪجهڙا غير ناطق چئجي ٿو. به غير ناطق هڪجهڙا ٿيڻ لاءِ سندن سگهه ۽ مولچندڙ ساڳيا هئڻ گهرجن.

$\sqrt{45}$ ۽ $\sqrt{80}$ غير ناطقن جي سڱه 2 آهي يعني سندن سڱه ساڳي آهي پر سندس مولجندڙ عدد ساڳيا نه آهن انڪري اهي هڪجهڙا نه آهن ائين مڃي ٿو. انهن کي اسين سادي روپ ۾ بدلايون.

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5} \quad \text{۽} \quad \sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{16} \times \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

$3\sqrt{5}$ ۽ $4\sqrt{5}$ هڪجهڙا غير ناطق آهن.

$\sqrt{45}$ ۽ $\sqrt{80}$ انهن غير ناطقن جا سادا روپ هڪجهڙا غير ناطق آهن.

ڏيان ڇرڪو



سادي روپ ۾ غير ناطقن جي سڱه ۽ مولجندڙ عدد ساڳيا ٿيندا هجن ته انهن غير ناطقن کي هڪجهڙا غير ناطق چئجي ٿو.

جاڻي ونون



(غير ناطقن جي پيٽ) (Comparison of surds)

سمجهو ته a, b, k واڌو حقيقي عدد آهن. جيڪڏهن

$a < b$ ته $ak < bk$ ساڳئي نموني $a^2 < ab < b^2$ ممڪن آهي.

جيڪڏهن $a < b$ ته $a^2 < b^2$ چو ته

جيڪڏهن $a^2 < b^2$ ته $a < b$, $a = b$, $a > b$ هئڻ سبب اهو ممڪن نه آهي.

$a = b$ ته $a^2 = b^2$, $a > b$ ته $a^2 > b^2$ اهو ئي ممڪن آهي.

$a < b$ ته $a^2 < b^2$ جيڪڏهن $a < b$.

هتي a ۽ b حقيقي عدد هئڻ سبب اهي منطق يا غير ناطق ٿي سگهن ٿا.

انجو اُپيوگ ڪري غير ناطقن ۾ ننڍوڌاڻي ڄاچينداسين.

(i) $6\sqrt{2}, 5\sqrt{5}$

$$\sqrt{36} \times \sqrt{2} \quad ? \quad \sqrt{25} \times \sqrt{5}$$

$$\sqrt{72} \quad ? \quad \sqrt{125}$$

$$72 \quad ? \quad 125$$

$$\therefore 6\sqrt{2} \quad ? \quad 5\sqrt{5}$$

(ii) $8\sqrt{3}, \sqrt{192}$

$$\sqrt{64} \times \sqrt{3} \quad ? \quad \sqrt{192}$$

$$\sqrt{192} \quad ? \quad \sqrt{192}$$

$$192 \quad ? \quad 192$$

$$\therefore \sqrt{192} \quad ? \quad \sqrt{192}$$

$$\therefore 8\sqrt{3} \quad ? \quad \sqrt{192}$$

(iii) $7\sqrt{2}, 5\sqrt{3}$

$$\sqrt{49} \times \sqrt{2} \quad ? \quad \sqrt{25} \times \sqrt{3}$$

$$\sqrt{98} \quad ? \quad \sqrt{75}$$

$$98 \quad ? \quad 75$$

$$\therefore 7\sqrt{2} \quad ? \quad 5\sqrt{3}$$

$$(6\sqrt{2})^2 \quad ? \quad (5\sqrt{5})^2,$$

$$72 < 125$$

$$\therefore 6\sqrt{2} \quad ? \quad 5\sqrt{5}$$

$$(7\sqrt{2})^2 \quad ? \quad (5\sqrt{3})^2,$$

$$98 > 75$$

$$\therefore 7\sqrt{2} \quad ? \quad 5\sqrt{3}$$

هڪجهڙن غير ناطقن تي ڪاروايون (Operations on like surds)

هڪجهڙن غير ناطقن تي جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ اهي ڪاروايون ڪري سگهجن ٿيون.



$$\begin{aligned} \sqrt{9+16} &\stackrel{?}{=} \sqrt{9} + \sqrt{16} \\ \sqrt{100+36} &\stackrel{?}{=} \sqrt{100} + \sqrt{36} \end{aligned}$$

مثال (1) ساهو روپ ڏيو: $7\sqrt{3} + 29\sqrt{3}$

حل : $7\sqrt{3} + 29\sqrt{3} = (7 + 29)\sqrt{3} = 36\sqrt{3}$

مثال (2) ساهو روپ ڏيو: $7\sqrt{3} - 29\sqrt{3}$

حل : $7\sqrt{3} - 29\sqrt{3} = (7 - 29)\sqrt{3} = -22\sqrt{3}$

مثال (3) سادو روپ ڏيو: $13\sqrt{8} + \frac{1}{2}\sqrt{8} - 5\sqrt{8}$

حل : $13\sqrt{8} + \frac{1}{2}\sqrt{8} - 5\sqrt{8} = \left(13 + \frac{1}{2} - 5\right)\sqrt{8} = \left(\frac{26+1-10}{2}\right)\sqrt{8}$

$$= \frac{17}{2}\sqrt{8} = \frac{17}{2}\sqrt{4 \times 2}$$

$$= \frac{17}{2} \times 2\sqrt{2} = 17\sqrt{2}$$

مثال (4) سادو روپ ڏيو: $8\sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{125}$

حل : $8\sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{125} = 8\sqrt{5} + \sqrt{4 \times 5} - \sqrt{25 \times 5}$

$$= 8\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 5\sqrt{5}$$

$$= (8 + 2 - 5)\sqrt{5}$$

$$= 5\sqrt{5}$$

مثال (5) غير ناطقن جي ضرب ڪريو: $\sqrt{7} \times \sqrt{42}$

حل : $\sqrt{7} \times \sqrt{42} = \sqrt{7 \times 42} = \sqrt{7 \times 7 \times 6} = 7\sqrt{6}$ (غير منطق عدد آهي)

مثال (6) غير ناطقن جي ونڊ ڪريو: $\sqrt{125} \div \sqrt{5}$ (5 منطق عدد آهي)

حل : $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{125}{5}} = \sqrt{25} = 5$

مثال (7) $\sqrt{50} \times \sqrt{18} = \sqrt{25 \times 2} \times \sqrt{9 \times 2} = 5\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 15 \times 2 = 30$

ٻن غير ناطقن جي ونڊ اپت يا ضرب منطق عدد ٿي سگهي ٿو اهو مٿين مثالن مان سمجهو.

غير ناطقن جو منطقي ڪرڻ (Rationalization of surd)

هن غير ناطقن جي ضرب اُپت منطق عدد هوندي ته انهن مان هڪ غير ناطق کي ٻئي غير ناطق جو منطقي ڪندڙ (Rationalizing Factor) چئجي ٿو.

مثال (1) $\sqrt{2}$ غير ناطقن کي $\sqrt{2}$ سان ضرب سان $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$ يعني ملي ٿو. $\sqrt{4}$ اهو منطق عدد آهي. $\therefore \sqrt{2}$ جو منطقي ڪندڙ جزو $\sqrt{2}$ آهي.

مثال (2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ ضرب ڪريو

$$\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \quad (4 \text{ منطق عدد آهي})$$

$\therefore \sqrt{2}$ جو $\sqrt{8}$ جو منطقي ڪندڙ جزو آهي.

$8\sqrt{2}$ جو $\sqrt{2}$ منطقي ڪندڙ جزو آهي.

$$\sqrt{2} \times 8\sqrt{2} = 8 \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 8 \times 2 = 16.$$

$\sqrt{2}$ اهي $\sqrt{50}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{6}$ جا منطقي ڪندڙ جزا آهن ڇا اهو ڄاڻيو.

ڏيان ڀرڪو ته



ڏنل غير ناطقن جو منطقي ڪندڙ جزو اڪيلو نه هوندو آهي. ڪو غير ناطق ڏنل غير ناطق جو منطقي ڪندڙ جزو هوندو ته انکي غير ٻڙي منطق عدد سان ضرب ڪري ملندڙ غير ناطق به ڏنل غير ناطق جو منطقي ڪندڙ جزو هوندو آهي.

مثال (3) $\sqrt{27}$ جو منطقي ڪندڙ جزو لکو

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3} \quad \text{حل : } 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 \times 3 = 9 \quad 9 \text{ منطق عدد آهي}$$

$\therefore \sqrt{27}$ جو $\sqrt{3}$ جو منطقي ڪندڙ جزو آهي.

$$3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 9 \times 3 = 27. \quad \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ , ڏيان ڀرڪو ته}$$

يعني ڏنل غير ناطق $\sqrt{27}$ جو $\sqrt{3}$ 3 ڀڙ منطقي ڪندڙ جزو آهي. ان کانسواءِ $7\sqrt{3}$, $4\sqrt{3}$ وغيره ٻيا به

انڪ ڄڙا ملندا. انهن مان $\sqrt{3}$ سادي روپ وارو منطقي ڪندڙ جزو آهي.

مثال (4) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ جي چيد کي منطق بڻايو.

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \text{حل : } \dots \text{ انس ۽ چيد کي } \sqrt{5} \text{ سان ضرب ڪرڻ}$$

مثال (5) $\frac{3}{2\sqrt{7}}$ جي چيد کي منطق بڻايو.

$$\frac{3}{2\sqrt{7}} = \frac{3}{2\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{2 \times 7} = \frac{3\sqrt{7}}{14} \quad \text{حل : } (\text{ کي } 2\sqrt{7} \text{ سان } \sqrt{7} \text{ ضرب ڪافي آهي})$$



چيد ڪي منطق بڻائڻ لاءِ منطقي ڪندڙ جزو لهڻ جو اڀيوڳ ٿيندو آهي. ڪنهن به عدد جو چيد منطق عدد هئڻ سهوليت ڀريو هوندو آهي. انڪري چيد ڪي منطق بڻائبو آهي

اڀياس 2.3

(1) هيٺين غير ناطقن جي سڱه ٻڌايو

(i) $\sqrt[3]{7}$ (ii) $5\sqrt{12}$ (iii) $\sqrt[4]{10}$ (iv) $\sqrt{39}$ (v) $\sqrt[3]{18}$

(2) هيٺين مان ڪهڙا عدد غير ناطق آهن

(i) $\sqrt[3]{51}$ (ii) $\sqrt[4]{16}$ (iii) $\sqrt[5]{81}$ (iv) $\sqrt{256}$ (v) $\sqrt[3]{64}$ (vi) $\sqrt{\frac{22}{7}}$

(3) هيٺين غير ناطقن جي جوڙن مان ڪهڙا هڪجهڙا ۽ ڪهڙا علحدا آهن اهو سڃاڻو.

(i) $\sqrt{52}$, $5\sqrt{13}$ (ii) $\sqrt{68}$, $5\sqrt{3}$ (iii) $4\sqrt{18}$, $7\sqrt{2}$

(iv) $19\sqrt{12}$, $6\sqrt{3}$ (v) $5\sqrt{22}$, $7\sqrt{33}$ (vi) $5\sqrt{5}$, $\sqrt{75}$

(4) هيٺين غير ناطقن کي سادي روپ ڀرڻ لايو.

(i) $\sqrt{27}$ (ii) $\sqrt{50}$ (iii) $\sqrt{250}$ (iv) $\sqrt{112}$ (v) $\sqrt{168}$

(5) هيٺين عددن ڀرڻڊ وڌائي طيء ڪريو

(i) $7\sqrt{2}$, $5\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt{247}$, $\sqrt{274}$ (iii) $2\sqrt{7}$, $\sqrt{28}$

(iv) $5\sqrt{5}$, $7\sqrt{2}$ (v) $4\sqrt{42}$, $9\sqrt{2}$ (vi) $5\sqrt{3}$, 9 (vii) 7 , $2\sqrt{5}$

(6) سادي صورت ڀرڻ لايو.

(i) $5\sqrt{3} + 8\sqrt{3}$ (ii) $9\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + \sqrt{125}$

(iii) $7\sqrt{48} - \sqrt{27} - \sqrt{3}$ (iv) $\sqrt{7} - \frac{3}{5}\sqrt{7} + 2\sqrt{7}$

(7) ضرب ڪري سادي صورت ڀرڻ لايو

(i) $3\sqrt{12} \times \sqrt{18}$ (ii) $3\sqrt{12} \times 7\sqrt{15}$

(iii) $3\sqrt{8} \times \sqrt{5}$ (iv) $5\sqrt{8} \times 2\sqrt{8}$

(8) ونڊ ڪري سادي صورت ڀرڻ لايو

(i) $\sqrt{98} \div \sqrt{2}$ (ii) $\sqrt{125} \div \sqrt{50}$ (iii) $\sqrt{54} \div \sqrt{27}$ (iv) $\sqrt{310} \div \sqrt{5}$

(9) چيد جو منطق بڻايو

(i) $\frac{3}{\sqrt{5}}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{14}}$ (iii) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ (iv) $\frac{6}{9\sqrt{3}}$ (v) $\frac{11}{\sqrt{3}}$



اسانکي ڄاڻ آهي ته

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \text{جڏهن } a > 0, b > 0$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 ; \quad (\sqrt{a})^2 = a ; \quad \sqrt{a^2} = a$$

ضرب ڪريو

مثال (2)

$$\begin{aligned} & (\sqrt{3} - \sqrt{2})(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}) \\ &= \sqrt{3}(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}) - \sqrt{2}(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}) \\ &= \sqrt{3} \times 2\sqrt{3} - \sqrt{3} \times 3\sqrt{2} - \sqrt{2} \times 2\sqrt{3} + \sqrt{2} \times 3\sqrt{2} \\ &= 2 \times 3 - 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 3 \times 2 \\ &= 6 - 5\sqrt{6} + 6 \\ &= 12 - 5\sqrt{6} \end{aligned}$$

مثال (1)

$$\begin{aligned} & \sqrt{2}(\sqrt{8} + \sqrt{18}) \\ &= \sqrt{2 \times 8} + \sqrt{2 \times 18} \\ &= \sqrt{16} + \sqrt{36} \\ &= 4 + 6 \\ &= 10 \end{aligned}$$



ٻڌو ٻڌڻي غير ناطق (Binomial quadratic surd)

$$\sqrt{5} + \sqrt{3} ; \frac{3}{4} + \sqrt{5} \quad \text{اهي ٻڌا ٻڌڻي غير ناطق آهن} \quad \sqrt{5} - \sqrt{3} ; \frac{3}{4} - \sqrt{5}$$

ٻڌ ٻڌا ٻڌڻي غير ناطق آهن.

هيٺيان ضرب جا مثال ڏسو

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{7})(\sqrt{3} - \sqrt{7}) = (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{7})^2 = 3 - 7 = -4$$

$$\left(\frac{3}{2} + \sqrt{5}\right)\left(\frac{3}{2} - \sqrt{5}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - (\sqrt{5})^2 = \frac{9}{4} - 5 = \frac{9-20}{4} = -\frac{11}{4}$$

$(\sqrt{5} + \sqrt{3})$ ۽ $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ اهي ٻڌي غير ناطقن جا ضرب ايتڙ جوڙا آهن اهڙن ٻڌي غير ناطق جي جوڙي کي سنجوڳي جوڙو چئجي ٿو. ٻڌو غير ناطق ۽ سندس سنجوڳي جوڙو آهي.

هڪ ٻئي جا منطقي ڪندڙ جزا هوندا آهن.

$\sqrt{5} - \sqrt{3}$ يا $\sqrt{3} - \sqrt{5}$ انهن مان هر هڪ ٻڌو غير ناطق $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ يا غير ناطق جو سنجوڳي جوڙو آهي.

ساڳئي نموني $7 + \sqrt{3}$ جو سنجوڳي جوڙو $7 - \sqrt{3}$ آهي.



ٻڌي غير ناطقن جي سنجوڳي جي ضرب اپت هميشه منطق عدد ايندو آهي.



چيد جو منطقي ڪرڻ (Rationalization of the denominator)

سنجوڳي ٻڌن غير ناطقن جي ضرب اپت منطق هوندي آهي انهيءَ خاصيت جو اُڀيوڳه ڪري، عددن جي ٻڌي غير ناطق چيد کي منطق بڻائي سگهجي ٿو.

مثال (1) عدد جو چيد منطق بڻايو $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

حل : ان ٻڌي غير ناطق جو سنجوڳي جوڙو $5 + \sqrt{3}$ آهي

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{5-3} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$$

مثال (2) عدد جو چيد منطق بڻايو $\frac{8}{3\sqrt{2}+\sqrt{5}}$

حل : ان ٻڌي غير ناطق جو سنجوڳي جوڙو $3\sqrt{2} - \sqrt{5}$ آهي

$$\begin{aligned} \frac{8}{3\sqrt{2}+\sqrt{5}} &= \frac{8}{3\sqrt{2}+\sqrt{5}} \times \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3\sqrt{2}-\sqrt{5}} \\ &= \frac{8(3\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(3\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2} \\ &= \frac{8 \times 3\sqrt{2} - 8\sqrt{5}}{9 \times 2 - 5} = \frac{24\sqrt{2} - 8\sqrt{5}}{18 - 5} = \frac{24\sqrt{2} - 8\sqrt{5}}{13} \end{aligned}$$

اڀياس 2.4

(1) ضرب ڪريو

(i) $\sqrt{3}(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(ii) $(\sqrt{5} - \sqrt{7})\sqrt{2}$

(iii) $(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(4\sqrt{3} - \sqrt{2})$

(2) هيٺين عددن جي چيدن کي منطق بڻايو.

(i) $\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

(ii) $\frac{3}{2\sqrt{5}-3\sqrt{2}}$

(iii) $\frac{4}{7+4\sqrt{3}}$

(iv) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$



سنتنر ملهه (Absolute value)

x جيڪڏهن x هڪ حقيقي عدد آهي ته x جو سنتنر ملهه يا عددن واري ليڪ تي r کان o انجو مفاصلو $|x|$ ائين لکيو آهي ۽ انکي ' x جو سنتنر ملهه' (Absolute Value) ائين پڙهيو آهي. سنتنر ملهه جي وصف هيٺين ۽ ريت ڪبي آهي.

جيڪڏهن $x > 0$ ته $|x| = x$ (جيڪڏهن x واڌو آهي ته x جو سنتنر ملهه x هوندو آهي)

جيڪڏهن $x = 0$ ته $|x| = 0$ (جيڪڏهن x ٻڙي آهي ته x جو سنتنر ملهه x ٻڙي هوندو آهي)

جيڪڏهن $x < 0$ ته $|x| = -x$ (جيڪڏهن x ڪاٺو آهي ته x جو سنتنر ملهه x ان جي اُتر عدد جيترو هوندو)

$$\text{مثال (1)} \quad |0| = 0 \quad |-3| = -(-3) = 3 \quad |3| = 3$$

ڪنهن به حقيقي عدد جو سنتنر ملهه ڪاٺو نه هوندو آهي

مثال (2) هيٺين جا ملهه لھو

$$(i) |9-5| = |4| = 4$$

$$(ii) |8-13| = |-5| = 5$$

$$(iii) |8|-|-3| = 5$$

$$(iv) |8| \times |4| = 8 \times 4 = 32$$

مثال (3) حل ڪريو: $|x-5| = 2$

$$\therefore x - 5 = +2 \quad \text{يا} \quad x - 5 = -2$$

$$\therefore x = 2 + 5 \quad \text{يا} \quad x = -2 + 5$$

$$\therefore x = 3 \quad \text{يا} \quad x = 7$$

اڀياس 2.5

(1) ملهه لھو


$$(i) |15 - 2|$$

$$(ii) |4 - 9|$$

$$(iii) |7| \times |-4|$$


(2) حل ڪريو:

$$(i) |3x-5| = 1 \quad (ii) |7-2x| = 5 \quad (iii) \left| \frac{8-x}{2} \right| = 5 \quad (iv) \left| 5 + \frac{x}{4} \right| = 5$$



مشغولي (I) : پروان ڪارڊن تي ڪجهه حقيقي
عدد ڏنل آهن. انهن کي ڪم آڻي جوڙ،
ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ جا به به مثال ٺاهيو ۽
حل ڪريو.

مشغولي (II)



گڏيل پيڙاس 2

(1) هيٺين سوالن جا مناسب جواب چونڊيو

(i) هيٺين مان غير منطق عدد ڪهڙو آهي؟

- (A) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ (B) $\sqrt{5}$ (C) $\frac{3}{9}$ (D) $\sqrt{196}$

(ii) هيٺين مان غير منطق عدد ڪهڙو آهي؟

- (A) 0.17 (B) $1.\overline{513}$ (C) $0.274\overline{6}$ (D) 0.101001000.....

(iii) هيٺين مان ڪهڙي عدد جو ڏهائي روپ ختم نه ٿيندڙ واراڻتو ٿيندو؟

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{3}{11}$ (D) $\frac{137}{25}$

(iv) عددن واري ليڪ تي هر هڪ ٽپڪو ڇا ڏيکاريندو آهي؟

- (A) قدرتي عدد (B) غير منطق عدد (C) منطق عدد (D) حقيقي عدد

(v) $0.\dot{4}$ عدد جو منطق روپ ڪهڙو آهي؟

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{40}{9}$ (C) $\frac{3.6}{9}$ (D) $\frac{36}{9}$

(vi) جيڪڏهن n پوري ٻي سڱه وارو عدد نه آهي ته $\sqrt{n}$ هيٺين مان ڪهڙو عدد هوندو؟

(A) قدرتي عدد (B) منطقي عدد

(C) غير منطقي عدد (D) A, B, C ٽيئي جواب ممڪن آهن

(vii) هيٺين مان ڪهڙو عدد غير ناطق نه آهي؟

(A) $\sqrt{7}$ (B) $\sqrt[3]{17}$ (C) $\sqrt[3]{64}$ (D) $\sqrt{193}$

(viii) $\sqrt[3]{\sqrt{5}}$ غير ناطق جي سڱه ڪهڙي آهي؟

(A) 3 (B) 2 (C) 6 (D) 5

(ix) $2\sqrt{5} + \sqrt{3}$ ٻيڊي غير ناطق جو سنجوڳي جوڙو ڪهڙو آهي؟

(A) $-2\sqrt{5} + \sqrt{3}$ (B) $-2\sqrt{5} - \sqrt{3}$ (C) $2\sqrt{3} - \sqrt{5}$ (D) $\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

(x) $|12 - (13+7) \times 4|$ ملهه ڪيترو آهي؟

(A) -68 (B) 68 (C) -32 (D) 32.

(2) هيٺيان عدد $\frac{p}{q}$ روپ ۾ لکو

(i) 0.555 (ii) $29.\overline{568}$ (iii) $9.315\ 315\ \dots$ (iv) $357.417417\dots$ (v) $30.\overline{219}$

(3) هيٺيان عدد ڏهاڻي روپ ۾ بدلايو

(i) $\frac{-5}{7}$ (ii) $\frac{9}{11}$ (iii) $\sqrt{5}$ (iv) $\frac{121}{13}$ (v) $\frac{29}{8}$

(4) $5 + \sqrt{7}$ ڏيکاريو ته عدد غير منطقي آهي

(5) هيٺيان غير ناطق سادي صورت ۾ بدلايو

(i) $\frac{3}{4}\sqrt{8}$ (ii) $-\frac{5}{9}\sqrt{45}$

(6) هيٺين غير ناطقن جو سادو منطقي ڪندڙ جزو لکو

(i) $\sqrt{32}$ (ii) $\sqrt{50}$ (iii) $\sqrt{27}$ (iv) $\frac{3}{5}\sqrt{10}$ (v) $3\sqrt{72}$ (vi) $4\sqrt{11}$

(7) سادي روپ ۾ بدلايو

(i) $\frac{4}{7}\sqrt{147} + \frac{3}{8}\sqrt{192} - \frac{1}{5}\sqrt{75}$ (ii) $5\sqrt{3} + 2\sqrt{27} + \frac{1}{\sqrt{3}}$ (iii) $\sqrt{216} - 5\sqrt{6} + \sqrt{294} - \frac{3}{\sqrt{6}}$

(iv) $4\sqrt{12} - \sqrt{75} - 7\sqrt{48}$ (v*) $2\sqrt{48} - \sqrt{75} - \frac{1}{\sqrt{3}}$

(8) ڇيڊ ڪي منطقي بڻايو

(i) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (ii) $\frac{2}{3\sqrt{7}}$ (iii) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ (iv) $\frac{1}{3\sqrt{5}+2\sqrt{2}}$ (v) $\frac{12}{4\sqrt{3}-\sqrt{2}}$





گهٽڀڌا

3

اچو ته سڪون



- گهٽڀڌن جي سڃاڻپ
- گهٽڀڌن تي ڪاروايون • گڏپڌن جي ڀڌوي
- سنشليتڪ ونڊ
- گهٽڀڌن جو ملهه • پاڇي سڏيان

اچو چڙا ڪريون



$$p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p ; m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5 ; 6$$

ماسٽر : شاگرد دوستو، $p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p$ ، $m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5$ ، 6 انهن ڪالڪن مان هر هڪ مان هڪ ڀڌ ڪٽو ان ڀڌ جي ڦيرائڻن جي سگهه ٻڌايو

مادري : $p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p$ ڪالڪ ڀڌن جي ڦيرائڻن جي سگهه نمبروار 1، 2، 3 آهي.

وويڪ : سر، $m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5$ ڪالڪ ڀڌن جي ڦيرائڻن جي سگهه نمبروار 2، 3، 5 آهي.

روهت : سر، 6 ان ڪالڪ ڦيرائڻو نه آهي. انکي $6 = 6 \times 1 = 6 \times x^0$ ائين لکي سگهجي ٿو. ان ڪري 6 ڪالڪ ڦيرائڻن جي سگهه 0 آهي.

ماسٽر : مٿين سڀني ڪالڪن ڦيرائڻن جي سگهه واڌو سڄو عدد يا ٻڌي آهي.

جن آلجبرا جي ڪالڪن ڦيرائڻن جي سگهه سڄو عدد هوندي آهي انهن کي آلجبرا جي ڪالڪن کي گهٽڀڌا (polynomial) چئجي ٿو. 6 پڻ گهٽڀڌو آهي 3، 0، $\frac{1}{2}$ ، -7، 6 وغيره اسٽر عددن کي اسٽر گهٽڀڌا (Constant polynomial) چئجي ٿو. پڻ اسٽر گهٽڀڌو آهي.

$$\sqrt{y} + 5 \text{ ۽ } \frac{1}{y} - 3 \text{ گهٽڀڌا آهن ڇا ؟}$$


سارا : سر، $\sqrt{y} + 5$ گهٽڀڌو نه آهي ڇو ته $\sqrt{y} + 5 = y^{\frac{1}{2}} + 5$ ان ۾ y جي سگهه $\frac{1}{2}$ آهي جيڪا سڄو عدد نه آهي.

جان : سر، $\frac{1}{y} - 3$ پڻ گهٽڀڌو نه آهي ڇو ته $\frac{1}{y} - 3 = y^{-1} - 3$ هتي y جي سگهه -1 آهي جيڪا سڄو عدد نه آهي.

ماسٽر : گهٽڀڌو نه هوندڙ کي به پنڄ ڪالڪ لکي اهي گهٽڀڌا ڇو نه آهن اهو سمجهايو هيٺين سوالن جا جواب الڳ الڳ مثال ڪٽي ۽ انهن تي چڙا ڪري ٻولهيو

- هر هڪ آلجبرا جو ڪالڪ گهٽڀڌو هوندو آهي ڇا؟
- هر هڪ گهٽڀڌو، آلجبرا جو ڪالڪ هوندو آهي ڇا؟

گهٽپدن جا قسم (پدن جي عدد موجب)



هڪ ڦيرائڻي وارا گهٽپدا سندس ڦيرائڻي موجب $p(x)$, $q(m)$, $r(y)$ اهڙي ريت ڏيکاربا آهن.

$$p(x) = x^3 + 2x^2 + 5x - 3 \quad q(m) = m^2 + \frac{1}{2}m - 7 \quad r(y) = y^2 + 5$$

ڄاڻي وٺون



هڪ ڦيرائڻي واري گهٽپدي جي پدوي (Degree of a polynomial in one variable)

ماسٽر : $2x^7 - 5x + 9$ گهٽپدي جي ڦيرائڻي جي سڀ کان وڏي سگهه ڪهڙي آهي؟
جيتو : سرسپني کان وڏي سگهه 7 آهي.
ماسٽر : هڪ ڦيرائڻي وارن گهٽپدن ۾، ڦيرائڻي جي وڏي ۾ وڏي سگهه کي ان گهٽپدي جي پدوي چوندا آهن.

اشوڪ : سر $2x^7 - 5x + 9$ گهٽپدي جي پدوي 7 آهي

ماسٽر : 10 گهٽپدي جي پدوي ڪيتري؟

راڌا : $10 = 10 \times 1 = 10 \times x^0$ انڪري 10، گهٽپدي جي پدوي 0 آهي.

ماسٽر : 10 وانگر ڪنهن به غير ٻڙي اسٽر گهٽپدي جي پدوي 0 هوندي آهي.

ٻڙي گهٽپدي جي پدوي وصفيل نه آهي.

هڪ کان وڌيڪ ڦيرائڻن واري گهٽپدي جي پدوي

گهٽپدي جي هر هڪ پد جي ڦيرائڻن جي سگهن جي وڏي ۾ وڏي جوڙاپٽ کي ان گهٽپدي جي پدوي چئجي ٿو.


مثال $3m^3n^6 + 7m^2n^3 - mn$ ٻن ڦيرائڻن وارو گهٽپدو آهي. ان گهٽپدي جي پدوي 9 آهي
(سگهن جي جوڙاپٽ $3 + 6 = 9$, $2 + 3 = 5$, $1 + 1 = 2$)

مشغولي I : ڦيرائتو x ۽ ڀڌوي 5 هوندڙ هڪڀڌي ، ٻيڌي ۽ ٽپڌي جو هڪ مثال لکو

هڪڀڌو ٻيڌو ٽپڌو

مشغولي II : 5 ڀڌوي هوندڙ : ٻن ڦيرائتن واري ٻيڌي جو مثال لکو .

گهڻپڌن جا قسم (ڀڌويءَ موجب)



گهڻپڌو : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ اهو x ڦيرائتي n ڀڌوي هوندڙ گهڻپڌو آهي هتي

$a_n \neq 0$ اهي گڻڪ آهن $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$

گهڻپڌي جو ڀر ماڻڪ روپ ، گڻڪ روپ ۽ قوت نما روپ

(Standard form, co-efficient form and index form of a polynomial)

$p(x) = x^4 - 3x^2 + x + 5$ اهو گهڻپڌو x جي سگهن جي گهٽجندڙ سلسلي ۾ $x^4 - 3x^2 + x + 5$

اٿين لکبو. اهو ڀر ماڻڪ روپ آهي. ان گهڻپڌي ۾ x جي ٽي سگهن وارو پڌ نه آهي. اهو $0x^3$

اٿين مڃي سگهجي ٿو. اهو پڌ ڪٿي گهڻپڌو $p(x) = x^4 + 0x^3 - 3x^2 + x + 5$

اٿين لکي سگهيو. اهڙيءَ ريت قوت نمائن (سگهن) جي گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکيل ۽ قوت نما روپ جا

سڀئي پڌ خاص گهڻپڌي کي قوت نما روپ چئجي ٿو.

ڪڏهن ڪڏهن قوت نما روپ واري گهٽپدي جا ڦيرائڻا نه ڪڍي فقط گڻڪ سلسليوار لکبا آهن مثال :

گهٽپدو $x^3 - 3x^2 + 0x - 8$ ائين لکبو آهي. انکي گهٽپدي جو گڻڪ روپ چئجي ٿو.

گهٽپدو $y^4 + 0y^3 - 5y^2 + 0y + 1$ ائين لکبو آهي. انکي گهٽپدي جو گڻڪ روپ چئجي ٿو.

ائين لکي سگهيو.

گهٽپدي جو گڻڪ ۽ قوت نما روپ

$$p(m) = 3m^5 - 7m + 5m^3 + 2$$

$3m^5 + 5m^3 - 7m + 2$	گهٽپدو پرمائڪ روپ ۾ لکيو
$3m^5 + 0m^4 + 5m^3 + 0m^2 - 7m + 2$	گهٽپدي ۾ نه هوندڙ ٻڙي گڻڪ ڪڍي شامل ڪريو ۽ قوت نما روپ لکيو.
$(3, 0, 5, 0, -7, 2)$	ڏنل گهٽپدي جو گڻڪ روپ لکيو
5	گهٽپدي جي پدوي

مثال (1) $x^3 + 3x - 5$ گهٽپدو گڻڪ روپ ۾ لکيو

$$x^3 + 3x - 5 = x^3 + 0x^2 + 3x - 5$$

حل : ڏنل گهٽپدي جو گڻڪ روپ $(1, 0, 3, -5)$

مثال (2) $(2, -1, 0, 5, 6)$ اهو گڻڪ روپ وارو گهٽپدو قوت نما روپ ۾ لکيو

حل : گهٽپدي جو گڻڪ روپ $(2, -1, 0, 5, 6)$

$$2x^4 - x^3 + 0x^2 + 5x + 6 =$$

$$2x^4 - x^3 + 5x + 6$$

3.1 اڀياس

1. هيٺيان ڪالڪ گهٽپدا آهن ڇا؟ سمجهايو

- (i) $y + \frac{1}{y}$ (ii) $2 - 5\sqrt{x}$ (iii) $x^2 + 7x + 9$
- (iv) $2m^2 + 7m - 5$ (v) 10

2. هيٺين گهٽپدن ۾ m^3 جو گڻڪ لکيو

- (i) m^3 (ii) $\frac{-3}{2} + m - \sqrt{3} m^3$ (iii) $\frac{-2}{3} m^3 - 5m^2 + 7m - 1$

3. هيٺين جاڻ موجب x ڦيرائڻو ڪر آڻي هر هڪ جو هڪ گهٽپدو لکيو

- (i) پدوي 7 وارو هڪپدو (ii) پدوي 35 وارو ٻپدو (iii) پدوي 8 وارو ٽپدو

4. گھڻپڊن جي ڀڌوي لکو.

- (i) $\sqrt{5}$ (ii) x^0 (iii) x^2 (iv) $\sqrt{2}m^{10} - 7$ (v) $2p - \sqrt{7}$
 (vi) $7y - y^3 + y^5$ (vii) $xyz + xy - z$ (viii) $m^3n^7 - 3m^5n + mn$

5. هيٺين گھڻپڊن کي ليکي، ٻسڻهي ۽ ٽسڻهي گھڻپڊن ۾ ورهايو.

- (i) $2x^2 + 3x + 1$ (ii) $5p$ (iii) $\sqrt{2}y - \frac{1}{2}$
 (iv) $m^3 + 7m^2 + \frac{5}{2}m - \sqrt{7}$ (v) a^2 (vi) $3r^3$

6. هيٺيان گھڻپڊا ڀرماڻڪ روپ ۾ لکو.

- (i) $m^3 + 3 + 5m$ (ii) $-7y + y^5 + 3y^3 - \frac{1}{2} + 2y^4 - y^2$


7. هيٺيان گھڻپڊا گڻڪ روپ ۾ لکو.

- (i) $x^3 - 2$ (ii) $5y$ (iii) $2m^4 - 3m^2 + 7$ (iv) $-\frac{2}{3}$

8. هيٺيان گڻڪ روپ وارا گھڻپڊا ڦيرائڻو x واپرائڻي ڀرماڻڪ روپ ۾ لکو.

- (i) $(1, 2, 3)$ (ii) $(5, 0, 0, 0, -1)$ (iii) $(-2, 2, -2, 2)$

9. هيٺ ڪجهه گھڻپڊا ڏنل آهن اهي مناسب چؤڪنڊن ۾ لکو.



ذرا ياد ڪريون



(1) ٻن هڪجهڙن آلجبرائي ڀڌن جو جوڙ يا ڪٽ ڪرڻ وقت سندن گڻڪن جو جوڙ يا ڪٽ ڪبي آهي.

$$\text{مثال، } 5m^3 - 7m^3 = (5 - 7)m^3 = -2m^3$$

(2) ٻن آلجبرائي ڀڌن جي ضرب يا ونڊ ڪرڻ وقت سندن گڻڪن جي ضرب يا ونڊ ٿيندي آهي ان سان

گڏ قوت نمائڻ جا قاعدا به واپرائبا آهن.

$$\text{مثال، } -4y^3 \times 2y^2z = -8y^5z ; 12a^2b \div 3ab^2 = \frac{4a}{b}$$



گھٹپدن تي کارروايون

گھٹپد جو جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ اهي کارروايون آڻجبرائي ڪالڪن تي کاررواين وانگر ڪبيون آهن.

مثال (1) $5a^2 - 2a$ مان $7a^2 + 5a + 6$ ڪٽ ڪريو

$$(7a^2 + 5a + 6) - (5a^2 - 2a) \quad \text{حل :}$$

$$= 7a^2 + 5a + 6 - 5a^2 + 2a$$

$$= \underline{7a^2 - 5a^2} + \underline{5a + 2a} + 6$$

$$= 2a^2 + 7a + 6$$

مثال (2) $-2a \times 5a^2 = -10a^3$

مثال (3) $(m^2 - 5) \times (m^3 + 2m - 2) = ?$

$$(m^2 - 5) \times (m^3 + 2m - 2) \quad \text{حل :}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{پهرئين گھٹپدن جي هر هڪ} \\ \text{پد جي پئين گھٹپدي سان ضرب} \end{array} \right\} \begin{array}{l} = m^2(m^3 + 2m - 2) - 5(m^3 + 2m - 2) \\ = m^5 + 2m^3 - 2m^2 - 5m^3 - 10m + 10 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{هڪ جھڙن پدن کي گڏ ڪرڻ} &= m^5 + 2m^3 - 5m^3 - 2m^2 - 10m + 10 \\ &= m^5 - 3m^3 - 2m^2 - 10m + 10 \end{aligned}$$

مثال (4) $3m^2n + 5mn^2 - 7mn$ ۽ $2m^2n - mn^2 + mn$ جو جوڙ ڪريو

$$(3m^2n + 5mn^2 - 7mn) + (2m^2n - mn^2 + mn) \quad \text{حل :}$$

$$= 3m^2n + 5mn^2 - 7mn + 2m^2n - mn^2 + mn$$

$$(\text{هڪجھڙن پدن کي گڏ ڪرڻ}) = \underline{3m^2n + 2m^2n} + \underline{5mn^2 - mn^2} - \underline{7mn + mn}$$

$$(\text{هڪجھڙن پدن جو جوڙ}) = 5m^2n + 4mn^2 - 6mn$$



هڪ گھڻپدي جي پڌوي 3 ۽ ٻئي گھڻپدي جي پڌوي 5 آهي ته انهن جي ضرب اپت جي پڌوي ڇا ٿيندي؟

ضربجندڙ ۽ ضربيندڙ گھڻپدي جي پڌوين ۽ سندن ضرب اپت جي پڌويءَ ۾ ڪهڙو لاڳاپو هوندو آهي؟

مثال (5) $(x + 2) \div (2 + 2x^2)$ اها ونڊ ڪريو ۽ جواب

پاڇي + ونڊاپت $\times$ ونڊيندڙ = ونڊڻي روپ ۾ لکو

مثال : پهرين $p(x) = 2 + 2x^2$

$$\therefore 2 + 2x^2 = 2x^2 + 0x + 2$$

پاڇي + ونڊاپت $\times$ ونڊيندڙ = ونڊڻي

$$2 + 2x^2 = (x + 2) \times (2x - 4) + 10$$

$$q(x) = (x + 2) \text{ ونڊيندڙ}$$

$$s(x) = 4 - 2x \text{ ونڊاپت}, r(x) = 10 \text{ ونڊيندڙ}$$

$$\therefore p(x) = q(x) \times s(x) + r(x).$$

$$\begin{array}{r} 2x - 4 \\ x + 2 \overline{) 2x^2 + 0x + 2} \\ \underline{- 2x^2 + 4x} \\ - 4x + 2 \\ \underline{- 4x - 8} \\ + + \\ 10 \end{array}$$

طريقو I :

طريقو II : ونڊ جو ليڪي طريقو

$$(2x^2 + 2) \div (x + 2) \text{ ونڊ ڪريو}$$

$2x^2$ پڌ حاصل ڪرڻ لاءِ $(x + 2)$ کي $2x$ سان ضرب ڪري، $4x$ ڪٽ ڪنداسين

$$(2x(x+2) - 4x = 2x^2)$$

$$\therefore \text{ونڊڻي} = 2x(x+2) - 4x + 2 = 2x^2 + 2 \dots (I)$$

هاڻي پڌ حاصل ڪرڻ لاءِ $(x+2)$ کي -4 سان ضرب ڪري 8 جوڙ ڪنداسين.

$$(-4(x+2) + 8 = -4x)$$

$$\therefore (2x^2 + 2) = 2x(x+2) - 4(x+2) + 8 + 2 \dots (\text{مان I})$$

$$\therefore (2x^2 + 2) = (x + 2) (2x - 4) + 10$$

پاڇي + ونڊاپت $\times$ ونڊيندڙ = ونڊڻي



يوڪلنڊ جو ونڊ جو سڌيان

جيڪڏهن $s(x)$ ۽ $p(x)$ اهي ٻه گهڻپدا آهن $s(x)$ جي پڌوي m ، $p(x)$ جي پڌوي n کان وڌيڪ هوندي ۽ $s(x)$ کي $p(x)$ سان ونڊڻ سان ونڊاپت $q(x)$ هوندي ته $s(x) = p(x)q(x) + r(x)$ هتي $r(x) = 0$ يا $p(x)$ جي پڌوي

اڀياس 3.2

(1) ڏنل امر استعمال ڪري جواب لکو.

(i) نندپور ٻوٽ a وٽ آهن. وٽن جو عدد هر سال b جيترو وڌي ٿو ته n سال کانپوءِ ان کانپوءِ ان ٻوٽ ۾ ڪيترا وٽ هوندا؟

(ii) ڊرل لاءِ هڪ قطار ۾ y پار بيهاري اهڙيون x قطارون ٺاهيون ته ڊرل لاءِ ڪل ڪيترا پار موجود رهندا؟

(iii) هڪ ٻن انگن واري عدد جي ايڪن ۽ ڏهاڪن واري جاءِ تي سلسليوار m ۽ n انگ آهن ته اهو ٻن درجن وارو عدد ڏيکاريندڙ گهڻپدو لکو.

(2) هيٺين گهڻپدن جو جوڙ ڪريو.

(i) $x^3 - 2x^2 - 9$; $5x^3 + 2x + 9$

(ii) $-7m^4 + 5m^3 + \sqrt{2}$; $5m^4 - 3m^3 + 2m^2 + 3m - 6$

(iii) $2y^2 + 7y + 5$; $3y + 9$; $3y^2 - 4y - 3$

(3) پهرئين گهڻپدي مان ٻيون گهڻپدو ڪٽ ڪريو.

(i) $x^2 - 9x + \sqrt{3}$; $-19x + \sqrt{3} + 7x^2$

(ii) $2ab^2 + 3a^2b - 4ab$; $3ab - 8ab^2 + 2a^2b$

(4) هيٺين گهڻپدن جي ضرب ڪريو.

(i) $2x$; $x^2 - 2x - 1$ (ii) $x^5 - 1$; $x^3 + 2x^2 + 2$ (iii) $2y + 1$; $y^2 - 2y^3 + 3y$

(5) پهرئين گهڻپدي کي ٻئين گهڻپدي سان ونڊ ڪريو ۽ جواب

(پاڇي + ونڊاپت $\times$ ونڊيندڙ = ونڊڻي) روپ ۾ لکو

(i) $x^3 - 64$; $x - 4$ (ii) $5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 2$; $x^2 - x$

(6*) هيٺين ڄاڻ ڪالڪ روپ ۾ لکو انڪي سادي صورت ۾ آڻيو.

هڪ مستطيل ڪيت جي ڊيگهه $(2a^2 + 3b^2)$ ۾ ۽ ويڪر $(a^2 + b^2)$ ۾ آهي ڪٽميءَ جي ڪيت ۾

$(a^2 - b^2)$ ۾ پاسي واري چوڙس جڳهه تي گهر اڏايو ته ڪيت جي بچيل حصي جي ايراضي ڪيتري؟

مشغولي: هيٺيون ٽڪريٽو ۽ چؤڪٽ ۾ مناسب ڪالڪ لکو، چرچا ڪريو.

سَندي ٻوٽ ۾ ڳوٺند جو 5 ايڪڙ جو ڪيٽ آهي، هنجي ڪٽنب ۾ زال، 2 ٻار ۽ ماءُ آهي. ڪيٽي ۽ لاءِ هن بئنڪ مان سوا لک روپيا جو قرض 10 في سيڪس بهان سان ورتو. هڪ ڪيٽ ۾ x ايڪڙ زمين ۾ سويابين ۽ y ايڪڙ زمين ۾ ڪپهه ۽ ٿوٽر جو فصل پوکيو. ڪيٽي ۽ لاءِ هيٺ ڏنل خرچ آيو.

ٻچن لاءِ هن 10,000 روپيا ڏنا. سويابين فصل لاءِ x 2000 روپيا پاڻ ۽ جيوڙا مار دوائن تي ۽ مزوري وغيره تي $4000x^2$ روپيا خرچ آيو. ڪپهه ۽ ٿوٽر فصلن لاءِ y 8000 روپيا پاڻ ۽ جيوڙا مار دوائن ۽ $9000y^2$ روپيا مزوري ۽ وغيره تي خرچ آيو.

ڪيٽي ۽ ۾ آيل خرچ x ۽ y واپرائي لکندا سين.

$$\boxed{} + \boxed{2000x} + \boxed{4000x^2} + \boxed{8000y} + \boxed{} \text{ روپيا}$$

هنجي ڪيٽي ۾ سويابين جو فصل $5x^2$ ڪٽنٽل ٿيو. هن اهو 2800 روپيا في ڪٽنٽل جي اگهه سان وڪيو. ڪپهه جو فصل $\frac{5}{3}y^2$ ڪٽنٽل ٿيو جيڪو هن 5000 روپيا في ڪٽنٽل جي اگهه سان وڪيو. ٿوٽر جو فصل $4y$ ڪٽنٽل ٿيو جيڪو هن 4000 روپيا في ڪٽنٽل سان وڪيو.

سڄو فصل وڪڻڻ کان پوءِ ڪل اُڀت x ۽ y ڪم آڻي ڪالڪ روپ ۾ لکندا سين.

$$\text{روپيا } \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$$

ڄاڻي وٺون



سنٿيٽڪ ونڊ طريقو (Synthetic Division)

هڪ گهٽپدي کي ٻئي گهٽپدي سان ڪيئن ونڊ ڪجي اها اسان کي ڄاڻ آهي. هاڻي اسان ونڊيندڙ گهٽپدو

هٿل وقت ونڊ جو سولو طريقو سمجهندا سين. هتي ونڊيندڙ $x+a$ يا $x-a$ روپ ۾ هجي.

مثال (1) $(3x^3 + 2x^2 - 1)$ گهٽپدي کي $(x + 2)$ سان ونڊيو.

حل: پهرين ونڊڻي گهٽپدو قوت نما واري روپ ۾ لکي پوءِ گڏڪ روپ ۾ لکندا سين.

$$\text{ونڊڻيءَ جو پرماڻڪ روپ: } 3x^3 + 2x^2 - 1 = 3x^3 + 2x^2 + 0x - 1$$

$$\therefore \text{ونڊڻيءَ جو گڏڪ روپ } = (3, 2, 0, -1)$$

$$\text{ونڊيندڙ گهٽپدو } = x + 2$$

هيٺين ڏاڪن وسيلي سنشليشڪ وٺڻ ڪنداسين

.....	پهرين ست
.....	ٻين ست
.....	ٽين ست

(1) پر ڏيکاريل موجب هڪ اڀي ۽ هڪ آڏي ليڪ ڪڍو

(2) وٺيندڙ $x+2$ آهي، 2 جو اڻٽڙ عدد -2 آهي ۽ پهرين ست ۾ اڀي ليڪ جي کاٻي طرف -2 ۽ ساڄي طرف وٺڻي گهٽپڻي جو گڻڪ روپ لکنداسين.

(3) آڏي ليڪ هيٺان يعني ٽين ست ۾ وٺڻي ۽ جو پهرينون گڻڪ جيئن جو تيئن لکنداسين.

- 2	3	2	0	- 1	پهرين ست
	↓				
	3				ٽين ست

- 2	3	2	0	- 1
	↓	-6	8	-16
	3	- 4	8	- 17

(4) ٽين ست ۾ 3 ۽ وٺيندڙ جي -2 جي ضرب اپت -6 ٻين ست ۾ 2 جي هيٺيان لکنداسين. پوءِ 2 ۽ -6 جو جوڙ 4- ٽين ست ۾ لکنداسين.

اهڙيءَ ريت ضربون ۽ جوڙ ڪري آخري عدد پاڇي هوندو آهي.

هتي پاڇي 17- آهي.

(3, -4, 8) وٺڻاپت جو گڻڪ روپ آهي

$$\therefore \text{ونڊاپت} = 3x^2 - 4x + 8 = \text{پاڇي} - 17$$

$$\therefore 3x^3 + 2x^2 - 1 = (x + 2)(3x^2 - 4x + 8) - 17$$

مٿئين طريقي کي سنشليشڪ وٺڻ طريقي چئجي ٿو.

اها وٺڻ ليڪي طريقي وسيلي هيٺين نموني ڪري سگهجي.

$$\begin{aligned} 3x^3 + 2x^2 - 1 &= 3x^2(x + 2) - 6x^2 + 2x^2 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x^2 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x^2 - 8x + 8x - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8x - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8x + 16 - 16 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8(x + 2) - 17 \end{aligned}$$

$$\therefore 3x^3 + 2x^2 - 1 = (x + 2)(3x^2 - 4x + 8) - 17$$

مثال (2) $(2y^4 - 3y^3 + 5y - 4) \div (y - 1)$ ونڊ ڪريو.

ونڊڻي سنشليشڪ طريقي : حل
 $2y^4 - 3y^3 + 5y - 4 = 2y^4 - 3y^3 + 0y^2 + 5y - 4$
 ونڊيندڙ $y - 1 = 1$ جو آبتڙ عدد آهي.

1	2	- 3	0	5	- 4	
		2	- 1	- 1	4	
	2	- 1	- 1	4	0	پاڇي

ونڊاپت جو ڳڻڪ روپ $(2, -1, -1, 4)$

$\therefore$ ونڊاپت $2y^3 - y^2 - y + 4 = 0$ پاڇي

ليکي طريقي:

$$\begin{aligned}
 2y^4 - 3y^3 + 5y - 4 &= 2y^3(y - 1) + 2y^3 - 3y^3 + 5y - 4 \\
 &= 2y^3(y - 1) - y^2(y - 1) - y^2 + 5y - 4 \\
 &= 2y^3(y - 1) - y^2(y - 1) - y(y - 1) + 4y - 4 \\
 &= (2y^3 - y^2 - y + 4)(y - 1)
 \end{aligned}$$

ڏيان ڇرڪو



سنشليشڪ ونڊ طريقي ۾ $x+a$ يا $x-a$ اهڙا پڌوي 1 هوندا ڳڻپڊا ٿي ونڊيندڙ طور ڪنيل آهن.

اڀياس 3.3

1. هيٺيون ونڊون سنشليشڪ ۽ ليکي طريقي ڪريو ونڊاپت ۽ پاڇي لکو.

- (i) $(2m^2 - 3m + 10) \div (m - 5)$ (ii) $(x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5) \div (x + 2)$
 (iii) $(y^3 - 216) \div (y - 6)$ (iv) $(2x^4 + 3x^3 + 4x - 2x^2) \div (x + 3)$
 (v) $(x^4 - 3x^2 - 8) \div (x + 4)$ (vi) $(y^3 - 3y^2 + 5y - 1) \div (y - 1)$

ڄاڻي وٺون



گهڻپڊي جو ملهه (Value of polynomial)

گهڻپڊي جي ڦيرائڻي جو ڪو ملهه رکڻ سان ان گهڻپڊي جو ملهه ملندو آهي. مثال $x+7$
 گهڻپڊي ۾ x جو ملهه 2 رکڻ سان، گهڻپڊي جو ملهه 9 ملندو.
 $p(x)$ گهڻپڊي ۾ x جو ملهه a رکڻ سان گهڻپڊي جو ملندڙ ملهه $p(x)$ وسيلي ڏيکاربو آهي.

مثال (1) $p(x) = 2x^2 - 3x + 5$ گھٹپدي جو مله لهو. جڏهن $x = 2$

$$p(x) = 2x^2 - 3x + 5$$

$$x = 2 \text{ مله رکڻ سان}$$

$$\therefore p(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 5$$

$$= 2 \times 4 - 6 + 5$$

$$= 8 - 6 + 5$$

$$\therefore p(2) = 7$$

مثال (2) $y = -2$ ته گھٹپدي $p(y) = 2y^3 - 2y + \sqrt{7}$ جو مله لهو.

$$p(y) = 2y^3 - 2y + \sqrt{7} \quad \text{حل :}$$

$$\therefore p(-2) = 2 \times (-2)^3 - 2 \times (-2) + \sqrt{7}$$

$$= 2 \times (-8) - 2 \times (-2) + \sqrt{7}$$

$$= -16 + 4 + \sqrt{7}$$

$$= -12 + \sqrt{7}$$

$\therefore y = -2$ هئڻ وقت گھٹپدي جو مله $\sqrt{7} - 12$ آهي.

مثال (3) $p(x) = 2x^2 - x^3 + x + 2$ گھٹپدي $p(0)$ لهو.

$$p(x) = 2x^2 - x^3 + x + 2 \quad \text{حل :}$$

$$\therefore p(0) = 2 \times 0^2 - 0^3 + 0 + 2$$

$$= 2 \times 0 - 0 + 0 + 2$$

$$= 2$$

مثال (4) جيڪڏهن گھٹپدي $m^2 - am + 7$ جو مله $m = -1$ وقت 10 آهي. ته a جو مله لهو.

$$p(m) = m^2 - am + 7 \quad \text{حل :}$$

$$\therefore p(-1) = (-1)^2 - a \times (-1) + 7$$

$$= 1 + a + 7$$

$$= 8 + a$$

پر $p(-1) = 10$ مليل آهي

$$\therefore 8 + a = 10$$

$$\therefore a = 10 - 8$$

$$\therefore a = 2$$

اڀياس 3.4

(1) جيڪڏهن $x = 0$ ته گهٽپڌي $x^2 - 5x + 5$ جو ملهه لھو.

(2) جيڪڏهن $p(y) = y^2 - 3\sqrt{2}y + 1$ ته $p(3\sqrt{2})$ لھو.

(3) جيڪڏهن $p(m) = m^3 + 2m^2 - m + 10$ ته $p(a) + p(-a) = ?$

(4) جيڪڏهن $p(y) = 2y^3 - 6y^2 - 5y + 7$ ته $p(2)$ لھو.

ڌيان ڀرڻو



قيبرائتي جي ڪنهن ملهه لاءِ گهٽپڌي جو ملهه لھڻ وقت هرھڪڀڙ ۾ ان قيبرائتي عيوض ڏنل ملهه رکي ان گهٽپڌي جو ملهه لھبو آھي.

ڄاڻي وٺون



پاڇي سڌيان (Remainder Theorem)

گهٽپڌي $p(x)$ کي $(x + a)$ سان ونڊڻ تي بچندڙ پاڇي ۽ ان گهٽپڌي ۾ x جو ملهه $(-a)$ رکڻ سان ملندڙ گهٽپڌي جي ملهه ۾ آپسي لڳاپو هوندو آهي. اهو لڳاپو سمجھڻ لاءِ هيٺيون مثال سمجھو.

مثال $p(x) = (4x^2 - x + 2)$ کي $(x + 1)$ سان ونڊ ڪريو.

[هتي $(x + a)$ جي $(x + 1)$ عيوض آهي.]

حل : ونڊڻي $4x^2 - x + 2 =$

ونڊيندڙ $x + 1 =$

ساڳيو مثال سنشليشڪ ونڊ وسيلي حل ڪريون.

$p(x)$ جو گڻڪ روپ $(4, -1, 2) =$

ونڊيندڙ $1 + x =$

1 جو اُبتڙ عدد -1

- 1	4	-1	2
		-4	5
	4	-5	7

ونڊاپت $4x - 5 =$ پاڇي $7 =$

$$\begin{array}{r}
 \text{ونڊاپت } 4x - 5 \\
 \text{ونڊڻي } x + 1 \overline{) 4x^2 - x + 2} \\
 \underline{4x^2 + 4x} \\
 - 5x + 2 \\
 \underline{- 5x - 5} \\
 7
 \end{array}$$

ونڊاپت $4x - 5 =$ پاڇي $7 = \dots (I)$

هاڻي اسين پاڇي ۽ ونڊڻي گهڻپدي جي ملهه ۾ لاڳاپو ڏسون .

ونڊڻي گهڻپدي $4x^2 - x + 2$ جو $x = -1$ لاءِ ملهه لهون.

$$p(x) = 4x^2 - x + 2$$

$$\therefore p(-1) = 4 \times (-1)^2 - (-1) + 2$$

$$= 4 \times 1 + 1 + 2$$

$$= 4 + 1 + 2$$

$$= 7$$

$\therefore x = -1$ وقت گهڻپدي $p(x)$ جو ملهه 7 آهي (II)

انگري بيان (I) ۽ (II) مان ، $p(x) = 4x^2 - x + 2$ گهڻپدي کي $(x + a)$ يعني هتي $x + 1$

سان ونڊڻ سان ملندڙ پاڇي ۽ $x = -1$ وقت $p(x)$ گهڻپدي جو ملهه يعني $p(-1)$ ساڳيا آهن.

ان مان هيٺين خاصيت سمجهه ۾ اچي ٿي.

$p(x)$ گهڻپدي کي $(x-a)$ سان ونڊڻ تي ملندڙ پاڇي $p(-a)$ جيتري يعني

$p(x)$ ۾ $x = -a$ رکڻ سان ملندڙ گهڻپدي جي ملهه جيتري آهي.

ان خاصيت کي پاڇي سڏيان چئجي ٿو.

يوڪلاڊ جي ونڊ قاعدي وسيلي اها خاصيت ثابت ڪنداسين .

$p(x)$ کي $(x + a)$ سان ونڊڻ تي،

$$p(x) = q(x) \times (x + a) + r(x) \quad [q(x) = \text{ونڊاپت} , r(x) = \text{پاڇي}]$$

جيڪڏهن ، $r(x) \neq 0$ ، ته قاعدي موجب $r(x)$ جي پڌوي 1 کان گهٽ يعني 0 آهي ان ڪري $r(x)$

حقيقي عدد آهي.

$\therefore r(-a)$ پڻ حقيقي عدد آهي.

هاڻي ، $p(x) = q(x) \times (x + a) + r(x)$ (1)

ان ۾ $x = -a$ ملهه رکڻ سان.

$$p(-a) = q(-a) \times (a - a) + r(-a)$$

$$= q(-a) \times 0 + r(-a) \dots \dots \dots (2)$$

$$\therefore p(-a) = r(-a) \dots \dots \dots \text{مان (2) ۽ (1)}$$

مشغولي : هيٺيان مثال جاچيو

(1) $p(x) = 3x^2 + x + 7$ گھڻپدي کي $x + 2$ گھڻپدن سان ونڊيو ۽ پاڇي لھو .

(2) $x = -2$ وقت $p(x) = 3x^2 + x + 7$ گھڻپدي جو ملھ لھو .

(3) هاڻي مليل پاڇي $p(-2)$ جي ملھ جيتري آھي ڇا؟

ھڪ ٻيو بہ مثال کڻي متئين نموني ڄاڇ لھو.

مثال (1) $x^4 - 5x^2 - 4x$ گھڻپدي کي $x + 3$ سان ونڊڻ تي پاڇي لھو.

سنشليشڪ ونڊ طريقي

پرمائڪ روپ $x^4 + 0x^3 - 5x^2 - 4x + 0$

گڻڪ روپ $(1, 0, -5, -4, 0)$

- 3	1	0	-5	-4	0
		-3	9	-12	48
	1	-3	4	-16	48

پاڇي = 48

پاڇي = 48

حل : پاڇي سڌيان وسيلي

ونڊڻي $p(x) = x^4 - 5x^2 - 4x$

ونڊيندڙ $x + 3 =$ ڪڻو

$x = -3$.

$\therefore p(x) = x^4 - 5x^2 - 4x$

$(p(-3) = (-3)^4 - 5(-3)^2 - 4(-3)$

$= 81 - 45 + 12$

$p(-3) = 48$

مثال (2) پاڇي سڌيان استعمال ڪري $x^3 - 2x^2 - 4x - 1$ گھڻپدي کي $x - 1$ سان ونڊڻ تي پاڇي لھو.

حل : $p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$

لکو $x = 1$. $\therefore x - 1 =$ ونڊيندڙ

$\therefore$ پاڇي سڌيان وسيلي، پاڇي $= p(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 - 4 \times 1 - 1$

$= 1 - 2 \times 1 - 4 - 1$

$p(1) = 1 - 2 - 4 - 1 = -6$

$\therefore$ پاڇي سڌيان وسيلي، پاڇي $= -6$

مثال (3) جيڪڏھن $t^3 - 3t^2 + kt + 50$ گھڻپدي کي $(t-3)$ سان ونڊڻ تي پاڇي 62 ملي ٿي ته k جو ملھ لھو

حل : ڏنل گھڻپدي کي $(t-3)$ سان ونڊڻ تي پاڇي 62 ڏنل آھي انڪري ڏنل گھڻپدن جو ملھ وقت لھنداسين. $t = 3$

$p(t) = t^3 - 3t^2 + kt + 50$

پاچي سڌيان موجب . $\therefore$

$$\begin{aligned} \text{پاچي } p(3) &= 3^3 - 3 \times 3^2 + k \times 3 + 50 & \therefore 3k + 50 &= 62 \\ &= 27 - 3 \times 9 + 3k + 50 & \therefore 3k &= 62 - 50 \\ &= 27 - 27 + 3k + 50 & \therefore 3k &= 12 \\ &= 3k + 50 & \therefore k &= \frac{12}{3} \\ & & \therefore k &= 4 \end{aligned}$$

پرپاچي 62 ڏنل آهي

ڌيان ڀرڻ



پاچي سڌيان : جيڪڏهن $p(x)$ ڪوبه گهڻپڊو 'a' حقيقي عدد آهي ته $p(x)$ کي $(x+a)$ سان ونڊڻ تي ملندڙ پاچي $p(-a)$ جيتري ٿيندي.

$$r(x) = 0 \quad \text{يا} \quad r(x) < 1 \quad \text{جي پڌوي}$$

$$p(x) = s(x)(x-a) + r(x)$$

مٿئين مساوت ۾ $x = a$ رکڻ سان $p(a) = 0 + r(a) = r(a)$ ملي ٿو.

$\therefore r(a)$ جي پڌوي $0 = 0$ يا $r(a) = 0$ يعني $(x-a)$ اهو $p(x)$ جو جزو آهي، اهو سمجهه ۾ اچي ٿو.

ڄاڻي وٺڻ



جزو سڌيان (Factor Theorem)

21 کي 7 سان ونڊڻ تي پاچي 0 ملي ٿي. انڪري اسان چوندا آهيون ته 21, 7 جو جزو آهي.

ساڳئي نموني ڏنل گهڻپڊي کي ونڊيندڙ گهڻپڊي سان ونڊ ڪرڻ تي پاچي 0 ملي ٿي ته اهو گهڻپڊو، ڏنل گهڻپڊي جو جزو آهي. ائين چئبو آهي.

مثال (2) $p(x) = x^3 + 4x - 5$ گهڻپڊي کي

$x + 2$ سان ونڊڻ تي پاچي لھو

$p(x)$ جو جزو آهي ڇا؟

حل : $p(x) = x^3 + 4x - 5$

$$p(-2) = (-2)^3 + 4(-2) - 5$$

$$p(-2) = -8 - 8 - 5$$

$$= -21$$

پاچي سڌيان موجب، پاچي -21 آهي.

هتي، پاچي $\neq 0$

$\therefore p(x)$ ، $(x + 2)$ جو جزو نه آهي.

مثال (1) $p(x) = (x^3 + 4x - 5)$ گهڻپڊي کي

$(x - 1)$ سان ونڊ ڪرڻ تي پاچي لھو.

ڇاڇ، لھو ته $p(x)$ جو جزو آهي.

حل : $p(x) = x^3 + 4x - 5$

$$p(1) = (1)^3 + 4(1) - 5$$

$$= 1 + 4 - 5$$

$$= 0$$

هتي پاچي سڌيان موجب، پاچي $= 0$

$\therefore p(x)$ ، $(x - 1)$ گهڻپڊي جو جزو آهي.

مشغولي : $(x - 1)$ گهڻپڊي $x^3 + 4x - 5$ جو جزو آهي ڇا؟ ڇاڇيو .

ڏيان چرڪو



جيڪڏهن $p(x)$ ڪوبه گهٽپڌو ۽ ڪوبه حقيقي عدد آهي ۽ $p(a)=0$ آهي ته $(x-a)$ اهو $p(x)$ جو جزو هوندو آهي.

انجي ابتڙ، $(x-a)$ ، $p(x)$ گهٽپڌي جو جزو هوندو ته $p(a)=0$ ٿيندو.

مثال (1) جزو سڌيان استعمال ڪري $x - 2$ ، گهٽپڌي $x^3 - x^2 - 4$ جو جزو آهي. ڇا، اهو طيء ڪريو.

حل: $p(x) = x^3 - x^2 - 4$ ونڊيندڙ $x - 2 =$
 $\therefore p(2) = 2^3 - 2^2 - 4 = 8 - 4 - 4 = 0$

$\therefore$ پاڇي سڌيان موجب، $(x - 2)$ گهٽپڌي $(x^3 - x^2 - 4)$ جو جزو آهي.

مثال (2) جيڪڏهن $(x - 1)$ ، $(x^3 - 2x^2 + mx - 4)$ جو جزو آهي ته m جو ملهه لھو.

حل: $(x - 1)$ ، $p(x)$ جو جزو آهي. $\therefore p(1) = 0$

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + mx - 4$$

$$p(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 + m \times 1 - 4 = 0$$

$$\therefore 1 - 2 \times 1 + m - 4 = 0$$

$$\therefore 1 - 2 + m - 4 = 0 \quad \therefore m - 5 = 0 \quad \therefore m = 5$$

مشغولي: اسان ڪسان گونڊ جي ڪيتي ۽ نسبت گهٽپڌن جي روپ ۾ ڪيتي ۽ جو خرچ ۽ اپت اهي ڳالهيون ڏٺيون.

هن بئنڪ مان سوا لک روپيا قرض ورتو هو ۽ 10% بها سان اهو واپس ڪيو هو. ٻڃن تي خرچ 10000 روپيا، سويابين فصل، پاڻ ۽ جيوڙا مارڊوائن تي $2000x$ روپيا ۽ زمين ڪيٽڙ لاءِ $4000x^2$ روپيا خرچ آيو هوس. ڪپهه ۽ ٿوهر فصلن لاءِ پاڻ ۽ جيوڙا مارڊوائن تي $8000y$ روپيا ۽ ڪيٽڙ وغيره تي $9000y^2$ روپيا خرچ آيو هوس.

ڪل اپت $14000x^2 + \frac{25000}{y^2} + 16000y$ ايتري ٿيس.

$x=2$ ، $y=3$ ملهه رکي گونڊ جي ڪيتي ۽ مان اپت ۽ خرچ لھو.

حل :

خرچ	اپت
$\text{₹ } 1,37,000$ بئنڪ کي وياج سان گڏ قرض موٽايو	$\text{₹ } 1,25,000$ بئنڪ جو قرض
₹ ٻڃن لاءِ	₹ سويابين مان اپت
₹ سويابين: پاڻ ۽ دوائون	₹ ڪپهه مان اپت
₹ سويابين: مزوري، ڪيٽڙ	₹ ٿوهر مان اپت
₹ ڪپهه ۽ ٿوهر، پاڻ، دوائون	₹ ڪل اپت
₹ ڪپهه، ٿوهر: مزوري، ڪيٽڙ	
₹ ڪل خرچ	

اڀياس 3.5

(1) x جو ڏنل ملهه رکي گهٽپدي $2x - 2x^3 + 7$ جا ملهه لھو.

(i) $x = 3$ (ii) $x = -1$ (iii) $x = 0$

(2) هيٺين گهٽپدن لاءِ $p(0)$, $p(1)$ ۽ $p(-2)$ لھو.

(i) $p(x) = x^3$ (ii) $p(y) = y^2 - 2y + 5$ (iii) $p(x) = x^4 - 2x^2 - x$

(3) جيڪڏهن گهٽپدي $m^3 + 2m + a$ جو ملهه $m = 2$ وقت 12 آهي ته a جو ملهه لھو.

(4) جيڪڏهن گهٽپدي $mx^2 - 2x + 3$ نسبت ۾ $p(-1) = 7$ آهي ته m جو ملهه لھو.

(5) هيٺين مان پهرئين گهٽپدي کي ٻيئي گهٽپدي سان ونڊ ڪرڻ تي ملندڙ ڀاڄي سڌيان وسيلي لھو.

(i) $(x^2 - 7x + 9)$; $(x + 1)$

(ii) $(2x^3 - 2x^2 + ax - a)$; $(x - a)$

(iii) $(54m^3 + 18m^2 - 27m + 5)$; $(m - 3)$

(6) گهٽپدي $y^3 - 5y^2 + 7y + m$ کي $y + 2$ ونڊڻ تي ڀاڄي 50 ملي ٿي ته m جو ملهه لھو.

(7) جزو سڌيان استعمال ڪري ٻڌايو ته ڇا $x + 3$, $x^2 + 2x - 3$ جو جزو آهي؟

(8) جيڪڏهن $x - 2$ گهٽپدي $x^3 - mx^2 + 10x - 20$ جو جزو آهي ته m جو ملهه لھو.

(9) هيٺين مثالن ۾ $p(x)$, $q(x)$ جو جزو آهي يا نه اهو جزو سڌيان وسيلي طيءَ ڪريو.

(i) $p(x) = x^3 - x^2 - x - 1$, $q(x) = x - 1$

(ii) $p(x) = 2x^3 - x^2 - 45$, $q(x) = x - 3$

(10) $(x + 1)$ سان $(x^{31} + 31)$ کي ونڊڻ تي ڀاڄي لھو.

(11) ڏيکاريو ته $m^{22} - 1$ ۽ $m^{21} - 1$, $m - 1$ گهٽپدن جو جزو آهي.

(12*) $x - 2$ ۽ $x - \frac{1}{2}$ ٻئي $nx^2 - 5x + m$ گهٽپدن جا جزا آهن.

ڏيکاريو ته $m = n = 2$

(13) (i) جيڪڏهن $p(x) = 2 + 5x$ ته $p(2) + p(-2) - p(1)$

(ii) جيڪڏهن $p(x) = 2x^2 - 5\sqrt{3}x + 5$ ته $p(5\sqrt{3})$ لھو.

ذرا ياد ڪريو



اڳئين درجي ۾ اسين گهٽپدن جا جزا لھڻ سکيا آھيون اچو ته ڪي مثال ڏسون.

جزا لھو

مثال (1) $4x^2 - 25$

$= (2x)^2 - (5)^2$

$= (2x + 5)(2x - 5)$

مثال (2) $3x^2 + 7x + 2$

$= \frac{3x^2 + 6x}{3} + \frac{x + 2}{1}$

$= 3x(x + 2) + 1(x + 2)$

$= (x + 2)(3x + 1)$

مثال (3) $63x^2 + 5x - 2$
 $= 63x^2 + 14x - 9x - 2$
 $= 7x(9x + 2) - 1(9x + 2)$
 $= (9x + 2)(7x - 1)$

مثال (4) $6x^2 - 5x - 6$
 $= 6x^2 - 9x + 4x - 6$
 $= 3x(2x - 3) + 2(2x - 3)$
 $= (2x - 3)(3x + 2)$

ڄاڻي وٺون



گهٽپدن جا جزا (Factors of polynomials)

ڪڏهن ڪڏهن ڏنل گهٽپدي کي $ax^2 + bx + c$ روپ ۾ لکي سگهجي ٿو. انڪري انجا جزا لھڻ سولڻ ٿيندو آھي. مثال (1) $(y^2 - 3y)^2 - 5(y^2 - 3y) - 50$ جا جزا لھو.

ڏنل گهٽپدي ۾ سمجھو ته $x = (y^2 - 3y)$

$$\begin{aligned} \therefore (y^2 - 3y)^2 - 5(y^2 - 3y) - 50 &= x^2 - 5x - 50 \\ &= x^2 - 10x + 5x - 50 \\ &= x(x - 10) + 5(x - 10) \\ &= (x - 10)(x + 5) \\ &= (y^2 - 3y - 10)(y^2 - 3y + 5) \\ &= [y^2 - 5y + 2y - 10](y^2 - 3y + 5) \\ &= [y(y - 5) + 2(y - 5)](y^2 - 3y + 5) \\ &= (y - 5)(y + 2)(y^2 - 3y + 5) \end{aligned}$$

مثال (2) جزا لھو

$$\begin{aligned} &(x + 2)(x - 3)(x - 7)(x - 2) + 64 \\ \text{حل : } &(x + 2)(x - 3)(x - 7)(x - 2) + 64 \\ &= (x + 2)(x - 7)(x - 3)(x - 2) + 64 \\ &= (x^2 - 5x - 14)(x^2 - 5x + 6) + 64 \\ &= (m - 14)(m + 6) + 64 \dots \dots \dots (x^2 - 5x \text{ لاءِ } m \text{ رکڻ سان}) \\ &= m^2 - 14m + 6m - 84 + 64 \\ &= m^2 - 8m - 20 \\ &= (m - 10)(m + 2) \\ &= (x^2 - 5x - 10)(x^2 - 5x + 2) \dots \dots \text{ } m \text{ جو ملھ واپس } x^2 - 5x \text{ رکڻ سان} \end{aligned}$$

اڀياس 3.6

(1) هيٺين گهٽپدن جا جزا لھو

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| (i) $2x^2 + x - 1$ | (ii) $2m^2 + 5m - 3$ | (iii) $12x^2 + 61x + 77$ |
| (iv) $3y^2 - 2y - 1$ | (v) $\sqrt{3}x^2 + 4x + \sqrt{3}$ | (vi) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$ |

(2) هيٺين گهٽپڊن جا جزا لھو

- (i) $(x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12$ (ii) $(x - 5)^2 - (5x - 25) - 24$
 (iii) $(x^2 - 6x)^2 - 8(x^2 - 6x + 8) - 64$ (iv) $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 2x + 5) - 35$
 (v) $(y + 2)(y - 3)(y + 8)(y + 3) + 56$
 (vi) $(y^2 + 5y)(y^2 + 5y - 2) - 24$
 (vii) $(x - 3)(x - 4)^2(x - 5) - 6$

گڏيل اڀياس 3

(1) هيٺين سوالن مان هرھڪ لاءِ مناسب جواب چونڊيو .

(i) هيٺين مان گهٽپڊو ڪهڙو آهي؟

- (A) $\frac{x}{y}$ (B) $x^{\sqrt{2}} - 3x$ (C) $x^{-2} + 7$ (D) $\sqrt{2}x^2 + \frac{1}{2}$

(ii) $\sqrt{7}$ گهٽپڊي جي ڀڌوي ڪهڙي آهي؟

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 5 (C) 2 (D) 0

(iii) 0 گهٽپڊي جي ڀڌوي ڪيتري آهي؟

- (A) 0 (B) 1 (C) وصيفل نه آهي (D) ڪوبه حقيقي عدد

(iv) $2x^2 + 5x^3 + 7$ گهٽپڊي جي ڀڌوي ٻڌايو؟

- (A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 7

(v) $x^3 - 1$ گهٽپڊي جو ٽڪروپ ڪهڙو آهي؟

- (A) (1, -1) (B) (3, -1) (C) (1, 0, 0, -1) (D) (1, 3, -1)

(vi) $p(x) = x^2 - 7\sqrt{7}x + 3$ ته $p(7\sqrt{7}) = ?$

- (A) 3 (B) $7\sqrt{7}$ (C) $42\sqrt{7} + 3$ (D) $49\sqrt{7}$

(vii) جيڪڏهن $x = -1$ آهي ته $2x^3 + 2x$ گهٽپڊي جو ملهه ڪيترو؟

- (A) 4 (B) 2 (C) -2 (D) -4

(viii) گهٽپڊي $3x^2 + mx$ جو $x - 1$ جزو آهي ته m جو ملهه ڪيترو؟

- (A) 2 (B) -2 (C) -3 (D) 3

(ix) ضرب ڪري ۽ ملندڙ گهٽپڊي جي ڀڌوي ڪيتري؟ $(x^2 - 3)(2x - 7x^3 + 4)$

- (A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 0

(x) هيٺين مان ليکي گهٽپڌو ڪهڙو آهي؟

(A) $x + 5$ (B) $x^2 + 5$ (C) $x^3 + 5$ (D) $x^4 + 5$

(2) هيٺين مان هر هڪ گهٽپڌي جي ڀڌوي لکو

(i) $5 + 3x^4$ (ii) 7 (iii) $ax^7 + bx^9$ { مقرر عدد آهن } a, b

(3) هيٺيان گهٽپڌا پرمائڪ روپ ۾ لکو.

(i) $4x^2 + 7x^4 - x^3 - x + 9$ (ii) $p + 2p^3 + 10p^2 + 5p^4 - 8$

(4) هيٺيان گهٽپڌا گڻڪ روپ ۾ لکو.

(i) $x^4 + 16$ (ii) $m^5 + 2m^2 + 3m + 15$

(5) هيٺيان گڻڪ روپ گهٽپڌا x ڦيرائڻو واپرائي قوت نما روپ ۾ لکو.

(i) (3, -2, 0, 7, 18) (ii) (6, 1, 0, 7) (iii) (4, 5, -3, 0)

(6) جوڙ ڪريو

(i) $7x^4 - 2x^3 + x + 10$; $3x^4 + 15x^3 + 9x^2 - 8x + 2$ (ii) $3p^3q + 2p^2q + 7$; $2p^2q + 4pq - 2p^3q$

(7) ڪٽ ڪريو :

(i) $5x^2 - 2y + 9$; $3x^2 + 5y - 7$ (ii) $2x^2 + 3x + 5$; $x^2 - 2x + 3$

(8) ضرب ڪريو

(i) $(m^3 - 2m + 3)(m^4 - 2m^2 + 3m + 2)$ (ii) $(5m^3 - 2)(m^2 - m + 3)$

(9) $3x^3 - 8x^2 + x + 7$ گهٽپڌي کي $x - 3$ گهٽپڌي سان سنشليشڪ طريقي وٺڻ ڪريو ۽ پاڇي لھو.

(10) m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $x + 3$ اهو گهٽپڌي $x^3 - 2mx + 21$ جو جزو ٿيندو؟

(11) 2016 سال جي آخر ۾ ڪوواڙ، وروڙ ۽ چڪلي ٻڙن جي آدمشماري نمبروار $5x^2 - 3y^2$ ، $7y^2 + 2xy$ ۽

$9x^2 + 4xy$ هئي. 2017 جي شروعات ۾ ٽنهي ٻڙن مان تعليم ۽ روزگار لاءِ نمبروار $x^2 + xy - y^2$ ، $5xy$

۽ $3x^2 + xy$ ماڻهو ٻين شهرن ۾ ويا ته 2017 جي شروعات ۾ انهن ٻڙن جي ڪل آدمشماري ڪيتري هئي؟

(12) $bx^3 - 2x + 5$ ۽ $bx^2 + x + 5$ گهٽپڌن کي $x - 3$ سان وٺڻ تي پاڇي نمبروار m ۽ n اچي ٿي.

جيڪڏهن $m - n = 0$ ته b جو ملهه لھو.

(13) سادي صورت ۾ ڏيکاريو: $(8m^2 + 3m - 6) - (9m - 7) + (3m^2 - 2m + 4)$

(14) $x^2 + 13x + 7$ مان ڪهڙو گهٽپڌو ڪٽ ڪجي جيئن $3x^2 + 5x - 4$ گهٽپڌو ملي؟

(15) $4m + 2n + 3$ کي ڪهڙو ڪالڪ جوڙ ڪجي جيئن $6m + 3n + 10$ گهٽپڌو ملي؟





اچو ته سکون



- ريشو جون خاصيتون
- الڳيتو پروپورشن
- K طريقو

- ريشو
- برابر ريشوز تي ڪارروايون
- برابر ريشوز جو سڌيان

ذرا ياد ڪريون



اسان اڳئين درجن ۾ ريشو ۽ پروپورشن جو اڀياس ڪيو آهي انهنجا مثال به اسان حل ڪيا آهن.

مثال : وٺ جا سوڄي ۽ جا ٺاهيل لڏون سواڊي آهن. هوءَ 1 وٺي گيهه، 3 وٺيون سوڄي ۽ 2 وٺيون کنڊ ڪڍي لڏون ٺاهي ٿي.

هتي سوڄي ۽ ۽ کنڊ جو ريشو 3:2 يا $\frac{3}{2}$ آهي.

جيڪڏهن لڏن لاءِ 12 وٺيون سوڄي ڪٺي ته ان لاءِ کنڊ ڪيتري لڳندي؟

سمجهو ته کنڊ x وٺيون لڳندي ان مان،
يعني لڏن لاءِ 12 وٺيون سوڄي ۽ ڪٺي ته 8 وٺيون کنڊ لڳندي.

اهو مثال هيٺين نموني به حل ڪري سگهجي ٿو.

$$\frac{3k}{2k} = \frac{3}{2} \quad \text{سوڄي } 3k \text{ وٺيون آهي ته کنڊ } 2k \text{ وٺيون لڳندي ڇو ته}$$

جيڪڏهن $3k = 12$ ته $k = 4$ انڪري $2k = 8$ يعني 8 وٺيون کنڊ لڳندي.

ڄاڻي وٺون



ريشو ۽ پروپورشن (Ratio and proportion)

ٻن عددن جي ريشو جو ويچارڻ يا وڌيڪ عددن لاءِ وڌائي سگهجي ٿو.

لڏن جو مثال کڻو. گيهه، سوڄي ۽ کنڊ جو پروپورشن 1:3:2 آهي. هتي گيهه ۽ سوڄي ۽ ريشو 1:3 ۽ سوڄي ۽ کنڊ جو ريشو 3:2 آهي.

اها ڄاڻ هڪ پروپورشن وسيلي ڏنل آهي.

گيهه 1k يعني k وٺيون، سوڄي 3k وٺيون ۽ کنڊ 2k وٺيون مڃي سگهجي ٿو جيڪڏهن سوڄي 12 وٺيون آهن ته

لڏن لاءِ ڪيتريون وٺيون گيهه ۽ کنڊ لڳندي اهو لهي سگهجي ٿو.

$$\therefore 3k = 12, k = 4, \therefore 2k = 8 \quad \text{يعني 4 وٺيون گيهه ۽ 8 وٺيون کنڊ لڳندي.}$$

ساڳيو ويچار چئن يا وڌيڪ ڳالهين جي پروپورشن لاءِ واپرائي سگهجي ٿو.

جيڪڏهن d, c, b, a انهن چئن عددن جو پروپورشن $2:3:7:4$ آهي ته سمجهو ته اهي عدد آهن $4m, 7m, 3m, 2m$ ڏنل ڄاڻ واپرائي m جو ملهه لهي سگهجي ٿو. مثال جيڪڏهن انهن چئن عددن جي جوڙاپٽ 48 آهي ته اهي عدد لهو.

$$2m + 3m + 7m + 4m = 16m = 48 \text{ هتي}$$

$$\therefore m = 3$$

$$\therefore 2m = 6, 3m = 9, 7m = 21, 4m = 12$$

$\therefore$ گهربل عدد آهن 6, 9, 21, 12.

مثال (1) پاڻ جي $18:18:10$ قسم ۾ نائٽروجن جا مرڪب 18% فاسفورس جا مرڪب 18% ۽ پوٽاشيم جا مرڪب 10% آهي. بچيل حصو ٻين ڀدارتن جو هوندو آهي. اهڙي 20 ڪگ پاڻ ۾ هر هڪ قسم جا مرڪب ڪيترا ڪگ هوندا؟

حل: سمجهو ته 20 ڪگ پاڻ ۾ نائٽروجن جا مرڪب x ڪگ آهن.

$$\therefore \frac{18}{100} = \frac{x}{20} \quad \therefore x = \frac{18 \times 20}{100} = 3.6$$

$\therefore$ نائٽروجن جا مرڪب 3.6 ڪگ هوندا.

فاسفورس مرڪب جو سيڪڙو به 18 آهي فاسفورس ۾ 3.6 ڪگ هوندو سمجهو ته پوٽاشيم جي مرڪب جو وزن y ڪگ آهي.

$$\therefore \text{پوٽاشيم مرڪب 2 ڪگ هوندو} \quad \therefore y = 2 \quad \frac{10}{100} = \frac{y}{20}$$

سڌي ڦير

هڪ موٽر ڪار 1 ل پيٽرول ۾ 10 ڪم مفاصلو طيءَ ڪري ٿي.

ته 20 رپيا پيٽرول ۾ اها ڪار $200 = 20 \times 10$ ڪم مفاصلو طيءَ ڪندي.

40 رپيا پيٽرول ۾ اها ڪار $400 = 40 \times 10$ ڪم مفاصلو طيءَ ڪندي.

مٿين ڄاڻ لاءِ خاڪي ۾ لکندا سين.

ليٽر x : پيٽرول	1	20	40	
ڪم y مفاصلو	10	200	400	
$\frac{x}{y}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{20}{200} = \frac{1}{10}$	$\frac{40}{400} = \frac{1}{10}$	$\frac{x}{y} = k$

ڪار ۾ وڌل پيٽرول (ليٽرن) ۽ ان پيٽرول وسيلي طيءَ ڪيل مفاصلو (ڪم ۾) اهو ريشو مقرر

آهي. ان وقت ائين چئبو ته اهي ڀد سڌي ڦير ۾ آهن.

اٽسڌي ڦير

هڪ ڪارڪي 50 ڪم في ڪلاڪ رفتار سان 100 ڪم مفاصلو ڪرڻ ۾ 2 ڪلاڪ لڳن ٿا. هڪ بئل گاڏي جي رفتار في ڪلاڪ 5 ڪم آهي ته ساڳيو مفاصلو (100 ڪم) طيءَ ڪرڻ ۾ بئل گاڏي ڪي 20 ڪلاڪ لڳن ٿا.

مفاصلو = رفتار $\times$ وقت اهو نيمر خيال ڀرڪي ڄاڻ خاڪي ۾ لکندا سين.

ڪار	رفتار / ڪلاڪ x	وقت y	$x \times y$	$x \times y = k$
	50	2	100	
بئل گاڏي	5	20	100	

هتي واهڻ جي رفتار ۽ مسافريءَ ۾ لڳندڙ وقت جي ضرب اپت مقرر آهي ان ڪري چئبو ته اهي پڌاڻي ڦير ۾ آهن.

مٿئين مثال ۾ واهڻ جي رفتار ۽ مفاصلو طيءَ ڪرڻ ۾ لڳندڙ وقت اٽسڌي ڦير ۾ آهن.

ذرا ياد ڪريو



ریشو جون خاصیتون

(1) ٻن عددن a ۽ b جو ریشو $a:b$ يا $\frac{a}{b}$ روپ ۾ لکجي ٿو هتي a کي پهرين پڌاڻي ۽ b کي ٻيون پڌاڻي چئجي ٿو.

(2) ٻن عددن جي ریشو ۾ جيڪڏهن ٻيون پڌاڻي 100 هوندو ته ان ریشو کي سيڪڙو چئبو آهي.

(3) ریشو جي سڀني پڌاڻن کي ساڳئي غير ٻڙي عدد سان ضرب يا ونڊ ڪرڻ تي ریشو نه بدلاجندو آهي.

مثال $3:4 = 6:8 = 9:12$ يا $2:3:5 = 8:12:20$ يا k غير ٻڙي عدد هوندو ته

$$a : b = ak : bk$$

$$a : b : c = ak : bk : ck$$

(4) جن عددن جو ریشو لھڻو آهي انهن جي ماپ ڇاڪو ساڳيو هئڻ گھرجي .

(5) ریشو کي ايڪو نه هوندو آهي.

جيئن 2 ڪگ ۽ 300 ڪ جو ریشو 2:300 نه ٿيندو اهو 2 ڪگ = 2000 ڪ ان ڪري 2000:300 يعني 20:3

ٿيندو.

مثال (1) سيما ۽ راجشريءَ جي عمر جو ریشو 3:1 آهي راجشري ۽ اتل جي عمر جو ریشو 2:3 آهي ته سيما، راجشري ۽

اتل جي عمر جو ریشو لھو.

3:1 = 3:1 راجشريءَ جي عمر : سيما جي عمر : حل

پھرئين ریشو جو ٻيون پڌاڻي، ٻئين ریشو جو پهرين پڌاڻي هئڻ گھرجي.

هتي الڳيتو ريشو حاصل ٿيڻ لاءِ پهرئين ريشو 6 جي ڀڌن کي 2 سان ضربينداسين
انڪري 3:1=6:2 ملندو.

$$\frac{\text{سيما جي عمر}}{\text{راجشريءَ جي عمر}} = \frac{6}{2}, \quad \frac{\text{راجشريءَ جي عمر}}{\text{اتل جي عمر}} = \frac{2}{3}$$

6 : 2 : 3 اتل جي عمر : راجشريءَ جي عمر : سيما جي عمر .

مثال (2) هڪ مستطيل ڪيٽ جي ڊيگهه 1.2 ڪم آهي، انجي ويڪر 400 م آهي ته ڊيگهه جو ويڪر سان ريشو لھو.
حل: هتي ڊيگهه ڪم ۽ ويڪر ۾ آهي. ريشو لاءِ ايڪا ساڳيا هئڻ گھرجن انڪري ڪ. م. ميٽر ۾ بدلائينداسين.
ڪم کي ۾ بدلائينداسين.

$$1.2 \text{ ڪم} = 1.2 \times 1000 = 1200 \text{ م} \quad \therefore 1200 \text{ م جو } 400 \text{ سان ريشو لھبو}$$

$$\text{ريشو} = \frac{1200}{400} = \frac{3}{1} = 3:1$$

مثال (3) مھيش جي ماھياني خرچ جو سندس اپت سان ريشو 3:5 آهي ٻڌايو ته هنجو خرچ سندس اپت جو ڪيترو سيڪڙو آهي؟

حل: خرچ جو اپت مان ريشو 3:5 آهي انکي سيڪڙي ۾ بدلائڻ لاءِ ٻيون ڀڌ 100 ڪبو.

$$\therefore \text{مھيش جو خرچ اپت جو } 60\% \text{ آهي.} \quad \frac{\text{خرچ}}{\text{اپت}} = \frac{60}{100} = 60\% \quad \text{يعني} \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{60}{100}$$

مثال (4) هڪ باغ ۾ انبن ۽ چڪن جي وڻن جي عددن جو ريشو 2:3 آهي. ان باغ ۾ هر هڪ قسم جا اڃا 5 وڻ لڳايا ته اهو ريشو 5:7 ٿئي ٿو. ٻڌايو ته ان باغ ۾ انبن ۽ چڪن جا ڪيترا وڻ آهن؟

حل: شروعاتي ريشو 2:3 آهي.

سمجھو ته انبن جا وڻ آهن $2x$ ۽ چڪن جا وڻ آهن $3x$

$$\text{ڏنل شرطن موجب,} \quad \frac{2x+5}{3x+5} = \frac{5}{7}$$

$$14x + 35 = 15x + 25$$

$$\therefore x = 10$$

$$\therefore \text{باغ ۾ انبن جا وڻ} = 2x = 2 \times 10 = 20$$

$$\therefore \text{باغ ۾ چڪن جا وڻ} = 3x = 3 \times 10 = 30$$

مثال (5) ٻن عددن جو ريشو 5:7 آهي جيڪڏهن هر هڪ عدد ۾ 40 جوڙ ڪيا ته جوڙا اُبتن جو ريشو 25:31 ٿي ٿو ته اهو عدد لھو.

$7x =$ ٻيون عدد ، $5x =$ پھريون عدد ، سمجھو ته : حل
ڏنل شرطن موجب

$$\frac{5x+40}{7x+40} = \frac{25}{31}$$

$$31(5x+40) = 25(7x+40)$$

$$155x+1240 = 175x+1000$$

$$1240-1000 = 175x-155x$$

$$240 = 20x$$

$$x = 12$$

$$\therefore \text{پھريون عدد} = 5 \times 12 = 60$$

$$\text{ٻيون عدد} = 7 \times 12 = 84$$

$$\therefore \text{گھربل عدد آھن } 60 \text{ ۽ } 84$$

اڀياس 4.1

(1) هيٺ ڏنل عددن جي جوڙي مان پھريئين عدد جو ٻئين عدد سان ريشو سادي ننڍي ۾ ننڍو روپ ۾ لھو.

(i) 72, 60 (ii) 38, 57 (iii) 52, 78

(2) هيٺين ۾ پھريئين ڀد ٻئين ڀد سان ريشو سادي روپ ۾ لھو.

(i) 308 روپيا ، 700 روپيا (ii) 40 پ ، 12 روپيا ، 14 روپيا
(iii) 2500 رل ، 5 ل (iv) 5 سال 8 مھنا ، 3 سال 4 مھنا
(v) 1900 گ ، 3.8 ڪگ (vi) 5 منٽ 6 س ، 7 منٽ 20 س

(3) هيٺيان سيڪڙا سادي روپ ۾ لھو.

(i) 75 : 100 (ii) 44 : 100 (iii) 6.25% (iv) 52 : 100 (v) 0.64%

(4) هڪ ننڍو گھر 3 ماڻھو ۾ 8 ڏينھن ۾ اڏين ٿا ته ساڳيو گھر 6 ڏينھن ۾ اڏڻ لاءِ ڪيترا ماڻھو گھر چنڊا؟

(5) هيٺين ريشوز کي سيڪڙي روپ ۾ بدلايو .

(i) 15 : 25 (ii) 47 : 50 (iii) $\frac{7}{10}$ (iv) $\frac{546}{600}$ (v) $\frac{7}{16}$

(6) آڀا ۽ سندس ماءُ جي عمر جو ريشو 2:5 آڀا جي جنم وقت سندس ماءُ جي عمر 27 سال هئي آڀا ۽ سندس ماءُ جي اڄوڪي عمر لھو.

(7) وندنا ۽ سارا جي اڄوڪي عمر نمبروار 14 سال ۽ 10 سال آهي ڪيترن سالن کانپوءِ سندس عمر جي نسبت 5:4 ٿيندي؟

(8) ريهانا ۽ سندس ماءُ جي اڄوڪي عمر جو ريشو 2:7 آهي. 2 سالن کانپوءِ سندن عمر جو ريشو 1:3 ٿيندو ريهانا جي اڄوڪي عمر لھو.



ريشو جي پيٽ

جيڪڏهن $b > 0$, $d > 0$ ته $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ انهن ريشوز جي پيٽ ڏسون - پيٽ هيٺين نموني ڪري سگهبي.

(i) جيڪڏهن $ad > bc$ ته $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ (ii) جيڪڏهن $ad < bc$ ته $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ (iii) جيڪڏهن $ad = bc$ ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

هاڻي هيٺ ڏنل مثالن ۾ ريشوز جي جوڙن جو سلسلو لڳايو ٿي ڪريو.

مثال (1) $\frac{4}{9}, \frac{7}{8}$
 حل : $4 \times 8 \quad ? \quad 7 \times 9$
 $32 < 63$
 $\therefore \frac{4}{9} < \frac{7}{8}$

مثال (2) $\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{8}}, \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$
 $\sqrt{13} \times \sqrt{5}, \quad ? \quad \sqrt{8} \times \sqrt{7}$
 $\sqrt{65} \quad ? \quad \sqrt{56}$
 $\sqrt{65} > \sqrt{56}$
 $\therefore \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{8}} > \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$

مثال (3) جيڪڏهن a ۽ b سڄا انگي عدد آهن ۽ $a < b$, $b > 1$ ته $\frac{a+1}{b+1}$, $\frac{a-1}{b-1}$ جو سلسلو لڳايو ٿي ڪريو

حل : $a < b$

$\therefore a - 1 < b - 1$

هاڻي ان ڪٽ جون ويچار ڪريون. $\frac{a-1}{b-1} - \frac{a+1}{b+1}$

$$\begin{aligned} \frac{a-1}{b-1} - \frac{a+1}{b+1} &= \frac{(a-1)(b+1) - (a+1)(b-1)}{(b-1)(b+1)} \\ &= \frac{(ab - b + a - 1) - (ab + b - a - 1)}{b^2 - 1} \\ &= \frac{ab - b + a - 1 - ab - b + a + 1}{b^2 - 1} \\ &= \frac{2a - 2b}{b^2 - 1} \\ &= \frac{2(a-b)}{b^2 - 1} \dots\dots\dots (1) \end{aligned}$$

هاڻي $a < b \therefore a - b < 0$
 $\therefore b^2 - 1 > 0 \quad b > 1$

$\frac{2(a-b)}{b^2 - 1} < 0 \dots\dots\dots (2)$

مان (1) ۽ (2) $\therefore \frac{a-1}{b-1} - \frac{a+1}{b+1} < 0 \dots\dots\dots (2)$

$\frac{a-1}{b-1} < \frac{a+1}{b+1}$

مثال (4) جيڪڏهن $a : b = 2 : 1$ ۽ $b : c = 4 : 1$ ته $\left(\frac{a^4}{32b^2c^2}\right)^3$ ڪالڪ جو ملهه لھو

$$\text{حل : } \frac{a}{b} = \frac{2}{1} \quad \therefore a = 2b \quad \frac{b}{c} = \frac{4}{1} \quad \therefore b = 4c$$

$$a = 2b = 2 \times 4c = 8c \quad \therefore a = 8c$$

ھاڻي $a = 8c$, $b = 4c$ ملهه رکڻ سان

$$\begin{aligned} \left(\frac{a^4}{32b^2c^2}\right)^3 &= \left(\frac{(8c)^4}{32 \times 4^2 \times c^2 \times c^2}\right)^3 \\ &= \left[\frac{8 \times 8 \times 8 \times 8 \times c^4}{32 \times 16 \times c^2 \times c^2}\right]^3 \\ &= (8)^3 \\ \therefore \left(\frac{a^4}{32b^2c^2}\right)^3 &= 512 \end{aligned}$$

اڀياس 4.2

(1) $\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ خاصيت جو استعمال ڪري خالن ۾ مناسب عدد لکو.

$$(i) \frac{5}{7} = \frac{\dots}{28} = \frac{35}{\dots} = \frac{\dots}{3.5}$$

$$(ii) \frac{9}{14} = \frac{4.5}{\dots} = \frac{\dots}{42} = \frac{\dots}{3.5}$$

(2) هيٺين ۾ ريشو لھو.

(i) گول جي نيم قطر جو انجي گھيري سان ھوندڙ ريشو.

(ii) نيم قطر ھوندڙ گول جي گھيري جو سندس ايراضيءَ سان ھوندڙ ريشو.

(iii) 7 س م پاسي واري چورس جي ارب جو سندس پاسي سان ھوندڙ ريشو.

(iv) ڊيگھ 5 س م ۽ ويڪر 3.5 س م ھوندڙ مستطيل جي گرد ماپ جو انجي ايراضيءَ سان ھوندڙ ريشو.

(3) هيٺين ريشوز جي جوڙڻ ۾ ننڍو وڌائي طيءَ ڪريو.

$$(i) \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{3}{\sqrt{7}}$$

$$(ii) \frac{3\sqrt{5}}{5\sqrt{7}}, \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{125}}$$

$$(iii) \frac{5}{18}, \frac{17}{121}$$

$$(iv) \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{48}}, \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{27}}$$

$$(v) \frac{9.2}{5.1}, \frac{3.4}{7.1}$$

(4)

(i) $\square ABCD$ ھڪ پورو چوٽ پاسو چؤڪنڊو آھي انجي $\angle A$ ۽ $\angle B$ جي ماپن جو ريشو 5:4 آھي $\angle B$ جي

ماپ لھو

(ii) البرٽ ۽ سليمر جي اڇوڪين عمر جو ريشو 5:9 آھي. پنجن سالن کانپوءِ سندن عمر جو ريشو 3:5

ٿيندو سندن اڇوڪي عمر لھو.

(iii) هڪ مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر ۾ ريشو 3:1 آهي. مستطيل جي گرد ماپ 36 س م آهي. ته مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر لھو.

(iv) ٻن عددن جو ريشو 31:23 آهي ۽ سندن جو ٽاپ 216 آهي اهي عدد لھو.

$$(5^*) \text{ جيڪڏهن } a:b = 3:1 \text{ ۽ } b:c = 5:1 \text{ ته لھو: (i) } \left(\frac{a^3}{15b^2c}\right)^3 \text{ (ii) } \frac{a^2}{7bc}$$

$$(6^*) \text{ جيڪڏهن } \sqrt{0.04 \times 0.4 \times a} = 0.4 \times 0.04 \times \sqrt{b} \text{ ته } \frac{a}{b} \text{ جو ريشو لھو.}$$

$$(7) (x+3):(x+11) = (x-2):(x+1) \text{ ته } x \text{ جو ملھ لھو.}$$

جاڳي وٺون



برابر لڳن ريشوز جون خاصيتون

برابريءَ جي خاصيتون ڪم آڻي ٻن برابر ريشو تي ڪجهه ڪاروايون ڪري سگهجن ٿيون اچو ته انهن جو اڀياس ڪريون جيڪڏهن a, b, c, d وڌو عدد آهن ته انهن نسبت هيٺين خاصيتون سمجهو.

$$(I) \text{ انورٽينڊو (Invertendo) جيڪڏهن } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ ته } \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\therefore a \times d = b \times c$$

$$\therefore b \times c = a \times d$$

$$\therefore \frac{b \times c}{a \times c} = \frac{a \times d}{a \times c} \text{ (ٻنهي پاسي } a \times c \text{ سان ونڊڻ تي)}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

∴ جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ ان خاصيت کي ٽينڊو يا الٽوگ چئجي ٿو.

$$(II) \text{ الٽر نينڊو ٽينڊو (Alternando) جيڪڏهن } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ ته } \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\therefore a \times d = b \times c$$

$$\frac{a \times d}{c \times d} = \frac{b \times c}{c \times d}$$

(ٻنهي پاسي $c \times d$ سان ونڊڻ تي)

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ ان خاصيت کي يا متبد لوگ الٽر نينڊو چئجي ٿو.

(III) کامپونيندو (Componendo) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1 \quad (\text{ٻنهي پاسي 1 جوڙڻ سان})$$

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ ان خاصيت کي کامپونيندو يا سنجو ٻڌجي ٿو.

(IV) ڊوڊيندو (Dividendo) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\therefore \frac{a}{b} - 1 = \frac{c}{d} - 1 \quad (\text{ٻنهي پاسي 1 ڪٽ ڪرڻ سان})$$

$$\therefore \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ ان خاصيت کي ڊوڊيندو يا ويوڱ چئجي ٿو.

(V) کامپونيندو - ڊوڊيندو (Componendo-dividendo) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ ، $a \neq b$ ، $c \neq d$

$$\therefore \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \quad (1) \dots \quad (\text{کامپونيندو وسيلي ڏنل}) \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{جيڪڏهن}$$

$$\therefore \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \quad (2) \dots \quad (\text{ڊوڊيندو وسيلي})$$

$$\therefore \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} \quad (1 \text{ ۽ } 2 \text{ مان})$$

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ ان خاصيت کي کامپونيندو - ڊوڊيندو يا سنجو ٻڌ - ويوڱ چئجي ٿو.

کامپونيندو ڊوڊيندو ڪريائڻ جو عام رُپ:

$$(\text{هڪ دفعو کامپونيندو}) \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ته} \quad \frac{c+d}{d} = \frac{a+b}{b} \quad \text{جيڪڏهن}$$

$$\frac{a+2b}{b} = \frac{c+2d}{d} \quad (\text{ٻه دفعا کامپونيندو ڪرڻا})$$

$$\text{عام طور} \quad \frac{a+mb}{b} = \frac{c+md}{d} \quad (1) \dots \quad (m \text{ دفعا کامپونيندو ڪرڻا})$$

$$\text{ساڳئي نموني} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ته} \quad \frac{a-mb}{b} = \frac{c-md}{d} \quad (2) \dots \quad (m \text{ دفعا ڊوڊيندو ڪرڻا})$$

$$\text{جيڪڏهن} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ته} \quad \frac{a+mb}{a-mb} = \frac{c+md}{c-md} \quad (1 \text{ ۽ } 2 \text{ مان، ونڊ ڪري}) \dots$$



جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ (انورٽينڊو) جيڪڏهن $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (ڪامپونينڊو)
 جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ (انٽرنيڊو) جيڪڏهن $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (ڪامپونينڊو)
 جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ (ڪامپونينڊو - ڊويڊنڊو)

حل ڪيل مثال :

مثال (1) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{5}{3}$ ته $\frac{a+7b}{7b} =$ ريشو لھو .

طريقو I

حل : جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{5}{3}$ ته $\frac{a}{5} = \frac{b}{3} = k$ (الٽرنيڊو موجب)

$$\therefore a = 5k, b = 3k$$

$$\therefore \frac{a+7b}{7b} = \frac{5k+7 \times 3k}{7 \times 3k}$$

$$= \frac{5k+21k}{21k}$$

$$= \frac{26k}{21k} = \frac{26}{21}$$

طريقو II

$$\frac{a}{b} = \frac{5}{3}$$

$$\therefore \frac{a}{7b} = \frac{5}{21}$$

$$\therefore \frac{a+7b}{7b} = \frac{5+21}{21} \text{ (ڪامپونينڊو موجب)}$$

$$\therefore \frac{a+7b}{7b} = \frac{26}{21}$$

مثال (2) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{7}{4}$ ته $\frac{5a-b}{b}$ لھو

طريقو I

$$\text{حل : } \frac{a}{b} = \frac{7}{4}$$

$$\therefore \frac{a}{7} = \frac{b}{4} \text{ (انٽرنيڊو موجب)}$$

$$\therefore \frac{a}{7} = \frac{b}{4} = m \text{ سمجھو ته}$$

$$\therefore a = 7m, b = 4m$$

$$\therefore \frac{5a-b}{b} = \frac{5(7m) - 4m}{4m}$$

$$= \frac{35m - 4m}{4m}$$

$$= \frac{31}{4}$$

طريقو II

$$\frac{a}{b} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{5a}{b} = \frac{5 \times 7}{4}$$

$$= \frac{35}{4}$$

$$\frac{5a-b}{b} = \frac{35-4}{4} \text{ (ڊويڊنڊو موجب)}$$

$$\frac{5a-b}{b} = \frac{31}{4}$$

مثال (3) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{7}{3}$ ته $\frac{a+2b}{a-2b}$ ملهه لھو.

طريقو II : $\therefore \frac{a}{b} = \frac{7}{3}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a}{2b} &= \frac{7}{6} \quad \text{ٻنهي پاسي سان ضرب سان} \dots \\ \therefore \frac{a+2b}{a-2b} &= \frac{7+6}{7-6} \quad (\text{ڪامپونينڊو ڪوڊينڊو موجب}) \\ \therefore \frac{a+2b}{a-2b} &= \frac{13}{1} \end{aligned}$$

طريقو I : سمجهو ته $a = 7m, b = 3m$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a+2b}{a-2b} &= \frac{7m+2 \times 3m}{7m-2 \times 3m} \\ &= \frac{7m+6m}{7m-6m} \\ &= \frac{13m}{m} = \frac{13}{1} \end{aligned}$$

مثال (4) جيڪڏهن $\frac{b}{2} = \frac{a}{3}$ ته $\frac{5a+3b}{7a-2b}$ جو ملهه لھو

حل :

طريقو I

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{2}$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots$$

هاڻي $\frac{5a+3b}{7a-2b}$ جي هرڪ پڌ کي b سان ونڊڻ تي.

$$\frac{\frac{5a}{b} + \frac{3b}{b}}{\frac{7a}{b} - \frac{2b}{b}} = \frac{5\left(\frac{a}{b}\right) + 3}{7\left(\frac{a}{b}\right) - 2}$$

$$= \frac{5\left(\frac{3}{2}\right) + 3}{7\left(\frac{3}{2}\right) - 2}$$

$$= \frac{\frac{15}{2} + 3}{\frac{21}{2} - 2}$$

$$= \frac{15+6}{21-4}$$

$$= \frac{21}{17}$$

طريقو II

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{2} \quad \text{ڏنل}$$

$$\therefore \frac{a}{3} = \frac{b}{2} = t \quad \text{سمجهو ته } t$$

ملهه رکڻ سان $a = 3t$ ۽ $b = 2t$

$$\frac{5a+3b}{7a-2b} = \frac{5(3t)+3(2t)}{7(3t)-2(2t)} \quad (t \neq 0)$$

$$= \frac{15t+6t}{21t-4t}$$

$$= \frac{21t}{17t}$$

$$= \frac{21}{17}$$

مثال (5) جيڪڏهن $\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$ ته $\frac{4x-y}{4x+y}$ جو ملهه لھو

حل :

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{4x}{y} = \frac{16}{5}$$

(ٻنهي پاسي 4 سان ضرب ٿي) ...

$$\therefore \frac{4x+y}{4x-y} = \frac{16+5}{16-5}$$

(ڪامپونينڊو ڊويڊينڊو) ...

$$\therefore \frac{4x+y}{4x-y} = \frac{21}{11}$$

$$\therefore \frac{4x-y}{4x+y} = \frac{11}{21}$$

(انورٽينڊو)

مثال (6) جيڪڏهن $5x = 4y$ ته $\frac{3x^2 + y^2}{3x^2 - y^2}$ جيڪڏهن ته جو ملهه لھو.

حل :

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{16}{25}$$

$$\therefore \frac{3x^2}{y^2} = \frac{48}{25}$$

(ٻنهي پاسي 3 سان ضرب ٿي) ..

$$\therefore \frac{3x^2 + y^2}{3x^2 - y^2} = \frac{48 + 25}{48 - 25}$$

(ڪامپونينڊو ڊويڊينڊو) ...

$$\therefore \frac{3x^2 + y^2}{3x^2 - y^2} = \frac{73}{23}$$

∴

ڄاڻي وٺون



برابر ريشوز جي خاصيتن جو استعمال (Use of Properties of equal ratios)

ڪجهه مساوتون ٻين طريقن سان حل ڪرڻ کان برابر ريشوز جي خاصيتن وسيلي حل ڪرڻ سولوتيندو آهي.

$$\text{مثال (1) مساوت حل ڪريو} \quad \frac{3x^2 + 5x + 7}{10x + 14} = \frac{3x^2 + 4x + 3}{8x + 6}$$

$$\frac{3x^2 + 5x + 7}{10x + 14} = \frac{3x^2 + 4x + 3}{8x + 6} \quad \text{حل :}$$

$$\frac{(6x^2 + 10x + 14)}{10x + 14} = \frac{(6x^2 + 8x + 6)}{8x + 6}$$

(ٻنهي پاسي 2 سان ضرب ٿي)

$$\frac{(6x^2 + 10x + 14) - (10x + 14)}{10x + 14} = \frac{(6x^2 + 8x + 6) - (8x + 6)}{8x + 6} \quad (\text{ڊويڊيندو})$$

$$\therefore \frac{6x^2}{10x + 14} = \frac{6x^2}{8x + 6}$$

اها مساوت $x=0$ مله سان صحيح بڻجي ٿي. $\therefore x=0$ اهو هڪ حل آهي.

جيڪڏهن $x \neq 0$ ته $x^2 \neq 0$ ، $\therefore 6x^2$ ونڊڻ تي،

$$\frac{1}{10x + 14} = \frac{1}{8x + 6}$$

$$\therefore 8x + 6 = 10x + 14$$

$$\therefore 6 - 14 = 10x - 8x$$

$$\therefore -8 = 2x$$

$$\therefore x = -4$$

$\therefore x = -4$ يا $x = 0$ ڏنل مساوت جا حل آهن.

مثال (2) حل ڪريو $\frac{\sqrt{x+7} + \sqrt{x-2}}{\sqrt{x+7} - \sqrt{x-2}} = \frac{5}{1}$

$$\frac{(\sqrt{x+7} + \sqrt{x-2}) + (\sqrt{x+7} - \sqrt{x-2})}{(\sqrt{x+7} + \sqrt{x-2}) - (\sqrt{x+7} - \sqrt{x-2})} = \frac{5+1}{5-1} \quad (\text{ڪامپونيندو - ڊويڊيندو})$$

$$\therefore \frac{2\sqrt{x+7}}{2\sqrt{x-2}} = \frac{6}{4}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{x+7}}{\sqrt{x-2}} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{x+7}{x-2} = \frac{9}{4} \quad (\text{ٻنهي پاسي ٻي سڳهه ڪري})$$

$$\therefore 4x + 28 = 9x - 18$$

$$\therefore 28 + 18 = 9x - 4x$$

$$\therefore 46 = 5x$$

$$\therefore \frac{46}{5} = x$$

$$\therefore x = \frac{46}{5} \quad \text{ڏنل مساوت جو حل آهي.}$$

مشغولي: ٿلهي ڪاغذ جا پنچ ٽڪر ڪٽو هر هڪ ڪاغذ تي هيٺين مان هڪ هڪ بيان لکو.

$$(i) \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \quad (ii) \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \quad (iii) \frac{a}{b} = \frac{ac}{bd} \quad (iv) \frac{c}{d} = \frac{c-a}{d-b} \quad (v) \frac{a}{b} = \frac{rc}{rd}$$

اها ڄاڻ مليل آهي مٿين مان هر هڪ بيان صحيح آهي يا غلط اهو ڪارڊ جي پٺيان لکو غلط بيان جو سبب لکو.

4.3 اڀياس

(1) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{7}{3}$ ته هيٺين ريشوز جا ملهه لھو.

$$(i) \frac{5a+3b}{5a-3b} \quad (ii) \frac{2a^2+3b^2}{2a^2-3b^2} \quad (iii) \frac{a^3-b^3}{b^3} \quad (iv) \frac{7a+9b}{7a-9b}$$

(2) جيڪڏهن $\frac{15a^2+4b^2}{15a^2-4b^2} = \frac{47}{7}$ ته هيٺين ريشوز جا ملهه ٻڌي ڪريو.

$$(i) \frac{a}{b} \quad (ii) \frac{7a-3b}{7a+3b} \quad (iii) \frac{b^2-2a^2}{b^2+2a^2} \quad (iv) \frac{b^3-2a^3}{b^3+2a^3}$$

(3) جيڪڏهن $\frac{3a^2-7b^2}{3a^2+7b^2}$ ريشو جو ملهه لھو.

(4) هيٺيون مساوتون حل ڪريو.

$$(i) \frac{x^2+12x-20}{3x-5} = \frac{x^2+8x+12}{2x+3}$$

$$(ii) \frac{10x^2+15x+63}{5x^2-25x+12} = \frac{2x+3}{x-5}$$

$$(iii) \frac{(2x+1)^2+(2x-1)^2}{(2x+1)^2-(2x-1)^2} = \frac{17}{8}$$


$$(iv^*) \frac{\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+3}}{\sqrt{4x+1}-\sqrt{x+3}} = \frac{4}{1}$$

$$(v) \frac{(4x+1)^2+(2x+3)^2}{4x^2+12x+9} = \frac{61}{36}$$

$$(vi) \frac{(3x-4)^3-(x+1)^3}{(3x-4)^3+(x+1)^3} = \frac{61}{189}$$

مشغولي: هيٺ ڏنل وچواري چوڪت جي a, b جا ملهه بدلائي يعني $a:b$ ريشو جو ملهه ڦيرائي ڏسڻ

مثال ٺاهي سگهبا. استاد اهڙا مثال ٺهرائي اڀياس ڪرائين.





برابر ريشوز جو سڌيان (Theorem on equal ratios)

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d} = \frac{c}{d}$ ته ان خاصيت کي برابر ريشوز جو سڌيان چئجي ٿو

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \therefore a = bk, \quad c = dk$$

$$\therefore \frac{a+c}{b+d} = \frac{bk+dk}{b+d} = \frac{k(b+d)}{b+d} = k$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

$$\text{اسان کي چاڻ آهي ته } \frac{a}{b} = \frac{al}{bl}$$

$$\therefore \text{جيڪڏهن } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k, \text{ ته } \frac{al}{bl} = \frac{cm}{dm} = \frac{al+cm}{bl+dm} = k$$

(محدود پڌ) n, m, l غير بڙي عدد آهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots\dots\dots$ ساڳئي نموني جيڪڏهن

$$\text{ته هر هڪ ريشو} = \frac{al+cm+en+\dots}{bl+dm+fn+\dots} \text{ (محدود پڌ)}$$

(اهو برابر ريشوز جي سڌيان جو عام روپ ملي ٿو.)



ويچار ڪريو

هڪ ڪسرت شالار ننڍڙن ٻارن جي گروهه ۾ 35 ڇوڪريون ۽ 42 ڇوڪرا، ٻار گروهه ۾ 30 ڇوڪريون ۽ 36 ڇوڪرا ۽ جوان گروهه ۾ 20 ڇوڪريون ۽ 24 ڇوڪرا آهن ته هر هڪ گروهه ۾ ڇوڪرين جو ڇوڪرن جي عدد سان ريشو لھو. ٽيهر ڪوايد لاءِ ٽيئي گروهه ميدان تي آيا. ته ڪل ڇوڪرين ۽ ڪل ڇوڪرن جي عدد جو ريشو ٻڌايو. مٿين مثال مان توهان برابر ريشو جي سڌيان جي چڪاس ڪريو.

مثال (1) هيٺيان خال ڀريو

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \frac{a}{3} &= \frac{b}{7} = \frac{4a+9b}{4 \times 3 + 9 \times 7} = \frac{4a+9b}{12+63} = \frac{4a+9b}{75} \\ \text{(ii)} \quad \frac{x}{3} &= \frac{y}{5} = \frac{z}{4} = \frac{5x-3y+4z}{5 \times 3 - 3 \times 5 + 4 \times 4} = \frac{5x-3y+4z}{15-15+16} = \frac{5x-3y+4z}{16} \\ \therefore & \frac{a}{3} = \frac{b}{7} = \frac{4a+9b}{75} \quad \text{--- (برابر ريشو جي سڌيان موجب) ---} \\ & \frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{4} = \frac{5x-3y+4z}{16} \end{aligned}$$

مثال (2) جيڪڏهن $\frac{a}{(x-2y+3z)} = \frac{b}{(y-2z+3x)} = \frac{c}{(z-2x+3y)}$ ۽ $x + y + z \neq 0$ ته

$$\text{ڏيکارڻو ته } \frac{a+b+c}{2(x+y+z)} = \text{هر هڪ ريشو}$$

سمجھو ته : حل $\frac{a}{(x-2y+3z)} = \frac{b}{(y-2z+3x)} = \frac{c}{(z-2x+3y)} = k$

∴ برابر ريشوز جي سڌيان موجب

$$\begin{aligned} k &= \frac{a+b+c}{(x-2y+3z)+(y-2z+3x)+(z-2x+3y)} \\ &= \frac{a+b+c}{2x+2y+2z} \\ &= \frac{a+b+c}{2(x+y+z)} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{a}{x-2y+3z} = \frac{b}{y-2z+3x} = \frac{c}{z-2x+3y} = \frac{a+b+c}{2(x+y+z)}$$

مثال (3) جيڪڏهن $\frac{a}{z+x} = \frac{b}{x+y} = \frac{c}{y+z}$ ته $\frac{y}{b+c-a} = \frac{z}{c+a-b} = \frac{x}{a+b-c}$ اهو ثابت ڪريو

حل

$$\frac{b+c-a}{y} = \frac{c+a-b}{z} = \frac{a+b-c}{x} \quad (\text{انور ٽينڊو موجب})$$

سمجھو ته $\frac{b+c-a}{y} = \frac{c+a-b}{z} = \frac{a+b-c}{x} = k$

برابر ريشوز جي سڌيان موجب

$$\begin{aligned} k &= \frac{(c+a-b)+(a+b-c)}{z+x} & k &= \frac{(a+b-c)+(b+c-a)}{x+y} & k &= \frac{(b+c-a)+(c+a-b)}{y+z} \\ &= \frac{2a}{z+x} \quad \dots(I) & &= \frac{2b}{x+y} \quad \dots(II) & &= \frac{2c}{y+z} \quad \dots(III) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2a}{z+x} = \frac{2b}{x+y} = \frac{2c}{y+z}$$

$$\therefore \frac{a}{z+x} = \frac{b}{x+y} = \frac{c}{y+z}$$

مثال (4) حل ڪريو : $\frac{14x^2-6x+8}{10x^2+4x+7} = \frac{7x-3}{5x+2}$

حل : مساوت کي ڇاڇڻ سان ڄاڻ پوندي ته ساڄي پاسي ريشو کي جي ٻنهي ڀڃن کي $2x$ سان ضرب ڏيئي ڪاٻي ريشو ڇاڇريان ٻه ڀڃ ملن ٿا ان ڪري اسين ساڄي ريشو کي $2x$ سان ضربينداسين. (هتي x غير ٻڙي عدد آهي اهو پڪ ڪريون)

$$\frac{7x-3}{5x+2} = \frac{-3}{2} \quad \text{ڇا} \quad \frac{14x^2-6x+8}{10x^2+4x+7} = \frac{8}{7} \quad \text{تہ } x = 0 \text{ جيڪڏهن}$$

$$\therefore \frac{8}{7} = \frac{3}{2} \quad (\text{ها اڻڄاتل آهي})$$

$$\therefore x \neq 0$$

(. .) ٻئي ريشو جي ٻنهي ڀدن کي $2x$ سان ضرب ڏيئي.

$$\frac{14x^2-6x+8}{10x^2+4x+7} = \frac{2x(7x-3)}{2x(5x+2)} = k$$

$$\therefore \frac{14x^2-6x+8}{10x^2+4x+7} = \frac{14x^2-6x}{10x^2+4x} = k$$

$$\therefore \frac{14x^2-6x+8-14x^2+6x}{10x^2+4x+7-10x^2-4x} = \frac{8}{7} = k$$

$$\therefore k = \frac{8}{7}$$

$$\therefore \frac{7x-3}{5x+2} = \frac{8}{7}$$

$$\therefore 49x-21=40x+16$$

$$\therefore 49x-40x=16+21$$

$$\therefore 9x=37 \quad \therefore x = \frac{37}{9}$$

اڀياس 4.4

(1) خال ڀريو

$$(i) \quad \frac{x}{7} = \frac{y}{3} = \frac{3x+5y}{\dots\dots} = \frac{7x-9y}{\dots\dots} \quad (ii) \quad \frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7} = \frac{a-2b+3c}{\dots\dots} = \frac{\dots\dots}{6-8+14}$$

(2) جيڪڏهن $5m-n=3m+4n$ تہ هيٺين کالڪن جا ملهه لھو.

$$(i) \quad \frac{m^2+n^2}{m^2-n^2} \quad (ii) \quad \frac{3m+4n}{3m-4n}$$

(3) (i) جيڪڏهن $a(y+z)=b(z+x)=c(x+y)$ ۽ a, b, c مان ڪي به ٻه عدد برابر نه آهن تہ ڏيکاريو.

$$\frac{y-z}{a(b-c)} = \frac{z-x}{b(c-a)} = \frac{x-y}{c(a-b)}$$

$$(ii) \quad \text{جيڪڏهن } x+y+z \neq 0 \quad \text{۽} \quad \frac{x}{3x-y-z} = \frac{y}{3y-z-x} = \frac{z}{3z-x-y}$$

تہ ڏيکاريو تہ هر هڪ ريشو جو ملهه 1 آهي.

$$(iii) \text{ جيڪڏهن } \frac{a+b}{2} = \text{هر هڪ ريشو } x+y+z \neq 0 \text{ ثابت ڪريو ته هر هڪ ريشو } \frac{ax+by}{x+y} = \frac{bx+az}{x+z} = \frac{ay+bz}{y+z}$$

$$(iv) \text{ جيڪڏهن } \frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{c+a-b} = \frac{z}{a+b-c} \text{ ته ڏيکاريو } \frac{y+z}{a} = \frac{z+x}{b} = \frac{x+y}{c}$$

$$(v) \text{ جيڪڏهن } \frac{3x-5y}{5z+3y} = \frac{x+5z}{y-5x} = \frac{y-z}{x-z} \text{ ته ڏيکاريو ريشو هر هڪ } \frac{x}{y} \text{ جيترو آهي.}$$

$$(i) \frac{16x^2-20x+9}{8x^2+12x+21} = \frac{4x-5}{2x+3} \quad (ii) \frac{5y^2+40y-12}{5y+10y^2-4} = \frac{y+8}{1+2y} \quad (4) \text{ حل ڪريو:}$$

جاڳي وٺون



(Continued Proportion) لڳيتو پروپورشن

12:36 ۽ 4:12 ريشو برابر آهن انهن ٻن ريشوز ۾ ٻيون جو پهرين پڌ ۽ پوئين جو پهرئين پڌ ساڳيا آهن هتي عدد 4, 12, 36 لڳيتي پروپورشن ۾ آهن ائين چئبو.

جڏهن $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ ته چئبو ته a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.

جيڪڏهن $ac = b^2$ ته ٻنهي پاسي bc سان وٺڻ تي $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ مساوت ملندي.

$\therefore ac = b^2$ ۾ به a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.

جڏهن a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ هوندا آهن ته b کي a ۽ c جو جاميٽرڪ وچ (Geometric mean) يا وچون پروپورشن (Mean proportional) چئبو آهي. مٿين جاڳ مان

هينيان هڪجهڙا بيان ملن ٿا.

$$\therefore \quad (1) \frac{a}{b} = \frac{b}{c} \quad (2) b^2 = ac \quad (3) a, b, c \text{ لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.}$$

$$(4) b \text{ اهو } a \text{ ۽ } c \text{ جو جاميٽرڪ وچ آهي.} \quad (5) b \text{ اهو } a, c \text{ جو وچون پروپورشن آهي.}$$

لڳيتي پروپورشن جو ٻه وستار ڪري سگهجي ٿو.

$$\text{جيڪڏهن } \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{e}{f} \text{ ته چئبو } a, b, c, d, e, f \text{ لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.}$$

مثال (1) جيڪڏهن x اهو 25 ۽ 4 جو جاميٽرڪ وچ آهي ته x جو ملهه لھو

حل: x اهو 25 ۽ 4 جو جاميٽرڪ وچ آهي.

$$\therefore x^2 = 25 \times 4$$

$$\therefore x^2 = 100$$

$$\therefore x = 10$$

مثال (2) جيڪڏهن $4a^2b$, $8ab^2$, p لڳيتي پروپورشن ۾ آهن ته p جو ملهه لھو.

حل : $4a^2b$, $8ab^2$, p لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.

$$\therefore \frac{4a^2b}{8ab^2} = \frac{8ab}{p}$$

$$p = \frac{8ab^2 \times 8ab^2}{4a^2b} = 16b^3$$

مثال (3) 7, 12 ۽ 18 عددن مان ڪھڙو عدد ڪٽ ڪجي جيئن ملندڙ عدد لڳيتي پروپورشن ۾ هجن.

حل : سمجهو ته x عدد ڪٽ ڪرڻ سان ملندڙ عدد لڳيتي پروپورشن ۾ ٿيندا.

لڳيتي پروپورشن ۾ آهن $(7-x)$, $(12-x)$, $(18-x)$

چڪاس

$$\therefore (12-x)^2 = (7-x)(18-x)$$

$$\therefore 144 - 24x + x^2 = 126 - 25x + x^2$$

$$\therefore -24x + 25x = 126 - 144$$

$$\therefore x = -18$$

$$(7-x) = 7 - (-18) = 25$$

$$(12-x) = 12 - (-18) = 30$$

$$(18-x) = 18 - (-18) = 36$$

$$30^2 = 900 \quad 25 \times 36 = 900$$

لڳيتي پروپورشن ۾ آهن. 25, 30, 36

$\therefore$ 7, 12, 18 مان -18 ڪٽ ڪرڻ سان عدد لڳيتي پروپورشن ۾ ملندا.

k - طريقو (k -method)

k طريقو ريشوز ۽ پروپورشن جا مثال حل ڪرڻ جو هڪ سٺو طريقو آهي. هن طريقي ۾ هر هڪ ريشو جو ملهه k مڃيو آهي.

مثال (1) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته ڏيکاريو : $\frac{5a-3c}{5b-3d} = \frac{7a-2c}{7b-2d}$

حل : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ سمجهو ته $a = bk$, $c = dk$

(a ۽ b جا ملهه ٻنهي پاسن ۾ رکي).

$$\text{LHS} = \frac{5a-3c}{5b-3d} = \frac{5(bk)-3(dk)}{5b-3d} = \frac{k(5b-3d)}{(5b-3d)} = k$$

$$\text{RHS} = \frac{7a-2c}{7b-2d} = \frac{7(bk)-2(dk)}{7b-2d} = \frac{k(7b-2d)}{7b-2d} = k$$

$$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\therefore \frac{5a-3c}{5b-3d} = \frac{7a-2c}{7b-2d}$$

مثال (2) جيڪڏهن a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ آهن ته ثابت ڪريو $\frac{(a+b)^2}{ab} = \frac{(b+c)^2}{bc}$

حل : a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ آهن سمجهو ته $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$

$$(\therefore b = ck, a = bk = ck \times k = ck^2)$$

a ۽ b جا ملهه رکڻ سان

$$\text{LHS} = \frac{(a+b)^2}{ab} = \frac{(ck^2 + ck)^2}{(ck^2)(ck)} = \frac{c^2 k^2 (k+1)^2}{c^2 k^3} = \frac{(k+1)^2}{k}$$

$$\text{RHS} = \frac{(b+c)^2}{bc} = \frac{(ck + c)^2}{(ck)c} = \frac{c^2 (k+1)^2}{c^2 k} = \frac{(k+1)^2}{k}$$

$$\therefore \text{LHS} = \text{RHS} \quad \therefore \frac{(a+b)^2}{ab} = \frac{(b+c)^2}{bc}$$

مثال (4) پنج عدد لڳيتي پروپورشن ۾ آهن انهن ۾ پهريون پڌ 5 ۽ آخري پڌ 80 آهي ته اهي عدد لھو.

سمجهو ته اهي پنج پڌ آهن

$$(a, ak, ak^2, ak^3, ak^4)$$

$$\text{هتي } a = 5 \text{ ۽ } ak^4 = 80$$

$$\therefore 5 \times k^4 = 80$$

$$\therefore k^4 = 16$$

$$\therefore k = 2 \quad \because 2^4 = 16$$

$$ak = 5 \times 2 = 10 \quad ak^2 = 5 \times 4 = 20$$

$$ak^3 = 5 \times 8 = 40 \quad ak^4 = 5 \times 16 = 80$$

اهي عدد آهن 5, 10, 20, 40, 80

مثال (3) جيڪڏهن a, b, c لڳيتي پروپورشن ۾ آهن ته ثابت ڪريو.

$$\frac{a}{c} = \frac{a^2 + ab + b^2}{b^2 + bc + c^2} \quad \text{سمجهو ته :}$$

حل : $a : b$ لڳيتي پروپورشن ۾ آهن . $\therefore \frac{a}{b} = \frac{b}{c}$

سمجهو ته ، $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$ ۽ $b = ck$ ۽ $a = ck^2$

$$\text{LHS} = \frac{a}{c} = \frac{ck^2}{c} = k^2$$

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \frac{a^2 + ab + b^2}{b^2 + bc + c^2} \\ &= \frac{(k^2 c)^2 + ck^2(ck) + (ck)^2}{(ck)^2 + (ck)(c) + c^2} \\ &= \frac{k^4 c^2 + k^3 c^2 + c^2 k^2}{c^2 k^2 + c^2 k + c^2} \\ &= \frac{c^2 k^2 (k^2 + k + 1)}{c^2 (k^2 + k + 1)} \\ &= k^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\therefore \frac{a}{c} = \frac{a^2 + ab + b^2}{b^2 + bc + c^2}$$

اڀياس 4.5

- (1) 16, 12 ۽ 21 مان هر هڪ عدد ۾ ڪهڙو عدد جوڙ ڪجي ته ملندڙ عدد لڳيتي پروپورشن ۾ ٿيندا؟
- (2) $(23-x)$ ۽ $(19-x)$ جو $(28-x)$ وچون پروپورشنل آهي ته x جو ملهه لھو.
- (3) ٽي عدد لڳيتي پروپورشن ۾ آهن انھنجو وچون پروپورشنل 12 آهي ۽ ٻڇيل ٻن عددن جي جوڙاپٽ 26 آهي ته اهي عدد لھو.
- (4) جيڪڏهن $(a+b+c)(a-b+c) = a^2 + b^2 + c^2$ ته ڏيکارو ته a, b, c عدد لڳيتي پروپورشن ۾ آهن.
- (5) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ ۽ $a, b, c > 0$ سال آهي ته ثابت ڪريو ته
- (i) $(a+b+c)(b-c) = ab - c^2$
- (ii) $(a^2 + b^2)(b^2 + c^2) = (ab + bc)^2$
- (iii) $\frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{a+c}{b}$
- (6) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 y^2}$ ۽ $\frac{x+y}{x-y}$ وچون پروپورشنل لھو.

مشغولي : جائگرافيءَ جي ڪتاب ۾ ڀارت جو سياسي نقشو ڏسو، ان ۾ ڏنل مفاصلي جو پيمانو ڏسو. ان وسيلي الڳ الڳ شهرن ۾ رستي ليڪ ۾ مفاصلو لھو.

جيئن (i) نئين دهلي کان بنگلور (ii) ممبئيءَ کان ڪولڪتا (iii) جڙپور کان پونيشور

گڏيل اڀياس 4

- (1) هيٺين سوالن لاءِ مناسب جواب چونڊيو.
- (i) جيڪڏهن $6:5=y:20$ ته y جو ملهه هيٺين مان ڪهڙو آهي؟
 (A) 15 (B) 24 (C) 18 (D) 22.5
- (ii) 1 م ۾ جو 1 س ۾ سان ريشو هيٺين مان ڪهڙو آهي؟
 (A) 1 : 100 (B) 10 : 1 (C) 1 : 10 (D) 100 : 1
- (iii*) جتن، نتن ۽ موهسين جي عمر نمبر 24, 16 ۽ 36 سال آهي ته نتن جي عمر جو موهسين جي عمر سان هوندڙ ريشو ڪهڙو؟
 (A) 3 : 2 (B) 2 : 3 (C) 4 : 3 (D) 3 : 4

(iv) شپڻ ۽ انبل ۾ 24 ڪيلا 3:5 ريشو ۾ ورهايا ته شپڻ کي مليل ڪيلا ڪيترا آهن؟

- (A) 8 (B) 15 (C) 12 (D) 9

(v) 4 ۽ 25 ڇو وڇون ۽ ڇو وڇون هينين مان ڪهڙو آهي؟

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

(2) هينين ۾ پهرئين عدد جو ٻئين عدد سان ريشو ننڍي ۾ ننڍي سادي روپ ۾ لکو.

- (i) 21, 48 (ii) 36, 90 (iii) 65, 117 (iv) 138, 161 (v) 114, 133

(3) هينين ريشو سادي روپ ۾ لکو.

(i) گول جي نيم قطر ۽ گهيڙي جي ريشو.

(ii) مستطيل جي ڊيگهه 4 س ۾ ۽ ويڪر 3 س ۾ آهي ته ان جي اُڀ جو ڊيگهه سان ريشو لھو.

(iii) چؤرس جو پاسو 4 س ۾ آهي ته چؤرس جي گرد ماپ جو انجي ايراضيءَ سان ريشو.

(4) طيءَ ڪريو ته هينين عدد لڳيتي ڇو وڇون ۽ ڇو وڇون آهن ڇا؟

- (i) 2, 4, 8 (ii) 1, 2, 3 (iii) 9, 12, 16 (iv) 3, 5, 8

(5) c, b, a عدد لڳيتي ڇو وڇون ۽ ڇو وڇون آهن جيڪڏهن $a=3$, $c=27$ ته $b=?$

(6) هينين ريشو ڪي سڪڙي ۾ بدلايو.

- (i) 37 : 500 (ii) $\frac{5}{8}$ (iii) $\frac{22}{30}$ (iv) $\frac{5}{16}$ (v) $\frac{144}{1200}$

(7) پهرئين پڌ جو ٻئين پڌ سان ريشو سادي روپ ۾ لکو.

1024 MB, 1.2 GB [(1024 MB = 1 GB)] (i)

(iii) 5 ڊزن , 120 نڱ

(ii) 17 ر , 25 ر 60 پ

(v) 1.5 ڪگ , 2500 ڪ

(iv) 4 ڇ س , 800 ڇ س م

(8) جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ ته هينين ريشو جو ملهه لھو.

(i) $\frac{4a+3b}{3b}$

(ii) $\frac{5a^2+2b^2}{5a^2-2b^2}$

(iii) $\frac{a^3+b^3}{b^3}$

(iv) $\frac{7b-4a}{7b+4a}$

(9) a, b, c, d ڇو وڇون ۽ ڇو وڇون آهن ته ثابت ڪريو.

(i) $\frac{11a^2+9ac}{11b^2+9bd} = \frac{a^2+3ac}{b^2+3bd}$

(ii*) $\sqrt{\frac{a^2+5c^2}{b^2+5d^2}} = \frac{a}{b}$

(iii) $\frac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2} = \frac{c^2+cd+d^2}{c^2-cd+d^2}$

(10) a, b, c لڳيتي ڀروپورشن ۾ آهن ثابت ڪريو ته .

$$(i) \frac{a}{a+2b} = \frac{a-2b}{a-4c} \quad (ii) \frac{b}{b+c} = \frac{a-b}{a-c}$$

$$(11) \text{ حل ڪريو : } \frac{12x^2+18x+42}{18x^2+12x+58} = \frac{2x+3}{3x+2}$$

$$(12) \text{ جيڪڏهن } \frac{x}{y} = \frac{z}{y} \text{ ته ثابت ڪريو هر هڪ ريشو } \frac{2x-3y}{3z+y} = \frac{z-y}{z-x} = \frac{x+3z}{2y-3x}$$

$$(13^*) \text{ جيڪڏهن } \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} \text{ ته ثابت ڪريو ته } \frac{by+cz}{b^2+c^2} = \frac{cz+ax}{c^2+a^2} = \frac{ax+by}{a^2+b^2}$$





ٻن ڦيرائڻن واريون ليڪي مساوتون

5

اچو ته سکون



- ٻن ڦيرائڻن واريون ليڪي مساوتون
- هر وقتي مساوتون حل ڪرڻ
- هر وقتي مساوتون جا لفظي مثال
- هر وقتي مساوتون

ذرا ياد ڪريون



مثال، هيٺيون مساوتون حل ڪريو.

$$(1) \quad m+3=5 \quad (2) \quad 3y+8=22 \quad (3) \quad \frac{x}{3}=2 \quad (4) \quad 2p=p+\frac{4}{9}$$

$$m = \boxed{} \quad y = \boxed{} \quad x = \boxed{} \quad p = \boxed{}$$

(6) 8 مان ڪيترا ڪٽ ڪرڻ سان 2 بچندا؟

$$8 - \boxed{} = 2$$

$$8 - y = 2$$

$$y = \boxed{}$$

(5) ڪهڙي عدد 5 جوڙڻ سان عدد 14 ملندو؟

$$\boxed{} + 5 = 14$$

$$x + 5 = 14$$

$$x = \boxed{}$$

مٿين مساوتن ۾ ڦيرائڻي جي سگهه 1 آهي انهن مساوتن کي هڪ ڦيرائڻي واريون ليڪي مساوتون چوندا آهن .

چاڻي وٺون



ٻن ڦيرائڻن واريون ليڪي مساوتون (Linear equations in two variables)

اهڙا ٻه عدد ڳولهيو جن جي جوڙايت 14 آهي.

انهن عددن لاءِ $y \neq x$ واپرائڻ سان $x+y=14$ اها مساوت ملندي .

اهڙا ٻن ڦيرائڻن واري مساوت آهي. هتي $y \neq x$ ٻنهي ڦيرائڻن جا ڪيترائي ملهه لهي سگهبا

$$9 + 5 = 14 \quad 7 + 7 = 14 \quad 8 + 6 = 14 \quad 4 + 10 = 14$$

$$(-1) + 15 = 14 \quad 15 + (-1) = 14 \quad 2.6 + 11.4 = 14 \quad 0 + 14 = 14$$

$$100 + (-86) = 14 \quad (-100) + (114) = 14 \quad \boxed{} + \boxed{} = 14 \quad \boxed{} + \boxed{} = 14$$

يعني مٿين مثالن ۾ $(x = 9, y = 5)$ $(x = 7, y = 7)$ $(x = 8, y = 6)$

وغيره حل ملن ٿا.

$y=5, x=9$ اهو حل $(9,5)$ ائين سلسليوار لکڻ جي ريت آهي. ان جوڙي ۾ پهريون عدد x جو ۽ ٻيون عدد y جو ملهه ڏيکاري ٿو $x+y=14$ سان مساوت صحيح بڻائيندڙ $(9,5)$, $(7,7)$, $(8,6)$, $(4,10)$, $(10,4)$, $(-1,15)$, $(2.6, 11.4)$... اهڙا انيڪ سلسليوار جوڙا يعني انيڪ حل آهن.

هاڻي ٻيو مثال ڏسو

اهڙا ٻه عدد ڳولهيو جن جي ڪٽ جو جواب 2 آهي

وڏو عدد x ۽ ننڍو عدد y مڃڻ تي $x-y=2$ مساوت ملندي.

x ۽ y جي ملهه لاءِ هيٺين نموني انيڪ مساوتون ملنديون.

$$10 - 8 = 2 \quad 9 - 7 = 2 \quad 8 - 6 = 2 \quad (-3) - (-5) = 2 \quad 5.3 - 3.3 = 2$$

$$15 - 13 = 2 \quad 100 - 98 = 2 \quad \square - \square = 2 \quad \square - \square = 2$$

هتي $x=10, y=8$ ملهه کڻڻ سان $(10,8)$ اهو سلسليوار جوڙو مساوت کي صحيح بڻائي ٿو يعني اهو جوڙو مساوت جو حل آهي $(10,8)$ جوڙو $(8,10)$ ائين لکڻ غلط آهي ڇو ته $(8,10)$ جو مطلب آهي $x=8, y=10$ انهن ملهن سان $x-y=2$ مساوت جو حل نٿو ٿئي.

ان مان سمجهو ته جوڙي جي عددن جو سلسلو اهميت ڀريو آهي.

هاڻي $x-y=2$ مساوت جا حل، سلسليوار جوڙن جي روپ ۾ لکندا سين.

$(8, 6)$, $(5.2, 3.2)$, $(0, -2)$, $(-2, -4)$, $(7, 5)$ وغيره انيڪ حل آهن.

$4m - 3n = 2$ مساوت جا حل لهو.

توهان ٻيون اهڙيون ئي مساوتون ٺاهيو ۽ انهن کي حل ڪريو

هاڻي پهريون ٻه مساوتون ڏسو.

$$x + y = 14 \quad \text{..... I}$$

$$x - y = 2 \quad \text{..... II}$$

I مساوت جا حل $(9, 5)$, $(7, 7)$, $(8, 6)$...

II مساوت جا حل $(7, 5)$, $(-2, -4)$, $(0, -2)$, $(5.2, 3.2)$, $(8, 6)$...


$(8,6)$ جوڙو ٻنهي مساوتن کي صحيح بڻائي ٿو. ان ڪري اهو ٻنهي مساوتن جو عام حل آهي.

ياد رکو



جڏهن ٻن ڦيرائين وارن ٻن ليڪي مساوتن جو هڪ وقت ويچار ڪبو ته انهن مساوتن کي هم وقتي مساوتون (Simultaneous equations) چئجي ٿو.

مشغولي : هيٺ ڏنل عينڪ جي شيٽن تي گهريل عدد لکو.



(i) جنجي جوڙاپٽ 42 ۽ ڪٽ جو جواب 16 آهي . (ii) جنجي جوڙاپٽ 37 ۽ ڪٽ جو جواب 11 آهي .



(iii) جن جي جوڙاپٽ 54 ۽ ڪٽ جو جواب 20 آهي . (iv) جنجي جوڙاپٽ ۽ ڪٽ جو جواب آهي .

ويچار ڪريو



$x+y=5$ ۽ $2x+2y=10$ اهي ٻئي ٻن ڦيرائين وارين ٻن مساوتون آهن.

$x+y=5$ مساوت جا 5 الڳ حل لھو انھن حلن سان $2x+2y=10$ مساوت بہ صحيح بڻجي ٿي ڇا اھا ڇاچ ڪريو.

ٻنھي مساوتن جي چڪاس ڪريو.

ٻن ڦيرائين وارين ٻن مساوتن جا سڀ حل ساڳيا هئڻ لاءِ ضروري شرط ملي ٿي ڇا؟

ڄاڻي وٺون



ڦيرائڻو رد ڪرڻ وارو طريقو (Elimination method)

$x+y=14$ ۽ $x-y=2$ اهي ٻه وقتي مساوتون ڦيرائڻ ۾ ملهه رکي حل ڪيوسين پر هر دفعي اهو طريقو سولائيءَ وارو نه آهي. مثال $2x+3y=4$ ۽ $x-5y=11$ اهي مساوتون y ۽ x جا الڳ الڳ ملهه کڻي حل ڪري ڏسو. توهان ڏسندا ته هتي اهو طريقو سولو نه آهي.

ان لاءِ هر وقتي مساوت حل ڪرڻ جو ٻيو طريقو ڪم آڻبو آهي. ان ۾ ٻن مان هڪ ڦيرائڻي کي رد ڪري هڪ ڦيرائڻي واريون مساوتون حاصل ڪيون آهن. ان وسيلي ان ڦيرائڻي جو ملهه لھبو آھي. اھو ملھ ٻنھي مان ڪنھن بہ مساوت ۾ رکڻ سان ٻئي ڦيرائڻي جو ملھ ملندو آھي.

هيٺين مثالن وسيلي اهو طريقو سمجهو.

(1) حل ڪريو: $x + y = 14$ ۽ $x - y = 2$.

حل : ٻنهي مساوتن جو جوڙ ڪرڻ سان هڪ ڦيرائڻي واريون مساوتون حاصل ڪريون.

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 14 \quad \text{.....I} \\ + \quad x - y & = & 2 \quad \text{.....II} \\ \hline 2x + 0 & = & 16 \\ 2x & = & 16 \\ x & = & 8 \end{array}$$

$$\begin{aligned} x &= 8 \quad \text{ملهم مساوت I ۾ رکڻ سان} \\ x + y &= 14 \\ \therefore 8 + y &= 14 \\ \therefore y &= 6 \end{aligned}$$

هتي (8,6) اهو پهرين مساوت جو حل آهي. ساڳيو حل ٻين مساوت جو به آهي ڇا انجي چڪاس ڪريون

$$x - y = 8 - 6 = 2 \quad \text{اهو صحيح آهي}$$

(8,6) ٻنهي مساوتن جو عام حل آهي

يعني $x + y = 14$ ۽ $x - y = 2$ هر وقتي مساوتن جو حل (8, 6) آهي.

مثال (2) ماءُ ۽ پٽ جي عمر جو جوڙ 45 سال آهي. ماءُ جي عمر ٻيڻ مان پٽ جي عمر ڪٽ ڪرڻ سان جواب

54 ملي ٿو ته ٻنهي جي عمر لھو.

ڏنل ڄاڻ کي مساوت جي روپ ۾ لکون.

حل : سمجهو ته ماءُ جي عمر آهي x سال ۽ پٽ جي اڄوڪي عمر آهي y سال

$$x + y = 45 \quad \text{.....I} \quad \text{پهرين شرط موجب}$$

$$2x - y = 54 \quad \text{.....II} \quad \text{ٻين شرط موجب}$$

$$\text{مساوت I ۽ II جو جوڙ ڪرڻ سان} \quad 3x + 0 = 99$$

$$3x = 99$$

$$x = 33$$

$$x = 33 \quad \text{ملهم ۽ پهرين مساوت ۾ رکڻ سان} .$$

$$33 + y = 45$$

$$y = 45 - 33$$

$$y = 12$$

$x = 33$, $y = 12$ اهو حل ٻين مساوت کي صحيح بڻائي ٿو اهو ڇاچيو

ماءُ جي اڄوڪي عمر 33 سال ۽ پٽ جي اڄوڪي عمر 12 سال آهي.

ٻن ڦيرائڻن واري ليکي مساوت جو عام روپ

$ax + by + c = 0$ مساوت ۾ a, b, c حقيقي عدد هوندا ۽ a, b ساڳئي وقت 0 نه هوندا ته اهو ٻن

ڦيرائڻن واري ليکي مساوت جو عام روپ آهي.

ان مساوت ۾ ٻنهي ڦيرائڻن جي سگهه 1 آهي. اها مساوت ليکي آهي

مثال (1) هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو

$$3x + y = 5 \dots\dots\dots (I)$$

$$2x + 3y = 1 \dots\dots\dots (II)$$

هتي ٻنهي مساوتن ۾ ڪنهن به ڦيرائڻي ۾ گڏڪ
ساڳيون يا ابتڙ عدد نه آهي. ان ڪري هڪ ڦيرائڻي کي
رد ڪرڻ لاءِ گڏڪ ساڳيو ڪندا سين.

مساوت I جي ٻنهي پاسي 3 سان ضرب ڏيڻ تي.

$$\therefore 3x \times 3 + 3 \times y = 5 \times 3$$

$$\therefore 9x + 3y = 15 \dots\dots\dots (III)$$

$$2x + 3y = 1 \dots\dots\dots (II)$$

مساوت III مان II ڪٽ ڪرڻ سان.

$$9x + 3y = 15$$

$$+ 2x + 3y = 1$$

$$7x = 14$$

$$x = 2$$

$x=2$ ملهه هڪ مساوت ۾ رکڻ سان

$$2x + 3y = 1$$

$$\therefore 2 \times 2 + 3y = 1$$

$$\therefore 4 + 3y = 1$$

$$\therefore 3y = -3$$

$$\therefore y = -1$$

حل (2, -1) ٻي مساوت کي به صحيح

بڻائي ٿو ڇا اهو ڇاڇيو.

مثال (2) هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو

$$3x - 4y - 15 = 0 \dots\dots\dots (I)$$

$$y + x + 2 = 0 \dots\dots\dots (II)$$

ٻنهي مساوتن جا مقرر ٻڌ ساڄي پاسي لکو

$$3x - 4y = 15 \dots\dots\dots (I)$$

$$x + y = -2 \dots\dots\dots (II)$$

y ڦيرائڻي کي رد ڪرڻ لاءِ مساوت II کي 4 سان
ضرب ڪري I مساوت ۾ جوڙبو.

$$3x - 4y = 15$$

$$+ 4x + 4y = -8$$

$$7x = 7$$

$$x = 1$$

$x=1$ ملهه مساوت II ۾ رکڻ سان

$$x + y = -2$$

$$\therefore 1 + y = -2$$

$$\therefore y = -2 - 1$$

$$\therefore y = -3$$

(1, -3) حل آهي. اهو حل مساوت I جو به آهي اهو

ڇاڇيو.



ويچار ڪريو

$3x - 4y - 15 = 0$ ۽ $y - x + 2 = 0$ مساوتون x ڦيرائڻي

رد ڪري به حل ڪري سگهبيون ڇا؟ حل پوءِ به ساڳيو ايندو ڇا؟



ملھ رکي رد ڪرڻ وارو طريقو (Substitution method)

ڦيرائڻي کي رد ڪرڻ جو ٻيو به طريقو آهي. مساوت جي هڪ ڦيرائڻي جو ملھ ٻئي ڦيرائڻي جي ذريعي سبب ۾ لھي اھو ٻي مساوت ۾ رکي ان ڦيرائڻي کي رد ڪيو آھي اھو طريقو ھيٺين مثالن مان سمجھو

مثال (1) حل ڪريو $8x + 3y = 11$; $3x - y = 2$

$$8x + 3y = 11 \dots\dots\dots (I)$$

$$3x - y = 2 \dots\dots\dots (II)$$

مساوت II ۾ y جو ملھ x جي نسبت ۾

لکڻ سولوتيندو.

$$3x - y = 2$$

$$3x - 2 = y$$

هاڻي $y = 3x - 2$ ملھ مساوت I ۾ رکندا سين.

$$8x + 3y = 11$$

$$\therefore 8x + 3(3x - 2) = 11$$

$$\therefore 8x + 9x - 6 = 11$$

$$\therefore 17x - 6 = 11$$

$$\therefore 17x = 11 + 6 = 17$$

$$\therefore x = 1$$

x جو ملھ $y = 3x - 2$ ۾ رکندا سين.

$$\therefore y = 3 \times 1 - 2$$

$$\therefore y = 1$$

$$\therefore (1, 1) \text{ اھو مساوتن جو حل آھي.}$$

مثال (2) حل ڪريو $3x - 4y = 16$; $2x - 3y = 10$

$$3x - 4y = 16 \dots\dots\dots (I)$$

$$2x - 3y = 10 \dots\dots\dots (II)$$

مساوت I جو x جو ملھ y نسبت ۾ لھون

$$3x - 4y = 16$$

$$3x = 16 + 4y$$

$$x = \frac{16 + 4y}{3}$$

x جو ملھ مساوت II ۾ رکڻ سان

$$2x - 3y = 10$$

$$2\left(\frac{16 + 4y}{3}\right) - 3y = 10$$

$$\frac{32 + 8y}{3} - 3y = 10$$

$$\frac{32 + 8y - 9y}{3} = 10$$

$$32 + 8y - 9y = 30$$

$$32 - y = 30 \therefore y = 2$$

هاڻي $y = 2$ ملھ مساوت I ۾ رکڻ سان

$$3x - 4y = 16$$

$$\therefore 3x - 4 \times 2 = 16$$

$$\therefore 3x - 8 = 16$$

$$\therefore 3x = 16 + 8$$

$$\therefore 3x = 24$$

$$\therefore x = 8$$

$$\therefore x = 8 \text{ ۽ } y = 2$$

$$\therefore (8, 2) \text{ اھو مساوتن جو حل آھي.}$$

اڀياس 5.1

(1) $y \neq x$ ڦيرائڻا ڪٿي ٻن ڦيرائڻن واريون 5 ليکي مساوتون لکو.

(2) $x+y=7$ مساوت جا 5 حل لھو.

(3) ھينٺيون ھر وقتي مساوتون حل رکيو.

(i) $x + y = 4$; $2x - 5y = 1$

(ii) $2x + y = 5$; $3x - y = 5$

(iii) $3x - 5y = 16$; $x - 3y = 8$

(iv) $2y - x = 0$; $10x + 15y = 105$

(v) $2x + 3y + 4 = 0$; $x - 5y = 11$

(vi) $2x - 7y = 7$; $3x + y = 22$


جاڻي وٺون



ھر وقتي مساوت جا لفظي مثال

لفظي مثال حل ڪرڻ وقت ڏنل ڄاڻ مان مساوتون ٺاھڻ ھڪ اھر ڪم آھي. مساوتن جو حل لھڻ جو طريقو ھينٺين ڏاڪڻ وسيلي ڏيکاريل آھي.

ڏاڪا



لفظي مثال

هاڻي اسين جدا جدا لفظي مثال ڏسون

(1) عمر سان لاڳاپو رکندڙ

(2) عددن سان لاڳاپو رکندڙ

(3) اڳپورن سان لاڳاپو رکندڙ

(4) مالي وهنوار سان لاڳاپو رکندڙ

(5) جاميٽرڪ شڪلين جي خاصيتن تي آڌار

(6) رفتار، مفاصلو، وقت تي مدار رکندڙ

مثال (1) ٻن عددن جي جوڙاپٽ 103 آهي. وڏي عدد کي ننڍي عدد سان ونڊڻ تي ونڊاپٽ 2 ۽

پاڇي 19 اچي ٿي ته اهي عدد لھو.

حل: ڏاڪو 1: لفظي مثال سمجھڻ.

ڏاڪو 2: گھربل عددن لاءِ اکر مڃڻ.

پاڇي + ونڊاپٽ x ونڊيندڙ = ونڊڻي اھو نيمرڌيان ڀرڻ.

وڏو عدد x ۽ ننڍو عدد y مڃينداسين.

ڏاڪو 3: مليل ڄاڻ: عددن جي جوڙاپٽ 103 آهي.

$x + y = 103$ اها هڪ مساوت ملي.

وڏي عدد کي ننڍي عدد سان ونڊڻ تي ونڊاپٽ 2 ۽ پاڇي 19 اچي ٿي.

(پاڇي + ونڊاپٽ x ونڊيندڙ = ونڊڻي) ... $x = 2 \times y + 19$

$x - 2y = 19$ ٻين مساوت ملي

ڏاڪو 4: مساوتن جو حل لھنداسين

$$x + y = 103 \quad \text{.....(I)}$$

$$x - 2y = 19 \quad \text{.....(II)}$$

(I) مساوت مان (II) مساوت ڪٽ ڪنداسين.

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 103 \\ - x - 2y & = & 19 \\ \hline 0 + 3y & = & 84 \\ \therefore y & = & 28 \end{array}$$

ڏاڪو 5: $x + y = 103$ مساوت ۾ y جو ملھ رکنداسين.

$$\therefore x + 28 = 103$$

$$\therefore x = 103 - 28$$

$$\therefore x = 75$$

ڏاڪو 6: گھربل عدد آھن 75 ۽ 28

مثال (2) سميت جي عمر سوهن جي عمر جي اڌ کان 23 سال وڌيڪ آهي. 5 سال اڳ سندس عمر جي جوڙاپٽ 55 سال هئي ته سندن اڄوڪي عمر لھو.

حل : سمجھو ته سميت جي اڄوڪي عمر x ۽ سوهن جي اڄوڪي عمر y آهي سميت جي عمر سوهن جي عمر جي اڌ کان 23 سال وڌيڪ آهي انڪري $x = \frac{y}{2} + \square$

پنچ سال اڳ سميت جي عمر $(x-5)$ سال پنچ سال اڳ سوهن جي عمر $(y-5)$

پنچ سال اڳ سندن جي عمر جي جوڙاپٽ = 55 سال

$$\square + \square = 55$$

مساوتون حل ڪرڻ

$$2x = y + 46$$

$$2x - y = 46 \dots\dots\dots(I)$$

$$(x - 5) + (y - 5) = 55$$

$$x + y = 65 \dots\dots\dots(II)$$

$$x + y = 65$$

$$\therefore 37 + y = 65$$

$$\therefore y = 65 - 37$$

$$\therefore y = 28$$

$$2x - y = 46$$

$$+ x + y = 65$$

$$\therefore 3x = 111$$

$$\therefore x = 37$$

سميت جي اڄوڪي عمر 37 سال ۽ سوهن جي اڄوڪي عمر 28 سال آهي.

مثال (3) هڪ بن انگن وارو عدد سندن انگن جي جوڙاپٽ جي چئوڻو آهي انجي انگن ۾ اڌل بدل ڪرڻ تي ملندڙ عدد اصلي مدد جي ٻيڻ کان 9 گهٽ آهي ته اهو عدد لھو.

حل سمجھو ته اصلي عدد جي ايڪن واري جاء تي x انگ ۽ y انگ ڏهاڪن واري جاء تي y انگ آھن.

انگن جي جوڙاپٽ	عدد	ايڪن واري جاء تي انگ	ڏهاڪن واري جاء تي انگ	
$y + x$	$10y + x$	x	y	اصلي عدد
$x + y$	$10x + y$	y	x	نئون عدد

$$10y + x = 4(y + x) \quad \text{پهرين شرط موجب}$$

$$\therefore 10y + x = 4y + 4x$$

$$\therefore x - 4x + 10y - 4y = 0$$

$$\therefore -3x + 6y = 0 \quad \therefore -3x = -6y \quad \therefore x = 2y \quad \dots\dots(I)$$

$$\begin{aligned}
 10x + y &= 2(10y+x)-9 && \text{ٻين شرط موجب} \\
 10x+y &= 20y + 2x-9 \\
 10x-2x+y-20y &= -9 \\
 8x - 19y &= -9 && \text{.....(II)} \\
 x &= 2y && \text{.....(I)}
 \end{aligned}$$

$x=2y$ مله مساوت II ڀرڻ سان

$$\begin{aligned}
 16y - 19y &= -9 && \text{.....(I)} \\
 \therefore -3y &= -9 \\
 \therefore y &= 3
 \end{aligned}$$

$y=3$ مله مساوت I ڀرڻ سان $x - 2y = 0$

$$x - 2 \times 3 = 0 \quad \therefore x - 6 = 0 \quad \therefore x = 6$$

$$\begin{aligned}
 10y + x &= 10 \times 3 + 6 && \text{اصلي ٻن انگن وارو عدد} \\
 &= 36
 \end{aligned}$$

مثال (4) هڪ ٻوٽ جي آدمشماري 50000 هئي. هڪ سال ڀرپڻ جو عدد 5% ۽ عورتن جو عدد 3% وڌيو اٿس. ٻوٽ جي آدمشماري 52020 ٿي ويئي ته پهرئين سال ٻوٽن ڀرپڻ ۽ عورتن جو عدد ڪيترو هو؟
حل : سمجهو ته پهرئين سال ڀرپڻ جو عدد x ۽ عورتن جو عدد y هو.

$$\square + \square = 50000 \quad \text{.....(I) ٻه شرط موجب}$$

ڀرپڻ جو عدد 5% وڌي x ٿيو.

عورتن جو عدد 3% وڌي y ٿيو.

$$\frac{\square}{\square}x + \frac{\square}{\square}y = 52020$$

$$\square x + \square y = 5202000 \quad \text{.....(II) ٻه شرط موجب}$$

مساوت کي 103 سان ضرب ٿي

$$\square x + \square y = 5150000 \quad \text{.....(III)}$$

I مساوت مان III مساوت ڪٽ ڪرڻ سان


$$2x = 5202000 - 5150000$$

$$2x = 52000$$

$$\therefore \square = x = \text{ڀرپڻ جو عدد} \quad \therefore \square = y = \text{عورتن جو عدد}$$

مشغولي I: هيٺين شڪل ۾ ٽن وسيلي ڪجهه هدايتون ڏنل آهن انهن وسيلي ملندڙ مساوت چوڪت ۾ لکو چوڪتن مان ڪي به ٻه مساوتون کڻي انهن کي حل ڪريو. حل جي چڪاس ڪريو

ٻن مساوتن جو هڪ جوڙو اهڙا ڪيترا جوڙا ملندا؟ انهن جي حل بابت ٻالھه ٻولھه ڪريو.



اڀياس 5.2

- (1) هڪ لفافي ۾ ڪجهه 5 روپئي جا ۽ ڪجهه 10 روپئي جا نوٽ آهن نوٽن جو ڪل ملهه 350 روپيا آهي. 5 روپين جي نوٽن جو عدد 10 روپين جي نوٽن جي عدد جي ٻيٽ کان 10 گهٽ آهن. ٻڌايو ته لفافي ۾ 5 روپيا ۽ 10 روپئي جي نوٽن جو عدد ڪيترو آهي؟
- (2) هڪ اڻڀورو جو ڇيڊ انجي انس جي ٻيٽ کان 1 گهٽ آهي. انس ۽ ڇيڊ مان هر هڪ ۾ 1 جوڙ ڪرڻ تي انهن جو ڇيڊ سان ريشو 3:5 ٿئي ٿو ته اهو اڻڀورو ڪهڙو آهي.
- (3) پرينڪا ۽ ڊيپيڪا جي عمر جو جوڙ 34 سال آهي. پرينڪا ڊيپيڪا کان 6 سال وڏي آهي ته سندن عمر لھو.
- (4) جانورن جي هڪ باغ ۾ شينهن ۽ مورن جو ڪل عدد 50 آهي. سندن پيرن جو ڪل عدد 140 آهي ته اتان جي شينهن ۽ مورن جو عدد لھو.
- (5) سنجي ۽ مهياني پگهار ملندي آهي هو سال هنجي پگهار ۾ رقم جي واڌ ٿيندي آهي. جيڪڏهن 4 سالن کان پوءِ هنجي مهياني پگهار 4500 روپيا ۽ 10 سالن کان پوءِ هنجي مهياني پگهار 5400 روپيا ٿي ته شروعاتي پگهار ۽ سالياني واڌ جي رقم لھو.
- (6) 3 ڪرسي ۽ 2 ٽيبلن جي ڪل قيمت 4500 روپيا آهي 5 ڪرسي ۽ 3 ٽيبلن جي ڪل قيمت 7000 روپيا آهي ته 2 ڪرسي ۽ 2 ٽيبلن جي ڪل قيمت لھو.

(7) هڪ ٻن انگن واري عدد جي انگن جي جوڙاپٽ 9 آهي. انگن جي ادل بدل ڪرڻ تي ملندڙ عدد اصلي عدد کان 27 وڌيڪ آهي ته اصلي عدد لھو.

(8*) $\triangle ABC$ ۾ $\angle A$ جي ماپ $\angle B$ ۽ $\angle C$ جي ماپ جي جوڙاپٽ جيئن آهي. $\angle B$ ۽ $\angle C$ جي ماپن جو ريشو آهي. 4:5 جي ڪنڊن جي ماپ لھو.

(9*) 560 س م ڊيگھ واري نوڙيءَ جا ٻه ٽڪر ائين ڪرڻا آهن جو ننڍي ٽڪر جي ڊيگھ جي ٻيٽ وڏي ٽڪر جي ڊيگھ جي $\frac{1}{3}$ اوڻ آهي وڏي ٽڪر جي ڊيگھ لھو.

(10) هڪ چٽاڀيٽي امتحان ۾ 60 سوال هئا. هر هڪ سوال جي صحيح جواب تي 2 مارڪون ۽ غلط جواب لاءِ ڪاٺو 1 مارڪ هئي. يثوننت سڀ سوال حل ڪيا ته کيس 90 مارڪون مليون. ٻڌايو ته هنجا ڪيترا جواب غلط ٿيا هئا؟

گڏيل اڀياس 5

(1) هيٺين مان مناسب جواب چونڊيو.

(i) $3x + 5y = 9$ ۽ $5x + 3y = 7$ ته $x + y$ ملهه هيٺين مان ڪهڙو آهي؟

- (A) 2 (B) 16 (C) 9 (D) 7

(ii) مستطيل جي ڊيگھ ۽ ويڪر هر هڪ مان 5 ڪٽ ڪرڻ تي انجي ڳرد ماپ 26 اچي ٿي ان جاڻ جو حسابي روپ ڪهڙو آهي؟

- (A) $x - y = 8$ (B) $x + y = 8$ (C) $x + y = 23$ (D) $2x + y = 21$

(iii) اڃي، وجير کان 5 سال ننڍو آهي. سندن عمر جي جواب 25 آهي ته اڃي جي عمر ڪيتري؟

- (A) 20 (B) 15 (C) 10 (D) 5

(2) هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو.

- (i) $2x + y = 5$; $3x - y = 5$ (ii) $x - 2y = -1$; $2x - y = 7$
 (iii) $x + y = 11$; $2x - 3y = 7$ (iv) $2x + y = -2$; $3x - y = 7$
 (v) $2x - y = 5$; $3x + 2y = 11$ (vi) $x - 2y = -2$; $x + 2y = 10$

(3) گڻڪ ساڳيا ڪري هيٺيون مساوتون حل ڪريو.

- (i) $3x - 4y = 7$; $5x + 2y = 3$ (ii) $5x + 7y = 17$; $3x - 2y = 4$
 (iii) $x - 2y = -10$; $3x - 5y = -12$ (iv) $4x + y = 34$; $x + 4y = 16$

(4) هيٺيون هر وقتي مساوتون حل ڪريو.

- (i) $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 4$; $\frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$ (ii) $\frac{x}{3} + 5y = 13$; $2x + \frac{y}{2} = 19$
 (iii) $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 13$; $\frac{5}{x} - \frac{4}{y} = -2$

(5*) هڪ ٻن انگن وارو عدد، انجي انگن جي جوڙاپٽ جي چئوڻ کان 3 وڏو آهي اڻ عدد 18 جوڙ ڪرڻ تي ملندڙ جوڙاپٽ، اصلي عدد جي انگن جي اڌ بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد آهي. ته اصلي عدد لھو.

(6) 8 ڪتابن ۽ 5 پينين جي ڪل قيمت 420 رپيا آهي. 5 ڪتابن ۽ 8 پينين جي ڪل قيمت 321 رپيا آهي ته هڪ ڪتاب ۽ ٻن پينين جي قيمت لھو.


(7*) ٻن ماڻهن جي اپٽ جو ريشو 4:3 آهي، سندن خرچن جو ريشو 4:3 آهي هر هڪ جي بچت 200 روپيا آهي ته هر هڪ جي اپٽ لھو.

(8*) هڪ مستطيل جي ڊيگهه 5 ايڪا گهٽ ڪئي ۽ ويڪر 3 ايڪا وڌائي ته انجي ايراضي 9 چورس ايڪا گهٽ ٿي. جيڪڏهن ڊيگهه 3 ايڪا گهٽ ڪئي ۽ ويڪر 2 ايڪا وڌائي ته ايراضي 67 چورس ايڪا وڌي ٿي ته ان مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر لھو.

(9*) هڪ رستي تي A ۽ B ٻن هنڌن ۾ مفاصلو 70 ڪم آهي. هڪ ڪار A جڳهه کان ۽ ٻي ڪار B جڳهه کان نڪتي. هڪ ئي طرف ۽ هلڻ سان اهي 7 ڪلاڪن ۾ ملن ٿيون ۽ مختلف طرفن ۾ هلڻ سان 1 ڪلاڪ ۾ ملن ٿيون ته سندن رفتار لھو.

(10*) هڪ ٻن انگن وارو عدد ۽ انجي انگن جي اڌ بدل ڪرڻ سان ملندڙ عدد جي جوڙاپٽ 99 آهي ته اصلي عدد لھو.

مشغولي : اڻپور لھو



$\square = \square$ گهربل اڻپور .:

جواب جي چڪاس ڪريو





مالي رٿا ٺاهڻ

6

اچو ته سڪون



- مالي يوجنا جي واقفيت
- بچت ۽ سيٽپ
- ٽئڪس جي بناوت
- اپٽ تي ٽئڪس جي بٽپ

اچو ته چرچا ڪريون



انيتا: اسان ڪمپيوٽر خريد ڪريون ڇا؟

ماءُ: ها، پر ايندڙ سال.

انيتا: هن سال ڇو نه؟

ماءُ: اُن جي قيمت ڪا گهٽ نه آهي

انيتا: يعني اسان کي پئسا گڏ ڪرڻ گهرجن؟

ماءُ: ها.

اسان کي پنهنجي آس پاس اهڙيون ڳالهائون ٻڌڻ پونديون آهن هر هڪ شخص کي پنهنجون گهر جون پوريون ڪرڻ لاءِ پئسن جي گهر پوندي آهي انڪري روزمره جون ضروري گهرجون پوريون ڪري ٻيون گهرجون پوريون ڪرڻ لاءِ هر هڪ پئسا جمع ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. انکي ئي اسين 'بچت' چوندا آهيون. بچت جي حفاظت ۽ واڌ لاءِ اسان انکي بئنڪ ۾ رکندا آهيون يا زمين گهر وغيره خريد ڪندا آهيون انکي ئي 'سيٽپ ڪرڻ' چئجي ٿو.

هر هڪ سيٽپ ڪار ضروري رقم خرچ ڪري بچيل رقم جي بچت ڪندو آهي ۽ بچت ڪيل رقم جي مناسب سيٽپ به ڪندو آهي. انکي 'مالي رٿا ٺاهڻ' چئبو آهي. ملڪيت جو واڌارو ۽ حفاظت اهي مالي رٿائن جا مکيه مقصد آهن.

زندگي ۾ ٿيندڙ اميد ڪيل يا اوچتن واقفن جي انتظام طور مالي رٿائن جو اڀيوڻ ٿئي ٿو. هيٺ ڪجهه مثال ڏنل آهن.

اوپنا واقعا

(1) قدرتي آڀا

(2) گهرجي ڪنهن پاتيءَ جي بيماري

(3) حادثي سبب ٿيل نقصان

(4) اڇانڪ موٽ

اميد ڪيل واقعا

(1) ٻارن جي تعليم تي خرچ

(2) ڏندي لاءِ موٽي

(3) وهڻ خريد ڪرڻ

(4) گهرجي اڏاوت يا مرمت

(5) ٻڏاپي جون گهرجون

مٿين ڳالهين مان مالي رٿائن جي ضرورت جي ڄاڻ پوي ٿي. مالي رٿا ٺاهڻ وقت ڪجهه ڳالهائون ڏيان ڀرڻ ضروري آهن.

(3) بچت کیل رقم ڏنڌو وڌائڻ، نئون هنر شروع ڪرڻ وغيره ڪمن لاءِ واپرائجي ته راشن ۾ اپت پرواڌ ٿيندي.

(5) ضروري خرچ ڪري ايش آرام جي شين تي گهٽ خرچ ڪرڻ ڪري تعليم، ڊاڪٽري علاج وغيره لاءِ بچت ڪرڻ فائدي مند ٿئي ٿو.



94



سيڙپ (Investments)

سيڙپ ڄاڳهڻائي طريقا آهن امانت ڪاربنڪ، پست وغيره مالي وهنوار ڪندڙ سنسٽائن ۾ سيڙپ ڪرڻ پسند ڪندا آهن ڇو ته اتي رقم محفوظ رهندي آهي. شيئرس ميوچوئل فنڊ وغيره ۾ سيڙپ ڪرڻ ٿورو جو کائڻو آهي. اهي پئسا جنهن اڊيوڪيٽڊ ۾ سيڙپيا ان ۾ نقصان ٿيڻ تي سيڙپيايل رقم گهٽجي ٿي. انجي ابتڙ فائڊو ٿيڻ تي رقم محفوظ رهي ٿي ۽ فائڊي جو حصو ملي ٿو.

سيڙپ ڪارڪي سيڙپ ڪرڻ وقت به مکيه ڳالههون ڏيان ڪرڻ گهرجن هڪ جوڪر ۽ ٻيو فائڊو وڌيڪ جوڪر کڻي سيڙپ ڪار وڌيڪ فائڊو ڪمائي سگهي ٿو پر جوڪر سبب نقصان به ٿي سگهي ٿو اهو ڏيان ۾ رکڻ گهرجي. اڀت ۽ سيڙپ تي آڌارت ڪجهه مثال هيٺ ڇڏايل آهن انهن جو اڀياس ڪريو.

مثال (1) شياملعل 16-2015 جي سڀ ٽيڪسون ڀرڻ کانپوءِ سالياني اڀت 640000 روپيا آهن هُو هر مهيني وييمي لاءِ 2000 روپيا قسط ڀريندو آهي. سالياني اڀت جو 20% هو پي ايف ۾ سيڙپائيندو آهي. اوچتي گهرجن لاءِ 500 روپيا مهينو پاسيرو ڪندو آهي ته هُو سال ۾ ڪيتري رقم خرچ ڪندو آهي؟

حل : (i) شياملعل جي سالياني اڀت 6,40,000 = روپيا

(ii) وييمي جي قسط = $2000 \times 12 = 24,000$ روپيا

(iii) پي ايف ۾ سيڙپايل رقم = $\frac{20}{100} \times 6,40,000 = 1,28,000$ روپيا

(iv) اوچتئين گهرجن لاءِ پاسيري ڪيل رقم = $500 \times 12 = 6,000$ روپيا

∴ رٿا جي ڪل رقم = $24,000 + 1,28,000 + 6,000 = 1,58,000$ روپيا

∴ سال ۾ خرچ ۾ لاءِ بچيل رقم = $6,40,000 - 1,58,000 = 4,82,000$ روپيا

مثال (2) شري شها 320000 روپيا بئنڪ ۾ 10% گڏيل وياج تي 2 سالن لاءِ سيڙپيا. هن 240000 روپيا

ٽيڪس فري ميوچوئل فنڊ ۾ سيڙپيا. 2 سالن کان پوءِ هن کي ان جا 3,05,000 روپيا مليا. ته هن جي

ڪهڙي سيڙپ وڌيڪ فائديمند ٿي؟

حل : (i) پهرين بئنڪ ۾ سيڙپايل رقم جو گڏيل وياج لهنداسين.

مور - راس = گڏيل وياج

يعني $I = A - P$

$$C.I = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - P$$

$$= P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$$

$$= 3,20,000 \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$= 3,20,000 [(1.1)^2 - 1]$$

$$= 3,20,000 [1.21 - 1]$$

$$= 3,20,000 \times 0.21$$

$$= 67,200 \text{ روپيا}$$

شماڪي بئنڪ مان 67200 روپيا وياج مليو.

ملييل وياج سيٽپ جو ڪينٽرو سيڪڙو آهي اهو ٻڌڻو.

$$\text{بئنڪ جي سيٽپ جو } 21\% \text{ نفعو ٿيو. } = 21 = \frac{100 \times 67200}{3,20,000} \text{ وياج جو سيڪڙو. } \therefore$$

$$(ii) \text{ ميوچوئل فنڊ مان 2 سالن کانپوءِ ملييل رقم } = 3,05,000 \text{ روپيا}$$

$$\therefore \text{ ميوچوئل فنڊ جي فائدي پتي } = 65,000 = 3,05,000 - 2,40,000 \text{ روپيا}$$

$$\therefore \text{ فائدي پتيءَ جو سيڪڙو } = 27.08 = \frac{65000 \times 100}{2,40,000}$$

ميوچوئل فنڊ ۾ سيٽپ سان 7.08% سيڪڙو نفعو ٿيو.

ان مان اها ڄاڻ پوي ٿي ته شماڪي ميوچوئل فنڊ جي سيٽپ ۾ وڌيڪ نفعو ٿيو.

مثال (3) ڪريمر پائيءَ کي شيشي جي ڪارخاني ۾ 400000 روپيا سيٽيا. 2 سالن کان پوءِ هنکي ان مان 520000

روپيا مليا. نفعي جي رقم هن 3:2 ريشو ۾ بئنڪ ۾ امانت ۽ شينرن ۾ سيٽيا ته هن ٻنهي ٻالهي ۾ ڪينٽري رقم سيٽيا ٿي؟

$$\text{روپيا } 1,20,000 = 5,20,000 - 4,00,000 = \text{ڪريمر پائيءَ کي ٻن سالن کان پوءِ ٿيل نفعو : حل}$$

$$\text{بئنڪ ۾ امانت رکيل رقم} = \frac{3}{5} \times 1,20,000$$

$$= 3 \times 24,000$$

$$= 72,000$$

$$\text{شينرن ۾ سيٽيايل رقم} = \frac{2}{5} \times 1,20,000$$

$$= 2 \times 24,000$$

$$\text{روپيا} = 48,000$$

ڪريمر پائيءَ امانت طور 72000 روپيا ۽ شينرن ۾ 84000 روپيا سيٽيا.

(4) انيل جي ماهياني اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4 آهي. امن بابت ساڳيو ريشو 3:2 آهي. امن جي ماهياني اپت

جو 4% رقم انيل جي ماهياني اپت جو 7% آهي. انيل جي ماهياني اپت 9600 روپيا آهي ته

(i) امن جي ماهياني اپت لھو (ii) انيل ۽ امن جي بچت لھو.

حل : اسانکي ڄاڻ آهي ته ، خرچ - اپت = بچت

امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4

$$5x = 9600$$

$$\therefore 5x = 9600$$

$$x = 1920$$

$$4x = 4 \times 1920 = 7680$$

امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4

امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4

$$\therefore \frac{4}{100} \times 3y = 9600 \times \frac{7}{100}$$

$$\therefore 12y = 9600 \times 7$$

$$\therefore y = \frac{9600 \times 7}{12} = 5600$$

$$3y = 3 \times 5600 = 16,800$$

$$2y = 2 \times 5600 = 11,200$$


$$16,800 - 11,200 = 5,600$$

امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4

امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 3:2
امن جي اپت ۽ خرچ جو ريشو 5:4

مشغولي I : سلوني ۽ 35000 روپيا مان ڪجهه رقم 4% بچيل رقم 5% وياج سان هڪ سال لاءِ سيڙائي. هن کي ڪل

وياج 1530 روپيا مليو هن ٻنهي قسمن جي وياج ۾ ڪيتري رقم سيڙائي؟



مشغولي 1: پانڪن جي مدد سان پنهنجي گهر جي هفتي جي ڪهاڙي ۽ خرچ ۾ لڳو خرچ جي قسم جا ڪالز ٺاهيو. ڪرائو، تعليم، ڊاڪٽري خرچ، سفر، ڪپڙا ۽ ننڍا خرچ انهن جو ويچار ڪري ڪل خرچ ۾ لڳو. ڪمائي پاسي گهر خرچ لاءِ مليل رقم پهريان جي بچيل رقم ۽ ڪجهه نئين ملڪيت هجي ته لڳو.

صفحہ 52 تي ڏنل ٿيڻ جي اپٽ خرچ ڏسو

(2) موڪلن جي مهني جي ڪمائي خرچ لڳو

مشغولي 2- بنا ريج واري زمين هوندڙ ڪڙميءَ جي اپٽ وڌائڻ جا ڪهڙا طريقا ٿي سگهن ٿا ان تي ڪلاس ۾ چرچا ڪريو. ڪجهه ويچار هيٺ ڏنل آهن.

شپٽل: ڪڙميءَ کي فصل وڪڻڻ کان پوءِ ئي اپٽ ٿيندي آهي. ان مان ٿيل نفعو سڄو سال پورو پوي ان لاءِ مالي رٿا ٺاهڻ گهرجي.

پرڪاش: فصل کي واجب اگهه ملڻ گهرجي جيئن اپٽ وڌي

نرگس: ارٿ شاسٽر جو نيم آهي ته رسد وڌڻ تي شيءَ جو اگهه گهٽجندو آهي.

اگهه گهٽجڻ سان فائدو ته گهٽجندو نه!

رينو: جيڪڏهن فصل گهڻو ٿيو ۽ اگهه گهٽ هجي ته مال سان ڏي رکجي پوءِ واجب اگهه ملڻ تي وڪڻجي.

آتش: ان لاءِ سناڻو ڏام ٺاهڻ گهرجن

ریشما: ڪڙمين کي گهٽ اگهه تي قرض ملڻ گهرجي

ويا: ڪير، ڪڪڙ پالڻ وغيره پورڪ ڏندا ڪيا ته وڌيڪ ڪمائي ٿيندي جانورن جي افراجي پڌارتن مان عضوي پاڻ به ملندو

ڪُنال: ڪيتريءَ جي فصل تي آڌار ڪارخانا وڌا ۽ شربت، جئمر، ڪٽائڻ، سُڪل پاجيون، ميون جو ڳودو وغيره شيون پئڪنگ ڪري سڄو سال وڪڻي سگهجن ٿيون.

مال جي روانگي ڪري وڌيڪ اپٽ حاصل ڪري سگهجي ٿي.

اڀياس 6.1

- الڪا کي هر مهني موڪليل رقم مان هوءَ 90% خرچ ڪندي آهي ۽ 120 رپيا بچت ڪندي آهي ته هن کي ڪيتري رقم موڪلي ويندي آهي؟
- سمت 50000 رپيا موڙي ۽ سان کاڌي جو ڏندو شروع ڪيو. ان ۾ هن کي پهرئين مال 20% نقصان ٿيو. بچيل موڙي مان هن ٻئي سال منائيءَ جو ڏندو شروع ڪيو ان ۾ هن کي 5% نفعو ٿيو ته مول موڙي تي هن کي ڪيترو سيڪڙو نفعو يا نقصان ٿيو؟
- راجڪمار پنهنجي ماهياني ڪمائي جو 5% ٻارن جي تعليم خرچ ڪري ٿو 14% رقم شينس ۾ 3% بئنڪ ۾ سينڙائي ۽ 40% رقم روزاني خرچن لاءِ رکي. سينڙپ ۽ خرچ ڪٽ ڪري هن وٽ 19000 رپيا. ته هن جي ماهياني ڪمائي لاهو.
- سعيد پائي پنهنجي ڪمائيءَ مان 40000 ر 8% گڏيل وياج تي 2 سالن لاءِ بئنڪ ۾ رکيا. فرنانڊز 120000 ر ميوچوئل فنڊ ۾ 2 سالن لاءِ سينڙايا. 2 سالن کان پوءِ هن کي ان مان 192000 رپيا مليا. ٻڌايو ته سعيد پائي ۽ فرنانڊز مان ڪنهن جي سينڙپ وڌيڪ فائديمند ثابت ٿي؟
- سيما پنهنجي ڪمائيءَ جو 3% رقم سماجڪ ڪمن لاءِ ڏني ۽ 90% ڪمائي خرچ ۾ ڪئي هن وٽ 1750 رپيا. ته سندس ماهياني ڪمائي لاهو.



ٽئڪس يعني ڇا؟ ٽئڪس جا ڪهڙا قسم آهن؟ ان بابت ڄاڻ هيٺين ويب سائيٽس مان حاصل ڪريو.

ICT Tools or Links www.incometaxindia.gov.in, www.mahavat.gov.in

ڄاڻي وٺون

ٽئڪس

دش جي وڪاس لاءِ سرڪار الڳ الڳ يوجنائون ٺاهيندڙ آهي انهن تي عمل لاءِ سرڪار کي گهڻي رقم جي گهرج هوندي آهي الڳ الڳ ٽئڪس وسيلي اها رقم گڏ ڪئي ويندي آهي.

ٽئڪس جو اُپيڊوگم (Utility of taxes)

- بنيادي سيواون ميسر ڪرائڻ
- ماڻهن جي ڪلياڻ جي يوجنائون لاءِ
- الڳ الڳ ڪيترن پروڪاس جا ڪم ۽ سنشودن ڪرڻ لاءِ
- قاعدي ۽ بندوبست لاءِ
- قدرتي آبادي کان پيڙت ماڻهن جي مدد لاءِ
- دش ۽ ناگرن جي حفاظت لاءِ

ٽئڪس جا قسم (Types of taxes)

اڻسڌي ٽئڪس (Indirect taxes)

جنهن ٽئڪس جو بار ٽئڪس ڀريندڙ سڌو نٿو پوي جيئن سيلس ٽئڪس، وٽ ٽئڪس، سروس ٽئڪس، ڪسٽمر ڊيوٽي، ايڪسائيز ڊيوٽي وغيره.

سڌي ٽئڪس (Direct taxes)

جنهن ٽئڪس جو بار سڌو ٽئڪس ڀريندڙ تي پوي ٿو
مثال: انڪم ٽئڪس، ملڪيت ٽئڪس، پروفيشنل ٽئڪس

۲۰۱۷ سال ۾ ٽئڪس جي قاعدن موجب انهنجا قسم مٿي ڏيکاريل آهن.

مشغولي: الڳ الڳ ٽئڪس ڀريندڙ نوڪريءَ وارا يا واپارين کان ٽئڪس بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.



انڪم ٽئڪس (Income tax)

ماڻهن سنسٽائن يا ٻين اڏيوگن وغيره جي ڀارت ۾ اڀت مقرر ڪيل حد کان وڌيڪ هوندي ته انٽي انڪم ٽئڪس لڳندي آهي.

هڪ باب ۾ اسين فقط ماڻهن تي لڳندڙ ٽئڪس بابت ويچار ڪرڻ وارا آهيون انڪم ٽئڪس مرڪزي سرڪار لڳائيندي آهي ڀارت ۾ انڪم ٽئڪس ٻن قاعدن وسيلي لڳائي ويندي آهي.

(i) انڪم ٽئڪس قاعدو 1961 جيڪو 01.04.1962 کان وجود ۾ آيو.

(ii) هر سال سنسد ۾ پيش ٿيندڙ بجيٽ جي انتظامن موجب هر سال رواجي طرح ضروري مهيني ۾ مالي منٽري، مالي سال لاءِ بجيٽ پيش ڪندا آهن ان ۾ انڪم ٽئڪس جا اگهه ڏنل هوندا آهن سنسد جي بجيٽ منظور ڪرڻ تي اهي ايندڙ سال لاءِ لڳو ٿيندا آهن.

انڪم ٽئڪس بابت مڊا

• انڪم ٽئڪس پريسنڊر (An assessee) انڪم ٽئڪس جي نيمن موجب جنهن ماڻهوءَ مان انڪم ٽئڪس جي اميد ڪيل آهي انکي انڪم ٽئڪس پريسنڊر چئجي ٿو.

• مالي سال (Financial year) جنهن سال جي عرصي و اڀت حاصل ٿيندي آهي انکي مالي سال چوندا آهن اسانجي ديش ۾ فلڪال مالي سال اپريل کان 31 مارچ هوندي آهي.

• ٽئڪس ڪاٿو سال (Assessment year) مالي سال کانپوءِ واري لڳتي مالي سال کي 'ٽئڪس ڪاٿو سال' چوندا آهن هلندڙ مالي سال ۾، اڳئين مالي سال جي ٽئڪس ڪٽ ڪبي آهي.

مالي سالي ۽ انجو ٽئڪس ڪاٿو سال جا مثال

ٽئڪس ڪاٿو سال (Assessment Year)	مالي سال (Financial Year)
2017-18	2016-17 کان 01-04-2016 - 31-03-17
2018-19	2017-18 کان 01-04-2017 - 31-03-18

• قائم ڪاٿو نمبر (PAN) : ماڻهوءَ جي عرض ڪرڻ تي انڪم ٽئڪس وياڄ هنڪي انگه اڪرن نمبر ڏنو ويندو آهي، ان کي قائم ڪاٿو نمبر (PAN) 'Permanent Account Number' چوندا آهن چڱن ڪاغذن ۽ مالي وهنوار ۾ اهو نمبر لکڻ ضروري هوندو آهي.



پن ڪارڊ جو اپيوگه : انڪم ٽئڪس وياڄه کي ٽئڪس پريٽ لاءِ چلڻ، ٽئڪس جو تفصيل وغيره ڪاغذن تي پن نمبر لکڻ ضروري هوندو آهي. وڏي مالي وهنوار ۾ به پن نمبر لکڻو پوندو آهي. انجو سڃاڻپ جي ثبوت طور به استعمال ٿيندو آهي.



انڪم ٽئڪس جي ڪٽ

انڪم ٽئڪس جي ڪٽ ايت تي ٿيڻ سبب ايت جي وسيلن جاڳڻ ضروري آهي ايت جا مڪيه 5 وسيلن آهن.

- (1) پنڀاروسيلي ملندڙ ايت
- (2) گهر مان ملندڙ ايت
- (3) ڏنڊي ۽ پيشي مان ملندڙ ايت
- (4) موڙي مان فائڊو (Capital gain)
- (5) ٻين وسيلن مان ملندڙ ايت

پنڀار حاصل ڪندڙ شخص جي انڪم ٽئڪس ڪٽ لاءِ مڪيه ٻالهيون.

انڪم ٽئڪس ڪل سالياني ايت تي لڳندي آهي انڪم ٽئڪس جي قلمن 80G, 80D, 80C موجب سالياني ڪمائيءَ مان مقرر ڪات ملندي آهي. ان ڪات کانپوءِ بچيل ايت کي 'ٽئڪس لائق ايت' چوندا آهن انڪم ٽئڪس ان رقم تي لڳندي آهي.

ٽئڪس ڪٽ ڪرڻ جا نيمر متڄندا رهندا آهن انڪري اسان کي نون نيمن جي ڄاڻ هئڻ گهرجي.

ٽئڪس لائق رقم مان مقرر حد تائين ايت تي ٽئڪس نه لڳندي آهي ان رقم کي ٽئڪس لائق ايت جي 'مول معاف ڪيل رقم' چئبو آهي.

• ڪسانن کي ڪيٽي جي ايت تي ٽئڪس نه لڳندي آهي.


• انڪم ٽئڪس جي قلم 80G موجب پرڏان منٽري فنڊ، مڪيه منٽري فنڊ يا مڪيهٽا مميئل سنسٽائن کي

چندوڏيڻ تي انڪم ٽئڪس 100% چوٽ ملندي آهي.

• 80D قلم موجب صحت ويمني جي قسط تي چوٽ ملندي آهي.

- الڳ الڳ قسمن جي سيٽپ تي 80C قلم موجب وڌ ڇوڏ 150000 ۽ تائين ڪات ملندي آهي.

• 2017-18 جي بجيٽ موجب سيٽپ تي ڪات حاصل ٿيڻ جا مڪيه طريقا ڏيکاريل آهن.



انڪمر ٽئڪس پريبنڊڙ جي عمر موجب به ڪٿ جا الڳ الڳ گروھ آھن ھيٺ ايت جي حد موجب انڪمر ٽئڪس جي اگھ جي چڱرو ڏنل آھن.

چڱرو I

60 سال عمر تائين جا شخص			
سيڪنڊري ۽ هائر سيڪنڊري سيٽ	تعليمي سيٽ (اپ ٽئڪس)	انڪمر ٽئڪس	ٽئڪس لائق ايت (روپين ۾)
ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	2,50,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	5 سيڪڙو (ٽئڪس لائق رقم مان 250000 ڪٽ ڪري)	2,50,001 - 5,00,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 20 + 12,500 ₹ (ٽئڪس لائق ايت مان 5 لک ڪٽ ڪري)	5,00,001 - 10,00,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 30 + 1,12,500 ₹ (ٽئڪس لائق ايت مان 10 لک ڪٽ ڪري)	10,00,000 کان وڌيڪ
سالياني ايت 50 لک کان 1 ڪروڙ تائين هوندي شخصن کي انڪمر ٽئڪس جي 10 سيڪڙو سر چارج ۽ 1 ڪروڙ کان وڌيڪ ايت تي 15% سرچارج پڻ ٿيندي آهي.			

مشغولي: مٿيون چڱرو ڇاچي هيٺين چوڪنڊن ۾ مناسب عدد لکو.

مثال: مهتا جي سالياني ايت ساڍا چار لک آهي. هن ڪاٺ ملڻ واري ڪابه بچت نه ڪئي آهي.

سندس ٽئڪس لڳت رقم ڪهڙي گروھ ۾ ايندي.

هن کي رقم تي اگھ سان انڪمر ٽئڪس ڏيڻي پوندي

هن کي رقم تي سيٽ (اپ ٽئڪس) ڏيڻي پوندي.

چڱرو II

بزرگ ناگر 60 سالن کان 80 سال عمر			
سيڪنڊري ۽ هائر سيڪنڊري سيٽ	تعليمي سيٽ	انڪمر ٽئڪس	ٽئڪس لائق جا گروھ (روپين ۾)
ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	تائين 3,00,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	5 سيڪڙو (ٽئڪس لائق مان 3 لک ڪٽ ڪري)	3,00,001 - 5,00,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 20 + 10,000 ₹ (ٽئڪس لائق مان 3 لک ڪٽ ڪري)	5,00,001 - 10,00,000
انڪمر ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪمر ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 30 + 1,10,000 ₹ (ٽئڪس لائق مان 3 لک ڪٽ ڪري)	10,00,000 کان وڌيڪ
(سالياني ايت 50 لک کان 1 ڪروڙ درميان هوندڙن کي انڪمر ٽئڪس جو 10 سرچارج ۽ سالياني ايت 1 ڪروڙ کان وڌيڪ هوندڙن کي انڪمر ٽئڪس جو 15% سرچارج)			

مشغولي : چڱري II مان هيٺين مشغولي ڪريو.

مثال: شري پنڊت جي عمر 67 سال آهي. گذريل سال سندن سالياني اپت 13,25,000 رپيا هئي ٻڌايو ته سندن ٽئڪس لائق اپت ڪيتري هئي؟ ڪيئن ڪيتري انڪم ٽئڪس پرڻي پوندي؟

$$13,25,000 - 10,00,000 = 3,25,000$$

$$\text{سندن ٽئڪس} = 1,10,000 + 3,25,000 \times \frac{30}{100} = \boxed{}$$

$$\text{يعني ڪل انڪم ٽئڪس} \quad \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{انڪم ٽئڪس جو } 2\% \text{ تعليمي سيس} \quad \boxed{} \times \frac{2}{100} = \boxed{}.$$

$$\text{انڪم ٽئڪس جو } 1\% \text{ سيڪنڊري ۽ هائر سيڪنڊري سيس} \quad \boxed{} \times \frac{1}{100} = \boxed{}$$

اڻ سڪيا سيس + تعليمي + سيس انڪم ٽئڪس = ڪل انڪم ٽئڪس .

$$= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{\text{₹ 2,13,725}}$$

چڱرو III

گهڻا بزرگ نگر (عمر 80 سالن کان وڌيڪ)			
سيڪنڊري ۽ هائر سيڪنڊري	تعليمي سيس	انڪم ٽئڪس	ٽئڪس اپت جا گروهه (روپين ۾)
ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	ٽئڪس معاف	تائين 5,00,000
انڪم ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪم ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 20 (ٽئڪس لائق اپت مان 5 لک ڪٽ ڪري)	5,00,001 - 10,00,000
انڪم ٽئڪس جو 1 سيڪڙو	انڪم ٽئڪس جو 2 سيڪڙو	سيڪڙو 30 + ₹ 1,00,000 (ٽئڪس لائق اپت مان 10 لک ڪٽ ڪري)	ڪان وڌيڪ 10,00,000
(سالياني اپت 50 لک کان 1 ڪروڙ درميان هوندڙن کي انڪم ٽئڪس جو 10% سرچارج ۽ سالياني اپت 1 ڪروڙ کان وڌيڪ هوندڙن کي انڪم ٽئڪس جو 15% سرچارج)			

مشغولي : 80C , 80G , 80D قلمن جي جاڻ هٿ ڪريو.
پئڻ ڪارڊ جي جاڻ ڇڏيو
روڪ رهت (Cashless) وهنوار لاءِ ڪهڙا طريقا آهن؟

مٿين ڇيڄن جي مدد سان الڳ الڳ شخصن جي انڪم ٽئڪس جي ڪٽ جا مثال اسين ڏسندا آهين.

خال (1) شري مهاتري جي عمر 50 سال آهي هن ڪل سالياني اپت 12,00,000 روپيا آهي هڪ هيٺين نموني سيٽپ ڪئي.

- (i) ويما قسط : ₹ 90,000 (ii) پي ايف : ₹ 25,000
(iii) پي پي ايف : ₹ 15,000 (iv) راشن بچت يوجنا : ₹ 20,000

ان وسيلي انڪر ٽئڪس ۾ ملندڙ ڪاٽ، ٽئڪس لائق اپت ۽ انڪر ٽئڪس لھو
روپيا 12,00,000 = ڪل سالياني ڪمائي (1) : حل
80C جي سيٽپ موجب (2)

سيٽپ	رقم (روپيا)
(i) ويما	90,000
(ii) پي ايف	25,000
(iii) پي پي ايف	15,000
(iv) راشن بچت يوجنا	20,000
ڪل	1,50,000

نمبر 80C موجب انڪر ٽئڪس لاءِ وڌو ڀروڙ 1,50,000 روپين جي ڪاٽ ملندي آهي.

[2] جي رقم [1] جي رقم = ٽئڪس لائق اپت. ∴ (3)

$$= 12,00,000 - 1,50,000 = 10,50,000$$

شري مهاتري جي ٽئڪس ڪٽ 2 چارجي I موجب ڪندا سين. (4)

(10 لکن کان وڌيڪ آهي) 10,50,000 = هن جي ٽئڪس لائق رقم.

(ڪل اپت مان 10 لکن ڪٽ ڪري) 30% + 1,12,500 = چارجي I موجب ٽئڪس.

$$∴ 10,50,000 - 10,00,000 = 50,000$$

$$∴ \text{انڪر ٽئڪس} = 1,12,500 + 50,000 \times \frac{30}{100}$$

$$= 1,12,500 + 15,000$$

$$= 1,27,500$$

ان کان سواءِ 2% تعليمي سيس ۽ 1% اوچ تعليمي سيس به جوڙڻي پوندي.

$$\text{روپيا 2550} = 1,27,500 \times \frac{2}{100} = \text{تعليمي سيس}$$

$$\text{روپيا 1275} = 1,27,500 \times \frac{1}{100} = \text{اوچ تعليمي سيس}$$

$$∴ \text{ڪل انڪر ٽئڪس} = 1,27,500 + 2550 + 1275 = 1,31,325 \text{ روپيا}$$

شري مهاتري کي 1,31,325 روپيا ٽئڪس ڀرڻي پوندي.

(2) 62 ورهين جو احمد ڀاڻي هڪ ڪمپنيءَ ۾ نوڪري ڪندو آهي سندس ڪل سالياني اپت 6,20,000 آهي هن پي ايڇ ڪاٽي ۾ 1,00,000 سيٽز اڀا ويڻي جو سالياني قسط 80,000 پري مڪيڻ مشنري فنڊ ۾ 10,000 ڇنڊو ڏنو. ته احمد ڀاڻيءَ کي ڪل ڪيتري ٽئڪس پڙهي پوندي؟

$$\text{رپيا } 6,20,000 = \text{ڪل سالياني اپت (1)}$$

$$80C \text{ موجب ڪاٽ (2)}$$

$$\text{رپيا } 1,00,000 = \text{پي. ايڇ (i)}$$

$$\text{رپيا } 80,000 = \text{ويڻو (ii)}$$

$$\text{رپيا } 1,80,000$$

$$80C \text{ موجب وڌ ڇوڌ, } 150000 \text{ ڪاٽ (iii)}$$

$$\text{رپيا } 10000 = (G \text{ 80 ڪاٽ}) \text{ مڪيڻ منتري فنڊ ڇنڊو (3)}$$

$$\text{ٽئڪس لائق اپت (4)} = (1) - [(2) + (3)]$$

$$= 6,20,000 - [1,50,000 + 10000]$$

$$= 4,60,000 \text{ رپيا}$$

ان رقم تي ڇڄري (II) موجب ڪٽ ٿيندي.

$$\therefore \text{لڳندڙ انڪم ٽئڪس} = (3,00,000 - \text{ٽئڪس لائق رقم}) \times \frac{5}{100}$$

$$= (4,60,000 - 3,00,000) \times \frac{5}{100}$$

$$= 1,60,000 \times \frac{5}{100}$$

$$= 8000 \text{ رپيا}$$

سيس جي ڪٽ ڪريون

$$8,000 \times \frac{1}{100} = 80 \text{ اڻچ تعليمي سيس} : 8,000 \times \frac{2}{100} = 160$$

$$\therefore \text{ڪل انڪم ٽئڪس} = ₹ 8,240 = 80 + 160 + 8000$$

∴ احمد ڀاڻيءَ کي ڪل 8240 روپيا انڪم ٽئڪس پڙهي پوندي.

مثال (3) شريمني هندو جا جي عمر 50 سال آهي سندس ٽئڪس لائق اپت 16,30,000 رپيا آهي هنکي

ڪيتري انڪم ٽئڪس پڙهي پوندي؟

حل: شريمني هندو جا جي اپت ڏهه لک کان وڌيڪ واري گروهه ۾ آهي.

هتي اسين ڇڄري I موجب ٽئڪس جي ڪٽ ڪندا سين.

ڇڄري I موجب

$$\text{ٽئڪس لائق اپت مان ڏهه لک ڪٽ ڪري انجو } (30\%) = 112500 + \text{ٽئڪس}$$

$$16,30,000 - 10,00,000 = \text{ڏهه لک شريمتي هندو جا جي اُپت}$$

$$= 6,30,000 \text{ رپيا}$$

چجري I موجب

$$\text{انڪر ٽئڪس} = 1,12,500 + 6,30,000 \times \frac{30}{100}$$

$$= 1,12,500 + 30 \times 6,300$$

$$= 1,12,500 + 1,89,000$$

$$= 3,01,500 \text{ رپيا}$$

$$1\% \text{ اوچ تعليمي سيس} = \frac{1}{100} \times 3,01,500 = ₹ 3015$$

$$2\% \text{ اوچ تعليمي سيس} = \frac{2}{100} \times 3,01,500 = ₹ 6030$$

$$\therefore \text{ڪل انڪر ٽئڪس} = 3,01,500 + 3015 + 6030$$

$$= 3,10,545$$

∴ هن کي ڪل 3,10,545 رپيا ٽئڪس پري پوندي

6.2 اڀياس

(1) هيٺيون چڱرو جا چيو ڏنل شخصن کي ٽئڪس لائق رقم تي انڪر ٽئڪس پري پوندي يا نه اهو لکو

نمبر	شخص	عمر	ٽئڪس لائق رقم (₹)	ٽئڪس پري پوندي يا نه
(i)	نڪتا	27	₹ 2,34,000	
(ii)	ڪلڪرڻي	36	₹ 3,27,000	
(iii)	مهتا	44	₹ 5,82,000	
(iv)	بجاج	64	₹ 8,40,000	
(v)	ڊسلوا	81	₹ 4,50,000	

(2) ڪرتار سنگهه (عمر 48 سال) خانگي ڪمپنيءَ ۾ نوڪري ڪندا اهڙي سندس ماهياني پگهار 42000 رپيا آهي. هو پي ايف ڇهر مهني 3000 رپيا سينڙائيندو آهي. هن 15000 رپيا روپئي جا راشن بچت سرٽيفڪيٽ به ورتا. 12000 رپيا جو چندو پرڏان منترن فنڊ ۾ ڏنو آهي. سندس ٽئڪس جي ڪت ڪريو.

(1) مناسب جواب چونڊيو.

(i) 80C قلم موجب وڌ ڀر وٽ ڪيتري ڪاٺ (روپيا) منظور آهي؟

به لڪ (D) هڪ لڪ (C) اڍائي لڪ (B) ڏيڍ لڪ (A)

(ii) هڪ شخص جي 2017-18 جي اپٽ جو ٽئڪس ڪاٺو سال هيٺين مان ڪهڙو آهي؟

(A) 2015-16 (B) 2017-18 (C) 2018-19 (D) 2016-17

(2) شڪراپٽ جو 60% خرچ ڪندو آهي. بچيل رقم مان هو اٺائون آڇ 300 روپيا ڇڏيو ڏيندو آهي ته هن وٽ 3200 روپيا بچندا آهن هنجي اپٽ ڪيتري آهي؟

(3) هيرالعل 215000 روپيا ميوچوئل فنڊ ۾ سيڙيا ان مان هنڪي 2 سالن کانپوءِ 305000 روپيا مليا. رمٽيڪ لعل 1,40,000 روپيا 8% سان گڏيل وياچ تي 2 سالن لاءِ بئنڪ ۾ سيڙيا هر هڪ کي ٿيل سيڪڙو نفعو ٻڌايو ڪنهن جي سيڙپ وڌيڪ فائديمند ٿي؟

(4) هڪ بچت ڪاٺي ۾ سال جي شروعات ۾ 24000 روپيا هئا ان ۾ 56000 روپيا ڀريا ۽ ڪل رقم 7.5% بها سان گڏيل وياچ تي بئنڪ ۾ رکي. 3 سالن کانپوءِ ڪل ڪيتري رقم واپس ملندي؟

(5) منوهر پنهنجي اپٽ جو 20% حصو پنهنجي وڏي پٽ ۽ 30% حصو ننڍي چوڪري کي ڏنو بچيل رقم جو 10% هن اسڪول کي ڇڏو ڏنو. ته هن وٽ 1,80,000 روپيا بچيا. منوهر لعل جي اپٽ لھو.

(6) ڪٽلاش جي اپٽ 85% خرچ ٿيندو آهي. هنجي اپٽ 36% وڏي ۽ هنجو خرچ پهرين کان 40% وڌيو. هن جي هاڻي ٿيندڙ سيڪڙو بچت لھو.

(7) رميش، سريش ۽ ڀرپتيءَ جي ڪل سالياني اپٽ 8,07,000 روپيا آهي. هو پنهنجي اپٽ جو نمبروار 90%, 80%, 75% حصو خرچ ڪندا آهن. جيڪڏهن سندن بچت جو ريشو 16:17:12 آهي ته هر هڪ جي سالياني بچت لھو.

(8) هيٺين ۾ انڪم ٽئڪس جي ڪٽ ڪريو.

(i) شري ڪڊم (عمر 35 سال) جي ٽئڪس لائق اپٽ 13,35,000 روپيا آهي.

(ii) شري خان (عمر 65 سال) جي ٽئڪس لائق اپٽ 4,50,000 روپيا آهي.

(iii) ڪماري ورشا (عمر 26 سال) جي ٽئڪس لائق اپٽ 2,30,000 روپيا آهي.



ICT Tools or Links



ڀارت سرڪار جي ويب سائيٽ www.incometaxindia.gov.in ڏسو. ان ويب سائيٽ [incometax calculator](#) مينو تي ڪلڪ ڪريو. ايندڙ فارم تي خيالي اپٽ ۽ ڪاٺ جون خيالي رقمون لکي انڪم ٽئڪس ڪٽ ڪريو.



اچو ته سکون




- گڏيل ڪالمر گراف
- اُڀ ورهايل ڪالمر گراف
- سيڪڙو ڪالمر گراف
- شروعاتي ۽ ٻئي درجي جي جاڳ
- اڻ گرهيل ۽ گهروهيل جهجهائي ورهاست چڄرو
- گڏيل جهجهائي ورهاست چڄرو

ذرا ياد ڪريو



گذريل درجي ۾ اسان سادو ڪالمر گراف ۽ گڏيل ڪالمر گراف، اهي ڪيئن ڪڍبا آهن، اهو سکيا آهيون. ساڳئي نموني اخبارون، مخرون، دوردرشن وغيره ماڌيمن ۾ ڏنل گراف ڏسي، انهن مان جاڳ حاصل ڪئي آهي. جاڳ جي نموني موجب ئي، ان جاڳ جي پيش ڪش ڪرڻ لاءِ گراف ڪڍڻ اهميت وارو آهي. مثال: هڪ ڪڙميءَ جو، سندس ڪيتي ۽ پيدايش ڪڙڪ ۽ گراف ڏنل آهي ان جي آڌار تي سوالن جا جواب ڏيو.




- ٽن سالن ۾ ڪهڙي اناج جي پيدايش لڳاتار وڌندي رهي.
- 2012 ۾ 2011 جي پيٽ ۾ جوئر جي پيدايش ڪيتري گهٽ ٿي؟
- 2010 ۽ 2012 ۾ ڪڙڪ جي پيدايش ۾ ڪيترو فرق؟
- ان گراف مان هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

ڪل	جوئر	ڪڙڪ	پيدايش (ڪڙڪنال) سال
			2010
			2011
60	12	48	2012



اُڀ ورهايل ڪالم گراف (Sub-divided bar diagram)



ڏنل ڄاڻ موجب ٻئي طريقي گراف ڪڍيو ويو آهي. ان قسم جي ڪالم گراف کي اُڀ ورهايل ڪالم گراف چئبو آهي. ان ۾ هڪ قسم جي ٻنهي مدن جو جوڙ ڪيو آهي آيل جوڙ مو مناسب پروپورشن موجب ڪالم ۾ ڏيکاربو آهي هر هڪ مدي جي ڄاڻ لاءِ ڪالم ۾ ورهاست ڪجي ٿي. اڳواٽ مثال ۾ ڏنل ڄاڻ موجب اُڀ ورهايل ڪالم گراف ڪيئن ڪڍبو، اهو ڏسون.

- ڪل پيدايش جو هر هڪ ڪالم، اُن جي اوچائي مناسب نموني ڏيکارجي
- اُن ۾ ڪٽڪ جي پيدايش، اهو هڪ حصو آهي، اهو خاص نشاني وسيلي ڏيکاربو
- ڪالم جو بچيل حصو، ظاهر آهي ته جوئر بابت ڄاڻ ڏيندو.


اهڙي ريت پرواري شڪل اُڀ ورهايل ڪالم گراف ڏسو.

ڪهڙن به ٻن وڏين ۾ سيڪڙو ڪڍي پيٽ ڪرڻ سان صحيح ڄاڻ ملندي آهي اهو اسان اڀياس ڪيو آهي. مثال 2000 رپين تي 600 روپيا نفعو ۽ 1500 روپين تي 510 روپيا نفعو انهن مان لڳي ٿو 600 رپيا نفعو اهو وهنوار سٺو آهي پر جيڪڏهن سيڪڙو ڪڍنداسين ته نمبروار 30% ۽ 24% جواب ملندو مطلب 1500 رپين تي 510 رپيا نفعو وڌيڪ فائدي وارو وهنوار آهي.

سيڪڙو ڪالم گراف (Percentage bar diagram)

سال	ڪٽڪ جي پيدايش	جوئر جي پيدايش	سيڪڙو
2010	30	10	$\frac{30}{40} \times 100 = 75\%$
2011	35	15	$\frac{35}{50} \times 100 = 70\%$
2012	48	12	$\frac{48}{60} \times 100 = 80\%$

ڏنل ڄاڻ جي چڱيءَ طرح پيٽ ڪرڻ لاءِ سيڪڙو روپ ۾ ورهايل ڪالم گراف ڪڍبو آهي اُن کي سيڪڙو ڪالم گراف چئبو آهي اڳواٽ مثال سيڪڙو ڪالم گراف ڪڍيو سمجهنداسين.



اها ڄاڻ ڏيکاريندڙ ڪالمر گراف هيٺين ڏاڪن وسيلي
ڪڍيو ويو آهي.


(i) هر هڪ سال جي ڪٽڪ ۽ جوئر جي ڪل پيدائش مان
ڪٽڪ ۽ جوئر جي پيدائش جو سيڪڙو ڪڍيو.

(ii) هر هڪ سال جي اوچائي y مڪدد موجب 100
سيڪڙو ڪٽي.

(iii) ڪٽڪ جي پيدائش جي ڪل پيدائش سان
سيڪڙو ڪالمر نشانينون ڪري ڏيکاريو.

(iv) ڪالمر جو بچيل حصو ڪل پيدائش ۾ جوئر جو
سيڪڙو ڏيکاري ٿو

هن کان وڌيڪ ڳالهين جي ڄاڻ اپ ورهايل يا سيڪڙو ۽
ڪالمر گراف وسيلي ڏيکاري آهي.



حل ڪيل مثال

مثال (1) ڀر ڀر سيڪڙو ڪالمر گراف ڏيکاريل
آهي

ان ۾ ٻن ڪٽنب جي خرچن جي ڄاڻ ڏنل
آهي

ان مان هيٺين سوالن جا جواب لکو

(i) هر هڪ ڪٽنب جي الڳ الڳ خرچن جا
سيڪڙا لکو

(ii) اهو ٻئي کان ڪهڙي ڪٽنب جي
ڪرائي جو خرچ انجي ڪل خرچ جي ڀيٽ
۾ وڌيڪ آهي؟

(iii) ٻنهي ڪٽنب جي ٻين خرچن جو
سيڪڙو ڪيترو آهي؟

(iv) ڪهڙي ڪٽنب جي بجلي خرچ جو
سيڪڙو وڌيڪ آهي؟

(v) ڪهڙي ڪٽنب جي تعليمي خرچ جو
سيڪڙو وڌيڪ آهي؟

حل : (i)

ڪٽنب \ خرج	ڪرانو	ڪپڙو	تعليم	بجلي	ٻيا خرج
A	60%	10%	10%	5%	15%
B	50%	15%	15%	10%	10%

(ii) ڪٽنب A جي ڪراني جو خرج ڪل خرج جي ڀيٽ ۾ B کان 10% وڌيڪ آهي؟

(iii) ڪٽنب A جو ٻيو خرج 15% ۽ ڪٽنب B جو ٻيو خرج 10% آهي.

(iv) ڪٽنب B جي بجلي خرج جو سيڪڙو وڌيڪ آهي. (v) ڪٽنب B جو تعليمي خرج وڌيڪ آهي.

اڀياس 7.1

- (1) هيٺين چجري ڀارتجي ٽرڪ ۽ بس جو اٽڪل عدد (لکن ۾) ڏنل آهي سيڪڙو ڪالمر گراف ڪڍو
- (2) هيٺين چجري ڀارت جي پڪن رستن ۽ ڪچن رستن جي جاڳ ڏنل آهي. ان وسيلي اپ ورهايل سيڪڙو ڪالمر گراف ڪڍو.

(سيڪڙا پرواري سڄي عدد ۾ ڪڍو)

سال	پڪا رستا (لک ڪم)	ڪچا رستا (لک ڪم)
2000-2001	14	10
2001-2002	15	11
2002-2003	17	13
2003-2004	20	19

(سيڪڙا ويجهي سڄن عدد ۾ ڪڍو)

سال	ٽرڪ جو عدد	بس جو عدد
2006-2007	47	9
2007-2008	56	13
2008-2009	60	16
2009-2010	63	18

مشغولي : هيٺين خاڪي ۾ الڳ الڳ راجين جي هر هڪ 1000 چوڪرن پٺيان چوڪرين جو عدد ڏنل

آهي. چجري جي خالي جڳهيون ڀريو.

راجيه	چوڪرن جو عدد	چوڪرين جو عدد	ڪل	چوڪرن جو % پرواري سڄي عدد ۾	چوڪرين جو % پرواري سڄي عدد ۾
آسام	1000	960	1960	$\frac{1000}{1960} \times \frac{100}{1} = 51\%$	$100 - 51 = 49\%$
بهار	1000	840	1840		
پنجاب	1000	900			
ڪيرل	1000	1080			
مهاراشتر	1000	900			

چجري جي جاڳ وسيلي سيڪڙو ڪالمر گراف ڪڍو. نتيجا ڪڍي چرچا ڪريو.



ويچار ڪريو صفحي 111 تي ڏنل مشغوليءَ ۾ پنجن راجين جي في هزار ڇوڪرن پٺيان ڇوڪرين جو عدد ڏنل آهي، انهن جي پڙهيلن جو انداز هيٺ ڏنل آهي.

آسام (73%)، بهار (64%)، پنجاب (77%)، ڪيرل (94%) مهاراشتر (83%)

چڱري جي ڇوڪرين جو عدد ۽ ان راجيه جي پڙهيلن جو انگي پيٽ ڪريو. ان مان ڪو نتيجو نڪري ٿو ڇا؟

اڇو چرچا ڪريون



هيٺين جاڻ ڏيکارڻ لاءِ ڪهڙو ڪالم گراف مناسب ٿيندو؟

- (1) چئن ٻونن ۾ پڙهيلن جو سيڪڙو عدد
- (2) هڪ ڪٽنب جو الڳ الڳ ٻالهيون تي خرچ
- (3) پنجن ڪلاسن مان هر هڪ ڪلاس ۾ ڇوڪرن جو عدد
- (4) ٽن ڏينهن جي وڳيان نماءُ ۾ آيل شخصن جو عدد
- (5) جنوريءَ کان جون تائين هر هڪ مهيني ۾ توهانجي شهر جو وڏو ڳوٺ ۽ گهٽ ڳوٺ گرمي پد
- (6) واهڻ هلائڻ وقت 100 ڪٽنبن جي هيلميٽ واپرائيندڙ نه واپرائيندڙ شخص جو عدد

جاڳي وٺون



عدد شاستر (Statistics)

ڪنهن وڏي گروهه جو اڀياس ڪرڻ لاءِ ان گروهه جو ننڍو گروهه بي ترتيب وار طريقي ڪندا آهن. اهو وڏي گروهه جو عيوضي گروهه هوندو آهي. ان گروهه جي نسبتي وشيه جي جاڻ حاصل ڪبي آهي اها گهڻا دفعا عدد روپ ۾ هوندي آهي. انجي تحقيق ڪري نتيجا ڪڍبا آهن. اهڙي اڀياس کي عدد شاستر (statistics) چئبو آهي.

Statistics لفظ status ان لئتن فقط مان تيار ٿيو آهي. انجي معنيٰ آهي راج جي حالت. ان مان لڳي ٿو ته پهرين اهو وشيه راجيه جي ڪاروباري سرشتي سان لاڳاپو رکندو هو پر هاڻي ان وڳيان جو استعمال سڀني ڪيترن ۾ ڪيو ويندو آهي. سر رونالڊ ايلمر فشر (Sir Ronald Aylmer Fisher) (17/02/1890-29/07/1962) کي عدد شاستر جو ابو چئجي ٿو.

جاڻ گڏ ڪرڻ (Data collection)

ماسٽرياڻي: هڪ ٻون جي هر هڪ ڪٽنب وٽ ڪيتري ڪيتي آهي اها جاڻ گڏ ڪرڻي آهي ڪيئن ڪندا؟

رابرت: ٻون ۾ هر هڪ جي گهرو جي جاڻ گڏ ڪبي.

ماسٽر: بمڪل صحيح، شاگرد دوستو ڪنهن خاص گروهه بابت اسان جيڪا جاڻ گڏ ڪريون ٿا اها عدد روپ ۾ هوندي آهي. انجي جاڻ چئجي ٿو جاڻ گڏ ڪرڻ کان اڳ انجو مقصد خبر هئڻ گهرجي ڪنهن ماڻهو نسبتي هنڌ تي وڃي سوال پڇي، جائزو وٺي جاڻ گڏ ڪئي ته انجي بنيادي جاڻ چئجي ٿو.

آفرين: يعني رابرت جي چوڻ موجب هر هڪ جي گهرو جي ڪنڀا ڪيل ڄاڻ بنيادي ڄاڻ آهي ماسٽريائيءَ کي شاباس آفرين!

رميش: پر ڄاڻ گهٽ وقت ۾ گڏ ڪرڻي هجي ته؟

ماسٽريائي: ويچار ڪريو اهڙي حالت ۾ ڄاڻ گڏ ڪرڻ جو ٻيو طريقو ڪهڙو هوندو؟

ڪينٽڪي: اسان تڏهين آفيس ۾ وڃي هر هڪ ڪٽنب جي ڄاڻ گڏ ڪري سگهون ٿا.

ماسٽريائي صحيح آهي، ڪجهه حالتن ۾ وقت يا وسيلن جي گهٽتائيءَ سبب ڄاڻ شخصي طور گڏ ڪرڻ ممڪن نه هوندو آهي. اهڙي وقت، ٻين جي گڏ ڪرڻ ڄاڻ ڪارٽالين جا دستاويزن مان، سرڪاري ويبسائٽن مان، تخففي پيپرو وغيره مان ڄاڻ هٿ ڪبي آهي ان کي ٻئين درجي جي ڄاڻ چئجي ٿو. مثال ڪينٽڪيءَ دوران ڏمل صلاح موجب تڏهين آفيس مان مليل ڄاڻ اها ٻئين درجي جي ڄاڻ چئجي ٿو.

هينريڪس مثال ڏسو

(i) اخبارن مان مليل ڄاڻ وسيلي ٺاهيل خاڪو ٻئين درجي جي ڄاڻ آهي.

(ii) ڪنٽين جي پڌارتن جو درجو سمجهڻ لاءِ گراهڪن کان پڇيل رايي بنيادي ڄاڻ آهي.

(iii) ڪلاس ۾ شاگردن جي ورتل اوچائي، بنيادي ڄاڻ آهي.

بنيادي ڄاڻ	ٻئين درجي جي ڄاڻ
1. گڏ ڪرڻ ۾ وقت لڳندو آهي. 2. ڄاڻ نئين ۽ تفصيلوار هوندي آهي. 3. تز ۽ پروسيمند هوندي آهي.	1. ترٽ ملندي آهي. 2. اها ڄاڻ جهوني به ٿي سگهي ٿي تفصيل نه ملندي آهي. 3. گهٽ پروسيمند هوندي آهي.

مشغولي: توهان الڳ الڳ سببن لاءِ ڄاڻ گڏ ڪندا آهيو ائين 3-14 مثالن ۾ گڏ ڪيل ڄاڻ بنيادي آهي يا ٻئين درجي واري ان تي چرچا ڪريو.

اڀياس 7.2

(1) هيٺ گڏ ڪيل ڄاڻ بنيادي آهي يا ٻئين درجي واري اهو ٻڌايو.

(i) ڪلاس ۾ وڃي هر هڪ شاگرد جي حاضري ڄاڻ.

(ii) هر هڪ شاگرد جي اوچائيءَ جي ڄاڻ جلد مٿين آفيس ۾ موڪلڻ لاءِ اسڪول جي پي ٽي وي ڳڙه ۾ درج ڄاڻ گڏ ڪئي.

(iii) وڳيان پروجيڪٽ لاءِ جهنگل ۾ وڃي وڻن جي ڄاڻ درج ڪرڻ.



جاڻ جو ورگيڪرڻ (Classification of data)

مثال (1) هڪ اسڪول جي درجي 9 جي 50 شاگردن جي پهرين يونٽ ٽيسٽ حسابن ۾ 20 مان مليل

مارڪون هيٺ ڏنل آهن.

20, 6, 14, 10, 13, 15, 12, 14, 17, 17, 18, 11, 19, 9, 16, 18, 14, 7, 17, 20,
8, 15, 16, 10, 15, 12, 18, 17, 12, 11, 11, 10, 16, 14, 16, 18, 10, 7, 17, 14,
20, 17, 13, 15, 18, 20, 12, 12, 15, 10

هتي گڏيل ڪيل جاڻ کي ڇا چئبو؟ بنيادي جاڻ

هر هڪ عدد کي ڇا چئبو مارڪون

مٿين جاڻ لاءِ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

(iv) سڀني کان گهٽ مارڪون ڪهڙيون آهن؟

(i) 15 مارڪون ڪٿندڙ ڪيترا شاگرد آهن؟

(v) سڀني کان وڌيڪ مارڪون ڪهڙيون آهن؟

(ii) 15 کان وڌيڪ مارڪون ڪٿندڙ ڪيترا شاگرد آهن؟

(iii) کان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن.



(1) توهان کي انهن سوالن جا جواب سؤا مليا يا هر دفعي مارڪون ڏسڻيون پيون؟

(2) مٿئين ڪم کي سؤو ڪيون ڪري سگهيو؟

شمير: هر دفعي مارڪون ڏسڻ سبب اهو ڪم ڏکيو ۽ بي مزي ٿي ويو. مٿين جاڻ وڌندڙ يا گهٽجندڙ

سلسلي ۾ لکڻ سان اهو ڪم سؤو ٿي سگهندو.

شمير جي صلاح موجب مارڪون وڌندڙ سلسلي ۾ لکندا سين.

6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13,
14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20

جاڻ وڌندڙ سلسلي ۾ لکڻ سان (1) جي پنجن ٽي سوالن جا سؤا مليل ڇا؟

ڇاچ مان جاڻ پيئي ته اهو ڪم سؤو ٿيو.



مارتن: جاڻ چڱي روپ ۾ لکڻ سان ڪم سؤو ٿيندو، اهو اسان اڳئين درجي ۾ سکيو آهي ان چيچري

کي جهجهائي ورهاست چڱو چئبو آهي ماستريائيءَ بلڪل صحيح، هاڻي (1) ۾ ڏنل مثال مان اهو

چڱو ٺاهيو.

مثال (1) ڀرسي کان گهٽ مارڪون آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ مارڪون 20 آهن انگري چچري ڀر ميليل مارڪن جي نئين ڪالهر جهجهائي لکبي. ڪالهر 6 کان 20 مارڪون لکو. ٻئين ڪالهر ليڪا نشان.

جهجهائي ورهاست چچرو

جهجهائي (f) (شاگردن جو عدد)	ليڪا (نشان)	ڪٽون (مارڪون)
1		6
2		7
		8
		9
5		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
6		17
		18
		19
4		20
N = 50 ڪل		

N سڀني جهجهائين جو جوڙ آهي.

اچو ته چرچا ڪريون



گروهيل جهجهائي ورهاست چچرو (Grouped frequency distribution table)

(1) هيءَ چچرو خوب وڏو لڳي ٿو ڇا؟

(2) جڏهن ڄاڻ ڀرڪٽن جو انداز گهڻو هوندو ته اهو چچرو تيار ڪرڻ ڏکيو ٿيندو ڇا؟

ماسٽرياڻي، مٿين چرچا مان توهان سمجهو هوندو ته، جڏهن ڄاڻ ڀرڪٽن جو عدد وڌيڪ هوندو آهي ته جهجهائي ورهاست چچرو وڏو ٿي ويندو آهي. ان ڀر وقت ٻڌندو آهي. ان لاءِ ڪجهه اپاءَ ڪري سگهجن ٿا؟
روعت: ان وقت ڄاڻ جا گروهم ٺاهجن.

ماسٽريائي: شابا س روهت ڄاڻ جا گروهم يعني ڪلاس ٺاهيا آهن جنهن سان اها جهت سمجھ ۾ اچي ٿي اهڙي ڇجري کي گروهيل جهجھائي ورهاست ڇجرو چئبو: آهي اها ڇجري ٻن طريقن ۾ پيش ڪري سگهيو آهي (1) شامل ڪرڻ وارو طريقو (2) ٻاهر ڪڍڻ وارو طريقو

(1) شامل ڪرڻ وارو طريقو (غير لڳيتو طريقو) (Inclusive method)

6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20

مٿين ڄاڻ ۾ ننڍي ۾ ننڍو ڪٽ ۽ وڏي ۾ وڏي ڪٽ آهي.

سڀني کان وڏي ڪٽ ۽ سڀ کان ننڍي ڪٽ ۾ تفاوت $16 - 2 = 14$ آهي ان تفاوت ڄاڻ جو دائرو ڇڻجي ٿو اهو دائرو ڏسي ڄاڻ جا ڪهڙا مناسب ڪلاس ٺاهي سگهبا؟

(i) 6 کان 8, 9 کان 11, 12 کان 14, 15 کان 17, 18 کان 20 يا

(ii) 6 کان 10, 11 کان 15, 16 کان 20 کان ائين ڪلاس ٺاهي سگهبا.

6 کان 10, 11 کان 15, 16 کان 20 ڪلاس ڪٽي مٿين ڄاڻ جو جهجھائي ورهاست ڇجرو ٺاهينداسين.

گروهيل جهجھائي ورهاست ڇجرو (شامل ڪرڻ وارو طريقو)

ڪلاس	ليڪا نشان	جهجھائي (f) ڏيکارڻ جو عدد
6 - 10		10
11 - 15		
16 - 20		20
		$N = 50$

اهو ڇجرو ٺاهڻ وقت 6, 10 ۽ انجي وچ ۾ وارن سڀني ڪٽن کي 6 کان 10 ڪلاس ۾ شامل ڪنداسين. انڪري اهڙي طريقي کي شامل ڪرڻ وارو طريقو چئبو آهي. 6 کان 10, 11 کان 15, 16 کان 20 انهن ڪلاسن کي اڻ لڳيتا ڪلاس به چئجي ٿو.

ڄاڻي وٺون



عدد شاستر جي بنيادي ويچار (Basic terms in statistics)

1. ڪلاس (Class) ڪٽن جي مناسب قد جي گروهن کي ڪلاس چئجي ٿو.

6 کان 10, 11 کان 15 يا 6-10, 11-15 ائين به ليکبا آهن.

2. ڪلاس جون حدون: (Class limits) ڪلاس ڏيکاريندڙ عددن کي ڪلاس جون حدون چوندا آهن.

6 کان 10 ڪلاس جي هيٺين حد ۽ مٿين حد 10 آهي.

3. جهجھائي: (Frequency) هر هڪ ڪلاس ۾ جيتريون ڪٽون هونديون آهن انهن ڪٽن جي ڪل عدد کي ان ڪلاس جي جهجھائي چئجي ٿو مٿين ڇجري ۾ 11 کان 15 ڪلاس ۾ 20 ڪٽون آهن انڪري ان ڪلاس جي جهجھائي 20 آهي.

4. ڪلاس جي ڊيگهه (Class width) : لڳيتن ڪلاس ۾ ٻن لڳيتن ڪلاس جي هيٺين (يا مٿين) حدن جي تفاوت کي ڪلاس جي ڊيگهه چئجي ٿو.

مثال 10-5 حدن کي تفاوت کي ڪلاس جي ڊيگهه ... آهي.

5. ڪلاس نشان (Class mark) : ڪلاس جي هيٺين ۽ مٿين حد جي سراسريءَ کي ڪلاس نشان يا ڪلاس جو وچ ٽپڪو چئبو آهي.

$$\text{ڪلاس نشان} = \frac{\text{مٿين حد} + \text{هيٺين حد}}{2}$$

$$\text{مثال ڪلاس جو ڪلاس نشان} = \frac{11-15}{2} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \frac{26}{2} = 13$$

۲. ٻاهر ڪڍڻ وارو طريقو (Exclusive method)

مثال : 6, 10, 10.3, 11, 15.7, 19, 20, 12, 13 ڏنل ڪٽون آهن.
6-10, 11-15, 16-20 اهي ڪلاس ڪٽي گروهيل جهڙائي چڪرو ٺاهيو.

حل :

ڪلاس (ڪٽون)	ليڪا نشان	جهڙائي (f)
6-10		2
11-15		3
16-20		2

مٿين چڪري ۾ ڏنل ڪٽن مان 10.3 ۽ 15.7 اهي ڪٽون نه آيون.

چون ٿا ته 10.3, 15.7 عدد 6-10, 11-15, 16-20 انهن مان ڪنهن به ڪلاس ۾ شامل نه ٿي ٿئي. ان لاءِ ڪلاس جي بناوت بدلائڻي پوندي. ڪلاس 5-10, 10-15, 15-20 ائين لڳيتا لکڻ سان مٿيون مسئلو نه ايندو. پر هتي سوال اهو ٿو اٿي ته 0110 ڪٽ کي 5-10, 10-15 انهن مان ڪهڙي ڪلاس ۾ رکبو. اها ڏکيائي حل ڪرڻ لاءِ 10 ڪٽ, ڪلاس ۾ نه ڪٽي ڪلاس ۾ رکبي اها ريت آهي انڪري 10 ڪٽ کي 10-15 ڪلاس ۾ شامل ڪبو. ان طريقي کي ٻاهر ڪڍڻ وارو طريقو چئبو آهي. انهن ڪلاس ۾ 10.3, 15.7 اهڙا عدد به شامل ڪري سگهبا.

هاڻي مٿي ٻڌايل نموني ٺاهيل چڪرو ڏسو

گروهيل جهڙائي ورهاست چڪرو (ٻاهر ڪڍڻ وارو طريقو)

ڪلاس (لڳيتا) مارڪون	ليڪا نشان	جهڙائي (f) شاگردن جو عدد
5-10		1
10-15		5
15-20		2
20-25		1

هي ٽيان ڀرڻو



جهجهائي ورهاست چجر

اڻ گروهييل

شاگردن جو عدد	ٺاڻين جي شاگردن جي عمر
12	14
23	15
10	16

گروهييل

شامل ڪرڻ وارو طريقو (غير لڳيتا ڪلاس)

شاگردن جو عدد	پونٽ جو نمبر
12	2-4
29	5-7
7	8-10

ٻاهر ڪڍڻ وارو طريقو (لڳيتا ڪلاس)

شاگردن جو عدد	اوپائي (س م)
18	145-150
27	150-155
3	155-160

اڀياس 7.3

1. 20 کان 25 ڪلاس جي هيٺين ۽ مٿين حد لکو
2. 35 کان 40 ڪلاس جو ڪلاس نشان لھو.
3. هڪ ڪلاس جو ڪلاس نشان 10 ۽ ڪلاس جي ڊيگهه 6 آهي ته اهو ڪلاس ڪهڙو آهي؟
4. هيٺيون چجر پورو ڪريو.

عمر سالن ۾ ڪلاس	ليڪا نشان	وديارتي عدد (f) جهجهائي
12-13		
13-14		
14-15		
15-16		
		$N = \sum f = 35$

5. هڪ اسڪول جي سائي سٽا جي 45 شاگردن مان هر هڪ جي پوکيل وڻن جو عدد هيٺ ڏنل آهي.
3, 5, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 6, 5, 3, 4, 5, 7, 3, 5, 6, 4, 4, 3,
5, 6, 6, 4, 3, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 4, 7.

ان مان اڻ گروهييل جهجهائي چجر ٺاهيو.

(6) π جو ڏهاڙي کانپوءِ 50 جاءِ ٺاڻين ملهه ڏنل آهن.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510

ان مان ڏهاڙي کانپوءِ وارن انگن جو اڻ گروهييل جهجهائي ورهاست چجر ٺاهيو.

(7*) هيٺين چچرن ۾ ڏنل ڄاڻ موجب ڪلاس ڪلاس ۽ لڳيتا ڪلاس ۽ اڻ لڳيتا ڪلاس وارا جهجهائي ورهاست چچرا ٺاهيو.

(i)

ڪلاس نشان	جهجهائي
5	3
15	9
25	15
35	13

(ii)

ڪلاس نشان	جهجهائي
22	6
24	7
26	13
28	4

(8) اسڪول جي نائين درجي جي 46 شاگردن جي ڪمپاس جي پينسلين جي اوچائي س ۾ ڏنل آهي.

16, 15, 7, 4.5, 8.5, 5.5, 5, 6.5, 6, 10, 12, 13, 4.5, 4.9, 16, 11, 9.2, 7.3, 11.4, 12.7, 13.9, 16, 5.5, 9.9, 8.4, 11.4, 13.1, 15, 4.8, 10, 7.5, 8.5, 6.5, 7.2, 4.5, 5.7, 16, 5.7, 6.9, 8.9, 9.2, 10.2, 12.3, 13.7, 14.5, 10

0-5, 5-10, 10-15, ڪلاس ڪئي ٻاهر ڪڍڻ واري طريقي جهجهائي ورهاست چچرو ٺاهيو.

(9) هڪ سهڪاري ڪير جمع ڪرڻ واري مرڪز تي 50 شخصن ڪيترا ليٽر ڪير جمع ڪيو اهو هيٺ ڏيکاريل آهي.

27, 75, 5, 99, 70, 12, 15, 20, 30, 35, 45, 80, 77, 90, 92, 72, 4, 33, 22, 15, 20, 28, 29, 14, 16, 20, 72, 81, 85, 10, 16, 9, 25, 23, 26, 46, 55, 56, 66, 67, 51, 57, 44, 43, 6, 65, 42, 36, 7, 35

مناسب ڪلاس ڪٿي گروهييل جهجهائي ورهاست چچرو ٺاهيو.

(10) هڪ سنسٽائون جي 38 ماڻهن وٽان ڪيترو دويانگم وڪاس چنڊو جمع ڪيو اهو هيٺ ڏنل آهي.

101, 500, 401, 201, 301, 160, 210, 125, 175, 190, 450, 151, 101, 351, 251, 451, 151, 260, 360, 410, 150, 125, 161, 195, 351, 170, 225, 260, 290, 310, 360, 425, 420, 100, 105, 170, 250, 100

(i) 100-149, 150-199, 200-249 ... ڏنل نموني ڪلاس ڪٿي گروهييل جهجهائي ورهاست چچرو ٺاهيو.

(ii) چچري وسيلي ٻڌايو ته 350 روپيا يا ان کان وڌيڪ چنڊو ڪيترن ماڻهن ڏنو؟



مٿين حد کان گهٽ گڏيل جهجهائي چڱرو (Less than cumulative frequency)

مثال: هڪ اسڪول جي درجي 9 جي 50 شاگردن جون پهرين يونٽ ٽيسٽ ۾ حسابن ۾ 40 مان ڪنيل مارڪن جو جهجهائي ورهاست چڱرو ڏيکاريل آهي.

ڪلاس	جهجهائي شاگرد (f)
0-10	02
10-20	12
20-30	20
30-40	16
	ڪل $N = 50$

(1) چڱري مان هيٺيان چوڪٽ ڀريو.

(i) 10 کان 20 ڪلاس جي هيٺين حد ۽ مٿين حد آهي؟

(ii) 10 کان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(iii) 20 کان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟ $2 + \text{$ = 14

(iv) 30 کان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟ $\text{$ + $\text{$ = 34

(v) 40 کان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟ $\text{$ + $\text{$ = 50

ڌيان ڀرڻو



ڪنهن خاص ڪلاس جي جهجهائي ۽ ان ڪلاس کان اڳ وارن سڀني ڪلاس جي جهجهائي جي جوڙاپٽ کي ان ڪلاس جي مٿين حد کان گهٽ وارو (Less than cumulative frequency) گڏيل جهجهائي ورهاست چڱرو چئبو آهي هنڪي ٿوري کان گڏيل جهجهائي به چئبو آهي.

مٿين حد کان گهٽ گڏيل جهجهائي چڱرو جي معنيٰ .

ڪلاس	جهجهائي	ڪان گهٽ گڏيل جهجهائي
0-10	2	2
10-20	12	$2 + 12 = \text{$
20-30	20	$\text{$ + 20 = 34
30-40	16	$34 + \text{$ = 50
N = 50		

ڪلاس	گڏيل جهجهائي	مٿين حد کان گهٽ جو مطلب
0-10	2	2 شاگردن کي 10 کان گهٽ مارڪون
10-20	14	14 شاگردن کي 20 کان گهٽ مارڪون
20-30	34	34 شاگردن کي 30 کان گهٽ مارڪون
30-40	50	50 شاگردن کي 40 کان گهٽ مارڪون
N = 50		

(2) هيٺين حد يا ان کان وڌيڪ وارو گڏيل جهجهائي ورهاست ڇڄرو.

گڏيل جهجهائي	جهجهائي	ڪلاس
50	2	0-10
$50 - 2 = 48$	12	10-20
$48 - 12 = 36$	20	20-30
$36 - 20 = 16$	16	30-40
ڪل 50		

هيٺين حد يا ان کان وڌيڪ جو مطلب	گڏيل جهجهائي	ڪلاس
50 شاگردن کي 0 يا 10 وڌيڪ مارڪون مليون.	50	0-10
48 شاگردن کي 10 يا 10 کان وڌيڪ مارڪون مليون.	48	10-20
36 شاگردن کي 20 يا 20 کان وڌيڪ مارڪون مليون.	36	20-30
16 شاگردن کي 30 يا 30 کان وڌيڪ مارڪون مليون.	16	30-40

مثال : هڪ اسپورٽس ڪلب ۾ ٽيبل ٽينس جي رانديگرن جي عمر جي ورهاست هيٺين ڇڄري ۾ ڪيل آهي. ان مان ڪان مٿي وارو گڏيل جهجهائي ورهاست ڇڄرو ٺاهيو.

حل : ڪان مٿي گڏيل جهجهائي ورهاست ڇڄرو

ڪان وڌيڪ گڏيل جهجهائي	جهجهائي (شاگردن جو عدد)	ليڪا نشان	عمر (سال)
50	09		10-12
$\square - 9 = 41$	$\square$		12-14
$41 - 23 = \square$	$\square$		14-16
$\square - 13 = \square$	05		16-18
ڪل N = 50			

اڀياس 7.4

(1) هيٺيون گڏيل جهجهائي ورهاست ڇڄرو پورو ڪريو.

ڪان گهٽ جهجهائي	جهجهائي (شاگردن جو عدد)	ڪلاس (اڻڄاڻي س م)
150-153	05	05
153-156	07	$05 + \square = \square$
156-159	15	$\square + 15 = \square$
159-162	10	$\square + \square = 37$
162-165	05	$37 + 5 = 42$
165-168	03	$\square + \square = 45$
ڪل N = 45		

2. هيٺيون گڏيل جهجهائي چچرو پورو ڪريو .

ڪلاس (ماهياني اپت)	(شخص) جهجهائي	ڪان وڌيڪ گڏيل جهجهائي
1000-5000	45	
5000-10000	19	
10000-15000	16	
15000-20000	02	
20000-25000	05	
	N = 87 ڪل	

(3) هڪ ڪلاس جي 62 شاگردن جون 100 مان ڪنيل مارڪون هيٺ ڏيکاريل آهن.

..... ڪلاس ڪٿي جهجهائي چچرو ۽ گڏيل هڪ جهجهائي چچرو (ڪان وڌيڪ) تيار ڪريو.

55, 60, 81, 90, 45, 65, 45, 52, 30, 85, 20, 10,
75, 95, 09, 20, 25, 39, 45, 50, 78, 70, 46, 64,
42, 58, 31, 82, 27, 11, 78, 97, 07, 22, 27, 36,
35, 40, 75, 80, 47, 69, 48, 59, 32, 83, 23, 17,
77, 45, 05, 23, 37, 38, 35, 25, 46, 57, 68, 45,
47, 49

ناهيل چچري وسيلي هيٺين سوالن جا جواب لکو

- 40 يا 40 ڪان وڌيڪ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 90 يا 90 ڪان وڌيڪ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 60 يا 60 ڪان وڌيڪ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 0-10 ڪلاس جي ڪان وڌيڪ گڏيل جهجهائي ڪيتري؟

(4) مٿئين مثال (3) لاءِ ڪان گهٽ گڏيل جهجهائي چچرو ٺاهيو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو.

- 40 ڪان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 10 ڪان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 60 ڪان گهٽ مارڪون ڪٿندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟
- 50-60 ڪلاس جي ڪان گهٽ گڏيل جهجهائي ڪيتري؟

چاڻي ونون



مرڪزي رخ جون ماپون : (Measures of central tendency)

مرڪزي رخ ڇاچ پڙتال سروي مان مليل عددي چاڻ ۾ عام طور هڪ خاصيت ڏسڻ اچي ٿي چاڻ جي ڪنهن عدد جي آس پاس ٻين عددن جي گڙدي ڏسندي آهي. ميٽر جي ان خاصيت کي ميٽر جي مرڪزي رخ چئبو آهي.

ائين مڃبو آهي ته ميٽر جنهن عدد جي آس پاس ٻين عددن جي گڙدي هوندي آهي، اها ان ميٽر جي عيوضي ٿئي ٿي. ان عدد کي مرڪزي لاڙي جي ماپ چوندا آهن. عدد شاستر ۾ مرڪزي رخ جا هيٺيان پئمنا واپرايا ويندا آهن.

(1) سراسري (Mean): ڄاڻ جي سڀني عددن جي انگي سراسريءَ کي ان ڄاڻ جو وچ يا سراسري چئجي ٿو.

$$\text{سراسري} = \frac{\text{سڀني ڪٽن جي جوڙاپٽ}}{\text{ڪٽن جو ڪل عدد}}$$

مثال (1) 25, 30, 27, 23, 25 انهن ڪٽن جي سراسري لھو.

$$\text{سراسري حل: } \frac{25 + 30 + 27 + 23 + 25}{5} = \frac{130}{5} = 26$$

مثال (2) نائين درجي شاگردن جون پھريون چماھي امتحان ۾ الجبرا ۾ ڪنيل مارڪون هيٺ ڏنل آھن. انھن جي سراسري لھو.

40, 35, 30, 25, 23, 20, 14, 15, 16, 20, 17, 37,
37, 20, 36, 16, 30, 25, 25, 36, 37, 39, 39, 40,
15, 16, 17, 30, 16, 39, 40, 35, 37, 23, 16.

حل: ھتي ڪٽن جو عدد وڌيڪ ھئڻ سبب جوڙ ڪرڻ ۾ تڪليف ٿيندي ھتي 3 شاگردن مان ھرھڪ کي 30 مارڪون آھن. سندن مارڪن جي جوڙاپٽ $30+30+30=90$ آھي، ان جي عيوض $30 \times 3 = 90$ ائين سولو ٿيندو ان لاءِ جھجھائي چڪرو اڀيوڻي ٿيندو.

مارڪون	شاگردن جو عدد	$f_i \times x_i$
14	1	$14 \times 1 = 14$
15	2	$15 \times 2 = \dots$
16	5	$16 \times \dots = \dots$
17	2	$17 \times 2 = 34$
20	3	$\dots \times 3 = \dots$
23	2	$23 \times 2 = \dots$
25	3	$25 \times 3 = \dots$
30	3	$\dots \times \dots = \dots$
35	2	$35 \times 2 = 70$
36	2	$\dots \times \dots = \dots$
37	4	$\dots \times \dots = \dots$
39	3	$39 \times 3 = 117$
40	3	$\dots \times \dots = 120$
	$N = \boxed{}$	$\sum f_i x_i = 956$

عدد شاستر ۾ $\sum_{i=1}^n$ اها نشاني واپرائڻ
سھوليت پڙير ٿيندو آھي. $\sum_{i=1}^n f_i x_i$ جو
مطلب سمجھڻ i واڌو سڄو انگي عدد
آھي f_i شاگردن مان ھرھڪ کي x_i
مارڪون مليون اھو مڃينداسين. $\sum$
(سگما) نشاني جوڙ لاءِ ڪم آڻيندا آھن. $\sum_{i=1}^n$
نشاني جي i کان i کان n ملھن لاءِ n پڌن
جي جوڙاپٽ ڏيکاري ٿي.

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum f_i x_i}{N} = \frac{956}{35} \\ &= 27.31 \text{ اٽڪل} \end{aligned}$$

∴ ڏنل ڄاڻ جي سراسري 27.31 آھي.

(2) وچون انگه (Median): ڄاڻ جي عدد وڌندڙ (يا گهٽجندڙ) سلسلي ۾ لکبا آهن. ان سلسلي جي وچين عدد کي ڄاڻ جو وچون عدد چئبو آهي.

ڄاڻ جي ڪٽن جو عدد ٻڌي هوندو ته وچ تي هوندڙ ٻن عدد جي سراسريءَ کي وچون عدد چئبو آهي. مثال (1) 54, 78, 63, 92, 87, 66, 72 ان ڄاڻ جو وچون عدد لھو.

حل: وڌندڙ سلسلو

54, 63, 66, 72, 78, 87, 92

ان سلسلي ۾ چوٿون عدد 72 وچ تي آهي

∴ ڏنل ڄاڻ جو وچون انگه آهي 72

مثال (2) 30, 25, 32, 23, 42, 36, 40, 33, 21, 43 ان ڄاڻ جو وچون انگه لھو.

حل: ڏنل ڄاڻ وڌندڙ سلسلي موجب لکنداسين.

21, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 40, 42, 43

هتي ڪٽن جو عدد 10 يعني ٻڌي آهي.

∴ پنجون ۽ ڇهون آهي ٻه عدد وچ تي آهن آهي 32, 33

$$\therefore \text{وچون انگه} = \frac{32+33}{2} = \frac{65}{2} = 32.5$$

ويچار ڪريو



ڄاڻ جي ڪٽن جو عدد n هجي ته،

(i) n آهي هوندو ته ڪاٺين ڪٽن ان ڄاڻ جو وچون انگه هوندي؟

(ii) n ٻڌي هوندو ته ڪهڙن ٻن وچن عددن جي سراسري وچون انگه ٿيندي؟

(3) ڍنگه (Mode): ڄاڻ ۾ سڀني کان وڌيڪ دفعا ايندڙ عدد کي ان ڄاڻ جو ڍنگه چئبو آهي.

مثال: (1) ڏنل ڄاڻ جو ڍنگه ٻڌايو 95, 55, 35, 40, 75, 75, 55, 67, 55, 90

حل: ڄاڻ جا عدد وڌندڙ سلسلي ۾ لکڻ سان سڃاڻڻ سولو ٿيندو ته ڪهڙو عدد وڌيڪ دفعا آيل آهي.

35, 40, 55, 55, 55, 67, 75, 75, 90, 95 ڄاڻ جو وڌندڙ سلسلو

55 = وڌ ڀرڻ آيل عدد

∴ 55 ڄاڻ جو ڍنگه.

مثال: (2) هڪ ڪارخاني جي مزدورن جي عمر هيٺين چجري ۾ ڏنل آهي.

سال عمر	19	21	25	27	30
مزدور	5	15	13	15	7

ان وسيلي ڍنگه لھو

حل: هتي وڌ ڀرڻ جهڙائي 15 آهي پر اها جهڙائي ٻن ڪٽن جي آهي.

∴ ڍنگه = 27 ۽ 21 ۾ ∴ عمر جو ڍنگه 21 ۽ 27 سال آهي.

اڀياس 7.5

- (1) مڪند جي ستن سالن ۾ سويابين جي في ايڪو پيڊائش (ڪئنٽل ۾) 10,7,5,3,9,6,9 آهي. ان مان في ايڪو پيڊائش جي سراسري لھو.
- (2) ڏنل ڄاڻ جو وچون انگ لھو 59,75,68,70,74,75,80
- (3) حسابن جي گھرو اڀياس ۾ 7 شاگردن کي 100 مان هيٺئين نموني مارڪون مليون ڏنل ڄاڻ جو ڏنگ لھو. 99, 100, 95, 100, 100, 80, 90
- (4) هڪ ڪارخاني ۾ 30 ڪامگارن کي هيٺئين نموني ماهياني پگهار ملي. 5000, 7000, 3000, 4000, 4000, 3000, 3000, 3000, 8000, 4000, 4000, 9000, 3000, 5000, 5000, 4000, 4000, 3000, 5000, 5000, 6000, 8000, 3000, 3000, 6000, 7000, 7000, 6000, 6000, 4000
ان ڄاڻ مان ڪامگارن جي ماهياني پگهار جي سراسري لھو.
- (5) هڪ ٽوڪريءَ ۾ 10 ٿمائن جو وزن گرامن ۾ 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 95 آئين آهي ان مان ٿمائن جي وزن جو وچون انگ لھو.
- (6) هڪ هاڪي رانديگر 9 مئچن ۾ هيٺئين نموني گول ڪيا. 5, 4, 0, 2, 2, 4, 4, 3, 3
- (7) 50 ڪٽنن جي سراسري 80 آهي پر ان جي 19 ڪٽن کي غلطيءَ سان 91 ڪنپو ويو غلطيءَ ۾ سڌاري کانپوءِ سراسري ڇا ٿيندي؟
- (8) هيٺ 10 ڪٽن وڌندڙ سلسلي ۾ ڏنل آهن جيڪڏهن انهن جو وچون انگ 11 آهي ته x جو ملھ لھو. 2, 3, 5, 9, $x + 1$, $x + 3$, 14, 16, 19, 20
- (9*) 35 ڪٽن جي سراسري 20 آهي انهن مان پھرين 18 ڪٽن جي سراسري 15 ۽ آخري 18 ڪٽن جي سراسري 25 آهي ته 8 ڪٽن لھو.
- (10) 5 ڪٽن جي سراسري 50 آهي انهن مان هڪ ڪٽن گھٽجڻ تي سراسري 45 ٿئي تي ته اھو ڪٽ لھو.
- (11*) هڪ ڪلاس ۾ 40 شاگرد آهن انهن مان 15 ڇوڪرا آهن. هڪ امتحان ۾ ڇوڪرن جي مارڪن جي سراسري 33 ۽ ڇوڪرين جي مارڪن جي سراسري 35 آهي ڪلاس جي ڪل شاگردن جي مارڪن جي سراسري لھو.
- (12) 10 شاگردن جو وزن (ڪگ ۾) هيٺ ڏنل آهي ته انھنجو ڏنگ لھو. 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42, 37
- (13) هيٺئين چجري ۾ ڪن ڪٽن جي 14 سالن کان ننڍن ٻارن جو عدد ڏنل آهي ته انھن ٻارن جو ڏنگ لھو.

ٻارن جو عدد	1	2	3	4
جھجھائي ڪٽن	15	25	5	5

(14) هيٺين ڄاڻ جو ڏنگ لھو.

مارڪون ڪٽن	35	36	37	38	39	40
شاگردن جو عدد	09	07	09	04	04	02

مرڪزي لاڙي جو ڪهڙو پئمانو ڪٿڻ مناسب ٿيندو؟ ان جو جواب مقصد تي مدار رکي ٿو. سمجھو هڪ ڪرڪيٽ رانديگر 11 مئچن ۾ نمبروار 73, 9, 107, 48, 63, 12, 23, 80, 35, 58, 41 رنسون ٺاهيون. هنجو ڪم ٿي ڪرڻ لاءِ هر هڪ مئچ جون رنسون ڏيان ۾ رکڻيون پونديون ان ڪري اتي مرڪزي لاڙي جو 'سراسري' پئمانو ڪٿڻ صحيح ٿيندو.

ڪيترا تيار ڪندڙ هڪ ڪمپنيءَ کي ڪهڙي ماپ جي شرٽ وڌيڪ سبجي اهو طيءَ ڪرڻو آهي ان لاءِ (34, 36, 38, 40, 42, 44 مان) ڪهڙي ماپ جي شرٽ وڌيڪ ماڻهو پائيندا آهن اهو ٻولھڻو پوندو. هتي 'ڊنگم' اهو پئمانو واپرائڻ صحيح ٿيندو.

گڏيل اڀياس 7

(1) مناسب جواب چونڊيو

(i) هيٺين مان ڪهڙي ڄاڻ بنيادي نه آهي؟

(A) ڪلاس جو دؤرو ڪري ڏيکارڻ جي حاضري ورتي.

(B) گهرن جو دؤرو ڪري گهرجي ماڻهن جي عددن جي ڄاڻ ورتي.

(C) تلاني آفيس ۾ رائجي ٻون جي ڪڙمين جي سويابين پوک بابت ڄاڻ ورتي.

(D) خود دؤرو ڪري نالن جي صفائيءَ جي ڄاڻ ورتي

(ii) 25-30 ڪلاس جي مٿين حد ڪهڙي آهي؟

(A) 25 (B) 35 (C) 60 (D) 30

(iii) 25-30 ڪلاس جو ڪلاس نشان ڪهڙو آهي؟

(A) 25 (B) 35 (C) 60 (D) 30

(iv) 0-10, 10-20, 20-30 اهڙا ڪلاس هوندڙ جهڙائي چڙهي 10 ڪٿڻ ڪهڙي

ڪلاس ۾ شامل ڪنداسين؟

(A) 0-10 (B) 10-20 (C) 0-10 (D) 20-30

(v*) جيڪڏهن $\bar{x}$ اهو $x_1, x_2, \dots, x_n$ ۽ $\bar{y}$ اهو $y_1, y_2, \dots, y_n$ جي سراسري آهي ۽ $\bar{z}$

جي سراسري آهي ته $z = ?$

(A) $\frac{\bar{x} + \bar{y}}{2}$ (B) $\bar{x} + \bar{y}$ (C) $\frac{\bar{x} + \bar{y}}{n}$ (D) $\frac{\bar{x} + \bar{y}}{2n}$

(vi*) پنجن عددن جي سراسري 50 آهي ۽ انجي 4 عددن جي سراسري 46 آهي ته پنجن عددن ڪهڙو آهي؟

(A) 4 (B) 20 (C) 434 (D) 66

(vii*) 100 ڪٿڻن جي سراسري 40 آهي جيڪڏهن انهن مان نائين ڪٿڻ 30 آهي 30 جي عيوض

70 ڪنيو ته نئين سراسري ڇا ٿيندي؟

(A) 40.6 (B) 40.4 (C) 40.3 (D) 40.7

(viii) 15, 20, 15, 25, 19, 19, 15 ڏنل ڄاڻ جو ڊنگم ڪهڙو آهي؟

(A) 15 (B) 20 (C) 19 (D) 25

(ix) 7, 10, 7, 5, 9, 10 ان جاڻ جو وچون انگ ڪهڙو آهي؟

(A) 7 (B) 9 (C) 8 (D) 10

(x) هيٺين چڪري ۾ 40-30 ڪلاس جي مٿين حد کان گهٽ گڏيل جهجهائي ڪيتري؟

ڪلاس	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
جهجهائي	7	3	12	13	2

(A) 13 (B) 15 (C) 35 (D) 22

(2) 20 نوڪردان جي پگهارن جي سراسري 10250 رپيا آهي جيڪڏهن ان ۾ آفيس جي وڏي جي پگهار

ملائي نه سراسري 750 روپيا وڌي ٿي ته وڏي اڌڪاريءَ جي پگهار لھو.

(3) نون عددن جي سراسري 77 آهي انهن ۾ اڃا هڪ عدد جوڙڻ سان سراسري 5 وڌي ٿي ته اهو نئون عدد لھو.

(4) هڪ شهر جي هڪ مهيني جي هر روز جو وڏو گرمي پد سيلسيوس ڊگري ۾ ڏنل آهي مناسب ڪلاس ڪٿي

گروھيل جهجهائي ورهاست چڪرو (لڳيتا ڪلاس) ٺاهيو.

29.2, 29.0, 28.1, 28.5, 32.9, 29.2, 34.2, 36.8, 32.0, 31.0,
30.5, 30.0, 33, 32.5, 35.5, 34.0, 32.9, 31.5, 30.3, 31.4,
30.3, 34.7, 35.0, 32.5, 33.5, 29.0, 29.5, 29.9, 33.2, 30.2

ٺاهيل چڪري وسيلي هيٺين سوالن جا جواب ڏيو.

(i) وڏو گرمي پد 34°C کان گهٽ آهي اهڙا ڪيترا ڏينهن آهن؟

(ii) وڏو گرمي پد 34°C يا ان کان وڌيڪ آهي اهڙا ڪيترا ڏينهن آهن؟

(5) هيٺين ڪٽن جي سراسري 20.2 آهي ته p جو ملهه لھو.

x_i	10	15	20	25	30
f_i	6	8	p	10	6

(6) ماڊل هاءِ اسڪول نانديپور جي درجي 9 جي 68 شاگردن قلعي امتحان ۾ حسابن ۾ 80 مان هيٺين نموني مارڪون ڪيون.

70, 50, 60, 66, 45, 46, 38, 30, 40, 47, 56, 68,
80, 79, 39, 43, 57, 61, 51, 32, 42, 43, 75, 43,
36, 37, 61, 71, 32, 40, 45, 32, 36, 42, 43, 55,
56, 62, 66, 72, 73, 78, 36, 46, 47, 52, 68, 78,
80, 49, 59, 69, 65, 35, 46, 56, 57, 60, 36, 37,
45, 42, 70, 37, 45, 66, 56, 47

30-40, 40-50 ڪلاس ڪٿي مٿين حد کان گهٽ گڏيل جهجهائي ورهاست چڪرو ٺاهيو.

چڪرو وسيلي هيٺين سوالن جا جواب لکو

(i) کان گهٽ مارڪون ڪٽندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(ii) کان گهٽ مارڪون ڪٽندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(iii) کان گهٽ مارڪون ڪٽندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(7) مثال 6 جي ڄاڻ ڪڍي 40-50, 30-40, اهڙا ڪلاس ڪٿي هيٺين حد کان وڌيڪ گڏيل جهڳهائي ڇڄرو
 ٺاهيو. ان وسيلي ٻڌايو ته

(i) 70 يا 70 کان وڌيڪ مارڪون ڪٽندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(ii) 30 يا 30 کان وڌيڪ مارڪون ڪٽندڙ شاگرد ڪيترا آهن؟

(8) هيٺ 10 ڪٽن وڌندڙ سلسلي ۾ ڏنل آهن. انهنجو وچون انگ 59 آهي ان مان جو ملهه لھو ان ڄاڻ جي


سراسري ۽ ڊينگه به لھو. 45, 47, 50, 52, x , $x+2$, 60, 62, 63, 74



حسابي مزو



پاسڪل جو ٽڪنڊو



اها عددن جي اڏاوت ٽڪنڊي روپ ۾ آهي ان بيهڪ - رچنا ڪي يا سڪل جو ٽڪنڊو چئبو آهي ان
 بيهڪ جون هيٺيون ٽي سٽون توھان پوريون ڪريو. ان بيهڪ ۾ آڏي قطارن ۾ ايندڙ عدد $(x+y)$ ٻيڙي
 جي قوت نمائن جي وستار ۾ سلسليوار ايندڙ گڻڪ هوندا آهن هيٺيون وستار ڏسو.

$$(x+y)^0 = 1$$

$$(x+y)^1 = 1x + 1y$$

$$(x+y)^2 = 1x^2 + 2xy + 1y^2$$

$$(x+y)^3 = 1x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x+y)^4 = 1x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + 1y^4$$

ان وستار ۾ x ۽ y سگهن ڪي ڇاپيو. ان مان $(x+y)^{10}$ جو وستار لکڻ جي ڪوشش ڪريو.

1. سيت

اڀياس 1.1

- (1) (i) $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$ (ii) $\{2\}$ (iii) $\{-1, -2, -3, \dots\}$ (iv) $\{\text{سا، ري، گا، ما، پ، ڌ، ني}\}$
- (2) (i) $\frac{4}{3}$ سيت Q جو جزو آهي (ii) -2 سيت N جو جزو آهي
- (iii) سيت P جا جزا P ائين آهن جو P اڪي عدد آهي.
- (4) (i) $A = \text{ڪٽي، اسو، ٻڌو، سانوڻ، آکاڙ، ڇيت، ويساڪ، ڇيت، ڦڦڻ، مانگ، پوه، ناهري}$
- (ii) $\{C, O, M, P, L, E, N, T\} = X$ (iii) $\{\text{ڄمڙي، ڇپ، اڻيون، ڪن، ڪن}\} = Y$
- (iv) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} = Z$
- (v) $E = \text{اٽر آمريڪا، ڏکڻ آمريڪا، انٽارڪٽا، آسٽريليا، يورپ، آفريڪا، ايشيا}$
- (5) (i) $\{x | x = n^2, n \in \mathbb{N}, n \leq 10\} = A$ (ii) $B = \{x | x = 6n, n \in \mathbb{N}, n < 9\}$
- (iii) $\{y | y = \text{'SMILE' لفظ جو هڪ اکر آهي}\} = C$
- (iv) $\{z | z = \text{لفظ جو هڪ اکر آهي}\} = D$ (v) $\{y | y = \text{'eat' لفظ جو هڪ اکر آهي}\} = X$

اڀياس 1.2

- (1) $A = B = C$ (2) $A = B$ (3) سيت A ۽ C خالي سيت آهن
- (4) (i), (iii), (iv), (v) محدود سيت (ii), (vi), (vii) لحد سيت

اڀياس 1.3

- (1) (i), (ii), (iii), (v) صحيح بيان (iv), (vi) غلط بيان
- (4) $\{1\}, \{3\}, \{2\}, \{7\}, \{1, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 7\}, \{3, 2\}, \{3, 7\}, \{2, 7\}, \{1, 3, 2\}, \{1, 2, 7\}, \{3, 2, 7\}, \{1, 3, 2, 7\}$ اهڙا ڪي به ٿي
- (5) (i) $P \subseteq H, P \subseteq B, I \subseteq M, I \subseteq B, H \subseteq B, M \subseteq B$ (ii) سيت B
- (6) (i) I, W, N مان ڪوبه سيت (ii) I, W, N مان ڪوبه سيت
- (7) حسابن ۾ 50% کان گهٽ مارڪون ڪٽندڙ شاگردن جو سيت

اڀياس 1.4

- (1) $n(B) = 21$ (2) ڪجهه به نه پيئندڙ شاگردن جو عدد = 5
- (3) ڪل شاگرد = 70
- (4) جابلو چڙهائي ۽ آڪاشي جاچ مان ڪجهه به نه پسند ڪندڙ شاگردن جو عدد = 20
- فقط آڪاشي جاچ پسند ڪندڙ = 20 فقط جابلو چڙهائي پسند ڪندڙ = 20
- (5) (i) $A = \{x, y, z, m, n\}$ (ii) $B = \{p, q, r, m, n\}$
- (iii) $A \cup B = \{x, y, z, m, n, p, q, r\}$ (iv) $U = \{x, y, z, m, n, p, q, r, s, t\}$
- (v) $A' = \{p, q, r, s, t\}$ (vi) $B' = \{x, y, z, s, t\}$ (vii) $(A \cup B)' = \{s, t\}$




گڈیل ایپاس 1

(i) (C) (ii) (D) (iii) (C) (iv) (B) (v) (A) (vi) (A) (1)

(i) (A) (ii) (A) (iii) (B) (iv) (C) (2)

(3) جالھائیندڑ 57, جالھائیندڑ 28, جالھائیندڑ 15

4 (6) 12 (5) 135 (4)



$S \subseteq X, V \subseteq X, S \subseteq X, T \subseteq X, S \subseteq Y, S \subseteq V, S \subseteq T, V \subseteq T, Y \subseteq T$ (8)

$M \cup \phi = M, M \cap \phi = \phi$ (9)

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13\}, A = \{1, 2, 3, 5, 7\} B = \{1, 5, 8, 9, 10\}$ (10)

$M \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}, A \cap B = \{1, 5\}$

$n(A \cup B) = 16$ (11)

2. ایپاس

2.1 ایپاس

(1) ختم ٿيندڙ (i), (iii), (iv) ختم نه ٿيندڙ واراڻتا: (ii), (v)

(i) 0.635 (ii) $0.\overline{25}$ (iii) $3.\overline{285714}$ (iv) 0.8 (v) 2.125 (2)

(i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{37}{99}$ (iii) $\frac{314}{99}$ (iv) $\frac{1574}{99}$ (v) $\frac{2512}{999}$ (3)

2.2 ایپاس

(i) (4) 0.2, -0.3, -0.4 اهڙا بيڪد عدد

(ii) -2.310, -2.320, -2.325 اهڙا بيڪد عدد

(iii) 5.21, 5.22, 5.23 اهڙا بيڪد عدد

(vi) -4.51, -4.55, -4.58 اهڙا بيڪد عدد

2.3 ایپاس

(1) (i) 3 (ii) 2 (iii) 4 (iv) 2 (v) 3

(2) (i), (iii), (vi) غير ناطق (ii), (iv), (v) غير ناطق نه آهن

(3) هڪجهڙا غير ناطق (i), (iii), (iv) علحددا غير ناطق: (ii), (v), (vi)

(4) (i) $3\sqrt{3}$ (ii) $5\sqrt{2}$ (iii) $5\sqrt{10}$ (iv) $4\sqrt{7}$ (v) $2\sqrt{42}$

(5) (i) $7\sqrt{2} > 5\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt{247} < \sqrt{274}$ (iii) $2\sqrt{7} = \sqrt{28}$

(iv) $5\sqrt{5} < 7\sqrt{5}$ (v) $4\sqrt{42} > 9\sqrt{2}$ (vi) $5\sqrt{3} < 9$ (vii) $7 > 2\sqrt{5}$

(6) (i) $13\sqrt{5}$ (ii) $10\sqrt{5}$ (iii) $24\sqrt{3}$ (iv) $\frac{12}{5}\sqrt{7}$

$$(i) 18\sqrt{6} \quad (ii) 126\sqrt{5} \quad (iii) 6\sqrt{10} \quad (iv) 80 \quad (7)$$

$$(i) 7 \quad (ii) \frac{\sqrt{5}}{2} \quad (iii) \sqrt{2} \quad (iv) 62 \quad (8)$$

$$(i) \frac{3}{5} \sqrt{5} \quad (ii) \frac{\sqrt{14}}{14} \quad (iii) \frac{5\sqrt{7}}{7} \quad (iv) \frac{2}{9} \sqrt{3} \quad (v) \frac{11}{3} \sqrt{3} \quad (9)$$

2.4 اڀياس

$$(i) -3 + \sqrt{21} \quad (ii) \sqrt{10} - \sqrt{14} \quad (iii) -18 + 13\sqrt{6} \quad (1)$$

$$(i) \frac{\sqrt{7} - \sqrt{2}}{5} \quad (ii) \frac{3(2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})}{2} \quad (iii) 28 - \sqrt{16} \quad 3 \quad (iv) 4 - \sqrt{15} \quad (2)$$

2.5 اڀياس

$$(i) 13 \quad (ii) 5 \quad (iii) 28 \quad (2) \quad 2 \quad \text{يا} \quad \frac{4}{3} \quad (ii) 1 \quad \text{يا} \quad 6 \quad (iii) -2 \quad \text{يا} \quad 18 \quad (iv) 0 \quad \text{يا} \quad -40 \quad (1)$$

گڏيل اڀياس 2

$$(i) B \quad (ii) D \quad (iii) C \quad (iv) D \quad (v) A \quad (1)$$

$$(vi) C \quad (vii) C \quad (viii) C \quad (ix) A \quad (x) B$$

$$(i) \frac{555}{1000} \quad (ii) \frac{29539}{999} \quad (iii) \frac{9306}{999} \quad (iv) \frac{357060}{999} \quad (v) \frac{30189}{999} \quad (2)$$

$$(i) -0.714285 \quad (ii) 0.8\overline{1} \quad (iii) 2.2360679... \quad (iv) 9.\overline{307692} \quad (v) 3.625 \quad (3)$$

$$(i) \frac{3}{2} \sqrt{2} \quad (ii) -\frac{5}{3} \sqrt{5} \quad (5)$$

$$(i) \sqrt{2} \quad (ii) \sqrt{2} \quad (iii) \sqrt{3} \quad (iv) \sqrt{10} \quad (v) \sqrt{2} \quad (vi) \sqrt{11} \quad (6)$$

$$(i) 6\sqrt{3} \quad (ii) \frac{34}{3} \sqrt{3} \quad (iii) \frac{15}{2} \sqrt{6} \quad (iv) -25\sqrt{3} \quad (v) \frac{8}{3} \sqrt{3} \quad (7)$$

$$(i) \frac{\sqrt{5}}{5} \quad (ii) \frac{2\sqrt{7}}{21} \quad (iii) \sqrt{3} + \sqrt{2} \quad (iv) \frac{3\sqrt{5} - 2\sqrt{2}}{37} \quad (v) \frac{6(4\sqrt{3} + \sqrt{2})}{23} \quad (8)$$

3. گهڻپڌا

3.1 اڀياس

$$(i) \text{ نه آهي، چو ته } \frac{1}{y} \text{ ۾ } y \text{ جي سگهه } (-1) \text{ آهي} \quad (1)$$

$$(ii) \text{ نه آهي چو ته } 5\sqrt{x} \text{ ۾ } x \text{ جي سگهه } \left(\frac{1}{2}\right) \text{ اڻپور آهي.}$$

$$(iii) \text{ آهي} \quad (vi) \text{ نه آهي چو ته } 2m^{-2} \text{ ۾ } m \text{ جي سگهه } (-2) \text{ آهي.} \quad (v) \text{ آهي}$$

$$(i) 1 \quad (ii) -\sqrt{3}, \quad (iii) -\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$(i) x^7 \quad (ii) 2x^{35} - 7 \quad (iii) x^8 - 2x^5 + 3 \quad (3)$$

$$(i) 0 \quad (ii) 0 \quad (iii) 2 \quad (iv) 10 \quad (v) 1 \quad (vi) 5 \quad (vii) 3 \quad (viii) 10 \quad (4)$$

$$(i) \text{ ٻسگهي} \quad (ii) \text{ ليکي} \quad (iii) \text{ ليکي} \quad (iv) \text{ ٽسگهي} \quad (v) \text{ ٻسگهي} \quad (vi) \text{ ٽسگهي} \quad (5)$$

$$(i) m^3 + 5m + 3 \quad (ii) y^5 + 2y^4 + 3y^3 - y^2 - 7y - \frac{1}{2} \quad (6)$$

$$(i) (1, 0, 0, -2) \quad (ii) (5, 0) \quad (iii) (2, 0, -3, 0, 7) \quad (iv) \left(\frac{-2}{3}\right) \quad (7)$$

$$(i) x^2 + 2x + 3 \quad (ii) 5x^4 - 1 \quad (iii) -2x^3 + 2x^2 - 2x + 2 \quad (8)$$

$$(9) \quad x^3 + 9 \quad ; \quad x^3 + x^2 + x + 5 \quad \text{تسڻهي ڳهڻ ٿي ٿو} \quad ; \quad 3x^2 + 5x \quad ; \quad 2x^2 + 5x + 10 \quad ; \quad x^2 \quad \text{بسڻهي ڳهڻ ٿي ٿو} \quad ; \quad x^2$$

$$\text{ليکي ڳهڻ ٿي ٿو} \quad : \quad x + 7 \quad ; \quad \text{ٻڌو} \quad : \quad x + 7, \quad x^3 + 9 \quad ; \quad \text{هڪ ٻڌو} \quad : \quad 2x^2 + 5x + 10 \quad ; \quad \text{هڪ ٻڌو} \quad : \quad x^2$$

3.2 اڀياس

$$(i) a + bx \quad (ii) xy \quad (iii) 10n + m \quad (1)$$

$$(i) 6x^3 - 2x^2 + 2x \quad (ii) -2m^4 + 2m^3 + 2m^2 + 3m - 6 + \cdot 2 \quad (iii) 5y^2 + 6y + 11 \quad (2)$$

$$(i) -6x^2 + 10x \quad (ii) 10ab^2 + a^2b - 7ab \quad (3)$$

$$(i) 2x^3 - 4x^2 - 2x \quad (ii) x^8 + 2x^7 + 2x^5 - x^3 - 2x^2 - 2 \quad (iii) -4y^4 + 7y^2 + 3y \quad (4)$$

$$(i) x^3 - 64 = (x - 4)(x^2 + 4x + 16) + 0 \quad (5)$$

$$(ii) 5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 2 = (x^2 - x)(5x^3 + 9x^2 + 6x + 8) + (8x + 2)$$

$$a^4 + 7a^2b^2 + 2b^4 \quad (6)$$

3.3 اڀياس

$$(i) \quad 45 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad 2m + 7 = \text{ونڊاڀت} \quad (1)$$

$$(ii) \quad 9 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad x^3 + 3x - 2 = \text{ونڊاڀت}$$

$$(iii) \quad 0 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad y^2 + 6y + 36 = \text{ونڊاڀت}$$

$$(iv) \quad 51 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad 2x^3 - 3x^2 + 7x - 17 = \text{ونڊاڀت}$$

$$(v) \quad 200 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad x^3 - 4x^2 + 13x - 52 = \text{ونڊاڀت}$$

$$(vi) \quad 2 = \text{ٻاڇي} \quad , \quad y^2 - 2y + 3 = \text{ونڊاڀت}$$

3.4 اڀياس

$$(1) \quad 5 \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 4a^2 + 20 \quad (4) \quad -11$$

3.5 اڀياس

$$(1) \quad (i) -41 \quad (ii) 7 \quad (iii) 7 \quad (2) \quad (i) 1, 0, -8 \quad (ii) 4, 5, 13 \quad (iii) -2, 0, 10$$

$$(3) \quad 0 \quad (4) \quad 2 \quad (5) \quad (i) 17 \quad (ii) 2a^3 - a^2 - a \quad (iii) 1544 \quad (6) \quad 92 \quad (7)$$

$$(8) \quad 2 \quad (9) \quad (i) \quad (ii) \quad (10) \quad 30 \quad (11)$$

$$(13) \quad (i) -3 \quad (ii) 80$$

3.6 اڀياس

$$(1) \quad (i) (x + 1)(2x - 1) \quad (ii) (m + 3)(2m - 1) \quad (iii) (3x + 7)(4x + 11)$$

$$(iv) (y - 1)(3y + 1) \quad (v) (x + \sqrt{3})(\sqrt{3}x + 1) \quad (vi) (x - 4)\left(\frac{1}{2}x - 1\right)$$

$$(2) \quad (i) (x - 3)(x + 2)(x - 2)(x + 1) \quad (ii) (x - 13)(x - 2)$$

- (iii) $(x - 8)(x + 2)(x - 4)(x - 2)$ (iv) $(x^2 - 2x + 10)(x^2 - 2x - 2)$
 (v) $(y^2 + 5y - 22)(y + 4)(y + 1)$ (vi) $(y + 6)(y - 1)(y + 4)(y + 1)$
 (v) $(x^2 - 8x + 18)(x^2 - 8x + 13)$

گڏيل اڀياس 3

- (1) (i) D (ii) D (iii) C (iv) A (v) C (vi) A (vii) D (viii) C (ix) A (x) A
 (2) (i) 4 (ii) 0 (iii) 9
 (3) (i) $7x^4 - x^3 + 4x^2 - x + 9$ (ii) $5p^4 + 2p^3 + 10p^2 + p - 8$
 (4) (i) $(1, 0, 0, 0, 16)$ (ii) $(1, 0, 0, 2, 3, 15)$
 (5) (i) $3x^4 - 2x^3 + 0x^2 + 7x + 18$ (ii) $6x^3 + x^2 + 0x + 7$ (iii) $4x^3 + 5x^2 - 3x + 0$
 (6) (i) $10x^4 + 13x^3 + 9x^2 - 7x + 12$ (ii) $p^3q + 4p^2q + 4pq + 7$
 (7) (i) $2x^2 - 7y + 16$ (ii) $x^2 + 5x + 2$
 (8) (i) $m^7 - 4m^5 + 6m^4 + 6m^3 - 12m^2 + 5m + 6$
 (ii) $5m^5 - 5m^4 + 15m^3 - 2m^2 + 2m - 6$
 (9) $= 19$ (10) $m = 1$ (11) $\text{ڪل آدمشماري} = 10x^2 + 5y^2 - xy$
 (12) $b = \frac{1}{2}$ (13) $11m^2 - 8m + 5$ (14) $-2x^2 + 8x + 11$ (15) $2m + n + 7$

4. ريشو ۽ پروپورشن

اڀياس 4.1

- (1) (i) 6 : 5 (ii) 2 : 3 (iii) 2 : 3
 (2) (i) 25 : 11 (ii) 35 : 31 (iii) 2 : 1 (iv) 10 : 17 (v) 2 : 1 (vi) 220 : 153
 (3) (i) 3 : 4 (ii) 11 : 25 (iii) 1 : 16 (iv) 13 : 25 (v) 4 : 625
 (4) 4 ماڻهو (5) (i) 60% (ii) 94% (iii) 70% (iv) 91% (v) 43.75%
 (6) ريهانا جي اڄوڪي عمر 8 سال آهي (7) 6 سالن کانپوءِ (8) 18 سال، ماءُ جي عمر 45 سال (9)

اڀياس 4.2

- (1) (i) نمبروار 7, 27, 2.25 (ii) نمبروار 20, 49, 2.5
 (2) (i) $1 : 2\pi$ (ii) $2 : r$ (iii) $\sqrt{2} : 1$ (iv) 34 : 35
 (3) (i) $\frac{\sqrt{5}}{3} < \frac{3}{\sqrt{7}}$ (ii) $\frac{3\sqrt{5}}{5\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{125}}$ (iii) $\frac{5}{18} > \frac{17}{121}$

$$(iv) \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{48}} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{27}} \quad (v) \frac{9.2}{5.1} > \frac{3.4}{7.1}$$

(4) (i) 80° (ii) البرت جي اڄوڪي عمر 45 سال، سليبر جي اڄوڪي عمر 45 سال

(iii) ڊيگهه 13.5 س م، ويڪر 4.5 س م (iv) 124, 92 (v) 20, 18

(5) (i) $x = 5$ (ii) $45 : 7$ (iii) 729 (iv) $2 : 125$ (v) $20, 18$

4.3 اڀياس

(1) (i) $22 : 13$ (ii) $125 : 71$ (iii) $316 : 27$ (iv) $38 : 11$

(2) (i) $3 : 5$ (ii) $1 : 6$ (iii) $7 : 43$ (iv) $71 : 179$ (v) $170 : 173$

(3) (i) $x = 8$ (ii) $x = 9$ (iii) $x = 2$ (iv) $x = 6$ (v) $x = \frac{9}{14}$ (vi) $x = 3$

4.4 اڀياس

(1) (i) 36, 22 (ii) $16, 2a - 2b + 2c$

(2) (i) $29 : 21$ (ii) $23 : 7$ (iii) $x = 2$ (iv) $y = 1$

4.5 اڀياس

(1) $x = 4$ (2) $x = \frac{347}{14}$ (3) 18, 12, 8 يا 8, 12, 18 (4) $\frac{x+y}{xy}$

گڏيل اڀياس 4

(1) (i) B (ii) C (iii) B (iv) D (v) C

(2) (i) $7 : 16$ (ii) $2 : 5$ (iii) $5 : 9$ (iv) $6 : 7$ (v) $6 : 7$

(3) (i) $1 : 2$ (ii) $5 : 4$ (iii) $1 : 1$

(4) (i) ۴ (ii) لڳيتو پروپوشن نه آهي (iii) لڳيتو پروپوشن آهي (iv) ۴ (v) $b = 9$

(6) (i) 7.4% (ii) 62.5% (iii) 73.33% (iv) 31.25% (v) 12%

(7) (i) $5 : 6$ (ii) $85 : 128$ (iii) $1 : 2$ (iv) $50 : 1$ (v) $3 : 5$

(8) (i) $\frac{17}{9}$ (ii) 19 (iii) $\frac{35}{27}$ (iv) $\frac{13}{29}$

(11) $x = 9$

5. ٻن ڦيرائين وارن ليکي مساوتون

5.1 اڀياس

(3) (i) $x = 3; y = 1$ (ii) $x = 2; y = 1$ (iii) $x = 2; y = -2$

(iv) $x = 6; y = 3$ (v) $x = 1; y = -2$ (vi) $x = 7; y = 1$

اڀياس 5.2

- (1) رڀيا 5 جا 30 نوٽ ۽ 10 رڀين جا 20 نوٽ آهن
 (2) $\frac{5}{9}$ (3) ڀرينڪا جي عمر 20 سال، ڊيڀيڪا جي 14 سال (4) 20 شينهن، 30 مور
 (5) سالياني واڌ 3900 ₹، شروعاتي ڀڳهار 150 ₹
 (6) $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 40^\circ$, $\angle C = 50^\circ$ (7) 36 (8) ₹ 4000
 (9) 420 س م (10) 10

گڏيل اڀياس 5

- (1) (i) A (ii) C (iii) C
 (2) (i) $x = 2$; $y = 1$ (ii) $x = 5$; $y = 3$ (iii) $x = 8$; $y = 3$
 (iv) $x = 1$; $y = -4$ (v) $x = 3$; $y = 1$ (vi) $x = 4$; $y = 3$
 (3) (i) $x = 1$; $y = -1$ (ii) $x = 2$; $y = 1$ (iii) $x = 26$; $y = 18$ (iv) $x = 8$; $y = 2$
 (4) (i) $x = 6$; $y = 8$ (ii) $x = 9$; $y = 2$ (iii) $x = \frac{1}{2}$; $y = \frac{1}{3}$ (5) 35
 (6) ₹ 69 (7) هر هڪجي ماهياني اُڀت (8) ₹ 1800 ۽ ₹ 1400
 (9) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (10) (i) 54, 45 (ii) 36, 63
 (11) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (12) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40
 (13) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (14) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40
 (15) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (16) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40
 (17) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (18) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40
 (19) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40 (20) ڪ م / في ڪلاڪ 30، ڪ م / في ڪلاڪ 40

6. مالي رٿا ٺاهڻ

اڀياس 6.1

- (1) ₹ 1200 (2) ٻئين سال کانپوءِ موڙي ₹ 42,000، مول (شروعاتي) موڙيءَ تي 16 نقصان ٿيو
 (3) ₹ 50,000 ماهياني اُڀت (4) شري فرنانڊر (5) ₹ 25,000

اڀياس 6.2

- (1) (i) ٽئڪس نه ڀرندي (ii) ڀرندي (iii) ڀرندي
 (iv) ڀرندي (v) نه ڀرندي
 (2) ₹ 9836.50

گڏيل اڀياس 6

- (1) (i) A (ii) B (2) اُڀت 8750 ₹
 (3) هيرالعل جو فائدو 36.73، رمٽيڪ لعل جو فائدو 16.64، هيرالعل
 (4) 12.5% (5) ₹ 4,00,000 (6) ₹ 99383.75

₹ 36000 پريٽيءَ جي بچت ; ₹ 51000 سرپش جي بچت ; ₹ 48000 رميش جي بچت (7)
 ٽئڪس نه آهي. (iii) ₹ 7500 (ii) ₹ 213000 (i) (8)

اڀياس 7.

اڀياس 7.2

(1) بنيادي ڄاڻ (v), (iii), (i) بئين درجي جي ڄاڻ : (iv), (ii)

اڀياس 7.3

(1) هيٺين ڪلاس حد = 20، مٿين ڪلاس حد = 25 (2) 7-13 (3) 37.5

اڀياس 7.4

(3) 62 (iv) 19 (iii) 3 (ii) 38 (i) (4) 43 (iv) 43 (iii) 3 (ii) 24 (i)




اڀياس 7.5

(1) 7 ڪئٽل (2) 74 (3) 100 (4) ₹ 4900 (5) 75 گرام
 (6) سراسري = 3، وچون انگ = 3، ڍنگهه = 4 (7) 78.56 (8) $x = 9$ (9) 20 (10) 70
 (11) 34.25 (12) 37 ڪڍ (13) 2 (14) 35 ۽ 37

گڏيل اڀياس 7

(1) (i) C (ii) B (iii) D (iv) B (v) A (vi) D
 (vii) B (viii) A (ix) C (x) C
 (2) ₹ 26000 (3) ₹ 127
 (4) (i) 24 (ii) 06
 (5) $P = 20$
 (6) (i) 66 (ii) 14 (iii) 45
 (7) (i) 11 (ii) 68
 (8) $x = 52$, سراسري = 55.9، ڍنگهه = 52





- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.




पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.



ebalbharati





विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर - ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९५५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपूर - ☎ २५४७७९६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५



$$x + y = 4$$

$$2x + 3y = 3$$

$$x = \square, y = \square$$



महाराष्ट्र राजीव पाठक पुस्तक

नरमती वा अपिपासकर्म

सन्शुदन मन्डल, पृथ्वी.

सिन्धी (अरे.) गणित इ. ९ वी भाग-१ ₹ 64.00

